





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4869/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4869/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4869/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4869/A

4869/A

A xix. o

55450
PAVLI AEGI-
NETAE MEDICI

OPERA,

*

A' IOANNE GVINTE

rio Andernaco Medico exercitatissi-
mo summiq[ue] iudici[um] conuersa,

Joanne & illustrata com-
mentarijs. *Joanne*

Adiectæ sunt annotationes IACOBI GOV-
PYLI medici Parisiensis, in aliquot sin-
gulorum librorum capita.

10.
I
N
V
I
R
T
U
E



E
T
F
O
R
T
U
N
A.

LVGDVN I,


Apud Guliel. Rouillium sub scuto Veneto.

M. D. LI.

Cum Privilegio Regis.

Antonius Laribeyrie D.m

EXTRAICT DES LET-
tres du priuilege du Roy.




A R grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, de imprimer, ou faire imprimer vne foys ou plusieurs, les œuvres de PAVLVS AEGINETA en Latin, avec les corrections & annotations de Monsieur M. IAQVES GOVPIL Docteur en Medecine, que ledict Rouille a recouertes depuis quelque temps en ça. Et faict defences de par ledit seigneur, à tous autres libraires, imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, ne faire imprimer, vèdre ne distribuer, en les pais, terres & Seigneuries, lesditz liures de PAVLVS AEGINETA, avec lesdictes annotations & correctiōs, sans le vouloir & consentement dudit Rouille: sur les peines contenues esdictes lettres de priuilege: & ce iusques au temps & terme de six ans, à compter du iour & datte que sera paracheuée la premiere impressiō: comme plus à plein est contenu esdictes lettres de priuilege, sur ce données à Saint Germain en Laye le xj. iour de septembre, Lan de grace M. D. L.

*Par le Roy, l'Euesque de Bayonne, Maistre des
Requestes ordinaire de l'hostel present.*

Signé Guyncau:

*Et seelé du grand seau, en cire
jaune, à simple queue.*



AD ILLVSTRIS.
ET REVERENDISS.

CARDINALEM D. O. COLLI-
GNIVM CASTILLIO-

NAEVM,

*


IACOBI GOPYLI MEDI-
CI PRAEFATIO.




*V*M apud me reputo, qua ratione doctissi-
mi quidam homines medendi artem, eiusq;
scriptores restituere nō ita pridem aggressi
sunt, eandem illos viam, qua qui artes pri-
mum constituerunt, tenuisse video. Nam
prisci earum inventores & quasi architecti, parua quaedam
initia posuerunt, quibus noua in singulos dies posterī adstruē-
tes, quod inchoatum tantum erat, perfecerunt. neq; enim ar-
tes & disciplina tam perfecte absolui potuissent, nisi multi ad
eam rem certatim operas suas contulissent. Quod Hippocrates
quoque significare videtur, nō solum inueniri artes in hoc tam
exiguo, tamque breui vitae momento non posse, sed ad discen-
dum, quae ab alijs inuenta sunt, breuem hanc vitam esse, dicti-
tans. Huius autem rei fidem ex historia facere nobis licet, ar-
tium initia cogitantibus. Et ne longius abeamus, rudis initio
& vulgaris medicina fuit, ut imperitissimae etiam gentes
herbas, aliāq; prompta in auxilium vulnerum morborū-
que nouerint, veruntamen apud Gracos vetustissimus auctor

Aesculapius eam excoluit, ut ob diuinum illud beneficium,
quo genus hominum affecerat, in Deorum numerū receptus
sit. Eius deinde duo filij Podalyrius & Machaon bello troia-
no ducem Agamemnonem sequuti, non mediocrem opem cō-
militionibus suis attulerunt: quos tamen Homerus non in pe-
ssilentia, neque in Vargis generibus morborum aliquid auxi-
lij attulisse, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamē-
tis mederi saluos esse proposuit. Post eos nonnulli clari viri me-
dicinam exercuerunt, donec maiore studio literarum discipli-
na hac agitari, & pars sapientiae haberi cepit: ut & morbo-
rum curatio & rerum naturae contemplatio sub iisdem aucto-
ribus nata sit, ideoque multis ex sapientiae professores perito-
tos huius fuisse accepimus: clarissimos vero ex his Pythago-
ram, Empedoclem & Democritum, cuius (ut quidam credi-
derunt) discipulus Hippocrates Comis vir arte & facundia in-
signis, primus quidem ex omnibus memoria dignis artem
hanc diligenter exercuit, & per eum salutaris ista nobis pro-
fessio multum increuit. Post quem Diocles Carystius, deinde
Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus, & Erasistrat-
us eam horridam adhuc sic excoluerunt, ut magnum
splendorem ei accersuerint, qui cum aliquandiu luxisset, desi-
nentibus praesertim Graecorum scholis obsoleuit, ut non minor
postea opera ad restituendum huic arti nitorem suum confe-
renda fuerit, quam studium in ea absolueda positum fuerat.
& certe nisi viri quidam egregie cordati intra hos centum
annos in eo euigilassent, ut rei medica auctoribus a prioribus
seculis male habitis opem aliquam ferrent, nulla aegris medi-
cina salutariter adhiberetur, quanquam hi quidem efficere
non potuerunt ut in medicorum libris, quasi in tenebris homi-
nes praesertim parum videntes nihil offenderent. Quod ta-
me in ea parte accipi velim, ut nemo me illis insultare putet.
Pro magno enim illo beneficio, quo vniuersam tūp & iuxta pōv
natio

nationem affecerunt, maximas ijs gratias agēdas & habē-
 das iudico. Nam & nisi Timotheus (quemadmodum Ari-
 stoteles ait) fuisset, non haberemus tam absolutam musicam:
 & nisi Phrynis eum antecessisset, talis non euasisset: ita nisi
 principes illi viri viam ad huius auctoris lectionem, tanquam
 ad inaccessam antea locorum difficultatibus regionem, muni-
 uissent, labor Herculis hic exantlandus fuisset, atque stabulum
 quoddam Augiæ repurgandum, tantum abest, ut hoc bel-
 lum à me profligatum & confectum dicam: tamen quod à
 me præstitum est non leuem victoriam iudicabunt hi, qui
 multos huius auctoris locos, peruersos & conturbatos, à nobis
 restitutos atque explicatos intelligent. Quem laborem eò lu-
 bentius suscepi, quod cum ab hinc tres annos Alexandri
 Tralliani libros ex Regia Bibliotheca depromptos emēdassent
 atque edidissent, sic studium hoc meum doctis quibusdam ho-
 minibus, qui mihi pro centum millibus sunt, probari, ut ni-
 hil tam artis medicæ studiosorum interesse censuerint, quàm
 ætatis illius auctores restituere, in qua naturalis nitor medici-
 næ inerat, non fucatus. Ad te verò patrone benignissime
 quod commentatus sum ob eam maxime causam mit-
 tere volui, ut nihil mihi antiquius esse intelli-
 gas, quàm ut tuæ voluntati paream, hoc
 est, ut ex hoc otio, quod mihi tua
 benignitate cōrigit, aliquid
 ad communem fru-
 ctum afferam.
 Vale.





AD HONORA-
TISSIMUM VI-
RUM IOANNEM
BELLAIUM CARDI-
NALEM ET EPI-
SCOPUM PA-
RISIEN-
SEM,

*

IOANNIS GVINTERII
*Andernaci Medici in Paulum
Aeginetam præfatio.*

*



QVAM olim Pauli Aeginetæ
interpretationem latinam
tibi dicaui, vir honorate, &
omni dignitate princeps, eā
rursus maiore nunc cura, &
fide ad vetusta exemplaria,
ipsiusq; artis rationem exa-
ctam, recognitamq; ac bre-
uibus quibusdam commentariis illustratam offe-
ro: non dubitans, quin illam eo sis animo exceptu-
rus, quo olim veluti rudimenta, & prima operum
nostrorum exercitia solebas. Hoc autem nomine
potif

potissimum offero: vt egregiis tuis in me beneficiis, literata quadam remuneratione, ac debita beneuolentiæ memoria gratiam reponam. Tu siquidem iuuentutis nostræ studiis ad optimas quasque artes celebrandas, recolendasq; fauere nunquā destitisti: per te labores nostri, qualescunque in Græcis medicinæ autoribus suscepti, clarissimo Francorum Regi Francisco innotuerunt. Vnde mihi non vulgaria præmia, & data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad gratiam. Ergo quicquid à me vnquam exactius eruditiusque prouenerit, id omne iure tibi optimo debere me libenter agnoscam. Cui enim potius aliquis otij sui fructum acceptum referre poterit, quàm Mecœnati suo, & patrono, ei que eruditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub cuius etiam nominis celebritate, & patrocinio tutior, à maleuolis, & vitilitigatoribus esse possit. Nam hodie ita comparatum est, vt statim vbi quis ingenij sui fœturas magno partas sudore in publicū ediderit, nonnulli malefieriati homines, acutius atq; acrius vitia quàm recta videant: autori potius, quàm codicum deprauationi ascribentes, quanquam nullius hætenus fuerit philosophiæ, aut medicinæ interpretes, quem non sæpius aberrasse demonstrare possem. Nullus autem labor in disciplinis veteribus instaurandis, magis quidē negotii, & molestiæ plenus, minus autē auctori gloriosus suscipi queat, quā qui in autoribus cōuertēdis insumitur. Id quod ego annis iā sat multis experior, dū cōmunibus hominū studiis & publicæ vtilitati prodesse cogito. Cū enim olim Lutetiæ

medicinam publicè docerem, non paucos obiter
Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinitate
donavi, ac in hoc præsertim excudendos permisi:
primum vt amicis aliquot gratificarer: deinde vt
haberē ex veteribus medicis, quos studiosis præ-
legerem. Eos tamen libros ex tempore sic potius
quàm cura translato, interim per interualla reuiſe-
re, ac recognoscere decreueram, maius aliquando
otium, & meliorum codicum exemplaria nactus,
sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-
to. Inter cæteros Paulum quoque Aeginetam,
excellentem medicinæ scriptorem, annis mille de-
sideratum, primus integrum latinum facere sum
aggressus: ea sanè causa & ratione, vt post ampla
illa Galeni theoremata compendiosum aliquem au-
thorem scholæ nostræ haberent, ex quo meden-
di rationem, quam practicem vocant, fideliter con-
discerent. Paulus siquidem omnes recentiores à
Galeno citra controuersiam compendio, ordine,
artificio, perspicuitate, & doctrina superat. Adde
quòd multa eruditè tractet, aliis aut intacta, aut
etiam incognita. Quid de parte chirurgica di-
cam? quam ita feliciter & dilucidè persequitur, vt
Auicenna ille Arabicæ familiæ princeps non pau-
ca in suum librum mutuare sit dignatus. Porro
quòd ad partes meas attinet, in hisce septem Pau-
li libris plurimum laboris mihi subeundum fuit,
tum exemplarium vitio, quamuis tria contige-
rint diuersa, tum quòd in Chirurgica vel instru-
mentorum nomine difficillima, nulli fere Latini
autores habeantur, quos tutò queas imitari. Quip-
pe is

pe is semper mihi in vertendis Græcorum monumentis fuit animus, vt præter fidem, purè omnia Latine & planè quoad eius fieri potuit, exprimerem. Quanquam hodie multos agrestes hircosósque philosophos, si diis placet, videre liceat, quos impolita, & rudia magis delectant. Ex horum numero nonnulli grauiores disciplinas exponere aggressi, vocabulis sordidis, & à politiore humanitate alienis fœdarunt, contaminaruntque. Vnde fit, vt qui paulò humanius educati, institutique sint, non reformident illas adeò sed fugiant, oderint, & despiciant: cùm magis referret egregias mentes, præclaræque ingenia, sermonis venustate, & elegantia, ad seueriores illas, vt ita dicam, matronas allicere. Quod an nos in hoc opere præstitimus, aliorum esto iudicium: certe sedulò conati sumus. Vale vir clarissime apud Mediomatri-

ces.

*

a s





PAULI AEGI-
NETAE PERIODE
VTI IN SVVM DE
RE MEDICA
OPVS,

PRAEFATIO.

*Pauli laborem nosce me, qui plurimas
inuisit orbis terras, Aegina satus.*



NON EQV IDEM opus hoc, quasi veteres aliqua arti necessaria pratermiserint, componere sum aggressus, sed totam v^t disciplinam in compendiu^m redigerem. E^t contrario enim illi recte quidem omnia & integre elaborauerunt: recentiores autem praterquam quod illos ne legere quidem curant, etiam loquacitatis adhuc coarguunt. Quare ratione impulsus volumen istud elucubraui, quod illis sane qui ipsum, vt verisimile est, habere velint, eorum qua^m legerunt commentarius, mihi vero exercitij loco erit. Absurdum nanque fuerit rhetoras quidem compendiosis vti libellis iudicialibus, & ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita continentur, vt dum vsus postulat, in promptu habeant, nos vero, nullam eorum habere rationem: quum illis non pauco tantum, sed iam longo etiam tempore, legibus inspiciundis immorari, ac differre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe raro ea facultas concedatur. Etenim necessitas in quibusdam morbis frequenter nullam ferens dilationem, subitam concertationem opemq^{ue} postulat. ob quod recte Hippocrates occasionem dixit praecipitem.

P R A E F A T I O.

tem. Illos præterea in solis ferè vrbibus rerum vtilitas incitat, & vbi libri nequaquam desiderantur: medicis autem non tantum in vrbibus, aut agris, aut etiam locis desertis, verum iam quoque per mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert discrimen. Quoniam igitur vniuersas medendi rationes, aut particularem omnem materiam memoria tenere vel difficillimè, vel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex veteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & visa & comperta. Nam in pluribus egregiis authoribus, magisquæ in Oribasio versatus, qui & ipse librum totum, quo vniuersam de tuenda valetudine rationem comprehendit, aliunde collegit: vtpote Galeno posterior, adeoque recentior adhuc, optima quæque ex ipsis selegi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Et enim Oribasij ipsius volumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomēcontabiblon appellatum, quod totam in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustatium scripta, præterquàm quod plerique morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem videas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam venerint.

P R A E S E N S autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, simularium, instrumentariorum, & eorum quæ ad vnitatis diuortium pertinent: idque non summatim, sed quatenus licet amplè & diffuse. Ante hæc autem omnem victus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositisque medicamentis conscripsimus.

*Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem
habentur, contineant.*

P R I M V S omnem sanitatis tuendæ rationem tradit. item quomodo morbi peculiaries ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisque nonnullis, caueantur, emendenturque. Præterea ciborum omnium vires & vsus habet, vt in capitibus comprehensum est.

I E C

P R A E F A T I O.

S E C U N D U S febreis vniuersas enumerat, ita vt præponantur ipsi, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretoriis, & id genus alia. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

T E R T I U S affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt sic vt à summo capite ad imos pedes, adeoq; vngueis descendat.

Q U A R T U S agit de exterioribus, & veluti in aperto contractis vitis, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestant. In quo & de tinea & dracunculis tractatur.


Q U I N T U S de animalibus ictu, morsuue venenum relinquentibus differit, vbi & de rabiosi canis morsu, & metu aquæ, adhuc de non rabidi canis morsu hominisq; agitur. Inibi de venenis eorumq; remediis disputatur.

S E X T U S chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis vitia curat, vbi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ ossium fracturas, luxationesq; artuum completur.

S E P T I M U S omnium medicamentorum vireis continet, primum quidem simplicium, deinde & compositorum, eorumq; potius quæ in sex aliorum librorum discursu commini, præsertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim illic non omneis diffusè explicari, ne disciplina tadium afferat: tum, vt quærens aliquis vnâ, aut etiam plureis nobileis confecturas, facile inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamentorum compositiones utilia. Item de alternantibus inuicem remediis agitur, vt totus liber in disciplinam de ponderibus & mensuris desinat. Incipiemus itaq; primum volumen.

P R I M U S totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est, dicenturq; iterum capita, vbi tantum hoc prælibauerimus, quod in primo, & secundo volumine plurima ex Oribasio mutuati sumus. Non enim peculiarem volumus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius commentariis huc transtuli.

C A P I



CAPITA PRIMI LIBRI.

*



QV AE grauidis superueniāt, & quæ victus ratio con- ducat.	cap.1
De nutrice.	cap.2
De lacte nutricis.	cap.3
Quomodo lac vitiatū cor- rigatur.	cap.4
Educatio pueri.	cap.5
De pustulis puero obortis quæ exanthemata di- cuntur.	cap.6
De tussi & grauedine pueri.	cap.7
De pruritu gingivarum.	cap.8
De dentium ortu.	cap.9
De oris vlceribus, quæ aphthæ dicuntur.	cap.10
Ad femorum intertrigines.	cap.11
Ad aures humentes.	cap.12
De Syriasi.	cap.13
Ratio victus infantium, atq; reliquarum deinceps ætatum ad vsq; declinantes.	cap.14
De frictione præparatoria quæ parasceuaſtice di- citur.	cap.15
De exercitatione.	cap.16
De ex	

C A P I T A

De exercitationum generibus.	cap. 17
De generibus frictionum.	cap. 18
De vocis exercitatione.	cap. 19
De lassitudinibus ob exercitationem.	cap. 20
De cute astricta.	cap. 21
De spontaneis lassitudinibus.	cap. 22
Ratio victus senum.	cap. 23
De rugoso corpore.	cap. 24
Qua ratione corpus suauiter oleat.	cap. 25
Quomodo habitus recalescat.	cap. 26
Quomodo color malus emendetur.	cap. 27
Ad liuores.	cap. 28
Quomodo dentes ab iniuria asserantur.	cap. 29
Quomodo grauis auditus corrigatur.	cap. 30
Ad oculorum caligines.	cap. 31
De repletione.	cap. 32
De ebrietate.	cap. 33
Quibus cibi corrumpuntur.	cap. 34
De Venere.	cap. 35
Ad eos qui venerem exercere nequeunt.	cap. 36
De iis qui immodicè coierint.	cap. 37
Si semen genitale redundet.	cap. 38
Si perfriçtio nocuit.	cap. 39
Si insolatus adussit.	cap. 40
De pituita in superiore ventriculo redundante.	
cap. 41	
Quomodo facilè quis vomat.	cap. 42
Quæ fanis aluum subducant, & quæ vrinam moueant.	cap. 43
De clysteribus.	cap. 44
De glandibus.	cap. 45
	De iis

P R I M I L I B R I .

De iis quæ per os, & nareis caput euacuant : quæq; eisdem partibus delinuntur.	cap. 46
Quæ menses ducunt.	cap. 47
Quæ sudorem mouent.	cap. 48
De aëre.	cap. 49
De aquis.	cap. 50
De lauacris.	cap. 51
De balneis naturalibus.	cap. 52
Quæ victus ratio quolibet anni tempore fit utilis.	cap. 53
Victus eorum qui in laboribus vitam agunt.	cap. 54
Proficiscentium victus ratio.	cap. 55
Nauigantium victus.	cap. 56
Quomodo extenuetur corpus.	cap. 57
Quomodo tenues impleantur.	cap. 58
De partium attenuatarum curatione.	cap. 59
Optimi temperamenti notæ.	cap. 60
Intemperatorum corporum notæ.	cap. 61
De capitis formatione.	cap. 62
Temperaturæ cerebri notæ.	cap. 63
Ventriculi temperaturæ notæ.	cap. 64
Pulmonis notæ.	cap. 65
Cordis notæ.	cap. 66
Iocinoris temperaturæ notæ.	cap. 67
Testiculorum temperaturæ notæ.	cap. 68
Quæ prætermiffa sunt.	cap. 69
Quomodo calida intemperies corrigatur.	cap. 70
Quomodo frigida intemperies emendetur.	ca. 71
Quomodo	

CAPITA I. LIBRI.

Quomodo sicca intemperies in ventriculo veluti exemplo, deinde & alia corrigantur.	cap. 72
De alimentorum facultatibus.	cap. 73
De oleribus.	cap. 74
De asparagis.	cap. 75
De radicibus quæ cibi rationem obtinent.	cap. 76
De tuberibus & fungis.	cap. 77
De frumentaceis.	cap. 78
De leguminibus.	cap. 79
De fugacibus fructibus.	cap. 80
De arborum fructibus.	cap. 81
De animalibus, & primò de volatilibus.	cap. 82
De ouis.	cap. 83
De terrestribus animalibus.	cap. 84
De partibus animalium.	cap. 85
De lacte, & terrestrium sanguine.	cap. 86
De lactis potione.	cap. 87
De lacte scissili.	cap. 88
De caseo.	cap. 89
De piscibus.	cap. 90
De testaceis.	cap. 91
De malaciis.	cap. 92
De cartilagineis.	cap. 93
De cetaceis.	cap. 94
De vini viribus.	cap. 95
De melle & mulsa.	cap. 96
De somno.	cap. 97
De vigilia.	cap. 98
De sopore.	cap. 99
Dioclis epistola, ad valetudinem tuendam conscripta.	cap. 100

P A V L

P A V L I A E G I-
N E T A E L I B E R P R I

M V S, I O A N N E G V I N-
T E R I O A N D E R N A C O

M E D I C O I N T E R-

P R E T E.

*

*Quæ grauidis superueniant, & quæ victus ratio
eis conducatur.* C A P. I.



VANDOQ V IDEM inter ea
quæ grauidis superueniunt, hæc
potissimū infestare solent, sto-
machi exundatio, continua vo-
mitiones, sputa crebra, oris vē-
tricoli rossi, & cibi fastidiū: non
alienum fuit remedia quibus ab
eis vindicentur, præscribere.
Profunt itaq; obambulationes,
cibi non nimium dulces, vina

fulua, odora, maxime quinquennia, & moderata potio. Hæc
enim omnia ne mulier stomachi exundationem experiatur
vomatq; impediunt. At medicamenti nomine, vincit poly-
gonium herbam aqua elixam bibere. item anethum & pon-
ticam radicem, quæ indigeti vocabulo rha nuncupatur, hæc
tum ante, tum post cibū licet assumere. Extrinsecus præcor-
dia adiuuari debent cataplasmate ex ænanthe balaustio,
† cythi smyrniq; coma, & fœniculi semine, siue per se, siue
quomodocūq; voles miscere, cū palmulis & vino veteri, Ad-
uersus stomachi rosiones confert, calidā aquā bibere, quiete
inambulare, præcordia contegere lana molli. At eas quæ ci-
bum fastidiunt, variis & ad voluptatem quæsitis cibis amy-
loq; sicco sollicitabis. magis autē hoc obruleris iis quæ ter-
rā edere cōcupiscunt, vt in malacia, quod viciū Græcis Citta
dicitur, accidere cōsuevit. id tertio à cōceptu mense potissi-

PAULI AEGINETAE

mum contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimentum ad ipsum fertur, tanquam imbecillius, nequit consumere, unde fit, ut quum varia ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundet, varia & naturæ aliena appetat, exempli gratia, carbonem extinctum, cretam Cimoliam, aliaque; complura. Hanc enim ob causam appellationem huiusmodi affectus accepit, vel à picæ anis varietate, vel quod eadem subinde hoc malo corripiatur. Iam labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat. Quæ verò mulier citra labores agere consuevit, ea si uterum gerat, haud commode repentinas subibit motiones. Verum acris quandoque gustare, præsertimque sinapi, cibum fastidienti non fuerit alienum. Ceterum eximios pedum tumores, quos ordemata Græci dicunt, anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaque; brassicæ in latum super deligata discutiunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cum aceto proficit. Rectè etiam pedes malorum medicorum, quæ Citria aliàs dicuntur, in aqua decoctorum iure lauantur.

† Hic locus sic legitur in veteribus libris manuscriptis, ἡ δὲ δι-
vάρδῃ. ἢ βαλάντιον. ἢ λυγρὸν. ἢ οὐροῦ λίαν. ἢ παρὰ τὴν σπῆματι,
λοιπὴ τὴν ὥσπερ πλεῖστον ἰδιότης πῆλῃ ποτίσας, ἢ λίαν ὡραίας κατὰ
πλάτος, &c. Quæ lectio magis probatur, quod cytiæ accommodatior
sit huic medicamento, quam cytisus.

De Nutrice.

CAP. I I.

DEligi nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec vetula nimium, nec adulescens, ita ut iunior quinq; & viginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neque coniuventibus neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multo antè pepererit, maiusque, si masculum. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, salia, acris, acerba, acida, amara, & validè calefacientia. Item odores ruri fædi, tum suaves præter modum, condimenta, aliaque acris nocent. Ad hæc venire nutrix abstineat, manus humerosque molendo texendoque; exerceat: puerum vlnis gestet, treis iam menses quatuorve natum.

De lacte Nutricis.

CAP. I I I.

Laudatissimum lac est, moderatum spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Commendatur & quod in vnguem

quem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neq; subito neque tarde videtur defluere. Iam verò in hunc modum probari potest: infuso lacti in vas vitreum coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. in quo postquam cōcreuerit, inspicietur, num casei portio minorquàm serum fuerit. hoc enim lac inutile est: contrarium huic, concoctu contumax: probatissimum quod vtraq; habet mediocria,

Quomodo lac vitiatum corrigatur.

CAP. II II.

Lac vitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, qui optime oxymelite epoto citatur: laboribus etiam cibum præcedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum, hyssopum, satureia, scandix & thymus, item raphani momentum, vetusq; salsamentum cum oxymelite. At si acrius tenuiusque lac euaserit, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæque & vini dulcis potu, reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, vinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Iisdem cucurbitula quoque defixa abundè præstiterit. Medicamenta verò etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis vti præceperim, ut quæ violentius consumant. est autem fœniculi radix, & semen, ptisanæ incoctæ: item cytisi folia ex vino nigro aut ptisana: melanthium in passo & anethum, pastinacæ radix atque semē, quæ calida prius irroratis admouenda sunt. Omni verò lacte vitioso, siue crassum, siue acre fuerit & fœtidum, prius emulcto, puer mamillis admouendus est. Lac autem acre nunquam ieiuno adhiberi debet, fœtorem eius vinum odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio volumine in capite de mamillis tractabimus,

Educatio pueri.

CAP. V.

Primum infans recens natus melle nutriri debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum ter, cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc iam & cibus solidior rectè datur qui non ipsum repleat. At si fortè imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim &

torpidus magis euadat, venter intumescat, inflaturque, & urinae aquosiores reddantur, quae repletionis notae sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abundè autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

De pustulis puero obortis quae Exanthemata dicuntur.

CAP. VI.

Pustulis quae quòd puero per cutem veluti efflorescunt, Graeci *Exanthemata* nominant, primum sanè nullū facessere negotium oportet, vbi verò probè ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus iniiciantur myrtum aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino vtendū: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit: nam valentiora non sustinebit. Optimum verò est nutricem dulciori victu vri. Laudatur autè maxime si puer etiam ipse neq; plenior, neq; nimis tenui cibo alatur. At si venter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquerere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris iniicies. Humectata aluo, milium potissimū offerre conducit.

De tussi & grauedine pueri.

CAP. VII.

Quod si quandoque tussicula aut grauedo puerū affligat, melitismi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore aqua calida loto caput ipsius melle copioso calido illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituitæ vomitu egeret.

† *De gingiuarum pruritu.* CAP. VIII.

Purientibus gingiuis fomento vtendum est, & liberali vunctione ex oleo discocto, in quo ceræ momentum cliquatum sit.

† *In margine alterius exemplaris manuscripti hæc verba leguntur, ὁ δὲ ξανθὸς ἐστὶν ὡς πικρὸν τὸς οὐκ ἐστὶν τοῖς οὐκ ἐστὶν ἐπὶ τοῖς οὐκ ἐστὶν ὁ δὲ ξανθὸς ἐστὶν ὡς πικρὸν τὸς οὐκ ἐστὶν τοῖς οὐκ ἐστὶν. Id est, Odax es mus est supernacanea quedam caro adnata gingiuis similis dentibus.*

De dentium ortu.

CAP. IX.

Dentiunt septimo quidem mense pueri: experiuntur autem tunc inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, aliquando etiam cōuulsionones. Tunc igitur puero nihil dandum, quod mādī postulet. digito autem in lauacro gin

gingiuæ continenter contrectari, & gallinaceo adipe vel leporis cerebello emolliri debet. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis lanis puris contegentur, oleoque dulci & calido fovebuntur: idemque meatibus auditoriis instillabitur. Cæterum plenius infantem tunc alere, & calida lauare oportet: & si alui profluuiū experiatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipuè sistunt, contrahere, inspergendo lanæ cuminum, aut anethum, aut apium.

Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summum † calidè desiccare. At si venter nihil reddit, melle in glâdis figuram coacto inferius leniter irritabitur, aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puero-
rum optimè videtur auxiliari heliotropium in aqua elixū, si puer in hac lauatur. confert & irino aut cyprino, & sycio-
nio perungere, & vniuersum calefacere. Cum autem exortis
dentibus digitos mordet vulneratque, bene faciet radicem
iris derafam, nec admodum siccam, ore cōtinere. Hoc re-
medium vlceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum mel-
le illitum adiuuat. Gingiuarum autem pruritus, veteris sal-
samenti caro lenit.

† In veteri codice hoc loco duplex est scriptura: prior enim ηγεὶ ὀλως
δερμαίναν ηγεὶ ξηραίναν. Posterior ηγεὶ δερμῶ ξηραίναν, calido de-
siccare.

De oris vlceribus quæ Aphthæ dicuntur.

C A P. X.

Oporitur puero etiam vlcus quod aphtha vocatur, nunc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigre scæ, quod omnium periculosissimum & lethale est. Remedio erit, iris cum melle, & sicca inspirata. Item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdē, & simul & priuatim singula melle tincta: adhæc mulsa, & mali punici dulcis succus proficit.

Ad femorum intertrigines.

C A P. XI.

Femorum intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuant.

Ad aures humentes.

C A P. XII.

Avriū humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsum, aut vinum vetus instillatum, aut crocum ex vino detritum, desiccant.

SYriasis, est inflammatio partium circa cerebrum eiusque membranas: concavum in ea sit sinciput, concavi itidem cum pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas. Succurrit huic malo vitellus oui sincipiti cum rosaceo, tomenti modo impositus: sic tamen, ut continuè renouetur.

Aliud ad Syriasim.

† Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci heliotropion, latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta, eucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem, aut hortensis solani succum cum rosaceo.

† In veteri codice hic locus sic legitur, κατὰ τὴν βέρυματος ἰπιδιόγαν καὶ ἀνίσποιν καὶ τὴν καλαμίναν. sed legendum suspicamur ut est apud Aetium καλίσποιν καὶ τὴν καλαμίναν, id est, heliotropij quod scorpiuron vel scorpioides dicitur.

*Ratio vultus infantium atque reliquarum deinceps
ætatum, ad vsque declinantes.*

POSTEA quàm lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis modo & suo ingenio hilariter vivere permittemus: exercitia autem & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septimo, tum pueri, tum puellæ, literatoribus blandis humanisque tradentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent. Animi autem relaxatio ad probam corporis educationem plurimum adfert momenti. Duodecimum annum egressi, ad grammaticos iam & geometras mittendi sunt, corpûsque eorum exercere oportet. A quartodecimo vsque ad primum & vigesimum, mathematicis disciplinis & sapientiæ studio incumbent: exercitiis pluribus propter corporis robur credentur, ut & animo & corpore laborantes, à libidinis impetu coerceantur: his etiam vinum circuncidendum est. Aetate florentibus educatio absoluta tum animi, tum corporis congruit. eoque exercitiis omnibus, præsertim quibus quisque assuevit, utendum cibo pleniori & valenti. Declinantibus autem remissa competit & animi & corporis educatio. Exercitia enim qualiacunque fuerint pro horum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut quorum habitus iam frigescere incipiat.

De

De frictione preparatoria, quæ parascenastice dicitur.

CAP. XV.

ANte exercitationem corpus mediocriter calefacere oportet frictione linteis adhibita, deinde nudis manibus oleo intinctis perfricare, usque dum bene incalescat emolliaturque, colore viuido rubescat, & in tumorem attollatur.

De exercitatione.

CAP. XVI.

EXercitatio motus est vehemens: vehementiæ autem finis est, respiratio crebra. Id verò cōmodi præstat, quod parteis instrumentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis validas: præterea ut alimenta fortius attrahant, promptius immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde quod meatus expurget, recrementa, propter validam spiritus motionem, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, non debet crudi incoctique, siue cibi siue humoris copia, in ventre, aut vasis contineri. periculum enim est, ne priusquam probè fuerint concocti, in vniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifestò liquet exercitationem cibum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex vrinarum colore petuntur: etenim aquosa nondum coctum humorem qui ex ventre distributus est, significat: rufa autem & biliosa, iam pridem elaboratum esse notat: mediocriter pallida, concoctionem modo factam indicat. Tunc igitur ad exercitia veniendum est depositis prius recrementis: tum quæ in vesica, tum quæ in aluo continentur.

† Veterum librorum aliter habet hanc scripturam δὲ μήτε πλῆθος αἵματος, μήτε ἀπὸ πύλων, μήτε σπλῆνος, μήτε περιττωμάτων, μήτε χυμῶν. &c. Id est non debet crudorum & incoctorum neque ciborum, neque recrementorum, neque humorum copia &c. Quam lectionem meliorem esse facile quis ex secundo libro πρὸς ὑγιεινὴν intelligere potest.

De exercitationem generibus.

CAP. XVII.

OMnis exercitationis commune est, quod animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habent officium, valida sanè, hoc est, violenta musculis & nervis robur præstaret,

cuius generis est quum quis fodit, & maximo onere sublato aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item acclivis ambulatio huius quoque generis existit: præterea per funem manibus apprehensum scandere, aliâq; plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur violentiâmq; peragitur: id genus sunt, cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum que per corycum & parvâ pilam fit exercitatio. Composita autem ex valida & celeri, quâdo quas validas diximus iis omnibus ut vehementibus uti licet, motus modo celeritatem adiciat. Præterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia crurâve laborant: per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri verò oportet quousq; corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus præptè æquabiliter & concione ædat. Inter hæc autem sudorem cum calido vapore mixtum cernes. Pausandū verò ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contractior corporis moles videbitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiâ quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conveniet. Idem si in sudore vlla qualitatis eius, aut quantitatis mutatio acciderit: quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothērapia uti deinceps oportebit, inde frictionem apothērapēticam adhibere, ut prædottibus facilitare solent.

De generibus frictionum.

CAP. XVIII.

INter frictiones, dura ligare corpus potest: mollis, solvere: quapropter quæ supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quæ autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore præditus sit, neque molliter neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus vitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimit: modica verò & mollis, è contrario implet. Porro tres quantitatis frictionum differentias, si tribus quæ à qualitate ducuntur, iunxeris, novem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim vna iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quæ à qualitate sumuntur, duræ dico, molli, & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiem differentias efficit: modica rursus si eisdem tribus addatur, treis alias

alias procreat. At mediocris qualitate eisdem tribus iuncta, alias treis progignit, vt in formula subiecta videre licet.

Q V A N T I T A S

Multa }
Multa }
Multa }

&

Pauca }
Pauca }
Pauca }

&

Mediocris }
Mediocris }
Mediocris }

&

Q V A L I T A S

Dura }
Mollis }
Mediocris }

Dura }
Mollis }
Mediocris }

Dura }
Mollis }
Mediocris }

De vocis exercitatione.

C A P. XIX.

INter vocis exercitationes suavis lenisque modulatio nihil ad sanitatem tuendam proficit: grauioris autem vocis sonus utilis habetur, eoq; exercere eū oportet. Ita enim aēr copiosissimus inspiratu in corpus attractus, thoracem, ventrem, & meatus totius corporis diducit, dilatat, aperitque. Quapropter ipsa lectione humiditates quæ redundant, excernit. fortius igitur legentibus, magis & per sudores: lenius autem, per latentem totius corporis perspiratum. Accidit enim propter extenuationem multa recrementa, nempe sputa, mucos & pituitam, per screatum excerni consumique. Iis verò qui propter frigiditatem exalferi desiderant, quodnam aliud praesentius remedium esse poterit, quàm functio quæ respiratione peragitur? Consilium igitur est, hos frequenter legere, vt toto corpore relaxato, fusaque carne, arteriam & alios spiritus transitus studiosè rarefacientes, per grauiiores vocis actiones modulentur. Vt autem oportet vocis officio neque temere neque inconsideratè: sed quum nec vitiosis corruptisque humoribus repleti sunt, neque magnæ & euidentès stomachi cruditates apparent, ad vocis exercitationem accedendum est, ne corrupti vapores per corpus largius distribuuntur.

De Lassitudinibus ob exercitationem.

C A P. XX.

VLcerosa lassitudo ab excrementorum tenuium simul & acrium copia contrahitur. Tensoria nullum quidè excrementū, cuius ratio aliqua sit habenda, in corpore contineri indicat, sed in musculis neruisque affectus quidam

quo tendi videntur, residet. Ea verò quæ inflammationis speciem præ se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatione obseffas parteis sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excalfacti, aliquid ex circumfusis sibi recrementis attraxerunt. Est & alia quædam præter has quarta affectio, quæ oritur, quum musculi supra quàm par est, siccantur, ita vt vestibis exutis squalens corpus contrahiturque appareat, atque ad motus pigrum. Remedium vlcerosæ lassitudinis est, si quæ redundant, euapores frictione multa mollique cum oleo copiosiore, quod omnis astrictionis sit expertus. Altera lassitudo in qua tētio sentitur, hoc pro curatione desiderat, vt relaxetur. sanè relaxatur quod distentū est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulci atq; egelido: item intermissione omnino, quiete, balneis temperatis atque in calida, mora longiori: adeò si bis tervē ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatorix curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe, superuacanei euacuationem, extenti remissionem & inflammationis refrigerium: itaque & oleum copiosum tepidumque, & frictiones mollissimæ, & lenta in temperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines persanant. pari modo & multa quies, vntiones assiduae. Quarta affectio nihil sanè à priori consuetudine immutari postulat, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat: altero die, apothepiæ exercitationem. protinus autem in lauacra frigidi solij exiliat. omnes autem qui lassitudinibus laborant, cibo boni succi refici debent.

†Vetus codex hanc scripturam habet, *κὺδὸν δ' ἰσχυρὴς ἐὶ νύκτωρ πίνων διατρίβει τρεῖς ἡμέρας*. Id est simul atque balnea excesserint cibo indiget. Quam lectionem Copus sequitur sed scriptura quam Orosius restituit *ἐν ἡμέρῃ δ' ἰσχυρὴς ἐὶ νύκτωρ πίνων διατρίβει τρεῖς ἡμέρας*, melior est.

De cute astricta.

CAP. XXI.

Astrictio, quam Græci *στέγνωσις* vocant, accidit, aut obstructis aut densatis meatibus. obstructio quidem ex copiosis crassisque humoris crudis concoctionemque non expertis, oritur: densatio autem, ab iis quæ refrigerant, aut astringunt, aut desiccant. Ac deprehenditur sanè iam dictus affectus, statim vbi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum duritie, tum densitate: tum quòd in ipsa exercita

citationē vix incalescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ valentiore exercitio, balneisque calidioribus petenda est. Mora verò in frigido folio diuturna non sit. imò nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi vesteis sunt induturi, vngentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abundè etiam sanat oleum anethinum, præsertim si viride fuerit anethum, oleumq; ex populo nigra confectum.

De spontaneis lassitudinibus.

CAP. XXII.

Quoniam vlcerosa lassitudo ex acrium recrementorum vitio contrahitur, siquidem paucus omnino vitiosus humor fuerit, apothera pie exercitatio suffecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, cuiusmodi malo obnoxiiis, nec exercitationem, nec vllum omnino motum iniugemus, sed quiete, somnoq; recreatos abstinere cibo totum diem cogemus, deinde vesperi pinguiter vinctis, temperatoq; balneo lautis, cibum boni succi & sordilem modicum dabitur, non tamen à vino eos arcetes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud, concoquit. Si ergo his peractis symptoma conquieuerit, ad consueta munia paulatim reduci sunt: sin in posterum etiam diem remaneat, de valentiore iam remedio considerandum est. Si enim vires constet, duorum alterum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quod si vires inuolida sint, sanguinem dimittere haud quamquam oportet, sed deiectionem mediocrem tentare. At si crudi humores omnino fuerint, neque sanguinis detractio, neque purgatio, neque exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis, potionibusq; & medicamentis quæ extenuent, incidantq; sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum prisana, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam verò præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataq; sunt, ac facile quicquid assumpserint in flatu conuertitur, satius fuerit cum cibo piperis aliquid offerre. Vtilius autem erit, & medicamento quod diospolites dicitur, uti: item dia trion pepereon, simplici: vtilissimumq; ipsis est oxymel. Potui sument apomel, præsertim ubi coacuit, vinumq; leuiter acescentia. ciberunt qui sine calore attenuent, cuiusmodi est cappararis si ex oxymelite, aut
oxelæo

oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitiis oboritur, copiam innuit solidas corporis parteis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut venam incidere, aut malleolos scarificatu lauciare. Quæ verò inflammacionem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusve diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrem accendit vehemētissimam, nisi sanguinis detractioe malo prius occurreris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahere: ac primū quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundò autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturq; bonæ fortunæ beneficio opus habent.

Victus senum ratio.

CAP. XXIII.

Senectus quum sicca, frigidāq; existat, per calefacientiā, humectantiq; corrigi debet. Frictio itaque adhibenda est, citra lassitudinem: imbecilliores ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: septima verò hora ubi frictionem, exercitationēsq; ipsis congruas, & balneū fuerint experti, primū sanē quæ aluum emolliunt, allument, deinde putes, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optima succi sunt, & agrē corrumpuntur. Non prohibeo item vinis ex melle præparatis uti præcipuē quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinum vino rectē iniicitur. At si quando pituita in ventriculo contracta, necessitas est aliqua quæ eam incidant, deligere, protinus ad humectantem victus rationem digrediendū est: ac sici maturæ ante alium cibum ipsis exhibentur: per hyemem verò caricæ, si nullum in dextra præcordiorum parte symptoma accidere sentiāt. At quia serosa pituitosāq; in senili corpore excrementa colliguntur, urinam quotidie promouere consilium est, & aluum subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbent. Clarum verò est, omnia olera ante cibum ex oleo, garōq; sumi oportere: item oliuas muria seruatas, quas halmasdas dicunt, & damascena. Quod si venter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & cnicum abundē sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim vnus auellana

na

nae, interim duarum triumve magnitudine sumpta. Iam oleum quibus alius contracta est, per clysterem vtilissime infunditur.

De rugoso corpore. CAP. XXIII.
ERugat corpus erui farina, viti albae mista.

Aliud smegma quo continuè corpus abstergitur.

FICI pingues simul cum bryonia contusae, farina erui, combusta sepiæ testa cum mellis momento affuso.

Quomodo corpus suaviter oleat. CAP. XXV.

VT corpus bene oleat, eidem vntioni cupressi comam aridam contusam admisceto, aut piceae corticem. Meminisse verò debes, vt manè postquam corpus vestimentis munierint, paucillum casiae aut sabinæ herbae degustent.

Quomodo habitus recalescat. CAP. XXVI.

QVandoquidem verò habitui senum succurrere oportet, vtatur dum lauat, puluere calefacienti, aquae indito, qui constat, nepita, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, faece combusta, nitro, pumice, pro cuiusque ratione: item sinapis, herbae pediculariae, & cocci gnidij momento. à balneo, acopo quod calefaciat vtatur. vinum fuluum vetus potet, sumatque propoma ex mulso pipere, ruta, & consimilibus.

Quomodo color malus emendetur. CAP. XXVII.

CORpus decoloratum pallidumve vita laeta & cibus gratus emendat, miscetur autem huic radícula, porrum, & viride cicer. Iam mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonum colorem efficit. Proficit etiam oleum cui bryoniae radix diutius sit incocta. idem & corporis cutem intendit, erugatque. Iis autem, qui corpori nitorem conciliant miscere conuenit pastillos, qui fiunt ex cuiusdam abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniae radice. bene colorant, si copia datur, tum radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro vtitur.

Ad liuores. CAP. XXVIII.

Luescere senum corpora prohibemus, si cutem ipsorum crassam, & iniuriis haud facile opportunam, habitumque calidiorem reddiderimus. Vt autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit vt conueniet, eandemque fomentis per spongas decocto raphani aut absinthij immersas, adiuuare.

Quomodo

Quomodo dentes ab iniuria asserantur. CAP. XXIX.

Dentes ab interitu vindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, adhuc ne continue vomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quod durum nimis sit, palmulas vix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quæq; adeo frangi contumacia sunt, ut dentibus commoueant. insuper vitare oportet, quæ dentibus stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibum dentibus purgare.

Quomodo grauis auditus corrigatur. CAP. XXX.

Ad grauem auditum corrigendum, vincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem linteum dropaci intinctum ipsis demittere, atque prius expressum retrahere. summæ enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturabis: postea ipso exempto, quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice excavata efferbuerit.

De oculorum caligine. CAP. XXXI.

Ne caligine oculi corriplantur, quum in aquam frigidam te mergis, illos diu in eadem apertos esse conueniet. hinc enim robur visui adiicitur. Lectione verò non te fatigabis, vino crasso & dulci abstinebis. similiter cibis qui in superiore ventre diu remorantur, cōcoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant: item cauebis erucam, porrum, & omnia quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiam oportet supinum incubitum diuturnum, frigus, ventos contra oculos flantes, fumum, & puluerem. iam verò aquam oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat. quæ in hunc modum præparatur, fœniculum viride fictili vasi extrinsecus picato, cum aqua cœlesti demittitur, deinde exempto fœniculo quod reliquum est repones.

De repletionē. CAP. XXXII.

Plurimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis enim probè quippiam ventriculus concoquat, venæ tamen nimium repletæ, laborant, distendantur, rumpuntur, obstruuntur

obstruuntur, flatu implentur, & valde grauantur. deterri-
 mum autem habetur in morbis, venas esse repletas. at ven-
 tris repletio si vrget, interim vomitu quod redundat, inte-
 rim per aluum excernitur: in totum inualidior hæc, ea est
 quæ venis accidit, non ramen & ipsa admitti debet, sed si
 quis impendio plura assumpserit, statim cum vomere oportet.
 periculum etenim est, ne obita concoctione venæ reple-
 antur: magisq; si intemperantius cibis continuè assumptis,
 nullam deinde vacuationem experiatur. vomitu igitur sol-
 licitari debet priusquam cibi corrumpantur. At si aliquid
 eum impediat, aluus soluta frequenter succurrit. sin minus
 illa fluxerit, certè diutius dormire & potui aquam calidam
 frequenter sumere, consilium est. Vbi iam abundè conco-
 xerit, præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomentisq; ad-
 iuuare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibere o-
 portet. At si neque descenderit aluus, neque celeriter obita
 est concoctio, sed corpus vniuersum graue, ad motus pigrum,
 & somnolentum fuerit, mens præter rationem quodammo-
 do torpescat, venarum repletionem esse cognoscas. Qui ve-
 rò præter hæc lassitudine premuntur, eos conquiescere dum
 ventriculus ingesta concoquat, deinde laboribus inanire
 expedit.

De ebrietate.

CAP. XXXIII.

Ebrietatem vomitus repentè obortus discutit: item a-
 quam & mulsam liberalius superbibere vincit, atq; sic
 vomere, vsque dum plurima reiecerint, ac stomachi vellica-
 tus obtundatur. à vomitu solum ingressi copiosè vngen-
 tur, reliquo tempore conquiescent, & accuratè cooperti
 diutissimè dormient, quousq; temulentia discutiatur.

Quibus cibi corrumpuntur.

CAP. XXXIII.

Cibis in ventre viciatis, si quæ corrupta sunt deiciun-
 tur, maximum ad sanitatem est compendium: sin mi-
 nus, iis quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huius-
 modi autem malo affectis vomitus ante cibum, vini dulcis
 potu excitatus, conducit. Nullum præterea cibum vel ni-
 dorosum, vel graueolentem, vel in totum corruptioni op-
 portunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni
 succi sunt deligere. Iam per intervalla temporis mediocria
 aluum subducere, ex iis quæ mediocriter purgant, ita affe-
 ctis confert.

Veneris hæc sunt commoda, repletos inanit, corpus agile præstat, in augmentum promouet, & virile magis efficit. Quantum verò ad animum spectat, impeditam intelligentiæ vim dissoluit, iratos mitigat, eoque melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo infanientibus integritatem sensuum restituit. Iam ex pituita morbis venus est utilisima: ceterum alij etiã cibum respicientes, eius cupiditatem hinc recuperarunt: alij, continuis per somnum veneris imaginibus liberati sunt. Porro natura veneri idonea est calida, & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minime verò coitum excitat victus qui siccat refrigeratque, ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter victus ratio humida calidaque adhiberi debet, mediocritas, & laborum, & ciborum. Quemadmodum verò moderari labores, ita etiam concubitus ipse mediocris conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoque cibi potissimum valentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes, ut qui alioquin etiam ad venerem incitare credantur. his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, cruca, & rapum, quæ in medicamentorum vicem dantur: ex leguminibus profunt, faba, cicet, ochri & dolichi, & pisæ, quæ præterquam quòd largiter corpus alunt, flatibus etiam replent. Ruta igitur quia flatus discutit aboletque, ideo etiam veneris ardorem obrundit. magnifice autem probo vuas, ut quæ humectent, & spiritu sanguinem repleant, qui in venerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne vomitus, aut purgatio præcellerit. similiter repentinum alui profluuium: inueteratum enim fluorem venus desiccet. At vehemētis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim iis quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum, moderatūque cibum, venerem exercere. ita enim viribus conducit, & frigus abortum minus efficitur. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut supra dixi, antequam somnus inuadat. lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormienti statim remittitur. Id verò tempus etiam liberis procre

procreandis accommodum est, tum aliis de causis, tum quod mulier consopita, genituram facilius retinet.

[†] Hic locus sic legitur in antiquis codicibus, *ἡ δὲ πνεύματι ἐμπι-
πλάσει τὸ σῶμα, ὃ δὲ ἐξ ὁρμῆς πρὸς ἀφροδίσια.* Id est corpus statu implent,
qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

Ad eos qui venerem exercere nequeunt.

CAP. XXXVI.

Naturalia continuè pingui vngentur, cui adiectum sit narcissi radiceis momentum, aut cocci gnidij, aut pyrethri, aut herbae pediculariae, aut seminis vrticae, aut viticis. Prebiberere autem ante venerem oportet piper, aut satyrion, aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillae marcidae modicum: item compositis aduersus hoc vitium inscriptis remediis vtendū est: item subinde lasciuia legere comperit.

De ijs qui immodicè coierint.

CAP. XXXVII.

Quonia ex immoderata venere corpus rarius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimiram quae densent, calefaciant, humectent, confirmentq;. Quigitur immodico concubitu exhausti sunt, vestimentis calidis operiti conquiescent, somnoq; satis indulgebunt, donec corporis contentio sublidat, & illi ab imbecillitate sese recollegerint.

Si semen genitale redundet.

CAP. XXXVIII.

Nonnulli semine copioso & calido collecto, in venerem prouunt: quod cū in coitu egresserint, corpus inualidū & stomachum resolutum obtinent, extenuantur siccanturque, ob quam causam si rursus à concubitu abstinerint, capite grauantur, & anxij fiūt, deinde statim veneris insomnia experti eodem modo afficiuntur. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamenta quae id corrumpant, offerri debent, à balneo lumbos oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satius autem est oleum cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereque succum aliquem refrigerantem, nempe semperuiui, solani, cotyledonis & psillij: ac horū quidem per aestatem, reliquis autem anni temporibus, tum aliorum, tum lactuca succum: item lini semen quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoque refrigerantem succū exhibet. Ad hanc la-

mina plumbea lumbis subiecta, veneris insomnia cohibet. Iam herba refrigerante vi praedita si cum ruta substernantur, & teneris viticis surculis, idem praestant. Praeterea semē viticis & rutae in cibo sumptum. Cauendū verò est, ne lumbis vehementer refrigeratis, renes offendantur.

Si perfrictio nocuit.

CAP.

XXXIX.

QUod si frigori nimio patuerint, locis calidioribus decumbent: cyprino aut irino peruncti. postea ubi modicē incaluerint, piper, myrrham cum vino dulci odorato & veteri assument, aut liquorem cyrenaicum cum vino vel aceto, aut pyrethrum castoriūve ex aceto: cibo autem calidiorē recreandi sunt.

Si insolatus adusit.

CAP.

XL.

SI qui verò exusti in sole sunt, his locis aëri expositis decumbendum est, perfundendaque frigida, facies, manus, & crura: si siti conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent, atque haec paulatim, & non vna vice ac subito facere expedit. cibum assument modicum, qui facile in membra distribuatur, humidiorē potius quā solidiorē.

† Vetus scriptura hoc loco habet, *καλυπτόμεν*, id est, duriorē, ἀντὶ τῆς καχυψίας καὶ τρυφερότης, quibus nominibus medici cibum solidiorē significant. vix vnquam inuenitur οἷον ἀδύπεπον in hac significatione.

De pituita in superiore ventriculo redundante.

CAP.

XLI.

† **Q**Uod si in aliquē interdum incidas fastidientem, qui quidē cibos valentis materiae auerſetur, & si assumere compellas, nausea afficiatur, sola verò acria appetat, & iis quidem oblectetur, sed ventris inflationem experiatur, nauseetque ac paululum ructibus solis leuetur, interim verò & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acorem conuersi, vitientur, omnino intelligendum tibi venit summam curationis existere, ut pituitam à ventriculo abstergas. Ego quādoque ita affectum noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili crassioris pituitae copia vomitu egesta, integræ statim sanitati restitutus sit.

† Hic locus sic descriptus est in veteribus libris. *Εἰ τιμὴ περιτετύχηκας ποτὶ τὰς μὲν τῶ τροφίμων σίτιον προσφορὰς ἀποστρεφόμενός, ἀποδίτω τὸ μένοντι.* Id est, Quod si aliquem incideris, qui cibos valentis materiae auerſetur, atque non alatur. ἀπόσις enim videtur positum ἀντὶ τοῦ ἀτρέφει.

Quæ

Quomodo facîle quis vomat.

CAP. XLII.

QVoniam validè vomentibus multa solent absurda superuenire, commodum fuerit quomodo quis facîle vomat, exponere. Etenim vomitus pituitam inanit, caput leuat, & ne qui auidius nonnunquam cibum ingesserint cruditate laborent, item ne qui vinum liberalius sumpserint, offendantur, prohibet. At quæ offerentur, neque acerbæ, neque sicca erunt, sed partim dulciora humidiora quæ, partim acriora. Commendatur ad hæc raphanus, eruca, fassamentum vetus, origanum viride, cepæ momentum & porri. Promouet vomitus etiam ex leguminibus ptisana cui mellis aliquid additum sit, ferculum ex fabis fressis confectum, magisq; carnes ipsarum. verum non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras deglutire oportet, eoquæ vomiturus non diu mandendis ipsis immorabitur. omnia verò per coctionem mollia flaccidaquæ erunt. Iam constat, vina dulciora deligi oportere, vt quæ in stomacho magis supernatent, atque eam potionem tepidiorem assumi. Confert etiam amygdalas melli intinctas comedere, ac placentas gustare: item peponis & cucumeris semen maceratum detritumque cum melle assumere, radicemque cucumeris contritam ex melle. At qui valentioribus vti volunt, narcissi bulbo aque incocto, vinum temperant. Mouet autem vomitiones irinum quoque vnguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro vomentis interest, ne cesset vel intermittat, vsque dum omnia eiecerit: à vomitu os colluat, faciemque posca aut aqua abstergat. id nanque dentibus conducit, & caput releuat.

Quæ sanis aluum subducant, & quæ vrinam moueant.

CAP. XLIII.

VEterum nonnullis satis esse ad secundam valetudinem tuendam visum est, si aluus quotidie & vrina pro ingestorum tum cibi, tum potus copia, sine vitio & abunde responderet. ac quum vacuatio iuxta assumptorum proportionem accidebat, commendabant: sin minus, promouebant, vrinam quidem scandice, apio, asparago, petroselinio, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduique radice, cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis,

b 2

quorum decoctum cum vino potui exhibebant. hæc enim per urinam sanguinem repurgant, unde non parum utilitatis percipitur. Aluum adiuuabant terebinthina: ex qua oliue magnitudinem dormituri deglutendam offerebant. At quum magis subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accommodata deiectioni sunt, oua sorbilia: ex oleribus, beta, malua. item cochlearum ius, atque hæc fortè abunde erūt. Efficacior est herba mercurialis, in aqua cum sale elixa comestaq; eiúsque decoctum potui datum: similiter folia sambuci. idem præstat polypodij radix duarum drachmarum pondere, salsamento inspersa, aut etiā in prisa sorpta, adhæc serum lactis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve assumptum: veteris quoque gallinacei ius, tum per se, tum cū cnici drachmis duabus. nonnunquā & aloë triū cicerū instar secūdū cœnā rectè assumitur. Præstantissimum verò est epithymum in vino post mediocrem cœnam potum: qui vehementius vacuare desideret, manè epithymi drachmam ex oxymelite, verno tempore ebibat.

De clysteribus.

CAP. XLIII.

IN quibus venter agrè descendit, & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia non sustinet, clysteribus vtendum est, quum pituita quidem in intestino residet, iis quæ fiunt decocto caricarum, beta, nitri, syluestris cucumeris radicis, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quum siccitas magis vrget, iis quæ constant althæa, fœnu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo. interim etiā oleum per se dimidiæ heminae mensura iniectum, abunde proficit. nō tamen continuè id faciundum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus.

CAP. XLV.

VTimur etiam glandibus subinde stercoreis excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterem inditum est, non egeritur. Finguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco guidio modico. Sed quia vellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit. præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitque resolutionem expertis, & iis qui ex perfrictione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ce-

ræ

re commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus ano imponitur. Fit quoque glans ex ficu cum nitro.

De ijs quæ per os & nares caput euacuant quæq; eisdem partibus delinuntur.

CAP. XLVI.

Humores in capite residentes per sputa vacuamus. quod si modicè facere voluerimus, piper cum masliche temperabimus: si largius vacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandi præcipiemus. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat, capparisque radicis cortex. Itaque huiusmodi remedia serosum excrementum vacuant. crassam verò lentamque pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatum, aut sapa in qua origanum, aut hyssopum sit incoctum. Ego autem saram cum sinapi & oxymelite misceo. At si cerebrum muco purgari desiderat, acribus eum remediis, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaque anagallidis vtriusque & anemonæ cuiusvis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cum betarum decocto succove infunditur. sternutamentum verò crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem ori illinetur tale est: sapo cum betæ succo palati regionibus & columellæ delitus bene facit. idem etiam per nareis purgat, melanthio verò quod facile paratur, ad narium illitionem subinde vsus sum, interim aceto acri pridie macerans, deinde post die cum aceto rursus lauigans infundensque naribus. Nonnunquam oleo veteri idem melanthium detritum, similiter illeui. Sic igitur & Archigenes eo in narium obstructione vsus est, priori autem, ex aceto, Crito in morbo regio vti solebat.

Quæ mensis ducunt.

CAP. XLVII.

Qvacunque vrinae ciendæ sunt, eadem omnia mensis ducunt, nempe brassicæ radicis decoctum potum, persicæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnium, & erucæ semen: item quæ ori vuluæ subiiciuntur, mensis commouet, ut ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritum subiectum, aut myrrha cum vino lauigata, aut leporis coagulum:

Quæ sudorem mouent.

CAP. XLVIII.

Sudorem eliciunt chamæmelum aridum tritumque, oleo inspersum, si summæ cuti validè infricetur: seseli, pyrethrum, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cum oleo efficax est: adhæc salis flos oleo temperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusque ciceris magnitudine: Pari modo nepita & pota cum mulla, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

De aëre.

CAP. XLIX.

Laudatissimus aër est, qui exactè purus: is autem nimirum erit qui non ex stagnorum, aut paludum vapore turbidus exurgit, neque ex profundo quodam specu pestilentem auram exhalante prouenit: ita qui ex cloaca quadam magnam ciuitatè expurgante turbidus exit, vitiosus est. Quinetiam nebulosus ~~similiter~~ sanitati non facit, quemadmodum item qui in cauo loco altis vndique montibus inclusus, nullam auram recipit. Hoc igitur modo vitiosus aër omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut optimus prodest. At qualitate varians aër colore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, non similiter vniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aër temperatus utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

De aquis.

CAP. L.

Aquarum præterea & virtutes & vitia cognita habere expedit, ut quæ ex multiplici ipsarum usu magis fere quam omnia alia ad quamlibet victus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullam aut gustu, aut odore qualitatem representat, sed protinus bibenti suavis est, & visu pura limpidaque, quum verò etiam à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda non est. Nam quæ in præcordiis relidet diutius, ventrem ferit, inflat, grauatque, vitiosa censetur, huiusmodi aqua neque citò calefit neque refrigeratur, sed quæ in ipsa elixantur, tardissimè peiusque decoquuntur. Præstat itaque talem aquam experimento discernere. Qui verò notis quoque eam volet agnoscere, iis quæ dicentur attendat. quæ enim ad septentrionem spectat, à sole auersa, tardè permeat, ægræ concoctionis lentè calefcit & refrigeratur: quæ autem ad orientem erumpit, ac per meatum quendam, aut terram colatur puram

ram, eadēq; citissime calefit, iterumq; refrigeratur protinus, hanc optimam esse existimandū est. Probatur item quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nonnulli & pondere aquam examinant, leuē præstare credentes, hoc igitur si aliis à me commemoratis accedit, cōmendatur, verū sola hæc bonæ aquæ nota nō sufficit. At imbrium aqua autote Hippocrate leuissima est, dulcissima, limpidissima, tenuissimāq; eò quòd sol leuissimum & tenuissimum attrahat, ac id non ex alia aqua solum, verū ex mari quoque & corporibus: quapropter etiam omnium promptissimè computrescit, ut quæ diuersis ex qualitatibus sit conflata. Nemo autē aquam putrefactioni opportunam deterrimam esse existimet. nam mutationis facilitas virtuti potius, quàm vitio tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ notas habet, si promptè etiam putrescat, ea cēsebitur saluberrima, etsi quum mutari incipit, occasionem raucedinis, tussiculæ, & grauitatis vocis illis quibiberunt præbeat. At inter imbrium aquas, æstiuæ quæ tonitru decidit, præstantior est, quàm quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuib; aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur. Porro palustrem fœdique odoris & absurdas recipientem qualitates, rectè decoques, atq; ita meliorem redditam potui dabis vīno temperatam: si adstringit, dulciori: aliam verò, acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas salvas, & bitumen referentes. At frigidæ nimium à cibo assumi debent, non tamen subito ac vna vice. Non desunt qui cibos & potiones aduersus aquarum vitia inuenerint: ac alij ciccerum decoctiones præbunt, vel eadem quoque edunt: alij caualidem similiter cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum: reliqui betam & cucurbitam sale conspersam cum vino dilutiore præsumunt.

De lauacris.

CAP. LI.

FRigidam lauationem ita quidem laudo, ut non iis qui nullo victus delectu agunt, ex usu esse dicam, verū solis illis qui accurate viuunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, vtentes. Porro multis qui amplius interdum refrigerari desiderant, abunde est natare per æstatem, si iuuenes sint, carnosī & frictionibus ante excelsi. Sint autem qui aquam ingredientur, neque venere, neque alio quodam modo lasi, neque cruditem sentiant, neque vomitu,

b 4

aut aluo inaniti, neq; vigiliis defatigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigidae lauacro utatur. Calidum verò balneum & optimum & tutissimum est: lassitudinem soluit, humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatus vbicunque decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & viro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

De balneis naturalibus.

CAP. LII.

Naturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia æs, alia ferrum representant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaque aquarum naturalium vis est quæ desiccat & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisque affectibus maxime conducit. Iam verò quæ nitrum & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato, stomacho humentiori, aquæ inter cutem, tumoribus laxis, œdemata Græci vocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodata. Aluminata sanguinis reiectioni, stomacho vomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisque abortibus, vtilis existunt. Sulfurata ueros emolliunt, calefaciuntque, & dolores mitigant, stomachum verò enervant euertuntq;. Bituminata caput replent, instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: calefaciunt autem continuè, & temporis processu emolliunt. Quæ aris naturam occupant, ori, tonsillis, uis, & oculis præcipuè cōferunt. Ferri virtutem sortita, stomacho & lieni sunt vtilis. Oportet autem in aquam sine tumultu, & lentè descendere, quo virtus corpori relaxato accedens immergatur.

Quæ victus ratio quolibet anni tempore sit utilis.

CAP. LIII.

Non alienum est, pro singulis quoque anni temporibus victum instituere. Ac hyeme quidem pluribus vti laboribus, plus esse conuenit præsertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus allumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius carnes calidas comedere & olera, plus vini bibere oportet. Vere autem ineunte, alius vomitu, alius
per

per aluum euacuari debet, alius sanguinis demissione, pro-
ut cuiusque consuetudo & voluntas fuerit. Per æstatem à
laboribus conquiescendum, cibóque demendum est, qui
rectè frigidioris erit naturæ: potione largiore vtendum,
ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humidita-
temq; conferunt. At in autumno, quoniam prorsus inæqua-
lis inordinatusque est, & omnigenos morbos inuehit, ma-
gna victus habenda sollicitudo est: frigus vitare, concubi-
tu & frigida potu prorsus abstinere expedit. item frigidus
auroræ aër, meridianusque ardor rectè cauebitur, poma a-
fatim assumere noxium est, vt quæ non copia tantum ob-
sint, verum etiam vitiosos procreent humores, & inflatio-
nes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & vux,
flatus pariunt corrumpuntque cibos, nisi ante alios præsu-
mantur: ita verò neque inflant neque corrumpunt. Vbi aër
frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere,
omniaque peragere oportet, ceu hyeme aduentante. Ni-
hil mali autem fuerit post æquinoctium vacuationem ex
commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum
in corpore retentum, hyeme facessat negotium.

Victus eorum qui in laboribus vitam agunt.

CAP. LIIII.

SI quis in laboribus vitam transigit, considerandum est,
priusne is exerceri consueuerit, an nullo exercitio se cre-
dens, mediocriterque eiusmodi consuetudinem ferat, ita vt
non morbo implicetur, continue, facili præditus perspira-
tu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliam
consuetudinem traducere non oportet, imò nec eos qui ex
longiore temporis interuallo agrotant. At si assidue quis
morbo conflictari videtur, in humorum quidem redundan-
tia *πληθώρα* græci appellant, eò per totam salubrem victus
rationem, consilium diriges, vt humorum mediocris sit & co-
pia: in eorum verò prauitate, *κακωχμία* græcis dicitur, vt o-
ptimos efficias. Qui igitur humorum redundancia labo-
rant, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, &
paululum dimoueri prius debent. Qui verò eiusmodi fa-
cere antea sunt aggressi, iis hæc eadem paululum augere,
cibo autem detrahare, eumque imbecillis materiæ ingere,
re consulemus. At qui prauos humores colligunt, non vno
consilio tractantur, quoniam neq; vna vitiosi humoris spe-

b 5

cies est. Nonnulli siquidem frigidiorē magisque pituitosam colligunt, alij calidiorē biliosiorēque, quemadmodum alij melancholicam magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuque abstinebunt, quae collectam ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est praesidium, alui subductio.

† *Vetus scriptura est παλιος, id est, facile, non uetustus.*

† *Ante hoc verbum in manu scripto est vox αὐτῷ, id est, semper quae omissa videtur à librarijs.*

Proficiscentium victus ratio.

CAP. LV.

Facillimè quis profectiōem inibit, si inunctus sit, & non fortiter incedat, Præterea ad proficiscendi facilitatem conducit per aestatem fascia mollis digitos sex aut septem lata, quinque autem cubitos non minus oblonga, lumbos ad ilia usque complexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliua praemissus, corpus quod praecipit ruit, ceu conto cuiusdam innixum retinet. quum ascendendum est, ipsi innitentes facilius in accliua corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio & paxillum cibi cuiusdam aestiui, potioque modica eo tempore conuenit: à prandio antè quàm iter arripiamus, conquiescendum est. Si verò necessitas abeundi fuerit, & sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cum salis momento bibetur: aestus ardorque solis caueri debet, cui nec corpus nudum exponere sed contactum esse oportet, ne ex itinere siccescans indurescat. Hac enim ratione, & minus lassatur, & nullum ex praedictis affectibus similiter percipit. Hyeme quum frigus urit, antequam itineri te accingas vêtre subducto, & unctiōe adhibita hyemaleis cibos copiose assumes, potionem modicam. Cæterum fascia longiore non solum lumbos sed spinam quoque & pectus rectè inuolues. Requiescenti autem, si interea vehemens frigus urat, neque vngi, neque cibum potumve assumere praestat. neque alio quodam modo refici debes, si inibi mansurus es. At secundum longas profectiōes, aliosque validos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter quàm lassus curabitur. minus enim sic periculis erit opportunus.

Nauigantium victus.

CAP. LVII.

Vomitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oboriētibus nec facile, nec utiliter succurrimus: ut quæ
omni

omnino magna ex parte præsidio esse soleant. A vomitu autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctâq; cui pulegij modicum sit adiectum, aut panem ex vino aquoso, & odoro maceratum ingerere oportet: portione uti modica, eaq; vel ex vino prorsus aquoso, vel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollescat, conueniet: mox in tenuem puluerem redigere, inde siccare, postea in vas fictile condere. At si diutius crebriusq; vomitus urgeat, cibo magis subtrahendum est, eadêmq; portione modica utendum, vel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium commaduerit: item aqua cum polenta polline aut vino odorato, eôq; aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouetur, aut thymus, aut pulegiû. Mare nequaquam aspiciendum est, vsq; dum in nauibus versari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbidæ, fædi odoris, ac falsæ existant.

Quomodo extenuetur corpus.

C A P. LVII.

QUum inmodicè corpus plenum est, extenuare id atq; imminuere oportet. Quia ergo calidior temperatura & siccior gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere voluerimus, inducimus. Didicisti autem citas exercitationes, victum extenuantem, similiaq; medicamenta, & animi curas, temperamentum siccius, & calidius, eôq; corpus gracilius efficere. Quæ igitur victus ratio extenuet, nulli non cognita est: medicamenta verò vehementiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum iplis corymbis, aristolochia rotunda, tenue centaurium, gentiana, polium, quæque ad vrinam ciendam valentiora sunt, uti petroselinum: singula nanq; hæc, & per se, & cum aliis omnia, humores abundè extenuant, inaniuntque corpus. Quinetiam sales ex crematis viperis largiter extenuare solent: ipsaq; adeò theriace. digerit autem, extenuatque oleum cui radix syluatici cucumeris, hibisci, gentianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta, si illinatur: sic polium & centaurium. At cibus non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præstaret etiam aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem sponte sua scarurentem habeamus, qualis est Mitylenæ: sin minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. VINO
vtemur

vtemur tenui & albo. Caterum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idē abūde efficit. Adhuc oportet cibi minus quā pro exercitiorū ratione ipsos assumere: iuuat etiam obarsos insolatus. praeibere autem non debent, sed epulas semel tantum die sumere, magis expedit. itē corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrū extenuat, modicum verō probam corporis nutritionem excitat. Postremo extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petroselini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & vrinae & alui promouendae efficax est.

Quomodo tenues impleantur. CAP. LVIII.

QUum extenuatos implere volumus, vinum quidem crassum, cibus autem crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, & vt summatim dicam, omnia praedictis contraria expediunt. Commodum est iisdem & pice diebus tribus quatuorve interpositis, obloni. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricare debet, deinde frictione dura non tamen multa cū, tem cogere, quō densa duraque euadat. Expedit igitur iis qui pallido sunt colore praediti, nec alimentum sentiunt, iram animique motus excitare.

De partium attenuatarum curatione. CAP. LIX.

EXtenuantur plerumque partes nonnullae, vel diuturnae ipsarum quiete, vel deligaturae modo quo confracta fasciantur. Itaque virtus partis extenuatae firmari, sanguisque ad eam elici debet copiosus, frictione moderata, aptoque motu, & calentis aquae mediocri superfusione. Haec sane tantisper faciēda sunt, dum rubescens corpus attollatur. cessandum verō prius quā collabatur. Iam & picationem praedictis membris, adhibere congruit. Quum autem frigidiorē partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodam medicamine oportet. Vfussum aliquando & thapsia, nunc cum melle, nunc cum cerato illinens.

Optimi temperamenti nota. CAP. LX.

TEMperatissimus homo est, cuius corporis compositio omnium extremorum exacte medium occupat, nempe gracilitatis, crassitiei, mollitudinis, duritiae, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, in vniuersum naturae ac animi functiones habet inculpatas: medius quoque est glabri & hirsuti, nigri & albi pilos in pueritia rufos magis quam

quàm nigros habet: in vigore, è contrario.

Intemperatorum corporum notæ.

CAP. LXI.

Corpora moderato calidiora citius dērient, increscētq; similiter: tangentibus autem calidiora, minúsq; pingua apparent: colore sunt rubido, pilis nigris, mediocriter hispidis, & latis venis. At si quis simul & pinguis, & crassus latiores venas habeat, is ob consuetudinem, non natura pinguis euasit. Frigidioris temperaturæ nota est, si ad tactum frigidius apparet corpus, glabrumq; sit & pingue, color vnà cum capillis rufus, si multa inest frigiditas, liuens quodammodo & plumbeus, venæ angustiores: si gracilis est eo temperamento præditus, neque is necessario talis, sed ex consuetudine factus est. Sicca autem temperies durior est, graciliórq; temperata, atque hirsuta, durities igitur à sicca temperie omnino separari nequit, gracilitas autem non modo naturaleis temperaturas, sed etiam ex longa consuetudine acquisitas comitatur. Indicium siccitatis est, si corpus a grè mouetur, siccum, & squalidum à siccantibus euadat. Humida temperies, cætera quidem temperatæ similis est, sed mollior, corpulentiórq; ac ab hac separari nequit, mollieties, quæadmodum, & crassitudo, non insitum modo temperamentū, comitatur, sed etiam ex longa quadam consuetudine constituitur. peculiare verò humiditatis signum est, corpus maxime hirsutum, facilis pilorum capitis prouentus, iiq; nigri sunt, & per iuuentutem copiosi: processu temporis caluitium sequitur, venæ latæ sunt, sicuti & arteriæ grandes, simulq; vehementissimè pulsant. prætereà totum corpus validum, articulatū, musculosum, pinguedinis expers apparet, cutis dura, & nigrior. Frigidam humidamq; temperaturam testatur thorax angustus, sicut etiam totum corpus glabrum, cutis tenera & alba, capilli subrubi, præsertim in iuuentute, hac præditi in senio non caluescunt, verum statim timidi, pusillanimes, pigri, venis latentibus, crassi pinguesq;, & femoribus, & musculis indistincti, inarticulati, blesique fiunt. At si humiditas frigiditásq; magis fuerit adaucta, color vnà cum pilis rufus videtur: si plurimum increuerit, liuescit. Porro calidum ac humidum temperamentum mollius carnosiusq;, optima temperie existit: auctum amplissimè, putridis affectibus opportunum est. Quum autem paulo quidem humidius, multo autem calidius fuerit, eo donati mollio

molliores paulò, corpulentioresq; temperatis existunt, non paulò verò hispidiores, imò etiam ad tactum calidiores apparent, nigri ipsi pili existunt, & caro pinguitudinis expers. Quod si paulò quidem fuerit calidius, multo autem humidius, mollis his caro, multaque existit, & color ex rubro, & albo commistus, tangentibusq; paulò calidiores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augeat, corpus erit durum, gracile, album, non musculosum nec articulatam, pilisq; vacuum, tangentibus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expediam, in coniugatis temperaturis semper euincens qualitas notæ superare solent.

De capitis formatione.

CAP. LXII.

EXiguum sanè caput prauam cerebri structuram propriè notat: magnum verò non necessariò bonam testatur. Si nanque tale insitæ virtutis, materiam probam, multamq; efformantis robore factum est, bonum est indicium: si ex solius materiæ copia, non item. Verùm distinguere ea conuenit figura, & iis quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaq; fuerit, hæc enim semper bona est constructio: iis autem quæ ex illo procedunt, si optimè sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, valens, siq; oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, vel occipite habent eminentiam, aut magis quàm decens est, auctam. Plerumq; igitur, ut magnam, ita has quoq; deprauatas comperiemus. fit tamen, sed rarò ut nonnullæ ex his bonæ proueniant cum formans scilicet vis, non inualida fuerit.

Temperatura cerebri notæ.

CAP. LXIII.

Cerebrum temperatum moderatas habet, & animi functiones, & excrementa, minimèq; ab omnibus exteris offendetur. Talium pili capitis in infantia subrui, pueritia subflui apparent: ubi adoleuerint flauescent, medijs quodammodo inter crispas exactè ac simplices, nec tamen facile caluescent. Si verò calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum venæ sensibilibiter apparent, capilli his in lucem

Lucem æditis protinus in capite oriuntur. Iis autem qui multò sunt calidiores, nigri, validi, & crispì: qui non multò, iis flauì primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementa sunt exigua, & inculpa-
ta fruuntur valetudine: capite verò à calefacientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauantur-
que, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus admodum. Frigidius autem quàm con-
uenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per me-
tus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & facile
à frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & graue-
dinibus continuè infestantur, oculorum venæ latèt, somno
maximè premuntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excre-
menti emanat, sensuum acrimonia, vigiliæ, capilli sunt ro-
bustissimi, statim ab ortu, ac iis crispì magis, verùm ex faci-
li caluent. Humidioris autem, capilli simplices planiq; , &
nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulenti, ex-
crementorum copia, somnus multus & profundus. Calido,
& sicco cerebro præditi, recrementis carent, exactos sensus
obtinent, vigilantissimi sunt, facile caluent, primum verò
capilli celerrimè ipsi proueniunt, & optimè habiti, plenif-
simiq; , nigri, calidi ad tactum capitis, rubriq; vsque ad vigo-
rem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita vt vtraq;
paululum excedant mediocritatem, colorati calidiq; sunt,
venæ oculorum grandes, excrementa pleniora, mediocriter
concocta, capilli recti, subflauì, caluitium haud facile expe-
riuntur, verùm capita ipsorum calefacientibus, humectan-
tibúsq; implentur, grauanturq; . Vbi verò humiditas, calidi-
tásq; accreuerit, caput morbidum euadit, faciléq; ex calidis
& humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamen-
to præditi, vigilare diu nequeunt, dormientes autem imagi-
nibus, per insomnia torquentur, oculi caligant, non exactos
sensus obtinent. Frigida verò simul & sicca temperamenta
cerebri, frigidum decolorq; caput efficiunt, oculorum ve-
næ non extant, à frigidis causis promptè offenduntur, còq;
inæquali valetudine fruuntur, sensibus per adolescentiam
exactis inculpatísq; , processu temporis subito contabescunt:
summatim circa omnes capitis partes citò consenescent,
capilli à natali die vix erumpunt, exorti non alantur, rufe-
scuntq; . Humidum frigidúmque temperamentum cerebri,
reddit

reddit soporosos, somnolentos, sensibus vitiosos, excrementicios, frigori opportunos, capita habentes quæ faciliè repleantur, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitium experiuntur.

Ventriculi temperaturæ notæ.

CAP. LXIII.

Ventriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctuationes experiantur, vel id quod redundat in ventriculo supernatet, cibisque delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis vrget, & largior humor non molestat, cibique placent humidiores. Calidior natura ventriculi melius sanè concoquit, quàm appetat, & dura potius, quæq; difficulter possint immutari, calidis cibis, & portionibus oblectatur, neque à frigidis quicquam incommodi percipit, si modicè vtatur. Frigidior, appetendo quidem valet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaque alimenta assumpserit, quæ faciliè in eo acescunt, frigidis quidem gaudet, sed immoderatus assumptis promptè offenditur. At intemperies ex morbo contracta hac ratione ab insitis differunt, quòd contraria sibi, non similia appetant. Si igitur venter probè concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos ædat ructus, immodicum etiam seruorem igneum fatetur: si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos probè concoquat, immodicum: si pisces concoquat, illos minus, imbecillum. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidoroso, graueolens, aliasq; extraneas qualitates ructant. Communiter autem vtrisque nausea superuenit. verùm si vitiosi humores in concauo ventriculi spatio supernatent, vomitu reiiciuntur. qui autem corpore ventriculi contenti, tunicis eius adharescunt, frustra cum obinane ad vomitum nauseam conturbant.

Pulmonis notæ.

CAP. LXV.

Non modo ventriculus sitim vel adfert, vel arcet, ac frigida calidaq; portionis appetentiam facit, sed etià quæ in thorace continentur viscera, cor, pulmo, & iecur. Verùm qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantq; longius, item sentiunt in thorace ardorem: non sicuti qui in ventriculo subter præcordia illum experiuntur.

† Quia

† Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, ac frigida potio magis quàm calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aër inspiratus refocillat, quum nihil ventriculi vitio sitibundos soletur. Hac ratione qui è contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiam percipiunt, quod maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adéoq; pituitam sereatu & cum tussi reiciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodum humidi excrementicij sunt, & obscuram raucamque vocem efficiunt: ac recrementa ipsis interueniunt, ubi aut vehementius, aut acutius loqui studuerint.

† Hæc verba ita leguntur in vetusto codice. καὶ μὴ δὴ καὶ πίνοντες, οὐκ, ἀνίσταται πίνοντες, καὶ τὸ ψυχρὸν ἐλάχιστον ποτὶν ἵσχοιεν ἀντὶ τῶν πολλῶν καὶ πολλῶν τοῦ διψῶντος. ἢ περὶ τὸ πολὺ διεμῖν. Id est. Quinetiam si bibant, non statim sitire desinunt, ac frigida pauca potio magis quàm multa calida sitim ipsorum restinguit. Qui sensus huic loco magis conuenire videtur.

Cordis notæ.

C A P. LXVI.

CORdis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus velox & creber, itidē audacia, insanaq; ferocitas: thorax ipsis hirsutus, præsertim pectora existunt, ac præcordiorum regio his vicina: magna verò ex parte totum quoque corpus calidum, nisi iecur valide renitatur. Quinetiam thoracis latitudo calorem notat, nisi & hic cerebrum valde resistat. Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui tale habent, † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes pectore glabro. Cor siccius pulsus ædit duos, iram excitat non procliuem, sed feram & quæ non facile queat placari, magna verò ex parte, vniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur repugnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad iram proni, sed quæ facile pacari possit, ac totum corpus humidius, nisi iecur resistat. Calidum & siccum cor ostendunt pulsus duri, magni, veloces, & crebri, item respiratio magna citata & frequens. hoc donati corde, maxime hirsutum pectus, nec non præcordia obtinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, temerarij, moribus tyrannicis: etenim ad iram procliues, quæ non facile conquiescat. Si autem humiditas cum calore superauerit, tales minus hirsuti sunt, quàm commemorati, prompti autem functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad

C

iram prono duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisque, pulsus quidem molles, mores autem pusillanimes, timidi, & pigri: talium pectora pilis vacant, ac nequaquam iram retinent diu, quæ admodum neq; ad eandem procliues sunt. Frigidum & siccum cor, pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minimè omnium iræ sunt obnoxij, sed ubi semel eam conceperint, diu retinent: pectora ipsorum omnium maxime pilis vacant.

† Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetam, quas Cratander formis expressit anno 1543. et Orosius locum hunc peruerterunt. Ita enim legendum putant, ἀπολαύει καὶ ἀμύδῃ, cum ex fide exemplaris vetustissimi artis parue Galeni (ex qua totus hic locus desumptus est) quod Alalus sequutus est, legendum sit ἀμύδῃ. ἀμύδῃ enim significat ἐκαστὸν, id est, cunctatorem. Et ἀμύδῃ vel ἀμύδῃ, id est, cunctatio propria eorum est, qui cor frigidum habent, v. scribit Gal. lib. 2. περὶ κρᾶσις. Quod autem Orosius ex Orbasio legendum putat καὶ ἀπολαύει καὶ ἀμύδῃ, quæ magnum vitium in ea scriptura. Nam pro ἀμύδῃ omnino legendum est ἀργὴ, id est, pigri (Nam ἀμύδῃ affectus est cerebri potius quam signum, quo cognoscas cordis frigidam intemperiem) pro ἀμύδῃ vero legendum est ἀμύδῃ, ut iam ostendimus. Ferè enim fit ut curi si hi ἀπολαύει, ἀμύδῃ inueniantur.

Iocinoris temperatura nota.

CAP. LXVII.

IEcoris calidi notæ, venarum latitudo, flauæ bilis copia, per ætatis autem vigorem, etiam atræ, sanguis calidior, eoque totum etiam corpus existit, nisi cor obliterit: præcordia & venter pilis obstita sunt. Frigidioris indicium, venæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, totiusque corporis habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia & venter pilis vacant. Siccus iecur testatur, sanguis crassior minusque redundans, venæ duriores, ac vniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, venæ molliores: sic etiam totum corpus, nisi cor resisterit. Calidi simul & sicci indicia sunt, præcordia maxime hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis vigore, atræ, venarum latitudo duritiesque: pari modo & totum corpus calidum siccumque. Siquidem calor à corde procedens, frigiditatem à iocinore pro

prouenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas caliditatem, siccitatem verò non potest cor humidius ad contrarium perducere. Constat autem quòd si in idem vtriusque principij temperamenta concurrerint, totum omnino corpus, illorum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus quàm calidum & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum verò sanguinis, venas grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obstat. Quòd si vtraque qualitas longius à naturæ modo recesserit, morbis qui ex putredine vitioque humorum habent originem, corripiuntur: idque magis, si plurimum humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus vitiosi fiunt. Caterum humidius frigidiusque glabra habet præcordia, sanguinem magis pituitosum, nec non venas angustas, totumque corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum iecur corpus efficit, modico sanguine, venisque angustis, & frigidius, præcordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

Testiculorum temperatura notæ. CAP. LXVIII.

CAlida testiculorum temperatura, ad libidinem proclivis est, fœcunda, & masculos procreat, parteis genitales celeriter hispida efficit, ac vicinas etiam attingit. Frigida contrà. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca, pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estque fœcundissima, ac celerrimè ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales itaque testiculi hispida statim genitalia, eorumque viciniam efficiunt, sursum, vsque ad umbilici regionem: infra, vsque ad media femora. ac eiusmodi temperamentum abundè venerem commouet, sed celerrimè satiatur, & si cōpellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales reddit: copioso autem semine magis abundant, non tamen magis quàm alij appetunt, minus autem frequentiori concubitu læduntur: si autem vtraque & humidum & calidum impense creuerint, non sine noxa à venere abstinere. At humidi frigidique temperamento testiculi, vicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt. neque ad actionem excitantur, † aquosum, tenue, & inualidum semen, ac fœminæ efficax proiciunt. Siccum frigidumque temperamentum, alia

quidem similia predicto, crassius autem semen & planè exiguum progignit.

† Scriptura vetus huius loci est, ὁδὸς τῶδε ἢ καὶ λεῖτον ἀντὶ τοῦ σπέρματος καὶ ἀγόνου ὅτι καὶ ἀκαλόγονον, Semen ipsorum est aquosum, tenueq; ac infæcundum, quem locum ita legendum esse faciliè ex arte parua Gal. atque aliò ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

Que prætermissa sunt.

CAP. LXIX.

Singulæ corporis nostri partes peculiarem quandam & Stenperaturam & vim sortitæ sunt: omnium verò notas hoc loco exponere necessarium non esse duco, quum infinitæ propemodum sint. & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quæ potissimum totum corpus consortij quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & via considerare præcipimus, temperamenta ipsorum tum ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt dignoscetes. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

Quomodo calida intemperies corrigatur.

CAP. LXX.

Qum itaque in calida intemperie bilis superet, si per inferiora descendit, notum est omnibus, nullū oportere negotium faceßere: si ad superiorem ventriculum tendit, vomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu ciatur. Vtilius autem exercitium ipsis est, quod non velox ac validum est, sed remissius leniusque. Nonnulli vehementer calidi nequaquam exercitationem requirunt, verum obambulatio balneumque ipsis sufficit, iidem lauacris quoque secundum cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione victus humectant, indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiorum valentium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauare, & à cibo rursus debent. frigida hos potius iuuat, Venus autem siccis temperamentis maximè est inimica: cauenda ipsis lassitudo, insolatus, sollicitudo, & vigiliæ. Humidæ & calidæ natura intemperies in pueritia morbis patent rheumaticis, plethoricisq; & præterea iis qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in ventre cō-

coct

coctione excretionēque per vrinas. quapropter si etiam ante cibum bis tēve lauent, vtanturq; aquis natura calidis, magnum sentiunt præsidium. Porro defluxionibus prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione etiam ante cibum, vrinæ, aluique excretionibus. Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam vti, & purgationibus, cibis boni succi, & vino quod vrinam moueat.

Quomodo frigida intemperies emendetur.

CAP. LXXI.

INter frigidas intemperies, tres numerantur differentia; ex quibus sicca est deterrima. quod enim processu temporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaque humectare eos & calefacere oportet, quod commode fiet exercitiis mediocribus, cibo humido & calido, vini calidioris potu, somno pleniore, cura tamen adhibita, vt quæ in corpore recrementa quotidie procreantur, omnia euacuentur. Cæterum venus omnes sicciores, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit: solis autem calidis humidisq; tuta. Porro vitiosa quoq; frigida temperamenta sunt quæ humiditatem habent coniunctam: & hæc potissimum rheumaticis corripuntur morbis. prodest ipsis balneo abstinere, largius exerceri, victus tenuior, vnctiones mediocriter calidæ. Qui autem frigidiores natura sunt mediocriter verò sicci humidique temperamento, horum calor suscitari firmarique debet, ac in humiditatis siccitatisque totius victus specie, media deligi debet.

Quomodo sicca intemperies in ventriculo, veluti exemplo, deinde & alia corrigantur.

CAP. LXXII.

INtemperies sicca, alia est, vbi solida similarium partium substantia reddita est siccior, quæ nihil in medicina spei habet, alia cum substantia, quæ ex humore concreto constat, est colliquata: tertia præter has cum propria humiditas vnde partes nutriuntur omnino est absumpta: quæ continetur in omnibus animalis partibus, roris modo eis inspersa. hanc igitur particulis sine nutrimento inserere, nulla ratione queas, ideoq; difficillima est omnium eiusmodi affectuum curatio. At quæ in exilibus arteriis venisq; consistit siccitas, curationem recipit, si singulas similarium partium, propria humiditate, humectantis alimenti auxilio repleas. Bal-

neum igitur temperatum conuenit, in quo diutius versari hominem expedit: inde statim lac exhibere asininum, quod recens mulctum fuerit, & pauxillum mellis repidi adiectum habeat: postea conquiescere ad secundam usque lauationem permittes, tum modice fricabis simul & pinguiter, utique si lac quod sumpsit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum ventris mole licet conicere. modicum verò temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinque æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurium. Quinetiam post vnāquāque lauationem, hominem, priusquam se vestiāt, oleo perungemus: ac si quidem lactē oblectatur, post secundam quoque lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatum. hinc ubi rursus conquierit, ad tertiam reducendus est lauationem, aut ilico ad cœnam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiose in furno sit coctus. obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facile, nutriendus, minimeque glutinosum & excrementitiū. potus, vinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ misctionem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astrictionis particeps: atque hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica verò non tam exacto victu indiget, & plenior cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturque ei frigiditas mediocris: in qua ad calefacientiū materiam transeundū est: ac commemoratis modo adiiciemus: in lactis quidem usu, mel copiosius: vinum autem minus aquosum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idque non naturalibus modo ipsorum temperamentis, verum recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea vnguento vngendus assidue venter est, aut mastichino. At verò si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & vix emendabilem censeo: eisdem verò utere, & melle per se discocto despumatoque, vinū autem eliges antiquius. Optimum sanè medicamentum talibus est, quo picatores assidue vtuntur. & illinere eo ventrem conueniet, ac post auellere etiamnum calidū. Cæterū iuuat eos probè carnosus puellus

vñ

vnà sic accubans, vt semper abdomen contingat. Iam verò multæ siccitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sane intemperie primum curationis modū seruabimus, ita vt mel prorsus nō degustetur, vinum verò exhibeatur quod minime sit vetustū. Porro cibos tepidos, lactis modo offeremus, & ventriculū oleo tum crudo tum melino perūgemus. Verūm hos vehemēter admodum refrigerare periculosum est, quandoquidem hæc affectio, febris quodammodo naturam, vbi calor superarit, imitatur. Fingamus itaque rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem, talem, frigida aquæ potu curabimus. huc optime facit vsus ciborum astringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, siccantes cibi, ita vt non calefaciant, aut refrigerent valide, auxiliantur. adhæc consuetæ potionis penuria. Si cum frigiditate humida vrget intemperies, optima remedia sunt, omnia acria. misceri autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua potio, eaq; vini valide calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū curantur. Quoniam verò sæpe in ipso vētriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas ventriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his differere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per vomitum facile conquiescit, si autem rursus ex alia quapiam aliisve particulis confluxerit, exactam requirit dignotionem, curatio verò statim subsequetur. Et enim vniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, iis quæ recipiunt, ne facile quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & iis quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt. At vitiosos in ventriculi tunica humores mediocriter purgantibus eduemus, cuiusmodi est aloë & ex ea confectum medicamentum amarum quod hiera picra dicitur. Verūm quibus lenta simul pituita ventriculo impacta est, iis prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecent. deinde purgatio tentanda. Quod si ad vomitum sunt idonei, ex sumpta radícula vomant. Sin nec lentus humor sit nec crassus, vtique abunde est à ptisanæ cremore vomuisse, itē à mulla. proficiet & ab synthij succū in mulla bibere, reliquarū verò partium intemperies haud absimiliter curare oportet, ita vt humoribus

idoneos effluxus inuentas. Nam si particula sensibilem, effluxum non habeat, redundantem in ea vel saniem vel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flatulentus, euaporatu discutere ac vacuare conuenit.

De alimentorum facultatibus. CAP. LXXIII.

QUUM de alimentorum facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda praecipit, proximū est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quā particulatim ipsa persequamur, paucula quaedam praelibauerimus. Quippe alimentorum vireis, si quid aliud, perceptas habere conuenit. Quae igitur attenuandi virtutem obtinent, meatus aperiunt, viscosa adhærescentia abstergunt, crassa incidunt extenuantque. Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosa biliosaque; contrahes recrementa. ac si vberius ingeras, sanguis atra bile vitiosus redditur. Quare cōtinuus ipsorū vsus praesertim biliosis temperamento vitari debet, conueniunt enim solis iis, qui pituitam, humoremque; crudū, lentum, & crassum collegerunt. Porro quae incrassandi viribus cōstant, valentis admodum materiae sunt, & si in ventriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassifundantur taxat succi, ut lenticula: alia viscosa, sicuti maluae quibusdam utraque cōtingunt, nempe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine praedita. Itaque victus extenuas ad sanitatē tuendam tutior quā qui incrassat, existit. Quum verò imbecillis sit materia nō robur nec vireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnunquā valentis materiae cibum, quum inedia quēda pressit, mediocriter exhibere. praesertim verò citra periculum assumunt, qui se exercent, & quātum libet dormiunt. omnes autem quibus ante cibum exercitari non licet, crassi succi alimenta euitabunt. Imò neque in otio degentes eiusmodi cibos assumunt. Porro quemadmodum summum otium maximē valetudini tuendae obest, ita mediocris motus summum adfert praesidium. Ceterum cibi inter eos qui incrassant & attenuant, medij, omnium sunt laudatissimi, ut qui mediocrē substantia sanguinē procreet. Talis itaque cibus corporibus nostris congruit: qui autem vitiosos humores gignit, noxius est, eoque semper cauere debet. Iam & varia ciborum genera assumere, cautio est, praesertim si ex diuersis consistant facultatibus. ingesta enim

enim concoctionem non, vt par est, sortiuntur.

De oleribus.

CAP. LXXIIII.

LActuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq; somnum accersit. vt autem inter olera valenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidique temperamenti, sed minus quam lactuca existit. Malua refrigerat quidem, sed non euidenter, magis autem humectat: vnde etiam aluum subducit, idque propter genuinam eius viscositatem. Beta vi abstergens ventrem subducit, eoq; stomachum largius comesta erodit, iecoris lienisque meatus aperit. Brassica bis cocta si edatur, aluum cohibet: semel autem non tamen vehementer cocta, cum oleo & garo, vel sale comesta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius etiam lenticulae efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brassica aluum emollit: manifesto salsa, & subamara: idem praestat halimon, amplioris autem salae qualitatibus particeps, aluum subducit, magis quam brassica stomacho conducit, ceu astringentis modicae compos: lac & semen producit. Blitum & atriplex humida quidem & ventrem soluunt, sed parum alimenti praestant. Omnia spinosa vt scolymos, attractylis, eiusque generis alia stomacho praeter cinaram conducunt, quae cum dura euaserit, improbum succum procreat, quapropter optimum est, incoctam cum oleo, garo, & coriandro assumere. Apium, hipposelinum, sion, & smyrnium, omnia urinae ciendae sunt, sed smyrnium aromaticum spirat, magis acre, urinae ducendae proficit, & mulieribus mensibus commouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quam cephalaeam dicunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acria, sed maxime nasturcium: concoctu vero difficilia, stomacho inimica, & vitiosi succi. Vrtica extenuat, ventrem subducit, modice alit. Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amarae qualitatibus particeps. praeterea stomacho congruit, vt etiam cibum fastidientibus cum aceto assumptum, proficiat: parum vero alimenti corpori ministrat. Porro syluestria dicta olera maxime vitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecoris lienisque meatus aperit, pituitam subducit. Utendum vero ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelao.

c 5

De asparagis.

CAP. LXXV.

BLiti, lactuca, atriplicis, malua & beta, planta quidem humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculæ, nasturcij, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt planta quidē sicca, asparagus autem humidus est. At à spinosis stirpibus palustris & hortēsis, asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, stomacho quidem vtilēs sunt, & vrinam citant, sed inualide alunt. At si probe coquantur, magis quàm ij qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Confimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

De ijs quæ radices esculentis habent.

CAP. LXXVI.

Napus & rapa si bis coquantur, nihilo minus quàm reliquæ stirpes alunt, continue autē assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergunt, cibi cupiditatem mouent, stomachū confirmant, & viscosos pectore humores eliciunt: bis incocti valentius quidem nutriunt, sed nihil emolliuntur, amara ipsorum qualitate sic abolita, præterea semen genitale augēt, libidinemque excitant, si largius vtare. item inflationes & tormina, pariunt. Quod si ex aceto cū garo & oleo edantur, suauissimi sunt, flatu non generant, valenter alunt, concoctu faciles. Pastinacæ verò, dauci & cari radices quidem minus quàm rapa nutriunt, calidæ autem aromaticæque manifeste sunt, & vrinam cient: Si verò immoderatus vtatur aliquis vitiosos humores gignunt & ægrè concoquuntur cōmuni radicum ratione. Nonnulli syluestrem pastinacam daucum nomināt, efficaciorē ad vrinam ciendam virtute præditum. Radicula quæ græcis raphanis dicitur extenuādi calefaciēdiq; vireis obtinet. sumitur recte ante cibū ex aceto & garo, alui ducendæ gratia: secundum cibum, nequaquam. Cēpa, allium, porrum, & ampelopræsum acri virtute donata, corpus calefaciunt, extenuāt, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, omnino nihil. Atqui allium magis meatu referat, humoresque discutit. Sunt autem porris sicciora ampelopræsa, vtpote syluestria. In totum omnia cruda olera, si edantur, peiores quàm cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitij continent. Verū quæ condita vel muria vel oxalme reponuntur, stomacho prosunt & appetentiam excitant, crudos humores incidunt, sed ægrè concoquuntur: & si abutare, vitiosos succos gignunt.

De

De tuberibus & fungis. CAP. LXXVII.

Tuber humorē de se reddit qualitatis expertem, sed frigidiorē & crassi succi. Fungi verò frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocentes boleti sunt, qualitatis expertes, si probe coquantur. Qui verò ammanitæ dicuntur, secundum ab his ordinem obtinent: aliis fungis abstinendum, plerique siquidem ipsorum lethales. Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edantur, periculi occasionem frequenter præbent.

De frumentaceis.

CAP. LXXVIII.

Ex iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, verum elotus, prauus habetur, quoniam promptè crassescens, concoctionis expertus permanet. probatur magis cremor chondri, si totus probe ptisanæ modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chondro quidem respondet: sed aluum magis astringit. Triticum, elixum sanè, concoctu difficile est, & inflationes creat: ubi verò concoctionem expertum est, alimentum præbet valentissimum. In panem autem coactum minus inflat, minusque agrè concoquitur, utpote fermenti & salis particeps. Inter panes firmissimus est siligineus, deinde ex simila, tertius à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas confusaneum appellant. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluum deiicitur. Amylum parum alimentum præstat, quemadmodum & panis elotus. Ordeum frigidae facultatis est & absterforiæ ptisanæ modo incoctum, humectat. torrefactum, quemadmodum in polentis fit, desiccatur. Polenta per ætatem ante balneum cum aqua pota, siti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilior concoquitur flatulq; magis quam panis ordeaceus gignit: melle autem adiecto aluum citat. Auena & calida est, & imbecillis materiæ. Milium & panicum refrigerant, siccant, paucillū nutriūt, & aluū cohibēt. Omnino autē milium panico est præstantius. Oryza vix concoquitur, parū nutrit & ventrē retinet. Porro ptisana in hunc modum coquitur: vni eius parti aquæ quindecim & olei momentum adiiciuntur, ubi ebullierint acetum quoque addes. quum iam exactè cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur, in quibusdam porram & anethum ei miscent. Ceterum auena chondrusque in ptisanæ modum decoquantur.

De

De leguminibus.

CAP. LXXIX.

EX leguminibus lenticula vitiosum succum, & melancholicum producit, imò etiam, præsertim bis cocta, aluum cohibet. decoctum verò ipsius cum oleo & garo potum aluum proritat. at quia inflationes mouet, satureia, vel pulegium admiscendum est. Fabæ leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia autem faba humidior nostra est, & excrementicia. Pisum laxum quidem, non tamen adeò flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinem incitat, & calculos confringit: frictum, minus quidem inflat, sed ægrè concoquitur. Lupinum concoctioni rebelle, haud facile per aluum transmittitur, crudi humoris efficax. Fœnugræcum si ante cibum sumatur, calefacit, & aluum mouet. Ochron & phaselum macerata donec etiam radices succreuerint, ex garo ante cibum sumpta, aluum subducunt, ac plus quàm fœnugræcum alimenti exhibent. At phaselum & dolichon integra cum siliquis viridia comesta, excrementitia magis redduntur.

De temporarijs fructibus.

CAP. LXXX.

Cucurbita refrigerat humectatq; , & ventrem subducit, sed parum alit. Pepon totus vitiosi succi est, frigidus, humidus, & vomitioni dicatus: non coctus, bilem generat. semen eius vrinam citat & calculos in renibus confringit, ac in totum, abstergit vehementer. Melo pepon omnia quæ de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone frigidus, humidusq; est, sed acrius cit vrinam, difficilis concoctu & vitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerant humectantq; , imbecilliter alunt, & vitiosum humorem progignunt.

De arborum fructibus.

CAP. LXXXI.

Ficus & vuæ inter omnia poma principatum obtinent, ut quæ minus vitiosos humores generent, & magis nutriant. Inter hæc ipsa ficus probioris succi sunt, valentiorisq; materiae aluo, & vrinæ ducendæ, renibus purgandis, idonea, præsertim admodum matura. Idem præstant caricae, quam inflationes & sanguinem non probum pariant: eoque frequentius usurpatae, pediculos procreant. Vuæ, si non descendunt, non quidem cōcoquuntur, verùm etiam crudum humorem generant: sin autem deiciantur, moderatiores sunt. Vuæ passæ aliis calidiores sunt, stomacho gratiores, valent

valentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ aliis sycamina Græcè appellantur, impensè humectant, mediocriter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, ventrem soluunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cerasiis, dulciora quidem aluum subducunt, verum stomacho inimica: quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædunt, sed non ventrem citant. Atq; hæc ratio tum in vis & moris, tum in aliis compluribus seruatur. In vniuersum, astringentia si prius ante alium cibum aut eduntur, aut bibuntur, aluum comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem venter non responderet, ij molliendi virtute prædita, nempe olera aut pisces, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ dum ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem incitant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem succi est crassiq; , & ad nutriendum valens, non tamen ex facili concoquitur. Persica prauæ succi, acidiq; sunt, & facile corrumpuntur. eoque primum exhiberi debent, quo protinus deiciantur, nullamq; in ventriculo diutius immorata, corruptionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persicis præstant, neque enim acescunt, neque similiter corrumpuntur, ac sunt etiam gustu gratiora. Malorum, dulcia sanè aliis calidiora sunt, & facile in corpus distribuuntur, præcipuè vel assa, vel elixa: acida, magis refrigerant, & humores ventriculo impactos incidunt: austerum stomachum firmant, & ventrem reprimunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira grandia maturaq; , præterea etiam valentius nutriunt. Mala punica frigefaciunt, & parum alimenti præbent. Mespila sorbaq; vehementius astringunt, eoque aluo fusæ accommodantur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho profunt, ventrem retinēt, crassos, glutinososq; humores gignunt, capiti faciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stomacho aduersantur, crassi humoris efficaces: muria condita, & colymbades, si ante cibum sumantur, appetentiam faciunt, & aluum subducunt, ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nuces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux viridis humidior est, & ventrem citat: arida, si ubi in aqua commaduerit membrana ipsius interior adimatur, consimilem viridi potestatem obtinet. Amygdala incidendi extenuandi; viribus pollent, ideoq; viscera & thoracem expurgant, idq;

idq; efficacius amara. Similiter & pistacia, verum iecur efficacius obstructione liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in mulla elixa ventrem solvunt. Syrica ægrè coquuntur, stomacho noxia, modicq; alimenti. Siliquæ ægrè conficiuntur, aluum cohibent, & humores creant vitiosos. Sycomora manifestò & frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro valenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abundè refrigerat. Glandes non minus quàm frumentacea alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tardè permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

De animalibus, & primò de volatilibus.

CAP. LXXXII.

ANimalia quæ volatu nituntur, minus quidem quàm quæ pedibus fidunt, & præcipuè quàm sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisq; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merula, & exigui passerres, inter quos sunt etiam à turribus vbi nidificant pyrgitæ appellati, durius alimentum præstant, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multò durius, cōcoctu difficilius, magisq; fibrosum pauo exhibet. Anserum verò & struthiocameli caro excrementicia, ægrius quàm omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quàm aliarum auium probi succi existunt. Porro gruum caro fibrosum durumq; præbet alimentum. In totum iuniora veteribus humidiora sunt, promptius concoctioni parent, valentiorum cibum præstant, atque per aluum facile descendunt. Similiter elixa ab asis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur, minúsque excrementicia sunt, quàm quæ in paludibus nutriuntur.

De ouis.

CAP. LXXXIII.

OVa gallinarum, phasianorumq; omnibus præstant. Anserum & struthiocamelorum praua habentur. Ex omnibus autem recentia veteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates læuigant. Reliqua omnia ad concoquendum rebellia, tardè transeunt, & succum gignunt crassiorum, præter ea quæ prædicta dicuntur, hæc autem sunt si
cruda

cruda immergantur in aquam calidam cum garo, vino, & oleo, & in vase mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia verò quæ facta gine friguntur deteriora sunt.

De pedestribus animalibus.

CAP. LXXXIIII.

INter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quàm alij cibi alimentum præbet, eò quòd gustu & odore familiaritatem cum humanis corporibus sortita est, ut nonnulli qui imprudenter humanas carnes gustarunt, cognouerunt. Alimentum verò quod ex illis contrahitur, viscosum est, & non facile in membra potest distrahi. Ouilla excrementicia prauiq; succi est. Caprilla acris est malumq; succum efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatem, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina crassi succi est, sed minus quàm ouilla & bubula. Ceruina dura est, & concoctioni rebellis. In totum, iuniora vetustis humidiora, molliorq;, & ad concoctionem faciliora sunt. Hoc modo etiam castrata non castratis, bene habita macris præstant.

De partibus animalium & sanguine.

CAP. LXXXV.

SVMMAE corporis particulae neruosae sunt, citra pinguedinem, & excarnes, eoque glutinosa, exigui alimenti, ac ad aluum mouendam efficaces, si excipias quæ volatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Rostra & aures cartilaginosa, & ad concoctionem sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxave, exanguis: parum alimenti habet. Glandulae suaves sunt, & friabiles, sed mammarum, præcipue scropharum, quum lacte scatent, dulciores habentur, hæ autem non minus quàm carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuaues & concoqui difficiles. At saginatorum gallinaceorum testiculi & suaves sunt, & probum corpori alimentum præstant: quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & vitiosos creant humores. Cerebrum pituitosum, crassi, vitiosiq; succi, lentè transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nausæam excitat: si autem probè coquatur, plurimum exhibet alimenti. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassi succi, ægrè concoquantur, & lentè transeunt. At suillum iecur aliis

aliis præstat. Lien tum vitiosi succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo facilius quidem, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorem cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, vulua, intestinâq; dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia siccius, quàm domestica alimentum exhibent, minúsque excrementicium. Sanguis quilibet, vix concoquitur, præsertim crassus, & melancholicus, qualis nimirum est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cõmendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam vero, & cum aliis visceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinem edunt. Caprillum verò nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

De lacte.

CAP. LXXXVI.

L Ac coctum probè nutrit, gingiuis autem & dētibus nocet. quapropter vbi assumptum est, primum mulsa, deinde vino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia, ventrémque inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassius autem è contrario, magis alit, minus descendit. At caprillum lac, mediocri consistentia est, sicut ouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusque efficitur.

De lactis potione.

CAP. LXXXVII.

Q Vi lac potare voluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctum fuerit, & inferius descenderit. Satiùs itaque est manè recens multum bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, ut quòd laborantibus necessario acescat, sed lentè obambulare satius est, & interea vigiles conquiescere: hoc enim pacto quamprimum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendum est: ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaque purgat vtiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in ventre continentur: mox, venas ingreditur, ac optimè nutrit, atque non amplius deicitur. Porrò in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad ventrem concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autem primum lentè paulatimque ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in caseum coalescat. quod optimè fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id
quod

quod recesserit vndique abradamus. Agitabitur autem ferula leui & tenui: & si quid oris ollæ inferuescat, hoc quoque spongia adimere oportet, id enim subinde etiam reliquum lac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi, lac coquendum est, vsque dum æquabiliter crassius dulciusque crudo euaserit. Quod in eo tenue est & serosum, calculis marinis ignitis in id demissis, ebibitur consumiturque. Atque hoc alui fluxionibus, præsertim biliosis est accommodatum.

De lacte scissili.

CAP. LXXXVIII.

Serosa lactis portio à caseo discernitur, si vehementius ad ignem largiorē citra fumū excoquatur, deinde colo, aut panniculo exactè traiciatur. Porro miscetur sero mellis momentum, aut oxymelitis aliorūve, daturq; subducendi ventris gratia, ætate quidem florentibus ad duos sextarios: iunioribus, non minus sextario. Quod verò marinis calculis ignitis aut ferro candenti demisso lac increassatum est, intestinum torminibus & alui profluuiis rectè exhibetur.

De caseo.

CAP. LXXXIX.

Omnis casus acris est, firim facit, agre concoquitur, vitiosos succos, calculosq; generat. Laudatior est recens, laxus, mollis, suavis, & modici salis particeps: qui secus habet, pessimus est.

De piscibus.

CAP. XC.

Omnēs pisces frigidioris, humidiorisque temperamenti esse, nulli non constat. Omnium verò optimi sunt, saxatiles, ad concoquendum prompti, bonique succi, modice humectant, vbi non duram carnem occupauerint. Verum ex non saxatilibus, pelagii, multum ab iis variant, qui in limo nutriuntur, vel in fluuij ostio, sed omnium deterrimi qui vel in stagnis vel mari stagnante viuunt. Particulatim verò capito, si pelagius fuerit, mediocriter suavis est, minus concoctioni rebellis, & boni succi, sanguinem verò gignit tenuiorem imbecilliorēque. similia & lupus præstat. Mulus qui & ipse pelagius est, aliis piscibus durior est, fragilis, concoctu facilis, validæ ad alendum materiæ, suavis & pinguedinis expers.

De testaceis.

CAP. XCI.

Generatim pisces qui testa conteguntur, Græci vocant ostracoderma, falsum crudumq; humorem producūt.

d

Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent & facilius descendunt. Chamæ verò, purpura, vugues, spondyli, buccina, cochlea, atq; huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacostrata græcis nominantur, nempe gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & ventrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus verò crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concocti difficilem, valentis materiæ & succis vitiosam fortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frigefaciunt, exigui alimenti, & vrinæ ciendæ efficaces.

De mollibus, quæ malacia dicuntur.

CAP. XCII.

Molles cute pisces, utpote polypi, sepia, loligines, dura carne & cōcoqui difficiles sunt, præcipue polypi, falsum humorem modicum obtinent: concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

De cartilagineis.

CAP. XCIII.

Cartilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemq; carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile concoquitur, & probe alit. Raia, leuiraia, squatina, atq; eius generis reliqua, duriora sunt, cōcoctioni renituntur, & valentius nutriunt. In summa, quibus dura caro est, & agre concoquuntur, & plenius alunt: ubi verò concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

De cetaceis.

CAP. XCIII.

Cetacea, utpote balenæ, vituli marini, libellæ, delphini, & prægrandes thynni, duram, concocti difficilem & crassi succi carnem habent. Sale condita eiusmodi modiora efficiuntur, iam qui ex aliis piscibus humidiores habentur & magis excrementicij, ad condituram magis sunt accommodi. Talis autem in condituris est differentia, qualis & piscium, ynde conficiuntur.

De vini viribus.

CAP. XCV.

Qui sanitatis tuendæ curam suscepit, eū quoq; vini facultates cognitās habere expedit. In vniuersum itaque vinum omne nutrit, verum rubens & crassum, magis: bon

boni autem succi nō est efficax. Item dulce & ipsum quidem impense nutrit, sed stomacho nocet. Austerum stomacho quidē amicum est, verū aegrē in corpus distribuitur, leuius-
 que alit: hoc autem minus, album. Præstantissimum est co-
 lore fuluum. Porro vetustius nouo magis & calefacit & de-
 ficit. hæ igitur vini sunt facultates, veluti summatim expo-
 sitæ. Cæterū vinum calorem genuinum refocillat, vnde cō-
 coctio melior, & sanguis probus euadit, cibum per omnia
 corporis membra, vt quod facile penetret, deducit. Quam-
 obrem ex morbo emaciatis reficit, corpūsque ipsorum au-
 get. Etenim cibi cupiditatem facit, pituitam extenuat, bilē
 per vrinam educit, & bonum colorem conciliat, animo læ-
 ticiam, voluptatemque parit, & robur adiicit. Harum itaq;
 commoditatum moderata vini potio, immoderata verò cō-
 trariorum occasionem præbet, eoque temulenti, animo tur-
 bantur. desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur
 premuntur. qua de causa immodica vini potio diligēter vi-
 randa est, quanquā longiore temporis spacio interposito
 liberaliter bibere conducat. ita namque vrina largius & su-
 dores promouentur. Vincit autem mox vomere, assumpta
 prius mulsa, quò ne paululum quidem ab eo noxæ perci-
 piatur. Qui igitur potationi indulgebit, alio cibo non ad-
 modum repleti debet, sed inter potandum brassicam eli-
 xam esse, & bellaria præsertim amygdala assumere, vt quæ
 capitis dolores leuent, & vomentibus nihil adferant mole-
 stia. Præstaret autem absinthij dilutum ante potionem bi-
 bere, vt quod omnium maximè crapulæ discutiendæ sit effi-
 cax. At si quis rosionem à vino sentiat, frigidam bibet: in se-
 quenti die, absinthij rursus dilutum, obambulatione itidē,
 frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

De melle & mulsa.

CAP. XCVI.

MEL coctum valentius nutrit, quā subducat aluum:
 non coctum, è cōtrario, ac frigidis humidisque tem-
 peraturis conducit: calidis, in bilem vertitur. Mulsa verò
 nō admodū biliosis utilis est, vt quæ in bilē degeneret. Itaq;
 in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur: iis qui vi-
 scera habēt affectibus opportuna, incōmoda est. Cæterū hoc
 modo preparari mulsa debet. Octupla aquæ portio melli ad-
 miscetur, incoquiturq; donec spumare desinat. spumam ve-
 rò continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

d 2

Prostea quam omnia quæ ad victus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eo quod omniū potestremus magna ex parte initur, disseramus. Itaque somnus virium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebrum madefaciente proueniens. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi verò ægritudines obliterat, rationem vitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo. sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidus ructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli verò fluctuatione ventris infestantur, nisi vel ex consuetudine, vel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioque animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorum instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum ventris contractione deprehenditur, secundum quam vigilantia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem molitur.

Vigilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore, aut febris, aut acutiore quodam casu oborientes, secundo libro de febribus persequemur. quæ autem sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob mœrorem, aut curam, aut quandam animi ægritudinem vigilaerit, primum id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducenda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinantur, qui enim sic permulcentur somno facile capiuntur. Præterea balneis præsertimque vespertinis quum bene concoxerint vrentur, ciboque humectanti utpote lactuca & id genus aliis. nonnunquam nigri papaueris folia viridia obsoniis admiscebunt. Piscibus ad concoctionem promptis, vino largiore tenui & non vetusto recreari debent.

bent. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum non vetus somnum accersit. Noui autem qui post lassitudinem quiete subito succedente, somno caperetur. Ad hæc venus moderata id ipsum præstat. Alij caput aut pedes refrigerantes, facile somno corripuntur. At si ex cibi copia vitio ve stomacho grauato vigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quemadmodum rursus alij præter consuetudinem inedia pressi, aut modico cibo sumpto, vigiliis sunt infestati, considerare id, ac causam succidere, oportet.

De sopore vehementi quæ cataphora græcis appellatur.

C A P. X C I X.

AT si è contrario alti vehementesque somni, quæ cataphora dicitur, vrgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante vnctione abstinerebimus, medicamentis pituitam per os elicientibus vtetur, atque in totum ad calidiorem victus rationem, sicciorem imbecilliorémq; ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi affectio à frigidiore, vt plurimum & humidior materia cerebrum imbuente, accidit.

Dioclis Epistola ad valetudinem tuendam conscripta.

C A P. C.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QVoniam tibi omnium regum literatissimo esse contigit, & multum iam ætate prouecto, omnis philosophiæ ditæ, & numerarumque mathematicarum peritia excellere, existimaui eam philosophiæ partem quæ valetudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienam à regia maiestate fore: eoq; tibi perscripsi, vnde morbi hominibus oriantur, & quibus signis præcedentibus, quomodoq; ipsis succurrere cõueniat. Quæadmodum enim in cælo nunquam tempestas ingruit, quâ non indicia quædã præcedant, quibus nautæ ceteriq; probe periti homines certiores reddantur, ita humanam naturam nullus inuadit morbus, quem non signum aliquod denuntiarit. Tu itaq; si iis quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactam illorum cognitionem indipscheris. Hominis corpus in quatuor partibus diducimus, caput scilicet, thoracem, ventrem & vetricem. Igitur vbi caput morbo conflictaturum est, hæ plurimum notæ solent præcedere, vertigo, capitis dolor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora saluunt, oculi mane illachry-

mant, caligantque, nares oppletæ odorem non sentiunt, dentium gingivæ attolluntur. Quum ergo ex his aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidem medicamento, sed vel hyssopi vel origani summitatibus tritis, quæ in ollula cū musto, aut sapæ hemina dimidio deferbuerint, atque hoc absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto deducet, eaque capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia. Optime facit etiam si sinapi, mulla calida dilutum, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamque ex capite eliciat. Cæterum caput operimētis prius calefacere oportet, quo pituita liquefacta, prompte effluxioni pareat. Si quis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægritudines solet experiri, lippitudinem, glaucomata, aurium vomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri cariem quem σφακελὸν Græci vocant, grauedinem, anginam nyctilopa, teredines, vuam, capillorum defluxus, capitis vlcera, & dentium dolorem. Quum autem à thorace morbus nascetur, totum corpus incipit sudare, thoraxque, lingua fit crassior, sputum falsum aut amarum aut biliosum existit, dolor costas aut scapulas sine occasione inuadit, oscitatio frequens, vigilia, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidū, brachia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudenter hoc modo, vomitus quàm optime fieri potest, post cœnam si ne repletionem, sineque medicamēto citari debet: vtiles sunt & vomitiones ante cibum, quas Græci syrmaismos appellant. Oportet autem eum qui sic vomet, radículas tenuis præsumere, nasturtium, erucam, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida superbibita, vomere. At si huiusmodi indicia contemnantur, hi morbi solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acutæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu: Quod si à ventre morbus orietur, hæc erunt signa, venter prius cruciatur, turbaturque, cibis & potio amara videntur, genua grauantur: lumbi nequeunt: flecti, totumque corpus etiam sine occasione laborat, crura torpent, febriculæ exiguæ affligunt. His itaque cognitæ, ventrem prius emollire oportet, non medicamentis, sed victu. Tutius enim est uti iis quibus nullus error committi potest, utpote betis mullæ incoctis, alliis elixis, maluis, lapatho, mercuriali herba, & ex melle confectionibus. Omnia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod è signis intendatur

tur, cnicī succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brassica in aqua largiore cocta, eiusque succus ad heminas quatuor potus cum melle & sale, utilis est: vel ciceris aut erui decocti aquam eodem modo ieiunus utiliter bibet. Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, in his morbis tentari solent, alui profluuium, intestinorum torminibus, eorumque læuitate, ilio, coxendice, febre tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo articulari. A vesica qui nascuntur morbi, hæc dabūt signa: pleni ex cibo modico esse videntur, inflationes ventris urgent, rictus, pallor totius corporis, somni graues, vrina liuida & vix erumpens, naturalia tumēt. Quum itaque huiusmodi notæ apparuerint, odoratis vrinam cientibus tutissime occurrere malo oportet. Itaque fœniculi apiique radices, vino albo odorato maderfacito, atque huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus propinabis cum aqua dauci, smyrnij, helenij, quodcunque horum habueris, nam omnia proficiunt: adhæc aqua ciceris macerati cum vino idem efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos expectent, aquam intercutem, lienem magnum, iecoris dolores, calculos, renum cruciatus vrinæ stillicidium & ventris tumorem. In omnibus huiusmodi indiciis infantes sane leuiori, adultos, acriore curatione tractabimus. Caterum anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silentio prætermittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta conueniant, paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

Solstitium hyemale.

SOLSTITIVM itaque hyemale vsque ad verum æquinoctium auget in hominibus destillationes humiditatesque ac propterea calidioribus uti cibis, parciori potu sed meraciori, atque ex origano bibere oportet, necnon veneri indulgere. Numerantur dies ad æquinoctium, nonaginta.

Æquinoctium verum.

HOC tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis fœcies sanguinis, vsque ad vergiliarum ortum, eoque tunc maxime succosa acriaque assumi debent, corpus exerceri, & Venus. Sunt autem ad vsque vergiliarum ortum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

HOC tempore bilis amara augetur, amarâque sanies, vſque ad æſtium ſolſtitium, dulcia omnia tunc quæ aluum moucant, conueniunt, venus quàm parciffimè exercenda, hinc ad ſolſtitium æſtium dies quinque & quadraginta exiſtunt.

Solſtitium æſtium.

HOC anni tempus atram bilem aduſq; æquinoctium autumnale promouet, quapropter aqua frigida atque odoratis omnibus vtendum eſt: venus pernicioſa: aut innocentius ſaltem quæ de ea præſcripſimus adhibeto. Porro ſunt ad æquinoctium autumnale, dies tres & nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

HÆC anni pars pituitæ copiam generat, tennesq; deſluxiones, donec vergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atque acerrima, maximeq; ſuccoſa aſſumere, vomitum rariffime citare, exerceri, atque concubitum vitare. Numerantur ad vergiliarum occaſum dies ſex & quadraginta.

Vergiliarum occaſus.

HOC tempore pituita aduſque ſolſtitium hyemale in hominibus redundat, quam ob rem acerbiffima quæque, vinum ſuauiſſimum, aſſumere oportet, pinguibuſque vti & exercitari. Sunt autem ad ſolſtitium hyemale dies quinque & quadraginta.

LIBRI PRIMI FINIS IOAN-

NE GVINTERIO ANDERNACO


INTERPRETE.

PAV

PAVLI AEGI-
NETAE LIBER SE-
CVNDVS DE FEBRI-
BVS, IOANNE GVIN-
TERIO ANDERNA-
CO INTER-
PRETE.

*

CAPVT I.



AB SOLVTIS de valétudine tuenda præceptis, exequi aggrediemur, quomodo eos, qui morbis iã cõsistuntur, restitua-
mus, à similibus vtpote simplici-
bus morbis exorsî. quales nimirû sunt,
quos febriles appellât. Rursus igitur nos
Oribasij compendio, quod ex Galeni
sane potissimû, & aliorû præterea cõpluriû commētariis est
excerptû, vtêres paucula quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

*Quot & quæ principalia in morbis potissimum febrilibus per-
quirenda.*

CAP. II.

PRimum quidem perquirere conuenit, morbus salutem-
ne promittat, an mortem minetur. & si polliceatur salu-
tem, vtrum acutus sit, an longus. Hæc sanè in aliis quoque
magnis affectibus commode quærantur. Tertium quoque,
nunquid vna vice crîsim experturus, quod febribus potissi-
mum peculiare est, an particulatim soluetur.

Ex Galeni cõmētarijs, quale morbi principiu dicamus.

CAP. III.

NEque enim capitis dolores & febris idẽ existunt, quẽ-
admodum neq; vigilia, & cibi fastidiû totiûsq; corpo-
ris grauitas, aut sensus lassitudinis: verûm vnumquodq; ha-
rum licet à febre sit diuersum, ipsam tamẽ denuntiat. porro
febris inuadẽs, præsertim acuta, neq; nos potest, neq; impe-
ritum aliquẽ latere. Sed sînge, si placet, etiam latere, miracu-
lum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subter fu-
gerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium di-
cemus, quo manifestò febricitare incipientes decumbant.

d 5

Vnde cognoscendum, morbusne sit sanabilis, an perniciosus.

CAP. II II.

Lethales notae sunt, facies cadauerosa, nares acutae, oculi concaui, reliquaue ab Hippocrate commemorata: si hac neque ex vigilia, neque euacuatione, neque inedia acciderint. Item in propinquo mors est, si agri lumē refugiunt & illachrymant, non ex quadam à foris accidente causa. neque tamen oculis peculiari vicio obnoxiiis. Adhuc si alter ex his minor appareat: quaeque in iis alba esse debent, rubescant, aut liueant, aut nigricent. Aut si pituita ipsis inhaereat, perque somnum alba oculorum appareant palpebris extrorsum non commissis, nisi ea larga vacuatio expresse-rit, aut ex consuetudine ipsis hoc acciderit. Iam illa mortis sunt indicia, dentibus stridere, aut delirare, aut in veste floccos legere, aut festucas carpere. Attendendumque, est ad in cubitum: nam si aeger supinus cubat, & veluti resolutus, vel si etiam deorsum à lecto ad pedes delabatur, extremam imbecillitatem fatetur. Multo adhuc peius est, frigidum spiritum ex naribus, & ore elidere: item pulsus languidus creberque, & deficiens: item si aeger ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem praesagit. Si igitur omnia, quae retulimus indicia, aut plura ex his appareant, aut etiam pauciora, sed valida, nullumque salutis argumentum affulserit, periculum mortis inuitabile signat. Contrà spirandi facilitas, pulsus vegetior, mens, sibi constans, bene erga cibum oblatum affici, adhuc facies iacentisque habitus, sani similis, bona indicia sunt, & salutaria. In vniuersum quae à naturali habitu maxime abhorrent, pestifera sunt. quae verò ipsi respondent, salutaria. Cæterum praesagia ex vrinis, deiectione, & spuro, paulo post exequemur.

† *De signis longae valetudinis.* CAP. V.

Quatuor notis morbi dignoscuntur: ipsorum motu, egrotantis habitu, pulsu, febrium specie. Motu quidē in eum modum: si quatuor particularis accessions tempora, ocys & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius extremus terminus est, Septimana, magna verò ex parte quarto die crīsim experitur. At si longius quidē quā hic affixerit, sed duodecim horarū spaciū non excedat, acutus praedicitur qui intra quartumdecimum diem potissimū iudicatur, si vero in plures horas prorogetur, vt initium duntaxat,

& in

& incrementum longiore tum diei, tum noctis tempore absoluat, talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus non habeat, sed inde ab initio adusq; finem continuet, tanquam vna sit accessio, veluti in continuis, etiã hunc nimirum acutis adscribes. Aegrotantis habitu hoc pacto deprehenduntur. Si quidem facies, & totum corpus reliquum collabatur, acutum morbum præfagire est. Si prorsus nihil emacrescit, longus erit. quippe copia materiæ longiore spatio concoquendæ signatur. Ex arteriarum motu ita diuineris. Magnus pulsus, vehemens, citatus, creber, acutum morbum indicabit, contrarius, longum. A febrium specie hunc in modum, quatenus calidæ & vrentes, acutum signant morbum, mitiores autem & veluti delitescentes, diuturnum.

† Hic titulus sic legitur in vetustio Cod. πῶς ἐξαρτιώσονται ἐν τῷ καὶ χρόνῳ νόσους, id est, de signis acuti & longi morbi. Qui quidem titulus huic capiti maximè conuenit.

Quomodo præsciemus an morbus iudicium subiturus soluentisve sit.

CAP. VI.

HOC quoque præscire licet ex iis quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrium specie, & tempore. Forſan autem totum ex febrium specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solent. Mitiores, leuiorésq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpunt. Hinc liquido constat, non solum quando morbus soluetur, sed etiam quo pacto. acuti enim potius per excreta iudicantur: quemadmodum rursus longiores, per abscessus.

De diebus decretorijs.

CAP. VII.

DIERUM decretoriorum alij de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfectè, manifesto, & insigniter iudicant, alij contrario his modo. Tertius decimus medium quendam inter vtrunque dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui vel exiguum naturæ imperum nacti de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, & quartus decimus: plerique verò, nisi in vehementibus naturæ motibus, morbos neutiquam possunt per crislum soluere. Verùm nec vniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec omnes mali, pari ratione sunt mali. item nec certo ordine

dine bonitatem malignitatēve obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nempe bonorum numero cōprehensi, hunc in modum se habent. Præstantissimi omnium sunt, septimus, & quartusdecimus: mox nonus, vndecimus, & vigesimus: deinde decimusseptimus, & quintus. hos sequitur quartus, post hunc tertius, & decimusoctauus. His contrarij, ad secundum ordinem referuntur: pessimus, quique cum periculo, nec clarè de morbis iudicat, ac veluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huic consimiles, octauus, & decimus: secundum quos duodecimus, sextusdecimus, & decimusnonus habentur. Medius horum est, & tertiusdecimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tam feliciter morbum potest soluere, quàm qui ad primam classem pertinent. Atque hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorum verò ordine boni sunt, tertius, quartus, quintus, vndecimus, quartusdecimus, decimusoctauus, vigesimus: mali autem sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, decimusnonus. inter hos medius consistit, tertiusdecimus. Porro ex his decretoriis nonnulli quoque aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eò quòd iudicia alio die decretorio futura prænuntient: contemplandaque exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurum præmonstrat: dum videlicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares vacuationes molitur, aut significationes prius non factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam verò Galenus etiā sexti, licet non boni, quartum esse indicem asserit. Vndecimus quartidecimi index est: septimusdecimus autem, vigesimi. Itaque ad quartumdecimum usque diem valentissima de morbis fiunt iudicia. proximè succedunt, qui usque ad vigesimum habentur. Qui post hunc ad usque quadragesimum porriguntur, paulatim vehementiam remittunt. Primæ dignitatis sunt, vigesimusseptimus, trigesimusquartus, & quadragesimus. Hos sequuntur, vigesimusquartus, trigesimusprimus, trigesimusseptimus. Qui verò dies reliqui à vigesimo ad usque quadragesimum intercedunt, omnes iudicij sunt expertes. Sicut qui post quadragesimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quàm crisi morbum finientes. Atque alios quidem à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere videtur, sexagesimi verò,

verò, octuagesimi, centesimi, & cētesimi vigesimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mensibus, alios septem annis, alios, vt verisimile est, duobus & tribus annorum septenariis iudicari tradit.

Decretoria indicia in morborum principio esse praua.

CAP. VIII.

Concoctionis signa nunquam sinistrè apparent. quippe **C**omnis concoctio, naturæ vincentis opus est, eòq; semper securitatem pollicetur. Decretoria verò signa aliquando incommode apparent, propterea quòd crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contingens, vt prius in capite de iudicatoriis diebus est comprehensum. Neque igitur per initia, neque in augmento ipsa commodè apparent, sed vbi morbus inclinauerit, quo tempore natura morbo valentior est.

Quemadmodum futurum iudicium prænoscendum sit.

CAP. IX.

Si accessiones vrgeant, præueniantq; tempus consuetum, & multo fiant vehementiores, ac tertio quoque die significationem sui præbeant, tum concoctionis signa in vrinis, aut deiectionibus, aut sputis cernantur, sine mora plane morbus iudicabitur. Sin accessiones lentè moueantur, eadēq; hora inuadant, ac quotidie affligant, longiore temporis spatio interposito morbi solutionem expectabis. Item iis qui ob rigores vehementer febricitant, fieri non potest, vt morbus ante soluatur, quàm illi fuerint leniti. si enim rigor nihil remittat, haud quaquam morbus ad statum peruenierit, multòq; minus inclinatio ipsius speranda est.

Quomodo instans morborum iudicium agnoscatur.

CAP. X.

An te quamlibet iudicationem agrotus grauiter excrucietur. Atque si interdū illa contingeret, noctu affligitur: si per noctem futura est, interdū exagitur. Ac superueniunt symptomata, vtpote capitis dolor, quem prius non sentit, præterea collum simul dolet, præcordia sursum conuelluntur, spirandi quædam difficultas repentina oritur, aliaq; graui accidentia, quæ superiori tempore non percipiebantur, apparent. Atque his obuenientibus, si pulsus non concidant, sed sublimius attollantur, vehementioresque fiant, adhuc si dies decretorius indicetur, isq; potissimum ex illo

illorum ordine, qui probè decernunt, non iudicium modo futurum, verum salutiferum quoque expectato. Neque deterrere in his te debet, si agrum delirantem, exilientémve conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentiū notæ sunt: sicut è diuerso inferiora petentium, aliæ, puta imi ventris rosio, circa vmbilicum tormina, lumborum dolor, ventris murmuratio. Est cum alia quoque indicia consimilia deprehenduntur. Adhæc si per hæmorrhoidas vacuari laborans consuevit, etiam huius vacuationis circuitus vnà incidit, repetitq;. Pari modo in menstruis, si mulier est quæ laborat, † non absurdum fuerit per talem vacuationē morbi fieri iudicium. Iam sudores tum ex corporis madore qui præcessit, vt verissimile est, & præsertim in die cōtēplatorio erumpentes, tum ex meatuum ad apertione prænoscedi sunt. Ac quæ per superna vacuationes futuræ sint, ex his maximè intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt expōsitā, etiam ægrotantis facies intuenta est. Item si qua partiū ipsius palpitet, aut venæ in temporibus pulsant, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes vacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine voluntate illachyment, aut splendores oculis obduci imaginentur, ac naribus veluti scabendi studio manus admo-ueant: tūc quidem non amplius morari, sed iam adesse fluorem sanguinis videbis. Vbi enim semel ac iterum scaberint, erumpit. Rosio vero stomachi, & labri inferioris tremor, crīsim per vomitiones futuram subinde nuntiarunt. Atque de his abundè est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ spem nostram confirment. præterea anni tempus, & præsens aëris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi compos, multo magis sperandum est. Quod si etiam antea, vel æger, vel sanus, vt supra dictum est, vacuationem sanguinis expertus fuerit, hoc vel solum ad profundendi sanguinis spem exhibendam satis est. Iam verò si anni tempus æstas est, aut si non æstas, certè calidus aëris status, ac sæpè illo tempore per sanguinis profusum crīsim sustinuerunt, corpūsq; sanguine redundet, quod *πληθύνει* nominant, & consuetarum excretionum sit retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Similis porro, & in reliquis vacuationibus ratio habenda est. At si horum nihil apparuerit, sed æger in aliquo decretoriorum, qui post
vigēsi

vigesimum maximè sunt, dierum grauitè morbum ferat, idq; cum consistit, ac dolores quidam in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aures, aliàsve particulas hæreant, aut dolores quidem minimè infestent, verum sudores, particulares continuè ex particula quadam erumpant, per abscessum crìsim excipere oportet. Ac in illa potissimum particula abscessus se promet, quamcunq; vel sudores, vel dolores, vel tumores exerceant.

† Hæc ita leguntur οὐδὲν ἄτοπον εἶναι ὅτι τοιούτους κινήσεις προσδοκᾶν γίνεσθαι τὸν νόσον, id est, non absurdum fuerit per talem vacationem expectare morbi solutionem: sed hæc leuia sunt.

Quemadmodum optimum iudicium peractum agnoscamus.

C A P. X I.

SI vacuatio competens post concoctionem accidat, & febris crìsim experiuntur soluantur: ægerq; aliis liberetur accidentibus, & coloratio euaserit pro vacationis ratione, pulsùmque vegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quòdque omnium securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsequuta sit, ea sanè laudatissima iudicatio habetur. Quòd si horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quantum id valeat, quo deficit.

De pulsibus ex Galeni commentarijs.

C A P. X I I.

Pulsus motus est, quo cor & arteriæ attolluntur, submitunturq;. Vsus ipsius duplex est. Etenim eleuatione Græci Διαστολήν appellant, qua arteria veluti explicatur quodāmodo, ac patescit, frigidus aër ingreditur, vitale robur euētilans, recreāsq; ex quo etiam animalis spiritus habet originem. Submissione, συστολή Græcis vocatur, qua arteriæ extrema ad medium sui confidunt, conuiuentq;, fuliginosa recrementa expelluntur. Caterum hæ arteriæ, oblonga sunt vasa, venarum modo concaua, sed duplici tunica muniuntur, tum prædicti motus gratia, tum quòd sanguinem, spiritumq; continent. Originem trahunt ex corde, sed per totum corpus membratim distribuuntur. Omnes igitur, & eodem pulsandi modo inter se, & cum corde conueniunt. Quamobrem ex vna ipsarum, omnium rationem queas colligere, nō item omnium ex æquo motum percipere. Sed earum quæ excarnes corporis partes perreptant, promptius.

quæ

quæ carnosæ subsunt, obscurius. Porro iis quæ per brachiale excurrunt omisissis, nullam, aut congruentius, aut usu commodius attigeris. Primum pulsum genus ex motus tempore sumitur, ut quod eleuatione arteriarum, atq; submissione examinetur. Differentiæ ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, & mediocris: quoniam omne quod motui est accommodatum, aut celeriter, aut lentè, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus est, qui exiguo tempore multum spatij motu emetitur. Tardus, qui longo tempore, paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quædam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterum genus diastoles quantitate constat. Quoniam enim quodlibet corpus tria sortitur interualla, longum, latum, profundum, arteria autem corpus etiam est: ipsam quoque tribus constare interuallis, necessum est. Verum in naturali animantis habitu, mediocriter ipsam vnde quaque eleuari reperies. Contra, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum distantia deficit, aliquando excedit. In quo statu, meminisse conuenit, qualis pulsus naturalis fuerit. si latitudine maior inueniatur, latum vocabis. si longitudine, longum. si profunditate, sublimem. Liquet autem contrarios quoque ipsis, & naturali minores, ad eum esse modum appellandos, arctum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni distantia æqualiter in statum naturæ contrarium vertuntur, quicumque hac ratione imminutus est, paruus: quicumque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulsum, ad virtutis robur exigitur. Differentiæ ipsius tres sunt, vehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem est, qui tangentis manum valide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horum medio consistit, quem nonnulli naturalem esse putauerunt. Nam ira & exercitiis vehementiorem fieri pulsum asserunt, qui à naturæ habitu recedit, quorum dictis Galenus venit obuiam, non constantem inquiens, sed promptè mutari eum pulsum, qui ex causis non naturalibus vehementior euadit. Pulsus igitur vehementior, qui non expeditè mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, instrumenti constitutione constat: dico autem arteriæ corporis statu. differentiæ huius quoque tres sunt. Vel enim instrumentum durius est, quàm natura exigit, ac pulsus vocatur durus. Vel mollius,

lius,

lius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infusi arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, vacuus, & mediocris: quoniã totum vas, aut plenum est, aut vacuũ, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, vt Archigenes definit, quĩ arteriã pleniorẽ repræsentat, & occursum eius humiditate plenum, vacuus qui aëris modo arteriam excitat, vt digitorũ impressione loci inanitas occurrat. Hæc igitur quinq; pulsuum genera, vno arteriæ motu constant. quoniã verò caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodãmodo magis euidenter appareret, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuum genus Sextum cõmemoratis annumerare. Ad reliqua verò genera, tum quæ ex vno, tum quæ ex multis pulsibus sumũtur, pertinet quod quietis tempore cõstat, & quod rhythmo, & quod equalitate, & inæqualitate, insuper quod ordine & inordinatione cõstituitur. Quod itaq; quietis tempus spectat, Septimum à primo numeratum diuiditur in frequentem, & rarũ, & moderatum. Nam cũ arteria duplici agitetur motu, qui ex cõtrariis constat particulis, necesse est vt duplex quies cũ ipso coincidat. Altera quæ post eleuationem, ante submisionem est: altera quæ secundum submisionem, eleuationem præcedit, quæ etiam quies plerisq; imperceptibilis esse videtur, vt inter duos motus quies aliqua media existat. Cui itaque longũ quietis tempus est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediũ, moderatus. Octauũ genus pulsuum ad rhythmũ pertinet. Est autem rhythmus summatim quidem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsu autem, secundũ nonnullorum sententiam sane, temporis motus, ad quietis tempus, vt eleuationis & submisionis, ad aliquam quietem interpositam. Secundũ aliorum verò opinionem temporis motus, & quietis, ad motus quiesq; tempus, aut motus ad motum, nempe eleuationis ad submisionem, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorem proportio. Differentiæ rhythmĩ principes sunt duę, pulsus boni rhythmĩ, & nullius rhythmĩ. Porrò vocatur pulsus nullius rhythmĩ, nũ qui nullũ rhythmum obtinet, id enim fieri non potest, sed malo rhythmo præditus, quemadmodum nullã habere vocem, nullam ceruicem, cum dicimus qui malam ceruicem malamq; vocem sortitus est. Ceterum pulsus cui nullus rhyth-

mus adest, triplex differētia existit. Alius siquidem est pararhythmus, mediocrē boni rhythmī peruersionē obtinēs. Alius heterorhythmus, id est alterius rhythmī, qui longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnino bonitatē rhythmī corrūpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili aetati secundū rhythmū pulsus eurhythmus appellatur: qui ad vigentē aetate pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhythmus dicitur. Nonum pulsum genus est, quod in omnibus prādictis inuenitur aequalitate & inaequalitate constans, quod vel in vno pulsu spectatur, vel in pluribus id quod à collectione pluriū, systematicum quoque vocant. de quo prius tanquā manifestiore dicendum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue magnitudine, siue robore, aut velocitate, aut reliquorū aliquo, aut etiam omnibus. Inaequalis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes vniuersi pares magnitudine qualicunque inciderint, eiusmodi pulsus aequalis vocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autē impar: talis nimirū magnitudine inaequalis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post vnū aut etiam plures magnos vnus minor apparet, sed nōnunquam totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiens appellatur, sicut alter huic cōtrarius coincidēs, cum expectata quiete in medio tanquā superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizontas & myuros nuncupant, nomē à figuris, quę in mucronem desinunt trāferentes. Qui quidem perpetuo ex ipsis immuuntur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectiōnem finiunt, ac vocamus ipsos myuros deficientes. Qui verō cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum desierant paruitate, hanc perpetuō conseruant. Quidā verō augeſcunt rursus, vel in parē priori magnitudinē redeūtes, vel ad minore, vel ad maiore, i) myuri recurrentes dicuntur. Iā verō & in vnius pulsus inaequalitate myuri pulsus fiunt, de quibus suo loco paulo post tractabitur. Huiusmodi sane quādā est pulsum inaequalitas, quę systematica appellatur: Atque vno in pulsu deprehenditur, vel in vna arteriæ particula, vel in diuersis accidit. quę adm

admodū in motu, exempli gratia, in vna quidē particula arteriæ inæqualitas dicitur, cū aliter inceperit, ac aliter defierit moueri circa vnū digitum arteria, incipiens quidem citatior, desinens autem tardior, vel è cōtrario. Atq; hoc triplici modo accidit, vel motus continue manet, vel intercidit, vel repetit, & veluti bis percutit. Si igitur manens continuus & nō intercisus, à celeritate ad tarditatē trāſierit, aut è cōtrario, impar citatus græce ἀνωστήχους eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quod si quiescat, & quiete interpollata postmodū velocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animante sumpta trāſlatione, quæ saliendo sublimis in aëre cōsistit, & secundū quendā motū inopinatum priore citatiore molitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionē absolutā, secūdo manū tangētis ferierit, dicrotus huiusmodi pulsus appellatur. Simile quippiā in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatq; semel manu in ipsas incusseris, reciprocatur, incudū renixu, & secundū rursus, vel etiā tertiū feriunt. Atqui nō solū inæqualitas quæ vno ictu in eademq; arteriæ particula accidit in motus tempore, potest fieri, verū & illa quæ virtutis robore cōstat: nō autē ea, quæ distantiarū quantitate cōprehenditur. Nullo enim modo idē pulsus eadē in particula magnus & paruus queat effici: neq; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in variis arteriæ particulis vnoq; in pulsu duplex fit inæqualitas. nūc quidem cū motus manet continuus, & arteria iuxta quosdā digitos citius mouetur, iuxta quosdā verò tardius. nūc autē cū motus quoq; interciditur, vt nōnulli quidē digiti motū apprehendant, nōnulli verò nō. Ac iuxta eleuationis quantitatem in pluribus quidē particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri vno in ictu inclinantes, quos Græci vocant ἐπιγινώσκτας, & περιγινώσκτας. Sināq; interna digiti parte magnus occurrit pulsus: & curuatus inde iuxta rationem minuitur, vt in exteriorē quæ ad egrotātis pollicē spectat arteriæ parte, minimus idē appareat, myurus vocatur ad muris caudæ similitudinē, vel meiurus quod caudæ modo imminuat. At si iuxta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; vtrobiq; minuatur, minor apparēs, hūc Archigenes περιγινώσκτας quasi dicas latinē inclinātē, & περιγινώσκτας appellauit, manifesto significare volēs eleuationis breuitatē, cū extremorū vtrorūq; veluti inclinatione. Nō enim vt abscisīs vniuersim ac

subito, vtrinque; partibus, sed veluti inflexis in arcum contractus est, utpote myurus, hoc est imminutus magnitudine vtriusque in partibus. Accum secundum magnitudinem inaequalitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum vndosi, tum vermiculantes, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est, acceperint, conuulsi & turbulenti, ut vocant, constituantur. exordiendum igitur est ab vndosis, in quibus non simul apparet in tali inaequalitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primum, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus continuus maneat in modum vndarum sese eleuantium. ac nonnulli vnam in rectum tendentem obtinent. quidam in latus inclinantem, & alii in breui longitudinis distantia, altitudinem magnam habent, alij contra, alii latitudinem, alii angustiam. Similiter etiam celeritate & robore inaequales sunt. Vndosus totus in paruitate cessans, vermiculus appellatur, vermis gressui assimilatus. Quemadmodum vero vndosum pulsus minorem factum vermiculans excipit, ita vermiculante formicans, ubi motibus multis abolitis in unum eundemque perquam exiguum desierit. Vocatus hic quoque est a formicae animalis similitudine, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est enim formicans admodum exiguus, ut quo minor alius non extet. Pari modo languidissimus omnium creberrimus non tamen citatus, ut Archigenes existimauit. Huic consinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic etiam pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo consimilis manet, trahitque ut ab initio incepit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum conuerso. Porro conuulsi pulsus vtrinque; ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli videntur, ceu chordae cuiusdam tensae sensum praebent: at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriae particulae quaedam sursum ferantur, uno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimulaueris: quae validius emissa, celeriter feruntur vibrata. Serratus pulsus est cum alia pars arteriae elata, alia minus, ob duritiem nimirum ipsius esse videtur. Caterum pulsus hic etiam turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est, creberrumque; non semper autem magnus. Decimum genus pulsuum ex inaequalitate prosectum commemoraris succedit, quod ordine, & in ordinatione constat. Nam ordinatus & inordinatus inaequali in circuitum paritate: & profus imparitate diuiso, ex vtraque; se

sectione originē trahūt. Ex circuituū paritate ordinatus: ex absolutaverò imparitate inordinatus. etenim pulsus equalis omnino est etiā ordinatus, siquidē subsequētia parē ipsū dicebamus: inæqualis autem non omnino inordinatus est. Si nanq; paritatē corrūpat, circuitū verò seruet aliquē, ut in eleuationis quantitate, verbi gratia, si duo magni, & vnus parvus sit: deinde rursus duo magni, & vnus parvus, atq; sic deinceps, vocabitur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatē corrūpat, ne ordinē quidē aliquem inæqualitatis cōseruet, cū inæqualis tū inordinatus talis est: similiter in aliis quoq; generib⁹ se habet. Inordinatorū quidē, alij sunt ex toto inordinati, ne vel exiguū quēdā circuitū cōseruantes, alij verò secūdū circuitus ordinati. Quatenus enim cōtinuam ordinationem nō habent, inordinati vocabūtur: quatenus autē diu circuitum quēdā tuentur, secūdū circuitus, ordinati vocari queant. Exempli gratia, si contingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquā reflectentes duos magnos, & duos exiguos: tres magnos, & totidem exiguos: & deinceps similiter. scire verò cōuenit, inter alios quidē contrarios singulos, quēdā esse mediū. Aequalis autē & inæqualis mediū nullū: neq; ordinati, neque inordinati: nisi voles secūdū circuitus ordinatū mediū dicere ordinati & inordinati. Ceterū aliorū omnium mediū, secūdū naturā sunt, præterquā vehemētis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secūdū naturā est, reliqui præter naturā, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsū genera vniuersa sunt, & generales ipsorū differentiarū. Nonnulli verò his etiā alia duo annumerarūt. Primum à situ arteriæ sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum deducta esse videatur. Alterū quo maturius, aut tardius: ex quorū numero vndosos turbulentosque pulsus esse diximus, ac nos cōpendij gratia simplices solū differētiās prodidimus. ex dictis autē si cōiugamus has, facile erit etiā compositas inuenire. † Porro opportunū erit deinceps, causas quoq; pulsibus cōuenientes exponere, quas comitatur etiā præfagiū ab ipsis desumptū, ac initiū à magnitudine capiemus, quoniā hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, vel propter vsum vrgentem, qui calor est in corde exuperans, externæ

appetens refrigerationis, & veluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatē, vt posterius ostendetur. Porro augetur calor, aut ex causis naturalibus, vt pote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tēpore, regiōe, & tēperamento calidiore. Aut causis nō naturalibus, veluti aëre qui nos ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis vino, medicamentis calfaciētibus. Aut causis naturæ cōtrariis, puta intemperie calida, aut humorum putredine, aut ira, aut similibus. Discernes vniuscuiusque pulsum hoc discrimine, quod causæ naturales magnitudinē ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ verò, ex facili mutabilē, vt etiā manu adhuc admota frequēter, aut certe paulopost subsidat. Iā verò pulsibus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, mollities quoq; accedit, quemadmodū iis, qui ob calidā & præsertim cum siccitate intemperie magni existunt, durities. Exercitatis verò mediocriter, aut perfricatis, nec duri, nec molles sunt, medio statu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior est, quod iam & iratis accidit. Ex cibo autē magnis, aut vini vsu, aut ira, præter magnitudinē etiā vehemētia inest. Qui verò occultare irā studēt, aut aliud quid præter medici permissionē factū, verbi gratia medicamē calidū sumptum, eundem medicū simulatque manū attingat, interrogantem celare volētes, iis præter magnitudinē manifesta quoque oboritur inæqualitas. Ad hæc ægrotantis mores & consuetudo nō mediocriter ad pulsus dignotionē faciunt. Cōsuetudo quidē, si medicaminū appetens sit si & rudis mores, si opinionis eximendæ peritus & callidus sit. Ex humorū putredine magnus, ad magnitudinē adhuc submissionē magis citatā habet. Verū ad magnū pulsum efficiendum, non solū vsus abunde est, sed etiā virtutis ministeriū desideratur, instrumentūq; cōmoderatio inter siccitatē & mollitiem. Aucto igitur cordis calore propter quālibet causam ex cōmemoratis, primū quidē magnus pulsus efficitur: vbi verò magnitudo vsui nō suffecerit, statim etiā celeritas ipsi accidit. At si ne sic quidem satis fuerit, mox frequentiam assumit, parui autem, tardi & rari pulsus, itidem à contrariis fiunt. Sed quandocunque à magno citato & crebro ad contrarios fit mutatio, vsu nimirum postulante, non amplius id quod in pulsu primum factum est, id etiam primum cessat, verū quod postea acquisiuit, id primum abicit, statim

statim quidem rarus euadens, deinde tardus, postea quoque exiguus. Sin autem tarditas paruitasque accreuerint, è contrario raritas in crebritudinem trāsmutatur, ut per eam ut-
cunq; vsui fiat abunde. Hę igitur magnitudinis, celeritatis, frequentię, & contrariorum ipsi pulsum causę habentur. At iūgetur ipsi ea quoque pulsus immutatio, quę una solum distantia constat. Itaque latitudo sola augetur, dum humiditas potissimum, vel secundum naturam, vel etiam ab exterioribus causis redundat, quemadmodum sublimitatis pulsus ob instrumenti mollitię virtute ad hoc opitulante, longitudo à siccitate, & carniū circumpositarum emaciatiū palam efficitur, reliquis distantiis collapsis. Non enim arteria longior, quā postulat natura fieri potest, ac proprie magis pulsum huiusmodi gracile appellaueris, quēadmodū ipsi contrariū secundū latitudinem solā, & profunditatem adauctū, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus nonnunquā incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantiis prohibetur, humilis, aut arctus, aut brevis apparēs, cū talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdā, aut carniū, aut membranarū oppositarū crassitię apparēs. interim, etiam totus paruus videtur, cū re vera paruus non sit, & languidus similiter. Quid opus est verbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdam esse putatur in omnibus arteriis, cum vere non sit, & maximē iis qui negligentius ipsum tangunt, sed cum motus ob carniū copiam delitescit, re vera obscurus existit. non enim extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad vita fruatur. quēadmodum igitur rursus in locis excarnibus, etiam parui pulsus, magni esse videntur. Corpore itaque vehementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum repręsentat, ac nonnulli etiam ex his, quę prius in artubus non erant conspicuę. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne dignotio ipsorum nos lateat. Pulsus autem vehemens virtutis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote vsus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus autem pulsus, imbecillę virtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Siquidem vehemens omnibus causis ad sui generationē indiget, languidum etiam sola imbecillitas efficit. Qui igitur per initia vehemens est, ætates anni tēpora, regiones, & temperamenta moderata comitatur,

languidus immoderata. Porro qui à languore in vehementiam incidit, virtute vindicata ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur vero, aut ex his quæ in ipso corpore continetur, veluti humorû cōcoctione, vel excretionem vel ira: aut ab exterioribus, nempe vino, cibo, exercitiis, ac aliis quæ intēperiē corrigunt. Vires dissolunt, inedia, vigiliæ, vacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectionem inferentes, ac omnia quæ intemperiem faciunt. Quidam vero ex rudibus ac in exercitatis, durum pulsum vehementem esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum ratione, tum tactu, nunquam laturit. Nam vehemens magna ex parte cū magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum valide percutiens: durus magnitudinem non recipit propter arteriæ contumaciam: fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quā refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim vero duritiē etiam paruitas, & celeritas nonnunquā, & frequentia magnitudinis loco propter vsum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quā humidiorē reddūt ex iis quæ secundū naturā sunt, humectiores cibi, balnea frequētia, somnus multus, victus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reliqua puitæ vitia. Plenus pulsus, aut humorum copiam, aut ciborū aut vini potionis abundantiam indicat, quēadmodū vacuus contraria, aut enim inediam, aut vacuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multam in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quāpiā arteriarum violento motu incalescentium, dispositionē fatetur. Archigenes vero tradit arteriæ locū proprie in catochis calidiorem deprehēdi, quemadmodū in iis, qui conuulsionem cum graui animi in somnū delatione quā cataphorā appellant. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præ se fert, quantum ad se pertinet, vel non magnam à bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin tēperatis. Ac si longius quietis tempus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quēadmodū in ætate florentibus, & his proximis, veluti igitur in corporibus senilibus æquabiliter frigidis, diuturnius motionis tēpus est quā quietis. Notare autē

autem oportet rhythmī inæqualitatem mensuram esse eius quæ celeritate & frequētia consistit. hanc autē veluti materiæ rationē ad rhythmū obtinere. Iam vero deficientes, coincidentēsq; pulsus fiunt, viribus oppressis, & veluti aggrauatis, sed coincidentes minorem offensam, deficientes maiorē significāt, ac in vniuersum virtus oppressa grauataq; pulsus mutat ad inæqualitatē inordinationemq; , tum aliā quamlibet, tum eam quæ vehementia & magnitudine constat. Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (vel enim in systematica, vt vocant, inæqualitate, vel in ea quæ vno fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidem extremam virtutis internitionem notant, repetētes autem recurrentesq;, & ipsi quidem imbecillē, sed repugnantem adhuc resistantemq;, & renuentem indicant. in vno autē ictu myuri & inclinantes, quos *πινυδνότης* vel *πριγινυδνότης* appellamus, maxime iis fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus nō solutis, præterea plurimis quomodocūq; tabescentibus, dū partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & caprizantes, febriles potissimum calores comitantur: verū si pulsus eleuationis principia dissoluens, extremum ipsius acceleret, & submisionis initium, putredinem exuperantem notat, natura fuliginosis recrementis excernendis incunabēte. Sin autem ē contrario submisionis initium dissoluerit, ad eleuationem vero magis instet, calorem præpollere scias, qui refrigerationē desideret. Comitatur hæc in febre etiam crebritudo plurima ex parte, interdū magnitudo quoq;, nisi virtutē instrumenti durtitia impediat. Cū autē hæc in arteria intenditur, & virtus non sit inualida, pulsus fit qui à bis feriendo dicrotus appellatur. Porro vndosus humidiores potissimum affectus sequitur, atq; his magis aquæ subtercutem genus, quod Anasarca vocant, itē lethargos, & peripneumoniam. At cum virtus dissolui inceperit, sed paululum adhuc resistat, vndosus in vermiculantem decidit, vbi extreme collapsa fuerit, etiam hunc formicās excipit. Hecticus autē proprie cōtabescētes & alioqui emarcescētes sequitur. Cōuulsorius fit, quū nervorum origo inflāmatoria quadā affectione cōstitatur, sicut in phreneticis, & acuta epilepsia correptis, quando etiā moriuntur, adhuc calentes, qui hoc vitio sunt occupati, cōtrario his modo quos syncope inuadit. illi nanq; vehemēter

etiam frigidi, adhuc viuunt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cum vsus magnam eleuationem requirit, ac vitale robur eam potest creare, solum vero arteriæ corpus præduritie, in magnam attolli diastolen, vt in magnis inflammationibus, obstructionibusque diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in totum index est inflammationis, & præsertim partium quarundam neruofarū: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidem, leni & ex facili concoquendæ: intensus autem difficili, & concoctu peruicaci: quæ cum imbecilla quidem virtute, subito in periculum præcipitat: cum valida autem longo tēpore concoquetur. Vel enim in vomicam transijt subinde, vel marcida tabes ipsam excepit. Iam verò sciendum venit, inordinationem comitari inæqualitates. rarò siquidem inuenire est inæqualem pulsum, ordinatum. Minores offensæ, inæquales pulsus & ordinatos: maiores, inæquales & inordinatos procreāt. Hæ igitur simplices pulsum causæ sunt & præsagia. Ex his etiam compositas, vt in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est hæc scriptura quæ in vetusto codice est. ἵκνς δ' ἂν ἐν λεί-
γῳ ἢ τὰ αἰτία τὰ πρῶτα τὸς σφύγμιν. Porro opportunū erit deinceps
causas pulsum immutantes exponere: facile enim fuit librario scribere πρῶ-
τα pro τῶν/x.

De deiectionibus. CAP. XIII.

Aluus optima est: mollis, coharens, & eodem tempore quo in secūda valetudine afflueuit, reddita. Talis nimirum est quæ leuiter ruffa est, simul & conuenienter spissa, non nimis fœtida: quæ talis non est, mala censetur. Quæ igitur colore similis cibo ingesto cernitur, & tenuis, & nō exucata & celeriter descendens, cruda est, At mere ruffa, initio quidem biliofiorem morbum indicabit. sin autem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat, viridis æruginosæ bilis nota est. nigra, vel atræ bilis, vel sanguinis cuiusdam indidem adusti. liuida, refrigerescere quodammodo, & emori non parum interiora significat. oleosa pinguisque, corporis pinguitudinem consumi innuit: quemadmodū rursus viscosa, pingui cum sit deterior, animantis particularum consumptionem præ se fert. Nimis fœtida haud exiguā fatetur putrefactionē. Porro in omnibus hisce, si alius qualitate cibo assumpto nō respōdeat eodem

eodē iam modo affectio quoq; considerabitur. Omnium deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

De vrinarum notis.

CAP. XIII.

Quemadmodum in deiectionibus, ita in vrinis quoq; regula sanorum vsi, de ægrotis indicia sumemus. Vrina igitur præstantissima est, quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subdaua. nimirum vero hæc & crassitiem moderatā habet. At cum triplex turbidarum vrinarum sit differentia, (vel enim redditæ tales, paulopost subsidunt, vel consimiles perpetuo manēt: vel puræ excernuntur, deinde vero turbantur) praua quidem existit tertia ordine dicta, moderata benignaque, prima: medio vtriusque consistit secunda: summe cruda est, exacte aquosa, veluti desperatæ cōcoctionis venosū generis accidēs. Quando autem celeriter descenderit, diabetes, vt Græci appellant, efficitur. Verum hæc sane inter vrinæ crudas deterrima est, succedit autem ipsi, tenuis admodū & aquæ modo exalbida. Huic vicina est alia vrina, quæ multis in morbis apparet, tenuis admodum, & albæ propinqua. Subpallida verò hanc sequitur: quæ pallida quidem modo erit, & subrufa, concoquitur autem tam quantum ad colorem ipsius attinet. Tantum verò crassitie ipsam ab aquosa recessisse oportet, si probè concoqui debeat, quātum etiam colore, si autem hoc secundum naturam adamussim seruato, subsidens album, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum cōcoctionis nota fuerit: largius autem crudum, humorem, expurgari signat. Iam verò si vrina crassa modicè fuerit, habeatque subsidens aliquod, non cruda, iam ex toto erit. Si enim subsidentia parvi farinæ crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut viridia, aut fœdi odoris, habeat, præterquam quòd quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum aliàs ostendit. Porro boni coloris vrinæ quæque simul, vel subsidentia alba, leuia, & æqualia representent, vel nebulas quasdam similes, vel suspensa, omnium vrinarum sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidēs, tale extiterit. Deinde commendatur vrina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulæ tales apparent. Ac, vt vno verbo expediam, quæ vrinis probè innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

De

Sputum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solam cruditatem, malum vero nullum insignius denuntiat. At sincere flauum, rufum, spumosum, viride, glutinosum, rotundum, atque his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim prater sanguinem, quisquis alius humor syncerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammæ sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt: flauæ, aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa ædantur, inspicere simul expedit. Nam si prompte excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria vero periculum testari. absolutam itaque concoctionem fatetur sputum leue, album. æquale: & substantia neq; liquidum, neque valde crassum. Summæ vero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuitur. At si expuatur quidem, sed tenue, languidæ concoctionis argumentum est, Sin autem Sincere rufum prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut æruginosum aut atrum, summam pernitiem portendit.

Diaras febres, vinarum in primo die concoctio, calorisq; suauitas seu propriæ ipsarum & inseparabiles notæ testantur. Verum à prima febris solutione, certiorē habiturus es earū cognitionem. Quippe arteriarum in hac motus ei qui in secunda valetudine fuit, ex toto responderet, cum nulla ex aliis febribus in naturalem statum reuertatur. iam verò quod facile morbum fert æger, maximum & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorum corpore quod defluit, halituosum non est, sed mordax & acre, fumi instar. Hi autem sunt calidi & sicci temperamēto: breuiter, biliosi, quos *πυροχολῆς* Græci vocant. qui igitur ob lassitudinem febricitarant, pinguius simul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; ducēdi. Quibus siccitas febrē intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauādi sunt liberalius. Quos curæ mœrores, vigiliæ & ira exercuerunt: lauare quidem non subinde oportet, verum oleo copiosiore tepido, cui minime astringens vis inest, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare conuenit. Ab insolatu vsti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem minime, verò aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceum & ompha

omphacinum sine sale confecta: eadem vero sincipiti vehementer refrigerata superfundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrem concepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum grauedine, & destillatione febriat, priusquam hæc concoquantur, lauatiōi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febricitant, ij, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt: qui autem ex frigore, iis quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendum est, cuiusmodi irinum est, & nardinum vnguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, victusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inedia, febris contracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducī, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, diutissime in calidi solij aqua immorari. Simulatque exierit, ac sese recollerit, denuò balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox ptisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium verò communis esto victus species, quæ & boni sit succi, & cōcoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & viribus aquosum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis intemperies ad calidius, sicciūsq; transiens, febres accendit. Qui ob bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciundum, sed vlceri, quod bubonis occasio fuit, prospicientes lauant, ubi accessio declinauerit. Caterum à vino ipsi sunt arcēdi, donec inflammationes inguinum fuerint, solutæ, & tenuiore victu enutriendi.

De putridarum febrium agnitione.

CAP. XVII.

Putridæ febres dignoscuntur eo quòd nulla ipsas exterior causa præcedat: item quòd à rigore incipiant, neq; insolatu, neq; vehementi frigore prægresso. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione perexiguos quidem ipsos & inæquales obtineant: hoc enim singulariter huiusmodi febrium est proprium, maxima autem putrida

tridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manū erodat. Similiter ad ipsas propriè spectat etiam vinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnum verò & notabile concoctionis indicium, in primis vrinis nunquàm eiusmodi febres repræsentant.

Curatio febrium putridarum.

CAP. XVIII.

SI vires sint validæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinem dimittes protinus, modo cruditas in ventre nō existat. At si vires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes: à cuius vacuatione, putrida per vrinas, aluum, & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os ventriculi capeffant, etiam per vomitum: alioqui non oportet ea præter naturam irritare: cæterum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandóq; valenter, prædictas vacuationes moliri possunt, veluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apiiq; radix in aqua potabili incocta. Cū alius nihil deiecit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est. verum totum corpus rarefacere prius non expedit, quàm vacuatum fuerit: ubi vacuaueris, rarefacias utique licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore vinum aquosum potui datum, vniuersas promouet vacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrum. Quòd si vero febris magnitudo obstiterit, neque vino vtendum, neque lauacro, neque vnctionibus rarefaciendi virtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commodè bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & vires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa planè euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit æger, tum status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidâ nationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur: sin autem mediocris existat febris, & vires inualidæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita habent balneum prodest, & vini portio. Tum verò ex vnctionibus ea quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione.

CAP. XIX.

TERTIANA febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum infert. hoc discrimine à quartanæ rigore variat, quòd pungere videatur, & cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis
insul

insultus vehementem perfrictionem habet. Quotidianas vero nequaquam rigor præcedit: sed solum perfrigescunt. Cæterum tertiana etiam exactum pulsum ordinem obtinet. Siti verò vehementi in statu affligit, & hominem perurit, ac paulò post conficit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur. Et si manum iniicis, primo quidem contactu, calor copiosus & acris occurrit, veluti cum vapore quodam erumpens, sed paulò post à manu remanente vincitur. Vbi potione æger fuerit recreatus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit, sudorum nuntia. Bilis vomitio superuenit, aut aluus soluitur, perq; vrinam biliosa redduntur. Præterea ad integritatem tertiana desinit, vbi accessio- nis tempus, horarum non plurium duodecim expedierit. Fe- brem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactã tertianam nominamus: quæ verò diuturniorem accessione habuerit, illam simplici vocabulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissimè productam accessionem ser- uauerit, exiguum vero interuallum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

Curatio tertiana.

CAP. XX.

EXquisitam tertianam, vt quam flauabilis procreet, hume- ctare oportet ac refrigerare. & sanè quod in ventricu- lum confluit, vomitionibus, & inferius elicere. Item per vri- nas, & sudores deducere idipsum conuenit. Aluus itaq; mol- libus clysteriis euocatur: vrina potionibus, in quibus apiũ, & anethum maduerunt, & si concoctionis signa deprehen- deris, magna iam confidentia etiam absynthium dabis. Bal- nea vero ex aqua calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neque sal, neque sinapi adici, sed ægrum oleo quam maximè calido perfusum in solium descendere oportet. At qui balneis admodum gaudent, eos etiam si bis die laueris, haud peccabis. Vbi verò concoctionis notas perceperis, tũc, vel si sapius laueris, nihil offendes. Porro vinum priusquam morbus concoquatur, ex toto circuncidendum est. simul- atq; vero concoqui inceperit, tenue, aquosum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerantẽsque vtiliter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi, salis & acribus omnibus. vinis autem admodum vetustis, & natura calidis. Cæterum nihil miri est, si in hominibus primũ exer- citis, inediãmq; expertis, nunc autem ordine conuerso otio- sis

sis cibóq; vñs plenior, bilis maxima ex parte mixta pituita reperitur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut citra rigorem sunt: aut perexiguus ipsis oboritur, vnde etiam animaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neque cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

Curatio tertianæ nothe.

CAP. XXI.

L Auare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando iam concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abundè est. Quies autem, & præcordiorum foras ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atque si sanguinem detrahendum opus est, neque hoc omittere oportet. Tota vero victus ratio erit, non quæ refrigeret in totum, humectetq; verum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maxime verò conduxerit ipsis ptisanæ cremor pipere iniecto. vel hyssopum quoq; nonnunquam, vel origanum, vel spica nardi, aquæ mulsæ admixta, incoctaq; potui exhiberi, & alia quæ urinæ ciendæ sunt, præterquam ea, quæ vehementer calefaciunt, exiccantque. Potissimum verò absynthium, post septimum diem porrigi debet. Iam & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ molliter ventrem subducunt. Porro vomitus secundum cibum, iis quibus hæc febris in vetustatem incidit, vtilissimus est.

Quartanarum cognitio.

CAP. XXII.

Quartana inuadit multa cum perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem verò feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtinet, imò nec bilis vomitus eam comitatur. Ad hæc si urinæ tenues, albæ, & aquosæ fuerint, quartana erit febris. Eximia verò ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus, Cæterum in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur: aliquando etiam plurium dierum intervallo, iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

Curatio quartanarum.

CAP. XXIII.

Quartana laborantes leniter tractandi sunt, neque medicamento villo forti sollicitandi, neque vacuatione, nisi

ne, nisi forte sanguis vehementer exuperare videatur, cum venam dissecare conuenit. Victus eis offeretur optimus, qui non inflat, & venter his quibus uti consuevit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, deinde verò acribus utendum est. A' suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinum utile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum per dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, id est, quod triplici constat pipere, vel quod diospoliticò appellant. Iam & piper solū recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu victus ægro tenuissimus præcipietur, statim verò etiā ut diu conquiescat, iniungendum est, tum visceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantque. Insecutis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam cient. atq; si cōcoctionis notæ apparuerint, cū fiducia tunc quoq; iis uti expedit, quæ atros humores vacuant, idq; non semel duntaxat, verum etiā sapius. Porro secundū validam purgationem, & medicamentum quod viperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omnium probatissimū, quod succum cyrenaicum recipit.

Quotidiane agnitio.

CAP. XXIII.

Quotidiana haudquaquam cū rigore primo statim die inuadit, sed procedente tempore perfrictio magis quàm rigor oritur. Aegre verò incalescit, & diuturnū habet incrementum: imò neq; adurit ægros, neq; multū, & crebro spirare compellit, neq; efflare, vel frigidam bibere. pituitosi autē vomitus hic accidunt, & quæ per aluum vacuantur, frigidiora, crudiora, aquosiora cernuntur: totum corpus crudis humoribus redundat: sudores minimè primis diebus erumpunt, neque ad integritatem venit, cutis ægrotantibus albicat, urinae vel tenues sunt & exalbide, vel crasse, turbide & rubrae.

Curatio quotidiane.

CAP. XXV.

Quotidianā curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum iis quæ urinā probe eliciunt, ac vniuersa victus species incisoria esto, circa statū verò ventriculi habenda est ratio, præsertim ipsius orificij, deinde ægris iubendum est, ut à radícula & cibis assumptis vomant. Itidem utantur iis quæ

f

pituitam subducunt, idq; tamdiu quam febris cessauerit,
De hepialo febris & rigore qui aegrè potest excalescere.

CAP. XXVI.

SI vitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, non dum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui aegrè excalescere potest, sine febris excitat. In febribus enim, quæ humoris vitio accenduntur, putrefactio maximè febrilem calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamè rarò fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa redditur. Quando verò non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, nonnullæ verò non putruerint, Hepialum febrem hanc facit: in qua simul & rigent, & febricitant. Particulæ quidè humoris eius necdum putredinem expertæ, omnibus venis, vel etiam reliquo corpori cōmunicatæ & sparsæ, rigorem creant: putrefactæ verò febrem accendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem à sale: dico autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in principio autem difficile turbulentumq; erat. Vel ab Hepios, quod est molliter & aleanin, quod significat calefacere, quali dicas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita nascens, illarum curationi subiicitur speciali, nisi quod tanto cōmemorata quotidiana calidioribus magisq; incidentibus præsidis indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali verò rigor multo magis calefacientia requirit. Itaq; medicamentum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, & quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item ex castoreo, similibusq; præparata remedia conueniunt. Latius autè diffusiusq; explicatam curationem horum reperies in capite quadragesimo quinto de rigore & perfriktione. Insuper Lypyriæ & Tiphodes, quæq; præter commemoratas febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multò rectius in libris manuscriptis quàm impressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legitur in antiquis cod. λέγειται ὅτι ἡπιάλῳ ἢ ἀπὸ μείλαφορος ἢ ἀλὸς, λέγει ὅτι θαλάσσης, ἡπίας μὴ φαινομένης, χαλεπὴς ὅτι καὶ τὰς ταραχὰς αὐτῇ ὑπαφχούσης, κατὰ τὰς ἀρχὰς. quibus verbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbulentum est & agitur.

De

Continentes finitimæ sunt singulis intermittētibus: tertianæ quidem exactæ ardens, quæ causos dicitur: quotidiana, ea quæ singulis diebus accessionem habet, nō autem ad integritatem desinit. Sic etiam quartanæ, ea quæ quarto die accedit. Exactus nanque causos: cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine variat, quod non cum rigore inuadat, neque ad integritatem veniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert. quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoque die accessionem habet, verum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta. Quum autē ne declinatio quidē accedit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis variat.

Agnitio febrium continuarum quas synochos græci vocant, & curatio.

Continuarum febrium, synochos græci appellāt, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Qua propter accessio ipsis adūscque finem vna est. Indicia vero sunt, pulsus maximi vehementes, citati, crebri, aquabiles, non mordaces. Urinæ non multum adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit derraclus, febricitantes in summum veniunt discrimen. At si quid per venæ sectionē vacuare prohibuerit, aliis vti remediis oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ vacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem evidentes humorum concoctionis notas in ipsis videris, neque in principe particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis speciem repræsentans, aut scirrurus fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut in hanc noxa procumbat, cum fiducia frigidam propinato: maxime si ager eius potioni allueuerit.

Ardentium agnitio

CAP. XXX.

ARdentibus hæc superueniūt, arida lingua, aspera & nigra, ventris rosio, deiectiones pallidæ, sitis vehemens, vigiliæ, nonnunquam etiam delirium.

Ardentium curatio.

CAP. XXX.

Horum alterutrum fieri necessariū est. si perfectè morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui. Excernuntur itaq; per sudores, vomitiones, & imum ventrem. Extinguuntur autem frigida potu: quoniam nos vrentes febres, causas appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit: neq; mulla duntaxat, verum aquosa mulla exhibita. Nam qui huiusmodi morbis conflantur, sola portione sustentandi sunt. Porro balneum illis solū vsui est, qui citra tumore inflammationis, aut erysipelatiū, ardenti febre laborant. Quod si verò concoctionis noctæ percipiuntur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore, febrim ardentem conceperunt, his est inutile. Verum iisdem ptisanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

Febrim quibus ex affectu erysipelaceo origo est, curatio & agnitio.

CAP. XXXI.

Febres quæ ex Erysipelaceo viscerū affectu procreantur, his notis agnosces. interna feruent immodice, dolor urget vehemens, præterea sitis excruciat, & ardor immoderatus. Summatim ex indiciis accerrimæ bilis cū pauco sanguine putrescentis deprehendes. Hunc in modum curabitur. A balneo in totū abstinere decet. Aqua frigida per morbi statum vehementi, hoc est frigidissima vtendū est: per initia nō item. Extrinsecus vero refrigerantia imponentur: & si nihil hæc promouerint, etiam intro eadē sumere agri cogentur. Maximè ipsis cōueniunt lactucæ, & quæ parem his facultatem obtinēt. à foris & ipse lactucæ succus idoneus est, ad eoque intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi virtute prædita. sed præstantissimo parte plurima vtimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contusa exprimimus. cū vsus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida mersa, refrigeramus. Lintheum verò duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut vbi calor sentitur, præcordiis obtendimus, nō diu adhærere sinentes, verū aliud frigidū eius loco applicantes. Iam verò

ro & oleum omphacinū medicamini nōnunquā miscemus:

Hecticarum febrium agnitio.

CAP. XXXII.

HECTICA febris non in humoribus, & spiritu solum, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absq; dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant: neque enim calorem percipiunt, cum vniuersæ ipsius particulae æqualiter sint exalfactæ. Duplex hecticarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ prorogantur adeo vt tempore corporis ipsius cordis madorem absumanr, vel etiam multo adhuc permanente. Quæ vero manente etiamnum humiditate fiunt cordis corpus occupantes, inde potissimum acceduntur: Vnam sane ipsius generationem prodidimus. Reliqua vero est cum statim ab initio inuadit, primam originem diariis similem, ex mœrore, ira lassitudine maiore, vna cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remediis. Quæ verò ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαγὰς* deuenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sane cognitu est facillima: oculi siquidem præter modum concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædam squalida, viuidi ipsorum coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimū, hac occupati, quemadmodū dormituriens. verum affectio, somnus non est, sed vigilandi impotentia: tempora collapsa sunt & quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? Nam si denudatis ipsis ventrem inspexeris, neque intestinum, neque viscus vllum superesse tibi videbitur: præcordia sursum conuelluntur, & cutis ipsis extrema resiccata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurso languida, paulopost acris & rodens erumpit. quousq; igitur humiditatis aliquid reliquū est, hectica solum febris dicitur. Cum vero periclitatur, ne nihil amplius humoris supersit, absolutus iam marcor constituitur.

Hecticarum febrium curatio.

CAP. XXXIII.

HECTICA febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorū rodentiū gratia. Maximum vero remediū huius est, victus humectans. Conuenit igitur quàm maxime ptisanæ cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiecto agrū nutritū, moderato frigida potu curare: si neq; inflammatio quædam, neq; humorū putrefactio sub-

est, at si magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxiliis, vti. Balnea verò hoc morbo obnoxiiis, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertiana.

CAP. XXXIII.

Quandoquidē tertiana cū rigore, quotidiana verò citra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrorem inducit, qui minor quidem res est rigore, maior autē perfrictione. Quapropter cū horror equali ab vtriusq; extremis interuallo, mediū amborū rigoris nimirū & frigoris occupet, quod cōtemperatis inuicem extremis accidit, nō abs re nomen huiusmodi feбри semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur. vel enim duæ accessiones in idē tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ inuicem iunguntur. Quando igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris etiam nonnihil per accessionem assumit. Protinus autē talis calidior est & ardentior, tum vomitionē quandā bilis, aut deiectionem, aut madorem adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercent, pauci verò horrores: neq; tamen sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana cōtinua, insultus quidem accessionis cū horrore accidit. At cum ex pituita proueniens febris præcelluerit, depressiones pulsuum fiunt, & horrores. Si verò calidior præualeat, subito ac vna vice incalescūt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquiualente duarū febrium, puta tertianæ intermittētis & quotidianæ continuæ temperatura proficiscens. Nō exquisita verò vel bilem largiorem, vel pituitam causatur, quæ iam magis etiā curationi renititur, cū modicus humor à copiosioris dominio artiq; auxilio expedite vinci possit. Si enim pituita sit superior, præfidiis maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus: si autem flaua bilis, iis quæ in tertiana cōprehensa sunt: In totum ei quod vrget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

De morbis publice grassantibus.

CAP. XXXV.

Publice grassantes communēsq; morbos nominant, qui multis simul obueniunt, quorum vt generatio, sic etiam causa cōmunis est. Cibiq; igitur communes prauī, illiusmodi morbos cōmunes pariunt: item aquæ vitiatæ potio, exercitia immoderata, labores quibus quisq; assueuerat omīssi,
inc

inedia, repletio, idque dum fames grassatur, aut fœcundus annonæ prouentus est. Item regionum naturæ, communes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquam palustres sunt, aliquândo barathrum habent vicinum, quod vaporem exitiosum prauumque exhalet. Hæc quidem non continue accidere consueuerunt. † aër vero nos ambiens, temperamenta corporum commutat, vel calidior impendio, vel frigidior, vel humidior euadens, siquidem in alias causas neque omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. aër autem quoniam omnibus circumfusus est, & per inspiratum attrahitur, ut animalium corpora, pro temperamenti ipsius immutationibus simul afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex vnoquoque aëris statu futuros præfagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumflui aëris temperaturis victum accommodans. Itaque corpora morbo alicui ex propria intemperie vicina, hæc à simili circumdantis nos aëris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam cœlo temperiem obtinent, præterquam quòd nullam offensam experiuntur, etiam meliora fiunt, dum repugnans aëris immoderatio temperamēti immoderationem punit. ac qui hoc nouit, secundā valetudinem tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida: aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem ocio, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autem, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parcior. Præterea lignorum acruatim constructorum incendio haud mediocriter aërem ad calidum & siccum mutaue-
ris, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem agrigentium factitasse ferunt.

† In antiquo codice hæc aliquanto explanatiora sunt. in eo enim hæc verba ita leguntur. ὁ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἀπὸ τοῦ πνεύματος τὰς ὑγρὰς, ἢ τοὶ δὲ μὲν τοὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ τοὶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ἢ οἱ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ οἱ ἀπὸ τοῦ πνεύματος: id est, Aër qui nos circumstat vel calidior, vel frigidior, vel siccior vel humidior temperamenta immutat. Quam huius loci veram esse scripturam vel ex ijs quæ de eadem re scribit Aëtius intelligi potest.

De pestilentia ex commentarijs Rufi.

CAP. XXXVI.

Pestilentia grauiissima omnia superueniunt: nihilque in hac sicut in aliis morbis singulis occultatum. Etenim

f 4

delirium accidit, & bilis vomitio, praecordiorum intentiones, labores, sudores largi, extrema algent, alui profluviaurgent biliosa, tenuia & flatulenta, urinae cernuntur aquosae, tenues, biliosae, nigrae, mala habent subsidencia, suspensa pessima, nares destillant, pectus ardet, lingua torrida est, siccitulosae, remissa, torquent vigilae, couulsionones violentae, aliaque multa praua. †At si quis pestem veteram praenosceret, ex malignorum anni temporum, & vitae studiorum ad sanitatem haud conducentium animaduersione, aliorumque animalium praecedente interitu, his apud se consideratis, & illud praeterea perpedito cuiusmodi sit praesens anni tempus, qualisque vniuersus annus. Inde si quidem qualis victus ratio esse debeat, optime deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem recte ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit necessum est victus ratione desiccare, ut humor superfluus absumatur. item ventris quoque habenda est ratio. Quibus superior ventriculus pituitam continet, vomitionibus sollicitare: quibus autem sanguis inundauerit, secare venam oportet. Iam per urinas purgatio, aliaque, & totius corporis, proficiunt. Quod si etiam aeger ardore aestuet, & flamma usque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idque non paulatim, nam magis hoc pacto incendit, verum una vice ac semel, ut flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat, summa vero inalgescunt, cutis in superficie frigida percipitur, praecordia contrahuntur, veteres colliquata, partim supra, partim inferius transmittit, vigilae urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur. †Ac si alio quopiam modo ab internis foras poterit elici. Iam vero & haec potio vtiliter praesumitur. Aloes partes duae, gummammyrrinae partes duae, myrrhae pars una. Haec in vino odorato contrita instar dimidia fabae exhibetur. nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui hoc potu pestem non superauerit. Haec quidem Rufus memoriae prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacem ex viperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quae Romam inter necino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

†sim

† Simplicior & meo quidē iudicio huius loci sensus verior est in exēpla-
ribus manu scriptis. Sic enim ea habent, σωείλοι δ' ἄν τις μέλλοντα ἡ-
ξῆν τ' ἰσχυρὰν πρὸς τὰς τ' ἄρ' αἰσ. &c. id est. conijciat, autem quispiā
futuram pestilentiam, si attentē consideret temporum &c.

† Quod est in impressis καὶ ὁδὸν, in manu scriptis magis explanatum
est, ἐν τῷ βάθρῳ, id est ex profundo.

De ijs qui ex redundantia crudorum humorum synco-
pe periclitantur. CAP. XXXVII.

Nonnulli, febricitare incipiunt, vbi magnā crudorum
humorum copiam ore ventriculi simul offenso, con-
gesserunt. His & præcordia inflantur, & os ventriculi va-
stiore mole, quam pro naturæ modo cernitur: adhæc co-
lor ipsis ad albidius, aquosiusque, magis est, mutatus. qui-
busdam ad nigrius. Nulli talium sanguis mitti sine maxi-
mo dispendio solet, etsi vacuationem desiderent. Verum
nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, vt-
pote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio
igitur medendi talibus est, quam frictione molimur. In-
cipere vero per initia statim morbi oportet, ac primum à
superiore crurum parte deorsum, idque linteis non admo-
dum mollibus, sed modice asperis. Deinde tota brachia ab
humeris vsque, & superiore parte deorsum simili modo
sunt fricanda. Vbi vero artus omnes abunde calidi viden-
tur: & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sen-
sus superueniat, oleo relaxante vteris, ab astringentibus au-
tem abstinere. per hyemem vero etiam digerentium vsus
erit, quod genus est siccionium, & chamæmelinum. Cum iam
artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, in-
de ad spinam dorsū transitus est: hæcque tota perfricabitur
similiter, ab hac rursus ad crura te cōferes: & hinc ad bra-
chia. exinde rursus ad spinam. ita toto die facies. Porro mul-
sa, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima, cauē-
dūque, ne vel cibum, vel sorbitionem, vel aquam exhi-
beas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tri-
bus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi
partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit,
& alius sua sponte commodè non deiciat, cum fiducia ali-
quid ab inferioribus partibus infundes. Quod si maior in-
sto recrementorum impetus ad aluū citetur: principio qui-

dempercoquere mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidem sistenda, alius sed exhibendus pro aqua mulsæ prisanae cremor est. Si vero fluere pergant, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu vires collapsas ob imbecillitatem didicerimus, panem ex vino diluto exhibere conueniet: utique si nec venter nec iecur inflammatione laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis succis referato, nulla plane medicina periculo subtrahit. Sin autem quandoque crassi abunde humores deprehendantur, oxymeli pro mulsâ continue exhibebitur. Ergo si æstas sit, & æger calidi temperamenti frigidaque potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis. Sin hyems sit, calidum omnibus. Sane balneum his est aduersissimum. Porro iis quos syncope iam premit, si partes modo commemoratæ inflammatione vacent, panis exhibebitur modicus, isque ex vino quod celerem in corpus digestionem adiuvet, statimque ad frictionem veniendum est, quæ pro tradito quoque iam modo administrabitur, verum quibus ex flava bili, quæ os ventriculi, infestet, syncope incidit, is frigida offerenda potio est vinum tamen tenac, fulvum & vetus.

De his qui ob prætenues humores syncope opprimuntur.

CAP. XXXVIII.

Qui tenuium humorum vitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. Porro ad exitium spectare existimandi sunt, si vel iecur ipsorum, vel venter inflammatione obsedit, viribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quàm priorum rarefacere, & frigidum ipsis aërem accerere. Vngendi sunt præterea astringentioris vnguentis. tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffluant, non aqua mulsæ, non prisanae cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum vero & cum pane. Vinum iis aquosum necessarium inter inania est, sumptum post cibum.

D

De reliquis occasionebus, quibus syncope succedunt.

CAP. XXXIX.

Reliquæ occasione, quæ syncopas cōcitāt, quatuor sunt numero: dolor vehemens, vigiliæ, immodica inanitio, ac in iis qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intemperiem. Celerrime igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

De dolore.

CAP. XL.

ITaque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Sin autē tanquā à palo impacto, aut veluti à terebro forari putes, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa membranas constituitur. Pertundens vehementissimis nō heterocraniis solū, sed cephalæis quoq; accidit. Est autē pertundēs dolor, cū à parte primario affecta, ceu à radice subito in vicinas perfertur. Porro distendentes vtrinq; nervorum dolores sunt, cum & laborant, & ad vtrāq; extrema tenduntur. minime vero in latitudinem porrectos nervi dolores percipiūt, at tenuis, stupefaciētesq; dolores mēbrana quidē sub cute porrecta inducit. quæ vero inter carnē hærescit, tanquam diuellentes cruciatus excitat. multæ si quidem existunt inæqualiterque inhærescūt, & ipsam carnē amplectuntur. Membranarum vero quæ ossibus circundantur, profundius sunt, ipsorumque ossium tanquam dolentium imaginem representant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedēs vitæ ratio venit inspiciēda, fueritne præter cōsuetudinē otiosa, aut cibus homo vsus sit largioribus, iisq; ex valēti materia, vel solita excretio sit re-tenta. Nam si ex his aliquod, vel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio: ac quācitissime homo vacuari debet. Sic enim licebit tibi maxima cum securitate iis vti remediis, quæ fluxiones dolentibus particulis incūbētes repellāt. Si igitur sanguinis sit copia, quod distēdit, veluti in inflammatione oriri solet, protinus si vires patiuntur, sanguis dimittendus est, per magnam venā patienti particula propinquam. Vbi autē vitiosus humor duntaxat affligit, purgandus est. Si vtrāq; coëant, ambabus vtere vacationibus, sanguine prius emissō. Quod si his peractis dolor etiam remanet, cōstat profecto in ægrotante particula impactum esse, quod

quod afficit. Patet verò curationem ipsam per digerentia quoque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: auxiliantes simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum per sedem iniectionibus, item cataplasmatibus irrorationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendove dolorem exciter, moli eidem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & viride sicco magis.

Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta.

C A P. X L I.

QUum per ventrem aliquid non ex esculentis, poculentisque, verum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam confluente: qui quidem flauæ bili continuè per vomitum, & infra erumpenti consimilis est, odoris autem fœditate ab ipsa differt, tum quod deiectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim verò oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nonnihil etiam ex ipsis solidis partibus absimitur. In hac perniciosissima febre frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, rectè offeruntur.

De vigilijs in febris.

C A P. X L I I.

AT vero eorum, qui immodicis torquentur vigilijs, crura & brachia vincire, † quo tempore somnum captare solent, iubemus, & excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conuiueant compellimus, donec abundè fatigentur. Inde subito vincula soluimus, lucernamque tollimus, & altè esse quietem iniungimus. si nihilominus vigiliae pertinaciter vrgent, ubi accessio remiserit, frons nigri papaueris capiti decocto illuitur, naribusque offertur papaueris albi cortex torrefactus, detritusque, & mandragoræ radicis leuigata tantundem cum vino, & rosaceo malagmatis fronti applicetur, serpillòque cum meliloto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est vtendum, vel trita papaueris capita excipientes pane cum rosaceo, vel eiusdem cerato illinimus.

linimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adiciatur autem sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. † oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint viridia, quantum tribus digitis potest comprehendi: sin minus, tria quatuorve papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinentur. Iam linctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sapa, mensura cochlearij, vel vnus, vel dimidij potus, somnum frequenter accersuit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & vigilia infestant, vt in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo singulorum vncia. carpobalsami drachma, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, singulorū drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc verba sic leguntur in veteri codice, ὁ περιβαλλόντων ἢ ἀγρυπνούντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κατ' ὃν ἰδί τ' ὑπὸν εἰσάσσει βέβαια καὶ κλειόμεν ἢ ἐγρηγορεῖν διότι τε πολλὰ καὶ μῦσαι ἀναγκάζονται τὰ βλέφαρα, id est, eorum verò qui multis vigilijs torquentur, crura & brachia tubemus, quo tempore somnum capere solent, ligari, & excitari, palpebrasq; saepe aperire & claudere cogimus donec &c. Qui sensus magis concinnus est.

† Id sic legitur in antiq. libr. τοῖς ἡλαχάνοις συνειξέτω μύκκωνος μελάινος, simul coquatur & ferueat cum oleribus papaueris nigri.

Curatio soporis noxij, qui cataphora Græcis dicitur.

CAP. XLIII.

FRons posca lactis modo repenti abstergitur, & summa valide ligamentis excipiuntur. naribus admoventur quæ incisoriæ facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ valenter dorso, & spinæ defiguntur. Si vero morbus his non cedit remediis, etiam quæ sternutamenta excitant, obiciuntur. Ciborum materia sit, quæ incidat, diuidatque, veluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus.

CAP. XLIIII.

† **S**I capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem febrium vacationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, vel rosaceo, cui etiam aceti paxillum sit admixtum: si æstas sit,

&

& febris ardens, frigidus: si hyems, neque febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygoniiq; succus, per astatem etiam papaueris capita, vel ipsum papauer: quemadmodum hyeme peucedani momentum. Quod si verò dolor in fronte perseveret, incipitq; pilis careat, hoc quoque obducendum est veteri polenta, & polygonio: vel pane similiter & rosis, vel modica myrto, vel serpillo. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum igneus sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, vel ipsum per se in viscum coctione redactum, & continuè mutatum. Item coriandrum similiter cum polenta, & aloë cum aceto illinitur, myrrhāq; & ammoniacum pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles autem dolores ruta, mentāq; cum pane diffat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxiliis non eliditur, primum caput ad cutem attondere oportet, deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri, mox cucurbitulae occipitio agglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq;: iam verò hirudines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam à capite, vel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, iis vtendum est auxiliis, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem à stomachi regionibus vapores sursum tēdentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, veluti præceptum à nobis est.

† Vera scriptura huius loci est, *μὴ δὲ τὸ προσήκον τῶν περιττωμάτων*, id est, post conuenientem excrementorum vacationem, facili enim fuit librarij lapsus.

Quomodo stomachi curam habere conueniat.

C A P. X L V.

SI stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulae sunt, vinum, polenta, crocus, mastiche, & aloë. aspergiq; debet oleis ex absinthio, melino, mastichino, nardino, & vino. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitae succus, lactuca, portulaca, solani, sereos, † & vix immaturæ. Sin autem inflammatorium quiddā in visceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspergionibus, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipēs gallinae, aut anseris, bdellium, vel ammoniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apij semen, fœnugræcum, althææ, chamæmelorum

ros,

Ros, & vt vno verbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amarâmq; , tum astringentem.

† Hic locus integer est in veteri exemplari: sic enim descriptus est, οἷον κολοκύνθης τε τὸν χυλὸν, καὶ δριλκίνης, καὶ αἰαντάχνης, καὶ τρυχνης, καὶ αἰσίου, καὶ ὀμφακός, οὗτος μὲν γὰρ οὐ ψύχῃ μένεται, ἀλλὰ καὶ τρυφῇ, id est, vt succus cucurbitæ, lactuce, portulacæ, solani, sereos, & vna immatura. Hic enim non solum refrigerat, sed etiam adstringit.

De immodica perfrictione in febribus, & rigore.

CAP. XLVI.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere non oportet: nec concertationem naturæ dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, promptè remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex frigidioris vero, copiosâq; maxime pituita nascitur) primum quidem artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiam piper oleo admiscebis, vel cachry, vel adarcen, vel castoreum. mollitèrq; totum corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc rigor non possit excalfieri, valentioribus quoque ex his factis acopis, necnon dropacibus, & sinapismis vti consilium est, aliâque fomenta ritè admoliri. Item aciora ex iis quæ admoventur naribus, comode faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssopum. Potui dabitur ante accessionem mulsa, in qua piper, & ruta sit incotta. adhæc liquoris cyrenaici cocto melle formati instat milij duabus horis ante accessionem præstabimus. Similiter & liquoris silphij. Adhæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam verò in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, vt Archigenes memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotano infricandam præcipit, vel calamintha arida, vel cunilæ tum foliis, tum floribus, vel coslo, vel pyrethro, vtroque horum cum oleo. vnde fiet, vt vel nequaquam, vel certè minus rigeant.

De

Sudores, in crisi erumpentes excipere oportet, quandiu satis vacuatum fuerit, adiutaréque calore mediocri, & quiete, adeò vt neque abstergantur, quoniam alius quoque alium elicit. item calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus morborum apparentes idem quod in crisi provenientes, administerium capient. Itaque præsidia quibus sudores euocantur, libro superiore, capite quadragesimo octauo abundè sunt comprehensa. Cum verò sudores largius eruperint, tunc abstergendo, leuandóque operimenta recreare conuenit. Etenim lassant, supra modum excidentés, vt in syncopen frequenter agros perduxerint. Tenui velamine madidóque debent esse coniecti, perflatus aëris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. Insuper myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, piceæ cortex, electrum, & polenta cum vino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, facièsq; posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiã calcem non restinctam, & flores vini combustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambæ siquidem inquit, recalescentes, siccantur. Media verò corporis loca delinenda succo plantaginis, vel coriandri, vel portulacæ, vel brassicæ præcipit, vt vndique concreta, sudores reprimant. † Per somnum verò creta cimolia aqua dissoluta, dorso, & thoraci subiecta proficit. Totum verò corpus rosaceo perungitur, vel melino, vel myrteo, vel lentiscino, vel ceratis quæ ex his confiunt. Nam magis sunt his idoneæ reuictiones, quæ latentes meatus obstruendo, humidi exitum prohibeant. Pater autem omnibus, quòd cibus quoque sicior his conuenit, & vina mediocriter astringentia. Ceterum largiore potu, & præsertim humidioré, tum crebris per aluum iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agitandum, in frigidioré aëris statu, & summæ his partes potissimum refrigerentur. Qui per validam expressionem sudores fiunt, (hi autem vel ob dolores excitantur, vel conuulsiones) faciliè curantur, † si extrema deligentur, calfiant, & per laneos panniculos reficiantur.

† Scri

† Scriptura quæ in veteri exemplari multò melior & sincerior est. Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὕπνοις κλωδίᾳ ὕδατι διχλυσθεὶς πικνόμενα ῥάκη ὑποβάλλειτ' μετὰ φρένα καὶ θώρακι. Id est, panni pinguefacti cimolia dissoluta aqua subiiciuntur dorso & thoraci. librarius enim indolens ex ῥάκη fecit ἀρχὴ καὶ.

† Concinnior sensus est in veteri codice. ita enim in eo scriptum est. καὶ δάλφι τ' ἄκρω καὶ ἀποψύξει διὰ ῥακιδίων ἀραιῶν κοῦφως θεραπεύειν, id est, leuiter curare oportet extremorum deligatione fotuq; ac exicatione per pannos raros.

De tussi in febris.

CAP. XLVIII.

T Vsi in febris, præsertim cum rigore obuenientibus, occurrere cōuenit. Nam tussis intentione, febris quæ inclinabat vires resumit, ac redintegratur. Aduersus hanc formulæ medicamenti ex melle cocto coactoq; hypoglotia vocant, offeruntur. Linguae autem supposita, vnde nomē habent, cliquescunt: & quod spirandi impedit facilitatem, discutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydro meli discoctum. Quibus autem de neruoso genere metus nō est, temporis processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus, hyssopi decoctū, quod etiā rigentibus auxiliatur. Item castoreum cum febris ardens non est, neruoso quoque generi cōfert. Adhæc linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, lini, amygdalis amaris, & vrticæ semine plurima vero ex parte cibus quoque hæc simul adiungentur. Ac resina quoque terebinthina in ouo exhibetur. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriæ vicinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleūve rutaceum esto, vel irinum, vel anethinum. Præterea deligatura valida in longum porrecta, tussim exactè cohibet: dico autem per medias partes extremasq;. Non ratione caret, & vna syluestri quæ staphis agria dicitur, tussis gratia uti, simul cum domestica, aut cum mastiche mansa. summa debēt infricari, permulceri, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluenda est in contrarium retractio. At si propter febris acrimoniam tussis concitatur, vtendum est gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, vel rosarum, vel dulcis radicula. Visceribus autem, vel etiā cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

§

Sternutamenta febribus saepe incidentia, molestant. Et-
 Senim caput replent, & virtutem arguunt. Nonnullis san-
 guinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incom-
 moda. Quare aduersus ipsa remediis pugnandum est. Co-
 hibet itaque sternutamentum irruens, nasi, frontis & oculo-
 rum perfricatio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ru-
 ctus, alium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque
 ad latus, summaram partium mollis contrectatio, maxillae
 musculorum perunctio, calentis olei in aures infusio, pului-
 num calidum mento subiectum. Caueri debet repentina ex
 fomno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, ca-
 storei, sinapis. Mentis autem malorum, & polentae odor co-
 ducit. obtundit enim sternutamenti elisum: Idem spongiae ex
 mari vacuae efficiunt. Vbi vero cupiditas sternutandi obor-
 ta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies
 accommodetur, & continue acriorum odorum experientia,
 & mentis remissio.

Quibus vitiosi humores fastidium procrearint, iis illa
 & esculenta & poculenta dare conuenit, quae huiusmo-
 di succos vel abstergendo per vomitiones, seu per aluum ex-
 cernere soleant, vel attemperando, meliores reddant, quorum
 materiam libro superiore, qui totius operis primus est, com-
 prehendimus. At si ob virtutis imbecillitatem, cibum re-
 spuant, quoniam omnis facultas ex particularum intempe-
 rie infirmatur: conuenit in temperamenti speciem, contra-
 riis medicari. Plura de fastidio, in stomachi vitiis libro ter-
 tio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per ini-
 tia cibi cupiditas, iis quae odorem mouent, recuperanda est.
 Potissimum vero polenta in aquam mersa, vel posca, vel di-
 luta vini potionc. Aut cuiusdam odorati pomi, & astringen-
 tis decocto, item perunctione odore grata, & moderata to-
 tius corporis frictione, ac blanda contrectatione tum faciei
 collutione, aquae sorbitione modica. Iam stomachus digito
 immisso turbatus, ad cibum assumendam quodammodo
 conuertitur, praesertim, vbi biliosum quid, aut acidum sur-
 sum eiecerit. Secundum primos dies, † cataplasmatibus quoque
 a foris stomachus ad cibum sollicitetur, ex palmulis, malis
 cotoneis, cenanthe, absinthio & aloe confectis. Cibi autem
 pra-

præparentur plures simplicēsq; & frumentacci: qui alterius quoque generis varietatem quandam habeant non tamen ab iis multum recedant, qui in febribus dantur, in quibus & poma conueniunt, quæ non ex facili aceſcunt, neq; nimium dulcia ſunt, ſed matura, neque ad ſatietatem exhibenda, verum ſolum quod ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam ſufficit. Præſto autem ſint ægris dum alentur familiariffimi, qui tum corripere eos, tum inhortari queant. Porro febribus ſolutis, ſi in viriū recreatione perduret faſtidium, etiam ſiſarum cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, ſaſamentum, bulbi, & quicquid ad bonitatem ſtomachi facit, accommodetur. Ne non & illud ipſum in memoriam reducat, quibus cibis per ſanitatē maximè uſi ſint. item ambulationes, geſtationes, vociferationes, dropaciſmi, frictiones & exercitia adhibeantur. Præterea abſinthij ſucci potio, vel aloës, acetiſque ſcillitis inſtar myſtri abſorbent, in id vehementer efficaciæ eſt.

† *Simplicior ſcriptura eſt, καὶ κατὰ πλάσματος ἐξωτερὸν τὸν στομάχον ἰατρῶν, id eſt, cataplaſmatis à foris ſtomachus curetur. Nam quod eſt in exemplari typis expreſſo κατὰ πλάσματος omnino deprauatum eſt.*

De grandi fame, quæ græcis bulimos dicitur.

CAP. LI.

SI verò in grandem famem, quā bulimon appellant Græci (dico autem cum minus quàm par eſt, cibos corpora ſentiūt) faſtidium deuenierit, hiſce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admouentur, tum ſuillis carnibus aſſis, & hœdinis. In ſumma omnibus, quæ nidoſum odorem repræſentant: ſauitria ſane febriliū præterita, extremæ partes deligari, ipſiq; excitari debent, maxillas pungendo, & crines, vel auriculas vellicando, recollectis autem, panis ex diluta vini potione, vel aliud quippiam diſtribui facile exhibetur.

De canino appetitu.

CAP. LII.

ET ſi hoc ſymptoma febribus non adeo ſuperueniat, ſed nonnunquàm ſecundum ipſas, attamen gratia cognitionis, quam cum faſtidio habet, nil fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quū ambo naturæ modū excedant, ſermonem inſtituere. Quoniam igitur à pituita potiſſimum

acida constituitur affectus, his utendum est, quæ hanc incidant, abstergeantq; Talia autem sunt maximè, dulcia, salsa, & alioquin detergētia calida. Vinū igitur ipsis recte datur copiosum, ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore fulua aut rubra, astrictionis expertia. Verū dulciora potius propinantur, etiam non sitientibus. At cum ad prandium venerint, primū ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerū, aut astringens sit adiectū, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, attamen impotentem ad cibos animi impetum dissolunt. Inedia verò spissitudinem pituitæ stomacho inhaerentis absorbit, minuitq; Iam salsamenta ipsis commodè exhibentur, ab his vina commemorata liberaliter assumpta prosunt: quod ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

† Codex manu scriptus habet, *ἢ ἄλλως τριπτικὰ διπμαίνοντα*. id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco convenit, quanquam *σπικτικὰ* etiam rectè legi potest.

De siti.

CAP. LIII.

Situm admodum longam fieri existimabis, ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in ventrem defertur, & siccitatis quidem remedium est somnus, caliditatis autem vigilia. Nonnulli verò sitibundi ex vino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpollenti in eis humorum vitio respondentes. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque vidimus, ex quorum numero etiam mortem oppetierunt, tum qui viperas dipsandas deuorant, tum qui vino veteri sese inebriant. adhuc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerunt. Verū sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, vel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbara. Oprime facit ad sitim nigræ lactucæ semen commanducatum. item glycyrriza appellata. adhuc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium. cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthū soluitur ouorum crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritūmq; cucumeris semini prius leuigato adiūgitur.

tur. Postquam emollieris, pilulæ formantur, in umbrâq; siccantur, ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim saliva solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorum, vel pirorum, vel mespilorum, vel pampinorum vitis, vel maligranati succus sorbitioni datur.

De linguae scabritie.

CAP. LIIII.

Humectanda est lingua scabrities, lini seminis decocto agris ut in ore teneat dato: melius autem facit myxiō cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluitur, vel sponsia undiquaq; abstergitur, deinde rosaceo illinitur. iam ipsum rosaceum melle cōtemperatum, in id valde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus. item rhu obsconiorū mulsæ admistum bene facit. insuper Damascena, & myscli (hoc autē est myxa) ossa ore retenta & linguae circundata. His adde etiam lactucæ cauliculum. Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem melleum, lenticulæ instar, vel plurimū ad fabæ magnitudinem deuoratum, vehementer posse humectare. Ceterū in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat. item os connuere. hiatus enim madorem absorbit. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

De nausea.

CAP. LV.

† **C**um sine cibo assumpto nauseabundus ager efficitur, cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores ventriculum infestare. Nonnulli verò turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbibito. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, seruando agrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores autem vomitus euicit, qui nonnunquam ex ptisanæ cremore, vel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuantia desiderant. quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autem praua in tunicis absorpta, picra ex aloe utilis est. verum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quemadmodum rursus, cū humiditas multa citra malitiam inest, astringentia quidem quam utilissima sunt: medicamentum verò ex aloe in marcorem perducit. Cum verò frigiditas humori adest, astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigidi affectus, quod neque sitim, neq; ardorem eo detenti experiantur.

† Hic locus sic legitur in veteri, ὅταν χολῆς το προσενχθῇ καὶ τὶ ἐμῆμεν οὐκ ὀφθαλμοῖς ὁ κἀμυρ γινῆται, id est, cum ager sine assumptione eorum, quæ vomitum mouent, nauseabundus fuerit. Quæ scriptura clarior est.

De bilis vomitione.

CAP. LVI.

Bilem vomentibus cataplasma applicandū ex est palmulis, malicorio, galla, vino incoctis, vel posca, pane simul contrito. Item acacia, hypocistis, balauſtium & rhu cataplasmati adiungantur. Præter hæc cucurbitula admota magnifice auxiliatur, cum largiore flamma. Cibum vero frequenter paulatim dabimus. † In his autem qui atram bilem vomunt, & inflationes stomachi experiuntur, spongas aceto quam acerrimo calente madidas imponito, vel hederæ folia vino incocta applicato.

† Vetus codex hanc scripturam habet, ἐν τῇ χολῇ καὶ κἀμυρ γινῆται. ὅταν χολῆς το προσενχθῇ καὶ τὶ ἐμῆμεν οὐκ ὀφθαλμοῖς ὁ κἀμυρ γινῆται, id est, in his autem qui atram bilem vomunt, & inflationes stomachi, intestinorum & ventris experiuntur spongas etc.

De singultibus.

CAP. LVII.

Singultus oritur vel ex repletione, vel inanitione, vel suc-
cis acrioribus stomachum erodentibus, quibus per vomitionem redditis, cessat. Plerique vero medicamentum diatrion pepereon assumentes, si statim vinū superbiberint, singultiunt. quod autem nonnulli etiam cibo intus corrupto singultu infestentur, cuilibet notum est. iam non pauci rigore correpti, singultiunt. Vomitus itaque iis qui ex repletione, aut rolione stomachi singultu cruciantur mederi abunde comperimus. calida vero, iis qui ob perfrictionem. At quum ab humorum repletione singultus originem habuerit, violenta indiget euacuatione, quam sternutamentum præstat, ob inanitionem vero creatos singultus sternutatio non finit, datur autem singultientibus ruta cum vino, vel nitrum in mulla, vel scili, vel daucum, vel cyminū, vel gingiber, vel calamintha, vel nardus gallica. Hæc sane singultus ex ciborum corruptione, aut frigore, aut repletione contracti, auxilia sunt. qui autem ex frigidorum viscosorumque humorum copia singultum experiuntur, castoreum tribus obolis potui fument ex posca, idem curi impositum vnà cum oleo veteri sicyonio adiuvat. Insuper acetum

tum scillites, vel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, præsens est remedium.

De aluo in febris astricta, & cita.

CAP. LVIII.

QUæ arefcentem aluum proritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus. quoniam vero eadem quoque liquida febris incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur excipiemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes ut quæ à corruptione & cruditate emanent. Sin autem vacuatio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidem acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & ptisana sorbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum verò pituitosiora & fluida erupant, contra sicciores calidioresque cibi erunt, quatenus febres permittant. Huius generis habetur, quæ ex condimentis calidis consunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud compulerit. Porro ubi concoctrix facultas infirmatur, astringentibus tum cibis, tum remediis utendum est. cibis sane, in quibus maxime malum granatum, aut mala cydonea, aut pira, aut mespila sint iniecta. vel etiam hispis, & vino tenui odorato astringente: remediis autem cataplasmatibus, nimirum ex polenta, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & consimili materia. Caterum considerandum venit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant imponi. dico autem stomacho, aut imo ventri: nonnunquam & circa lumbos applicamus. Cruentæ autem excretiones reprimunt ex thure confecta, desiccantque, vel subtilior portio polentæ cum thure, vel manna vino macerata, vel posca. Porro acriorem humiditatem etiam iniectione per aluum, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, vel chondri, vel oryza, vel tragi, idque non semel verum saepius. Postea vero adiunguntur etiam rosæ siccæ, vel myrti. nonnunquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo vinoque tenui astringenti, vel rosarum decocto inditum vel sedi quoque subiectum excernenti cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus, Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immittatur.

Quoniam sanguinis distillatio totius corporis, aut caritis redundantiam innuit, per contusionem, vel densitatem eueniens: largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioque est inde ipsam moliri, vnde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus thyphe, vt mos est, narium vasa conuulnerare: oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro viribus detrahere. Spontanea vero in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere conuenit. si autem sanguis immodice erumpat, sistere conandum est. Primum itaque extremæ partes valide deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Viderur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere. æger non expurget narium foramina, neque locum irriter, verum sanguinem concreescere sinat. nasus spongia, quæ in posca maduerit, refrigerat, ac obturamentum ex panniculo naribus profluentibus demittatur, medicamentum quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam curationem inter remedia vnicuique loco affecto conuenientia libro subsequenti verbosius persequemur.

Si anima deficiat.

CAP. LX.

Qui ex cholera, alui profluvio, aliisque multis, & vniuersim factis vacuationibus, resoluuntur, uis aqua frigida aspergitur, & nares comprehenduntur, os ventriculi infricatur, vomitus præcipitur, stomachus turbatur, vel digitis immisissis, vel pinnis. præterea pluribus vinculis valide deligari debent. Cum per imas particulas vacuationes fiunt, brachia: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum vergens, & cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias vacuationem experiuntibus. Curat etiam vinum aqua temperatum resolutiones ex subitis vacuationibus ortas, nisi viscerum inflammatio, aut vehemens capitis dolor, aut mentem turbans aliquis affectus, aut febris ardens, in crudo morbo prohibeat: in his siquidem magnavinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidique temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigidum vinum
exhi

exhibebitur. sin contraria euenerint, calidum. At si ex sudoris copia anima deficiunt, cutis densanda est, quemadmodum à nobis prius est dictum. Tum vt frigidus aëris perflatus accedat, prospiciendum est. Porro in ventriculum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquam ipsi ventriculo stomachoque corroborantia admouere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, verum sanguinis profluvia, & sudores vehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, vino ciboque abstinebunt. item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua vel thymus, vel origanum, vel pulegium vel hyssopum sit incoctum. Propitium vero iis est & oxymeli. At si propter humores vitiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubendi sunt vomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem vomere nequeant, oleum quamlaudatissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferioribus partibus infusum, subinde vacuat. Iam vero absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis vti expedit quæ firmando ipsi sunt: veluti antea in capite de eodem comprehensum est, summâque perfricare oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur: qui perfrixerunt, medicamen diatrion pipercon, ipsumque piper assument. Qui vero ob caliditatem largiorem, æstumve, aut lentam in balneo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si ad ventum conuertas, stomachi frictione, vini cibique vsu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantque, artus fricare valenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc vigilias in ediamque præcipito. Ea vero & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusve horis ante accessionem, cibus offeretur, vel chondri cremor, vel panis ex aqua simul cum mali granati nucleis, aut malis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam vinum dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est ac ubiq; causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accidat, atque contra hanc pugnandum est. Nonnunquam vero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, vel etiam mortem minatur.

Quomodo vlcus circa os sacrum proueniens curetur.

CAP. LX.

EThic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno decubitu superuenit. Cum itaque sacri os is regio incipit rubescere, circulum ex lana iustæ magnitudinis, parti subiiciemus, postea rosaceum, vel myrteum ceratum, quod argenti spumam, aut cerusam habeat superaccommodabimus. Inflammatione autem oborta, cataplasma ex pane cum solano, vel polygono, vel plantagine, vel tenera brassica applicatur. Si vlcus serpat, lenticula cum malicorio instar cataplasmatidis inducitur.

* *

FINIS LIBRI SECUNDI

IOANNE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

*

PVVL

PAULI AEGI- NETAE LIBER III.

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO IN:

TERPRETE.

*

DE PILORVM AF- FECTIBVS.

**

De alopecia, & ophiasi, & caluitio.

CAP. I.



VEM ADMODVM stirpium nonnullæ
succis defectu inarescentes contabescunt:
nonnullæ vero alienis à natura sua hu-
moribus infectæ emarcent, haud dissi-
mili ratione idipsum quoque pilis usu
venit. Etenim Caluitium, humidi penu-
ria fieri consuevit: prauitatem autem,
vitiq; succi, Alopecia, & Ophiasis, fi-
gura tantum inter se differentes. Quoniam in Ophiasi, par-
tem oblesam, serpentis modo glabram, ostendit: alopecia,
quod vulpes continuè infestet, sic appellata est. Itaque con-
iecturam de humore, qui superat, ex cutis colore facientes,
vacuationem medicamento purgante prius moliemur: de-
inde loco, viciato auxilia inducemus. Si igitur color ad ni-
grius, albidiusve mutatus fuerit, Antidoto Hiera quod pi-
tuitæ educendæ humorisq; melancholico est, utemur: sin ad
pallidius, catapota ex Aloë exhibebimus: singulorū autem
ipsum descriptionem in libro de medicamentis compo-
sitis inuenies. Vbi corpus iam totum inanieris, medicamenti
quod pituitam per os extrahit, apophlegmatismum Græci
vocant, vsus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isq; non semel, ve-
rum

rum crebrior. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origa-
num, vel pulegium, vel thymus, vel hyssopum commadue-
rit. Cæterum in aliis quoque capitis affectibus eadem vre-
mur curandi ratione: primum humorem, qui præpollet eua-
cuâtes, vel purgatione, vel etiam sanguinis emissionem, si eius
subest redundantia, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus
iniiciuntur, transgredi conuenit.

De alopecia
CVTIS nitro confricata, lintheoq; aspero, lanæve potius
deterfa, & iterum defricata, adeò vt ruborem contraxerit,
verbenaca in Sole ex aceto detrita, illinitur. Aut alcyonio
primæ asperitatis combusto, reductoq; in puluerem cum
oleo lex lucerna inungitur. Aut arundinis radix, aut amygdalæ
amaræ cortex torridus, oleo, vel adipe vrsina exceptus
inducitur. Hæc itaque sunt mitiora medicamina, verum ex
euphorbio, thapsia, & adarce, oleo leuigata laurino, vel pi-
ce liquida, vehementiorem vim representant. *ALIVD.* Eri-
naceorum marinorum testa ignem experta cum adipe vrsi-
no excepta, loco prius nitro exterso illinitur. *ALIVD.* Pi-
peris, stercoreis ouilli sicci, erylini, arucæ seminis singulo-
rum drachmæ quatuor, veratri albi drachmæ treis, murium
stercoreis drachma. Excipiuntur felle taurino, aut hircino,
aut suillo.

Aliud experientia probatum ad alopecia.

*a dipio voss
c. d. g. m. m. f. o. r.*

MANDRAGORAE, radicis, mæli terræ, ari radicis, ceræ,
pice liquidæ singulorum vnciæ octo, axungia porci subru-
mis, nerij herba medullæ modicum. Axungiam, & nerium
incoquito, donec herba intabescat: deinde exemptam pro-
iicito: & reliqua axungia adiungito, incoquitoq; mox ce-
ram, & picem liquidam. Vtitor in sole audacius. Vbi iam vl-
cera ad cicatricem venerint, caput vulpeculæ vrito, & al-
cyonium, anchusæq; nigre folia omnia contrita super inun-
ctioni inducito, vt capiti pili succrescant. *ALIVD.* Muris
capitis combusti pars vna, testarum marinarum tantundē,
cum axungia porcina. omnia in fictili coctis vtitor insper-
gens etiam ex ipsis siccis aliquid.

Medicamentum ex thapsia ad omnes inveteratos affectus.

EUPHORBII, thapsiæ, baccarum lauri singulorum vnci-
a, sulfuris ignem non experti semuncia, veratri tantun-
dem, ceræ vnciæ sex, laurini, vel ricini aut veteris olei
quod

quod satis est. In validioribus etiam uti vincit nasturtij vicia, alcyonij combusti vncia: iisq; non solum ad Alopecias, verum etiam ad omnem diuturnam perfriktionem. Summarum in Alopecis cutis prius nitro est extergenda, infricandaque, & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem plerisque noui ex sola infricatione, frequenti que rasura pilos prouenisse.

Quomodo caluitium abigatur, & pili crescant.

Ex Critonis commentationibus.

LEPORVM ventriculi quinque arefacti diligenter olla fictili friguntur. His adiecto, myrteorum, myrti, summitatum, acaciae fructus, acaciae succi, rubi canini, aequali modum, adianthi vncias tres. Hæc omnia accurate felicata in pollinem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde adipis vrsini libris quatuor, & phocæ totidem admistis denuo tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruantur. Cum vsus postulat, quolibet oleo aromaticis imbuto diluuntur.

Adiantum *Bi* *Que pilos conseruent.*
POLYTRICHI herbe pars vna, ladani partes duæ, vino myrteoq; oleo excepta in vsu adhibentur. ALIVD. Anemone flos tritus cum oleo inungitur: idem vero, & nigrefact. ALIVD. Verbenacam rectam vnâ cum radicibus torrefactam, tusamq; tenui cribro incernito, mixtam oleo ut sordium habeat spissitudinem æreo vase reposito. Cum liquefeceris, vitior inuicem olei similiter.

Aqua pilos augens, eosdemq; denigrans.

AQVÆ pluuiæ sextarij sex, rhûs alexandrini sextarij tres, polytrichi vnciæ quatuor, herbæ sabinæ tantundem, ladani vncia, myrti vncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Sinito ad dies viginti vitreo vase commadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, vitior quotidie. Item semen altheæ in Balneo illitum pilos coleruat, augetq; pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum altheæ decoctum est, vel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῆς ἰπτιόους λυταβάπτην εἰς τὸ ὕδωρ τῆς κτίνας καὶ ἐν οὕτω ποιεῖ καὶ ἐκάστην ἡμέραν, id est, in sequenti die pectinem in aquam intingens vtere, atque ita fac quotidie.

Que

Quae medicamenta pilos extenuent.

FICUS foliorum, vitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarum buccinorum, terræ cimoliæ singulorum ^{mina}. Omnibus in nouam, crudamq; ollam coniectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, teritoq; , adiiciens aphronitri minæ semellem, gallas immaturas numero triginta. In puluerem redacta excipito, ac vtitor. **ALI V D.** Aphronitri minæ septē, pumicis tosti minæ quatuor, aluminis filsi, iridis siccæ, myrti syluestris nigrae, gummi, bryoniae radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorum crudorum in pollinem detritorum, congi pars quarta: Vtere absque pingui.

Ad fluentes pilos.

ALOB ex vino nigro austero illinitur, vel purpura tegmina ex oleo cocta, vel myrrha, & ladanum cum vino, myrteoq; , vel caprillum stercus in testa combustum ex oleo lenigatur ac cuti prius rasa inungitur.

Quomodo pili crispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopatra libris, quos de capillis crispis faciendis prodidit. CAP. II.

Capite prius deterso, spondylii radix cum mero pilis inungitur. **ALI V D.** Nux pinea recens ad cinerem vsque comburitur, iniecta q̄ue pilæ teritur, myrteum vnguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atque sic pili raso capite absterfo q̄ue delinuntur. **ALI V D.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergens vtitor, **ALI V D.** Gallæ viginti numero, adianthi vnciæ duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo vrina prius deterfo, vel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentum ad biduum, per quod vbi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo inungi. Id teneriū crispumq; & nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

Quae canos arcent, & eosdem denigrant.

OLEI, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, Ipiæ nardi drachma, vnguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem: incoquantur cū oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi vncia vna, vino soluta leuigatq; diligenter. Vbi vero tertia pars olei fuerit relicta, hanc percolato, & acaciæ mixtam in fidelia excipito, ac vtitor quotidie pilos inungens. **ALI V D.** Nucum viridium corticis vncias tres, ilicis radicis tantundem, vini nigri sextarios tres, ad tertias

tias decoquito, ac vbi id quod reliquum est, expresseris cum olei myrtei sextario iterum subiges, vsus eius est quotidianus.

Aqua pilos denigrans.

GALLAE sextarius vnus, rhus coriarij sextarij duo, myr-
ti nigra totidem, cypeti foliorum æqualis mensura, cinaræ
manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum
tantundē, aquæ lacustris sextarij duodecim. Omnia multis
ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illi-
nuntur, absterfis, siccatisq; crinibus. Ac cimoliæ terræ acce-
tabulum cum vina calce pari mensura inungitur. Hæc au-
tem succo betæ enitida soluta illinuntur. Deinde betæ folia
regminis gratia super accommodantur. ac vbi satis adhæse-
rint, in balneo abluuntur.

Vt ruffi capilli tingantur, & flauescant.

MYRRHAE pars vna cum salis floris altera, accuratè
teritur. vbi sordium facta est crassities, caput prius deter-
sum medicamento inungitur. siniturq; per noctem, & diem,
postea tunc ablui præcipies. ALIVD. Lupinos crudos cum
aqua illinito. ALIVD. Argentæ spumæ drachmam, terræ
creticæ drachmas quatuor, calcis vitæ drachmam. Ex aqua
mellis crassitiem faciens inungito, & betæ foliis adiectis ad
duos, tresve dies abluito.

Vt pili nigri flauescant.

LOCES vini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine
cerati facta sub somnum illinuntur, & mane pili flauescunt.
ALIVD. Cyperi folia succo herbæ lanariæ fruticis mada-
scunt. Et diluto vteris.

Quæ capillum reddunt colore aureum.

ALVMINIS, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, cro-
ci drachmæ duæ, thapsi qua tinctores vtuntur, Romani vo-
cant herbam rubiam, drachmæ octo, è cinere lixiuij quo pi-
learij vtuntur sextarij quatuor. Lixiuium cum thapso con-
tusa incoquito. vbi dimidia portio relicta fuerit, humorem
exprimito. quo alumen, sandaracham, & crocum dilues.
Deinde vase vitreo condes. Vbi vsus venerit, pilos prius ab-
sterfos illinito. postquam verò combiberint, ablues decocto
scenugræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusæ,
quod sufficit, ad hæc saponis quantum satis est adicies.
ALIVD. Flores vini vstæ vnâ cū oleo balanino, pilis obli-
nuntur.

nuntur. ALIVD. Saponē gallico cum aqua in singulis bal-
neis pili abstergantur.

Aliud valde generosum.

rubri RH *s* rubri sextarius, gallarum libra vna, Selydrij vn-
cia duae, herbae aurum colore imitantis (quam Romani ru-
biam vocant) vnciae duae, polytrychi fasciculi duo, absyn-
thij vnus, lupinorum quibus cortex sit detractus cyathi
duo, aquae sextarij septem. Omnia in vitreum vas coniecta,
dies nouem finito commadescere: quotidie bis rudicula a-
gitans. cum vsus exigit, auferes quod satis est. & hoc spon-
giam madefaciens, pilos confricato, humectosque combi-
bere finito. vbi siccati fuerint, saponē calida aqua soluto,
abluuntur.

Quae pilos albos faciunt.

VERBASCI candidi flos combustus aceto mergitur, &
in saponem miscetur. ALIVD. Verbasci seminis, aluminis,
raphanorum corticis singulorum drachma. Contundito, &
glutini quod ex tergoribus bouum confit, *ταυροκόλλη* Græ-
ci vocant, drachmas quatuor misceto.

De capitis affectibus cutem infestantibus, porriginē, quae pityriasis
dicitur. *et fletu dicitur vna et a p. S. p. r. u.*
lib. 4. **P**orrigo, quae pityriasis Græcè dicitur, est, cum tenues,
& furfuraceae squamulae ex capitis, vel etiam reliqui
corporis superficie citra exulcerationem reloluuntur. Id
autem euenit vitioso corporis humore, salsaue pituita, aut
bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaque
corpore toto (ut dictum est) euacuato, subscriptis reme-
diis vtetur. Cimoliam aqua prius maceratam betae succo
miscbis illinēsque, & tantisper ita permittes, donec inarue-
rit. Deinde postquam ablueris, thus ex vino oleoque detritū
perunges: die in sequenti staphida agriam, hoc est herbam
pediculariam ex oleo inunges. ALIVD. Nitri, fecis con-
crematae, myrobalarum, singulorum libra, herbae pedi-
culariae libra vna semis. vino dilutis caput abstergitur. sin
autem reliquum corpus pruritu vexerur, occis. Ad humi-
diorem vero pityriam, muria, vel lupinorum decocto ca-
put abluendum est. hoc enim subinde sum expertus.

Ad psudracia & exanthemata capitis

PSYDRACIA & exanthemata capitis sunt, pustulis
similia, quae summam cutem excedunt. Exanthemata vero
cutis

cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrumque vitium præfidiis infra positis exteritur. Argenteæ spumæ, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum viridium totidē. ex aceto myrtéoq; oleo leuigata cuti illinuntur. A L I V D. Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à capite abscedit, oleæ folia elixa cū melle cataplasmatris modo inducuntur. A L I V D. Argenti spumæ, cerusæ singulorum drachmæ duodecim, sulfuris viui drachmæ octo, cera to myrteo excipiuntur.

Ad huiusculæ capitis densa rubraq;

Hæc papillis sunt similia, ex quibus sanies eliquatur. Capite prius nouacula raso, & aqua nitroq; absterfo, sulfure viuo ex hominis vrina contrito vitor. Vel cretam sulfوريا, *μικαντηρίαν* vocant Græci, cum aceto inungito.

De manantibus capitis vlcibus, quæ achores *αχόρες* graece dicuntur, & fauis.

INTER capitis vitia, quæ in cute oboriuntur, vnum est, quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia vlcera, tenuissimis cutē foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malum specie est, quod à faui, similitudine *κύνειον* à Græcis nominatur. quod magis amplis foraminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, cōtinetur. Origo est ex nitrofa salivaque pituita, victus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acra & falla vitari debent: præsertim si inflammationem affectus resipiat. postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, derasis capillis caput fouendum bis tervodie, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, vel rubus, vel lenticula, vel amari lupini, vel asparagi radix. Quum verò plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, vel lenticula, instar cataplasmatris applicantur. terra autē cimolia, vel cretica, vel samia, vel pompholyx, vel spodiū, vel argenti spuma, vel cadmia, vel charta combusta, vel etiam medicamentum ex charta Xerion, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate verò hoc vtendum est, sulfure viuo, & perdicij herba, saponisque æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duodecim rutæ foliorum drachmæ octo, herba pediculariæ quam staphida agriam Græci vocant drachmæ quatuor, chalchanthi drachmæ duæ, Aceto

h

myrteoque in sordium spissitudinem coacta illinuntur.
 ALIVD. Sandicis drachmæ quatuor myrrhæ drachmæ qua-
 tuor sulfuris ignem nō experti pondo drachmæ duæ, polli-
 nis thuris drachmæ quatuor ex oleo veteri inunguntur.

quod dicitur in fine fontis
 Ad achoras ^{Alind ad achoras.} recrementum argenti, vel molibdenam con-
 tritam oblineto. ALIVD. Ad achoras & humidæ scabies,
 rhododaphnæ, rosarum vnciæ quatuor, sulfuris viui vnciæ
 quatuor, picis liquidæ, & picis aridæ vtriუსq; vnciæ tres, ce-
 ræ selibra, olei myrtei quantum opus est. in pueris autem,
 lacte soluta illinuntur.

De ficis.

FICVS, nominant eruptiones, vlcerosas, rotundas, sub-
 duras, rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit verò hoc
 mali plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo
 corpore. Probat^{ur} maximè contra hos alumen fissile, æris
 flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris du-
 plo. Teruntur ex aceto illinunturque. Præstans etiam reme-
 dium est ^{in finem} inenarum capita combusta, elixique bulbi, & cinis
 aceto mixtus.

*Aduersus capitis & menti ficosæ exan-
 themata, xygraphium.*

MISYOS drachma vna semis, chalcitidis drachmæ duæ
 semis, squamæ æris drachma, aluminis fissi. drachma. Bene-
 loto, hoc medicamen aridum impositum dimittitur. Die in-
 sequenti rursus pars lauatur, spongiaq; deterisæ idem appli-
 catur. Decidit enim ramentum crassissimū. Et si diebus sub-
 secutis idem fiat, sine cicatrice breui consanescit. Cæterum
 medicamen hoc non mediocriter adhæret.

Ad capnis pediculos.

LVPINORVM in aqua coctorum diluto, caput deterge-
 ri iubeto: vel herba pedicularia, vel sandaracha, vel vtraque
 contrita ex oleo veteri, seu aceto illinitur, vel piperis mo-
 mentum (ne exulceret) cum oleo, aut hederæ succo cū melle,
 † aut minio synopico cum aceto, aut cedrino liquore, aut
 pice liquida cum alumine, aut baccarum lauri expresso, aut
 oleo raphanino. Ego pediculariam ex aceto oleoque tri-
 tam inunxi, ac semper quod volui, sum affecutus.

† Græcus codex manu scriptus ἢ σίναπι, id est, vel sinapi cum aceto.
 quæ scriptura verior est.

po

LIBER III.

De capitis dolore, quem greci κεφαλαλγία vocant.

CAP. IIII.

Capitis dolor qui grecis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est grauiſſimum, ac nunc ex ſola intemperata qualitate oritur, nunc ex nimia humorum copia. Interim ex vtraque cauſa: interim vero ex primaria cauſa: nempe ſolis æſtu extrinſecus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehementiſſimi igitur capitis dolores ex efficientibus qualitatibus naſcuntur, & potiſſimum ex calida: qui verò ob ſiccitatem contrahuntur, non æque vehementes exiſtunt. Humida qualitas ſui ipſius reſpectu, nullum plane dolorem conciliat. niſi caliditati, aut frigori, aut humorum copię adiuncta. Itaque de eo capitis dolore qui cum febre eſt eo loco explicatum eſt, quo febrium curatio expoſita eſt, nunc de cæteris dicendum eſt.

De capitis dolore ex inſolatu contraſto.

Qui ex inſolatu capite dolent, eorum cutis tactu calida eſt, & primo ſtatim manus iniectu aridior apparet: oculos habent rubentes, frigidis aſperginibus, & inunctionib. oblectantur, ſentiuntq; ab ipſis præſidium. Cæterum curatio his conueniet, etiam ea, quam dolori in febribus præſcripſimus. Si dolor perſeuerat, inſcriptis vtendum eſt cataplaſmatis. Prodeſt fronti & temporibus inductus panis ex poſca, & roſaceo. Interdum cum amygdalis, vel roſis, ſiccis, aut teneris, vel cum menta cui pulegium ſit adiectum, vel panis cum perſici foliis. facit etiã ocymum ex aceto & roſaceo tritum, vel hederæ corymbi in aceto elixi. Iam farinam triticeam cum roſaceo leuigatam vel ſerpilli ex aqua decocto miſcere conuenit, vel cardamomum torridum leuigatũq; ex aceto & roſaceo: vel fermentum cum roſaceo, vel iridem aridam cum aceto. Sed mutantur continue ſingula: nam ſi diutius adhæreant, inefficacia redduntur,

Pæſtilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.

Crocī drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, aluminis drachmæ ſedecim, myrrhæ drachmæ ſeptē, omphacij drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drachmæ tres. Vini auſteri quod ſufficit. Ex poſca ſumuntur. Sin etiam vigilię inſeſtent, aliquid ex ſomniferis applicatur.

De ijs quibus caput ex frigida intemperie indoleſcit.

† At ſi frigus nocuit, contraria iis qui ex ſolis æſtu dolent, affectos ſigna teſtantur. Etenim facies ipſorũ non concidit,

sed colorem decoremque amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Verum horum agnitionem tum victus ratio, tum reliqua concurrentia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, vel irino, vel nardino, vel etiam opobalsamo, præsertim si recrementa fuerint crassiora viscosaque. Frons autem tum hoc liquore, tum iis medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinum subtilius propinandum: corporis motione & balneis uti calidis præcipiendum. Interim à radícula vomitu. In quibus autem qualitas citra humorum copiã diutius persistat, hoc utendum est medicamine. Piperis albi drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ duæ euphorbij recentis drachmæ octo S, stercoris colubini drachma vna S, aceti acerimi quantum satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in veteri græco exemplari, τοῖς ἐν ἰνὰ νοεὶ κεφαλαλγῶσι πέναντιος ἔχουσιν τὰ τὴν σκευήν, ἢ ἢ διὰ πᾶσα τὴν ἐν ψύξει, id est, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore dolet, sunt contraria signis & curationi eorum quibus caput ab æstu dolet.

Si biliosus humor dolorem inuexerit.

NOTAE horum persimiles iis, quos ob solis æstum dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. Interim etiam os inamarefcit. Porro affectus hic ætatibus potius vigentibus, & temperaturis calidioribus, vitæ sollicitæ, & bilem flauam coaceruantibus solet accidere. Quamobrè balneum temperatum his, inunctiones, aquæ potus, & vniuersa victus ratio humidior, bonique succi adhiberi debet. Biliosus humor absynthij diluto, vacuabitur: vel aloe, aut ipsa Picra, antidoto per se, aut cum modica scammonia, aut catapotiiis quæ ex aloe constant. Inungenda frons, aut crocodi pastillo, aut trigono, aut quodam simili.

Si caput consortij lege indoleseat.

SI caput consortij lege cum toto corpore afficiatur, cura adhibenda, ut contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus. & si copia quidem premit & maximè in venis, sanguis mittendus est: sin autem magis qualitas vrgeat, purganti utendum medicamine. Quòd si particula laborante aliqua simul condoleseat, veluti iocinore, aut ventriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida afficit
intem

intemperies, panis ex aquoso vino exhibetur, vel etiam ex chondro sorbitiunculae. Extrinsecus vincit superfundere, quae modice refrigerent, virēsque confirment, sicut à me prius comprehensum est. At si glutinosi, crassi que humores in stomacho infarcti, capitis dolorem concitent, hos quoque amoliamur potu oxymielitis, tum simplicis, tum Iuliani. Insuper medicamentis ex hyssopo & origano, & his adhuc calidioribus magisque incidentibus. Iam vomitus à radícula utilis, superfusiones calidiores, & cataplasmata.

De capitis dolore ex vino.

SI vinum adhuc incoctum in stomacho fluctuet, tepentis aquae potu vomere dolentem iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusque utemur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, vel hederæ succo, vel brasiçæ. Quia & ipsa brasiçæ folia in aquam calidam demersa, & capiti circumdata ligataque, naturaliter ebrietatem arcet. eiusdem decoctæ usus in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumque ventriculo humidiorē præditos. Adhuc alica, malicorium, & mala ipsa, piraque, tum aquae potio, vtiliter affluuntur.

De capitis dolore ex ictu.

QUI ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi summa omnino cute percussi sint, sanguis statim emittendus est, & conuenientes aspergines capiti sunt adhibendae. Oléoque dulci irrigandum ipsum lanisque contegendum. Vino ciboque pleniori, praesertim si febris adest, & gros coercere expedit. Et tota curatio ceu ad neruosarum partium inflammationem & praecipue membranarum cerebri quas meningas appellant, adaptabitur. Si verò & vulnus factum fuerit, huic quoque decenter medebimur.

Malagma ad capitis dolorem.

CERAE drachmae septem, amygdalini olei vnciae tres, terebinthinæ drachma octo, æruginis rasæ, cimoliæ, chalcidis singulorum drachmae quatuor, pumicis drachmae tres, aris vsti, squamæ stomomatis singulorum drachmae duae. Si videtur paulo esse durius, amygdalino emolliendum.

De cephalæa, & hemicrania.

C A P. V.

VTerque hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis vini po-

tu, & implentibus caput odoribus excandescit exacuiturq;

Ac aliis totum feriri caput in hoc dolore, aliis alterā ipsius partem duntaxat excruciarī videtur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sane intra caluariam malum consistit, iis dolor ad oculorum radices porrigitur: quibus extra est, circa ipsam caluariam indolescunt. Quapropter dolores cum grauitate molesti, plenitudinem testantur: cum erosione infestantes, vel humorum, vel vaporum acrimoniam: qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem: qui cum tentione, si quidem grauitas & pulsus non adsit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantiam innuit. si cum pulsū, membranosa partis inflammationem: cum grauitate vero, copiam intra membranas contineri. At si putridus etiam humor, calidior euaserit, & cum febris simul capite dolitant: febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorem parit. Quum igitur corpus totū succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethoricum dicitur, venā secare si vires patiantur, & acrioribus vti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis videtur exuberare, etiam vena narium ad aperta, quantum satis esse videtur, detrahes. Mox hiera, quam exacueris, intenderisq; exhibēda, deinde pituitæ eductionibus, apophlegmatismos vocant, vtendum est, tum iis quæ per nares vacuant, & ἑρπύλλæ græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterij succus, cum lacte infusus, vel etiam aridum elaterium inspiratum, succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentum quod naribus inditur ad veteres cephalæas, lippitudines & morbos comitiales. melanthij drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterij drachmæ quatuor. Tunsa, oleo sycionio, vel irino, vel cyprino excepta, vt cerati fiat spissitudo, naribus demittuntur.

*Medicamentum quod pituitam extrahit,
naribus inspiratum.*

CYCLAMINI sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autē in vicem nitri elaterium indideris, magis proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspirabitur. Porro epithemata quoque capiti ad moueto, & inunctiones, vbi morbus in vetustatem magis inciderit.

Epithema ad cephalæam.

VNGVENTI irini, peucedani, castorei singulorū drachma, baccarū lauri drachmæ duæ rutę summitatum drachmæ qua

quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasq; capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædã in hemicranicis hoc etiã quod sequitur epithemate usã, mirandũ in modũ inclaruit. Radicẽ cucumis sylvestris viridẽ minutim cõcisã, absinthiũq; cũ hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectam irrorabat. radicenẽ vero & absinthium, in puluerem contrita oblinebat. Atq; hoc solo medicamine, hemicranicos, id est altera capitis parte dolentes, & cũ febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maxime increuerit, vt dolorẽ ferre nequeãt, vitior medicamẽtis etiã quẽ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

Unguentum ad cephalæam.

L I Q V O R I speucedani drachmẽ sedecim, lachrymẽ papaueris, anisi, alterci quod hyosciamũ græci vocant, croci, myrrhæ, scammonia singulorum drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum vsus postulat, ex aceto vel posca illinuntur iis, quibus humores crassi, vel spiritus flatulentus dolorem fecit. Iam dropax & sinapisimus iisdem benefacit: & pastillus ex thapſia. Iam qui ex atramento scriptorio sit mirifice eidẽ causæ medetur, quo post hæc vtendum est sicut in opere de compositis docebitur. **Q uin** & istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolentes efficax est. Euphorbij portio vna cum pari castorei modo aqua excepta auriculæ demittitur qua parte indolescit, inde balneum adeundum, vbi paululum immorati ipsum assument, & consueto more lauabunt. Sic quidem expertum est, verum non alienum absurdumque fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Item quod medicamen ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes. & hemicranicos ex toto perſanat.

Ad hemicraniam veterem.

A L L I O R V M drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axũgiæ veteris drachmæ duæ, cãtharidũ drachmæ duæ. Vesperti illitũ finito per noctẽ adhærere. Mane rupta papula, malagmate, quia liquidũ est, *παρυγδον* appellãt, ei medeberis. **A L I V D.** Baccarum lauri quibus cortex sic ablatu, drachmẽ duæ, rutæ foliorũ, drachmæ duæ, sinapios, drachma. Aqua dilutum oblinito. At iis qui frigori patuerunt, vtilissimum est infra scriptum medicamentum vt plerunq; semel ante balneas illitum, confestum affectui medeatur, & ægrotantes

omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabini pondo, ceræ quadrans, euphorbij vncia. Hoc dimidiæ frontis partempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui vero frigoris iniuriam non senserunt, iis gallæ, & crocogmatis parem portionem cum vino detritam inungito. Sed qui ex calidis vaporibus, vel succis capite dolitant, iis medicamenta quæ euphorbio constant, non applicabis.

Apophlegmatismus, id est medicamentum quod salivam mouet contra cephalæam.

SINAPEOS cōtriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tusa, cribratæque misceto, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem aut quandam in temperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorum vsus veniet quæ in sermone de dolore capitis cōprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neque cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balineæ naturales recte adhibentur.

De phrenitide. CAP. VI.

Phrenitis, membranarum cerebri, quas meningas græci appellant, inflammatio est, nunc quidem ipso quoq; cerebro simul eam experiunt, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est, vel sanguis superans, vel biliosus humor: nonnunquam & flaua bilis perusta, adeo ut in nigram degenerauerit, quando etiam grauißima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrum septi transuersi consortio dolens, ex nervis qui in ipsum sparguntur vitium concipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimarum febrium statibus accidit, quæque ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solum, puta delirium. Comitantur proprie phreniticos vigiliæ quidē plurima parte: interdum vero & somnus turbulentus accedit, ut consurgant, exilient, & furibunde vociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit ij cum risu insaniunt: quibus flaua bilis ferociter, quæadmodum quibus atra vitium contraxit, tam immaniter sæuiunt. ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciuntve, obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant: interim ari-

dos,

dos, interim lachrymantes, vel lemis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis è naribus destillat: floccos festucasque colligunt, feбри per totum morbi decursum acuta conficiuntur: sed quæ in alto maligna delitescat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiã duos. Respirationem magnam & raram, cum cerebrũ primariò afficitur. At si phrenitis septi, transuersi, quod græci phrænas vocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuellantur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri vitio insaniunt, facies incalescit, & subcruenta est, venæ repletæ. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, vti causam, ita appellationem quoque compositam habet. Nam vigilans coma, nominant, in vniuersum quidem cum biliosus superauerit, quippe tales ægri vigilantes phrenitide laborant: cum vero pituitosus præpollet, contra in grauiorem veluti somnum quem coma vocant græci deferuntur. Atque hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon vocauerunt.

Curatio phrenitidis.

Quod si vires ægri patiãtur, sanguis protinus è cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachiũ non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundũ vacuationẽ, sanguinis profluuij, dum manũ æger subinde ob mentis turbationẽ iactitet, recta in frõte vena diuisa, vna vice quod satis est auferemus. itẽ clysteriis vtemur, ex hydrelæo, vel rosaceo cũ ptisanæ cremore. Si vigilæ vrgent, rosaceũ, vel oxyrhodinũ in caput dandum est. Aliquando calida ipsum aqua prius superfundendum: & medicamentum quod ex papaueris capitibus vocatur diacodyon exhibebitur nisi virtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandum superius scripta sunt huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum tẽperie moderato: & variis quibusdam picturis libero, vt quæ tales de terreant. Quod amici quidam gratissimi ingredientur, & commodum incident, qui nunc blande ægro tũ alloquantur, nũc acerbius corripiant. Cibus primũ esto aqua mulsæ, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, vt apomelite, vel hydrorofato, vel rhodomelo, vel dulci hydromelo. Nam vinosum hydromelum, quod in paruis vasculis ex Cibra apportatur, repudiandum, vt quod grauiores vino no-

xas in talibus excitet, & maxime in capitis affectibus, idq;
 ante concoctionem. Panis quoque aqua lotus recte exhibe-
 tur, intubi, lactucae elixæ. Si multus feruor conficiat, etiam
 cruda hæc dantur. Item cucumeris medulla, peponis, dura-
 cini, & similium. Aquæ frigida potu coercendi sunt, potis-
 simum si septum transuersum consortij lege malo dedisse
 originē deprehenderimus. Quod si vrina ipsis, vt consenta-
 neum est, delirij vitio cohibeatur, †fota adhibito calēte hy-
 drelæo & inferiorem ventris ab vmbilico regionem *ἡτρον*
 græci vocant & vesicam superfundemus, deinde digitis ma-
 nus, loco innixis ad reddendum vrinam incitabimus. Reli-
 quum corpus ipsis decumbentibus calido oleo perungi de-
 bet. Etenim in quiete, quoad eius fieri licet, seruari debent,
 ita vt si quidem prædiuites aliqui fuerint, per famulos con-
 tineantur: sin minus, vinculis constringantur. Nam inordi-
 nata motio vires cōuellit. Iam vero alia etiam de causa pe-
 des, prius foti, deligaturis constringi, manuq; contrectari
 debent, nempe quò humores deorsum reuellantur. Porro si
 longior affectus, & contumax fuerit, ab iis quæ soporem
 accersunt, *καρποτικά* græci appellant, abstinendum: ea vero
 quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus
 miscenda, scilicet mentę succus, vel serpilli vel calaminthæ,
 vel ruthæ. Tum iis quoque vtendum quæ naribus inserun-
 tur. A septimo die si viscera sentiant inflammationem, cata-
 plasmatis ex lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo
 leniemus. Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatio-
 ne, tum his ipsis, tum occipitio, & spinæ accommodabimus.
 Si corpus squalidum perulsumque esse coniecturaueris, fe-
 brisque ad sit, etiam balneis vtendum aquæ potabilis, & vn-
 ctione liberaliore. Vinum tenue & aquosum, quod *δαγροφόρον*
 appellant, viribus recolligendis propinabimus, nullam inde
 mentis turbationem, vt est verisimile, futuram suspicantes.
 Aut enim nulla sit, cum morbus declinat. aut certe si sit, ex
 facili subsidet. Processu autem declinationis, gestatione cor-
 poris vti expedit, & cōgrua virium recreatione. Sed ita phre-
 nitici sese recolligent, vt ebrietatem, iram, ciborum corru-
 ptiones, & in primis solis æstum caueant.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, *ποιήσαντες ἀλῆα καὶ ἀντὶ λίσσω-
 μιν διερμῶν ὕδατι καὶ ὑδρελαίῳ. id est fota adhibita calente aqua aut hy-
 drelæo.*

De

De inflammatione cerebri.

CAP. VII.

Cerebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut capitis futuræ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diuturnus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli: oculi fiunt emissicii, caput inturgescit. Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinem ex cubito mittere, item ex naribus, & vasis linguæ subditis debent. Porro vti-
tor & aspersio- nibus quæ per inflammationes capiti adhibentur, & cataplas-
matis. quæ humectare, & maturare sunt idonea.

De erysipellate cerebri.

CAP. VIII.

Accidit quoque erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur: capite dolet vniuerso, adeo ut flammis id vri putet. facies frigida est, & subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est, & potissimum ex venis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysipelatis vtimur.

De lethargo.

CAP. IX.

Lethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat: materia vero mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorque cerebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris lenta, non impensè acris erodensque, cum alto sopore, quæ cataphora Græcis dicitur. Pulsus his magni, rarique sunt, & vndosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo præmuntur, à quo ægre possunt excitari, & quocunque modo interpellentur vix respondent: obliuiosi, mente capti, oscitant crebro, & hiant ore nonnunquam persistunt, tãquam claudere id obliti. Deiciunt per aluum complures quidem, liquidiora: nonnullis autem contra venter inarescit. Vrinam reddunt iumentorum lotio similem. Quidam ex eis tremiscunt, & vndiquaque desudant. Huic affectui respondet Carus quasi dicas veterinosus sopor ex eadem materie proficiscens: sed hoc discrimine variat. Febris Carum præcedit, eaque vehementior: Lethargum subsequitur: item quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressio- nibus, modo ossæ quidem in fracturis, modo autem membranæ custode, quem *μηνυγγορύλλα* Græci vocant, priorem cerebri ventriculum premen

premente. Lethargus autem peculiarem quandam constitutionem obtinet: superuenit comitialibus.

Curatio lethargi.

Vires si permittunt, etiā hic venā secari debet: sin minus, clysteriis acribus aluū ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiā castoreū sit adiectū. Nonnulli in vicem olei, oxyrhodino cū castoreo vtuntur: robur hinc capiti calorēque simul accersentes: reliquū vero corpus delinētes, & præcipue extrema, oleo veteri: cū nitro tosto, vel pyrethro, vel pipere, vel cocco gnidio extergūt. Licet & cerato quod his, & castoreo simul cōstet, vti. Porro naribus admoventur odoranda thymū ex aceto contritū, aut origanum, aut pulegiū. Os vngi cōuenit, & palati cœlum detricto sinapi, cum mellis momento. Conariq; oportet pituitā indidē affixam digitis elicere. Si admittāt, etiā apophlegmatismi vsus erit ex oxymelite cū hyssopo, aut pulegio, aut oryano, aut ipso quoque sinapi. Potui exhibebitur aliquid ex iis quæ citō trāseūt præsertim diaspolites cochlearij, mensura cū posca. iis autē qui in vetustatem inciderūt, & tremuli sunt, castorei quoq; scrupulos duos, trēsve dabimus. Si humoris inest copia, nihilq; aliud prohibeat, scāmonię scrupulū, castoreo tēperatū exhibebimus. At si his affectus nō discutitur, caput radēdū fouēdumq; est sale, milio, & similibus per sacculos abhibitis: Adhæc sinapismis vti in capite prodest, tū iis quę per sternutamenta euocāt. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cū multa flāma partim cū scarificatione. Præterea ad naturæ excretionē frequēter sollicitare oportebit tū iniectionibus, tū iis quę vrinā mouēt. Inferiorē vētris ab vmbilico regionē oleo rutaceo, aut fycionio cui sit adiectū castorei paululū aspergere fouereq;. Iam vero vt deglutiāt, crebrius admonebimus, cū calida aqua dulciū portionum, aliā præsertim apomeli ex angustioris vasculis. *βονβύλια* gręci vocāt, instillātes. Quod si mediā infestet regionē quādā inflammatione, huic itidē medebimur superfusionibus & cataplasmatibus. Naribus sinapi aceto tritū, vel castoreū vstū admo- uere profuerit. Alimentū esto cremor ptisanę, vel auenę, vel alicā cū oxymelite, vel salibus, vel pulegio, nunc quotidie, nūc vno die interposito. A cibo, vinciari debēt: summa cedere multū oportet, cruraq; pun gere: nōnunquā pilos etiā in ipsis
vehe

vehementius euellere conniti, quò excitentur. Iam femorum & crurum rubores excitati, *φωρίγμυς* Græci vocant subinde profunt. Cæterum vbi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis vtendum, & ad balneum reducendi sunt. Viētus qui vires recolligat, recreētq; decenter adhibendus.

De catocho, aut vigili comate.

CAP. X.

Huius morbi causam, vbi de phrenitide sermo est habitus, sumus complexi. notæ, vt summatim dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis, & lethargi. Sed pro materia abundante variant, peculiare autem hæ. Detinetur æger supinus, extensusq; interim facies subtumescit, & modice lethargicorū modo liuet: interim rubore tincta est, & superior gena sursum conuelli videtur, ac excedere, vt ne coniuere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Vrina & aluus cohibetur, aut certè modice redditur. ac qui sanè mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutiunt: qui vero malo viētī sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pituita bilem superante constituuntur à lethargicis discernimus, eò quòd neque facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis: præterquàm quòd paulatim etiam leuiter desudant. In iis autem periculum maius est, quibus peruigilium adest continens, urinæ non respondent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus ad nares potus resorbetur. At si mulier hoc laborare vitio cœperit, ab ea quæ vuluæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quòd naturaliter iacere videatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rursusq; somno gravi sopiatur. Est vbi dicunt catochon diuersum à vigili comate, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum frigidiorē, sicciorēq; materiam, quæ posteriore cerebri ventriculo obstruēto malum hoc excitarit. Ob quam etiam æger, si corripitur subito, in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, vel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochos, vel catochomenos quasi dicas occupatos, detentōsque nominauerunt: recentiores affectum catochen, & catalepsi, veluti detentionem, & deprehensionem. Curatio prædictis quidem est, sed pro symptomatum

ratio

ratione quæ superueniunt, euariat.

Curatio catochi.

HVI^o quoque malo sanguinis missione succurritur, præsertim quibus facies rubescit, modo vires suadeant: aut clysteres iniiciendi partim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant: pari modo aliorum quoque præsidiorum usus erit. Similiter ægros nutrire confert, interim diebus singulis, interim vno interposito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam alimentis, aut potus errato acciderit, qui statim ad vomitum cogendi sunt, ac parciore victu continendi, alius irritari, ac viscera resperisionibus ex cumino, aut ruta foueri debent. Qui ex ebrietate vitium conceperunt, crapula dissoluta, humidior cibo tractandi sunt, qualis est pisanæ cremor. Præterea caput inunctionibus accommodis per æstatem frigidis, per hyemem tepidis obducetur. Si crapula nequiquam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatæ valetudinis ægrum longe fugere oportet.

De memoriæ iactura, & ratiocinationis, item de caro, hoc est, venenoso sopore, & fatuitate.

CAP. XI.

MEmoriæ iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa accidit: quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius accidit. deinde memoriæ iactura insequitur. Verum cum vtraque pars, malè fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur. causam habent communem efficientem nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriæ & ratiocinationis vitiū creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci vocant, longos, altosq; somnos. Si vero humori frigiditas etiā accesserit, caros & lethargos: eodēq; modo si sola quidē fuerit siccitas, vigilias tantum inducit: sin autem calor accesserit siccitati, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus, nonnunquam cerebri ventriculis, vel ipsius vasis: vel utique in humiditate inspersæ, vel in ipsomet cerebri corpore, vel etiam temporum musculis tali modo vitiatis. At si quando humores cum ipsis fuerint mixti, similem quoque morbum inferent: verum simplex, an composita sit intemperies, efficiens, ex specie excrementorum condiscet. Quod enim memoriæ, & ratiocinationis

tionis iactura, frigiditatis soboles existat, compertum habemus: ea vero humiditatis ne, an siccitati iuncta sit, excrementis, agri habitu, temperatura, victus ratione, anni tempore, & loco deprehendemus.

Curatio.

si frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet. rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit. si siccitas accesserit, pariter humectare. si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, venam aperire, vel clysteriis acribus vti consilium est. deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis vti conuenit. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, exiccantq; rosæ dico, myrti, lentiscus, aliaq; similia: nec non toti corpori prospiciendum est. Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrhodino perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida, humectaq; vti conuenit: cum in aliis tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, vel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est, vt in lethargicis prius comprehendimus, vbi & ipsorum discrimen explicitum est,

De vertiginibus.

C A P. XII.

Vertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque humor cerebrum occupat: vnde leui occasione protinus etiam concidunt. veluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, vt rotas, verticēsve, aut quādo etiam ipsi circumaguntur. Interim vero etiam calfacti capite, cum humores in eo contenti, vel spiritus quoque commouentur: interim prioribus cerebri ventriculis, dum caluaria confRACTA perforatur pressis, in quibus etiam vehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario afficiatur vehemens in eo dolor veternosus sopor, qui *ναρῶς* Græcis dicitur, & aurium sonitus. & quidam sennè olfactu læduntur, quidam vero gustu. at quibus ex consensu ventriculi oris vertigines accidunt & stomachi rossiō, quam cardiogmon Græci appellant, & nausææ simul commitantur.

Cura

Curatio.

VERTIGINOSOS in accessione quidem medicamentis quæ odore movent idoneis, excitare conuenit. Item frictionibus vti, & id genus aliis. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia sanguis primum mittendus est: deinde purgatio ex hiera præstanda. Interposito tempore acri clystere ex centaurei, vel cucurbitæ syluestris decocto vtendum est. Secundum huiusmodi vacuationes caput ipsum cucurbitulis ad occipitium cum scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saliuam per os eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor, auriumq; sonitus male habet, ceu vaporibus calidioribus per arterias sursum elatis, etiam arteriæ sectio retro aures iis adhibenda est: vt in parte chirurgica sumus dicturi.

De morbo comitiali.

CAP. XIII.

MORBUS comitialis, cum totius corporis sit conuulsio, cum principis animæ functionum noxa, partim sanè in ipso cerebro, partim vero in vniuersis huius ventriculis causam habet constitutam: ea modo est humor pituitosus, modo melancholicus, præterea etiam ore ventriculi affecto consortij lege oboritur. quemadmodum in colicis quoque, sicuti cum de illis agemus exequemur. vel certè aliis quoque partibus contagionem impartientibus nascitur, cum aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, aliàs à crure, aliàs à manus digitis. Insuper visus est quandoque prouenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauidà: à partu autem cessauit. Occupat hoc morbi genus maximè pueros, eosq; adhuc paruulos. deinde vero adolescentes, & iuuenes, minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animiq; status, tristitia, eorum quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiusque repletio continua, ob iracundiam maximè, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus: nonnulli ipsam quoque commordent. Quibus autem à stomacho vitium oritur, etiam palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, irritantur. vbi vero symptoma iam institerit, ægri de repente concidunt, conuellunturq;: interdum etiam exclamant voce nihil significante. at eximia, peculiarisq; admodum nota ipsorum existit, oris spuma: cum alia cōmuniter aliis quoque mor

morbis eueniant. Non desunt quibus etiam vrina & stercus præter voluntatem excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessionum continuatione, & symptomatis, vehementia. In pluribus autem longus esse solet: eoque si non in pubertate, vel menstruis purgationibus, vel per conceptum solutus fuerit, aut si post hoc tempus contractus fuerit, sæpe vsq; ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem consequatur. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumē, vel lapis gagates, vel cornu caprillum, iecur hircinum comestum, & iecoris tosti odor.

Curatio.

si infans adhuc fuerit qui agrotat: nihil moliendum est. nam ætate ad biliosiores, siccioresque statū transeunte, & victu moderatiore adhibito, sua sponte plerumq; morbus finitur. Conuenit autem victus etiam solum tum infantium, tum nutricum rationem habere. Qui verò post annos pueriles in morbum hunc prolabuntur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui oleorum aspergine foueri, vinciri & in rectum dirigi debent. Deinde ore distento digitus demitti, aut penna oleo irino vncta, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamentis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, vt peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedrina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utiq; è cubito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ partes sinapismo delinendæ sunt: cucurbitula autē præcordiis defigetur. Quòd si nec his morbus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo secius tamen medicus animo confidente castoreum necessitate adactus, & liquorem cyrenaicum cum melle & aceto ori infundet. in anum centaurei decoctum, vel cucurbitæ syluestris dabit. vbi ad se redierint ex morbo comitali viribus ante recreatis purgatione ex hiera vacuandi sunt hæc sane est recentis & acuti morbi comitalis curatio. Deinceps quomodo inueterato succurratur, trademus. Itaq; ægrotos aquæ potu continere diu expedit. aggredientes autē curationē, si nihil obest, sanguinē dimittere. Interpositis quatuor aut quinque diebus corpusculū reficere, & sic purgante medicamēto euacuare, præsertim veratro nigro, vel cucurbita syluestri, vel certe scammonia. Porro veratrum sine medulla tunsum cribratūque

aquæ mulsa cyathis quinq; vel sex inspargere oportet, aut melle discocto cum piperis momēto excipere. Cucurbitam verò syluestrem, semine eiecto, sed quæ medullam reseruet, passo implebis, sinēsq; totam noctem commadescere: mane passum auferetur potuiq; dabitur. Vel etiam medicamento ex veratro albo purgationē molieris: quod hæc recipit: baccharum lauri purgatarum, piperis albi, alypiados, euphorbij, veratri albi singulorum drachmas octo. Hoc totum datur cū passo quod in cucurbita syluestri pernoctarit, probe vacuat per vomitum. Vbi verò sat purgati sunt, ægri balneo credentur. Tertio die in præcordiis & dorso cute scalpello incisa cucurbitulæ affigendæ sunt. Deinde complusculis diebus interpositis corpusculum reficiendum est, & Hiera diacolocynthidos assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulsa, tritus autem cū amaris amygdalis, vel serpyllo, vel menta, vel calamintha, vel ruta superdandus: atque id per triduum cōtinuabitur. ab hoc, caput radendū est, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo spondylion sit coctum perungendum: rursus interposito spacio corpusculum reficitur: & antidoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulsa exhibentur: & interpositis diebus iterum tres ex antidoto offerre cōuenit. Inde medicamentis vti quæ sternutamenta citāt. post quinq; decēve dies castoreum ex mulsa præbatur: tēpore rursus interposito in aluum dabitur centaurei decoctū & cucurbitæ syluestris: ab hoc iterum hiera offeretur mox vtendum iis quæ saliuam per os & nares educant, deinde sinapismus capiti inducitur. iam etiam acriū ciborū esus conuenit, cum opportunitas est, adhibitus. Auxiliatur his etiam oxymel scilliticum quotidie potum, & mel, in quo scilla intrabuerit, instar cochlearij assumptum. Viſtus autem ratio est quæ incidat, extenuetq;. Capparis igitur frequenter esus & fassamentum prodest. Fugere oportet carnes, legumina, vinū copiosius, venerem liberaliorem, balnea, sinapi, & porum statim à balneo, præsertim vini meraci. Exercitia profunt & frictions, sed capiti post reliquas omnes corporis partes adhibita.

De ijs qui stomachi vitio comitali morbo corripuntur.

si stomachus primariò affectus, morbū inuexerit, sollicitudo habenda est, vt ex facili æger concoquat. Panis igitur
acc

accurate elaboratus ex vino temperato quod leuiter astringat, albūmq; colore sit ad horam tertiam assumi debet. medicamentum verò ex aloë bis, tēve singulis annis dare his expedit. Vidi autem quādoq; puellum (inquit Galenus) nequitiam hoc tentatum morbo posteaquā radicem glycydis (dicit autem pæoniam magnam recentēmq;) ex collo suspensam gestaret. Insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat sesili, spondylii fructus, radixque aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huc facit, & cōtinua crurum scarificatio.

De iis qui à particula quadam morbum concipiunt.

INVASVRO quidem symptomate, vbi particulam communicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, fune excipi valenter debet quæ superposita est. Cum autem remittit, recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidium, & diacantharidos dicta similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianum comitiales vehementer adiuuat, particulatim materiā emolliens. Post omnia cōmemorata & Theriace, & naturales balnearum locū obtinent. per totum autem vitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionem obitum, isq; crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitatio, vinū largius & potus à balneo, sicut comprehensum est, maxime, meracus, præterea valde vetusta, crassaq; vina, tum acris ex his quæ odore mouēt, & caput replent, incōniuens è sublimi conspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

De melancholia.

CAP. XIII.

MELANCHOLIA mētis quedā alienatio est sine febrī, ex melancholico maxime humore nascēs, qui mentē occupauerit: aliàs cerebro ipso per se agrotāte, aliàs totius corporis consensu immutato. Tertia verò melancholiæ species est, quā flatulentā & à præcordiis hypochondriacā appellant, ob inflāmata circa stomachū præcordia proueniens. quæ modo aurā quandā maligniorem, modo substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum transmittant. Communia omniū signa sunt, metus, tristitia, homines auersantur, alij se credunt animalia quādā bruta esse, & voces ipsorū imitantur: alij vasa fictilia, metuuntque ne rumpantur. adhuc mortem hi expectant, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alij verò putant à maiore quadam vi se inua-

di, & vaticinantur futura, non aliter quàm vates & diuina-
culi quos græci *ὀφθαλμοί* proprie nominant. Peculiares au-
tem notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu me-
lancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsu-
tus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel etiam ex acqui-
sito per sollicitudines quasdam, aut vigilias, aut prauorum
ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum sup-
pressionem. At qui ex præcordiis melancholici existunt, eos
testantur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorum graui-
tas, tum quòd præcordia sursum conuellantur: interim etiã
inflammatione conflantur. Adhæc quòd incipientibus,
deinde maioribus effectis melancholica comitetur sympto-
mata, quòdque hæc leuentur, concoctione, vel alui excretio-
ne, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu. Cũ autem nul-
lum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ ap-
parent signa cerebrum primario affici in totũ succi conta-
gione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis su-
pra modum exustæ in nigram fiat mutatio, insaniam, dictã
græce maniam inferet, ob quam ferarum modo efferuntur
insani, vt etiam eos qui imprudentius ipsis occurrunt, manu
violenter tractent.

Curatio melancholie.

Qui igitur ex primario cerebri affectu melancholici sunt,
crebris balneis, victu boni succi & humido curantur vnã cũ
decenti animi delectatione, sine alio præsidio, cum certe hu-
mor qui molestat nondum ob temporis longitudinem ex-
cerni contumax est, quando etiam valentiora magisque va-
ria tentare oportet remedia. Itaq; purgentur per initia epi-
thymo, aut aloë. Nam vel pauxillum ex his sumptum quo-
tidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit. vbi verò pur-
gati fuerint, vt dictum est, absinthium propinabitur: nunc
quidem herba ipsa in aqua macerata cocta; duorum cya-
thorum instar, nunc autem eius succi drachma semissis,
cum aqua continue liquefacta. Aceti quam acerrimi mo-
dicum sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa ob-
somnia in id intincta, esse conuenit. præstantius autem fuerit
aceto mixtam esse scillam, polium, & tenuem aristolochiã.
At cum morbo quidem incipienti ex totius corporis affe-
ctus cõsortio, vt supra dictũ est, incidis, corpus autẽ, viribus
constat, à sanguinis missione incipiendũ est: post hanc, viri-
bus

bus relictis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucurbita syluestri, tū eo quod constat nigro veratro. ac si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis malū fuerit concitātū, illas adaperiemus, hos proritabimus. Laudatur etiam facultates, tum quæ urinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgant. Sin autē præcordiorum offensione morbus debetur, & horū habenda erit sollicitudo: ac fouebuntur ipsa decocto rutæ, anethi, absynthij, pulegij, agni seminis, & fructus lauri perfundendo. Hæc etenim dolores quoque leniūt & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affectæ parti applicata. Cæterū præter hæc insunt, cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus discutiendis faciūt. nēpe apiū, vel anisum, vel cuminū. Nil mali fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosmarinum vocant. Cum hæc admoues lōgo tempore per diē & pasto & ieiuno adhærere sines. Vbi ademeris, aliud quoddam operimentum super accommodato, lanā scilicet latiorē. Cucurbitulis ad flatus digerēdos leuibus vtitor: ad dolores vero inflāmationesq; cū scarificatione. Porro adhibita curationi diligētia, nec sinapi obliuiscere, sed acribus smegmatis, & dropacibus super dorsum, ventrēq; vti cōuenit. Quibus vitiū inueterauerit præsentissimū est remediū etiā citato per veratrū albū vomitu purgatio. Vt etus omnib' melācholicis cōferet probi succi, & mediocriter humectās. Vitāda sunt, caro bubula ceruina, lēticula brasice cochleg, vina crassa, & nigra: breuiter, q̄ atrā bilē generāt.

Curatio insaniæ.

INSANIENTES consimilē melancholicis curationem recipiunt. Propriam vero habent, vt caput ipsorum tum rosaceo tum oxyrhodino perfundatur. Itē ex antidoto picra purgabimus, verum sanguine prius misso: nec nō hirudinibus in capite vtemur. Vnice ipsos iuuat hippomarathri radix, semenq; eius ex aqua potum. Insuper Brioniæ radicis drachma ex aqua quotidie assumpta. Sin autem delirantes purgantium medicamentorum potionem renuant, misceri debent ea nescientibus ipsis, cibis nempe buccellis vel ficibus pinguibus, vel palmulis, interdum vero potionibus adiicienda sunt. † Ante omnia vero aut in lecto vinciēdi, ne & tibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferant: aut gestandi grabato intra lecticam quandam insanientibus peculiarem γύραδον græci vocant, ex alto pensili.

† Plura leguntur in nostro codice. ita enim habet, πρὸ δὲ πᾶντων
πραγμάτων ὑπὸ τινῶν παίδων, ἢ σκωδισμῶν ὡς αὖτε. id est, ante
omnia contineantur à servis aliquot.

De incubone, qui ephialtes graece dicitur.

C A P. X V.

Ephialten, qui latinis incubo est, aliqui à viro dictū asse-
runt, vel inde quòd hoc malo correpti ceu insipientem
aliquem se imaginentur. Themison autem decimo epistola
rum volumine à suffocando forte, Pnigalionem appellauit.
Constituitur id vitij ex crapula, & continua stomachi cru-
ditate. Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in
somnia sensus, suffocationis imaginatio, & veluti quodā su-
per incidente, oppressio, ita vt exclamare nequeant hoc de-
tenti, aut vocem edant nihil significantem. Nonnulli verò
etiam audire saepe eum qui super ipsos inciderit, ac venerem
exigere imaginantur, sed contractis eos digitis fugere. Cu-
ra itaque habenda est mali per initia. nam si diutius proro-
getur, continue per noctem incidens, magnum aliquē mor-
bum nunciat, vt apoplexiam, insaniam, & morbum comitia-
lem, cū in caput huius vitij causa ferri cœperit. Quæ enim
comitiales interdum, eadem ephialtici dormientes noctu pa-
tiuntur. Itaque commodum est sanguinis detractione &
purgationibus vniuersum agri corpus vacuare. Maxime his
opitulatur, nigri veratri drachma, cui scammonij oboli tres
sint adiecti. & nonnulla ex odoratis, anisum, daucum, petro-
selinum. Iam hiera diacolocynthidos, strenue auxiliatur:
est autem ea quæ ad Rufum authorem refertur. Victus por-
ro sit tenuis, nō qui inflationes pariat. Succurrit ipsis & pæ-
onix semen. Dandaque continue sunt potui ex aqua grana
eius nigra quindecim contrita.

De lycæone, vel lycanthropia.

C A P. X V I.

Qui lycanthropia detinentur, noctu domo aggressi, lu-
pos in omnibus imitantur, & donec dies illucescat,
circa defunctorū monumēta plerunq; vagantur. Hæ con-
ites ipsorū notæ sunt, facies pallida, oculi ad vidēdū imbecil-
les & sicci, lingua aridissima, nulla in ore salua, sitis im-
modica, tibiæ quòd frequēter impingāt exulcerata, adeo vt sa-
nari nequeant. Tales quidā sunt notæ: speciē verò melācho-
liæ lycanthropiā esse existimare cōuenit, curandūq; in ac-
cessionis tempore, sanguinis ex vena ad animi usq; defectū
det

detractione: item, cibus, probi succi, ager, & balnets dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduum vsus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terve purgabitur. à purgationibus, Theriacem quoque ex viperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu commemorata. Inuadent iam morbo, asperginibus somnum accersere conuenit, in id efficacibus. vbi somnus accesserit, nares opio illinantur.

De amantibus.

CAP. XVII.

A Mores cerebri affectibus annumerare cum sint quædam curæ, haud fuerit absurdū. Cura vero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantium sunt notæ. Oculi concaui non illachrymant, sed tanquam, voluptate pleni apparent, continens palpebrarum motus, & cum reliquæ corporis partes non collabuntur soli hi amantibus concidunt. Pulsus ipsorum proprie nullus est, vt quidam opinari sunt verum, qualis eorum deprehenditur, qui crura conficiuntur. Cum vero id quod amatur in mentem ipsis vel auditu, vel visu, & præsertim repente venerit, tunc pulsuum animo turbato contingit immutari neque naturalem æqualitatem, neque ordinem retinere. Hos igitur & tristet, & vigiliis torsos nonnulli quæ dispositionem ignorarent, balnei abstinencia, solitudine & tenui victu consumpserunt, in quibus sapientiores cum amantem deprehendunt, ad balnea, compotationem, gestationem, ludos, fabulâsq; animum abducunt. nonnullis metum incutere conuenit. Nam qui amorî semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, pro ratione vitæ quam singuli delegerint. In vniuersum mens ad alias curas abducenda est.

De apoplexia & hemiplagia, vel paralyfi. CAP. XVIII.

Q Vando commune quidem neruorum principium affectum est, eoque omnes corporis particulæ motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur ita vt pariter principis animæ functiones sint oblesæ. Sin autem in altera capitis parte obstructio fuerit oborta, hemiplagia & paralyfis nominatur. Si vero vnâ quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicetur. Quippe Hippocrates memoriæ prodest, apoplecton hoc est resolutū ipsi crus euaserat. Seruatur itaq; in apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum &

naturali functione recesserit, maximam esse affectionem putabis. si paululum, exiguam. Deterrima verò est respiratio, cum intermittitur, vel etiam ubi magna cum violentia trahitur. Origo vitij est ex frigidiore pituita, quæ principalissimos cerebri ventriculos vniuersæ & subito repleat. Sin autem spinalis medullæ principium quandoque totum huic cõstitatur malo, omnes faciei subiectæ partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum motumque partes quæ ibidem habentur à cerebro excipiant. Si dimidia ipsius regio infestatur illarum partium resolutio quæ dicitur paraplagia cõstituitur. Si odoratus vitiatu fuerit, vel ad priores cerebri ventriculos intemperie expertos, vel ad meatus osiũ quæ à percolando ethmoide dicuntur, obstructos, talis referetur affectio. Itaque iacet apoplecti, voce intermortua, sensus motusque expertes, citra febrẽ. Præcedit hoc mali, capitis subitus, acutusque dolor, venarum circa guttur extantiũ, sphagitidas Græci vocant, toruli eleuantur, tenebræ oculis offunduntur: itemque splendores eisdem oboriuntur, & extremarum partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendũ stridores, vrina veluti arginosa, atra, modica, & farinæ crassiori similia subsidencia quædam refert. Accidit autem hic affectus circa ætatẽ senilẽ temperaturis pituitosioribus, victuque tali vltis. At si iuuenes, & per ætatem infestet, magnam necessitatem fatetur.

Curatio.

APOPLEXIAE morbus, nequaquam, aut raro curatur, ut qui mortem minetur præcipitẽ. Si vero etiã discussa fuerit, plurimũ cum partis cuiusdã corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex vena detrahendus est, & sicubi remissionẽ quandam habuerint, detrahere conuenit eadem die, aut sequenti, aluum autem acri clystere ex muria & melle cõtemperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfurato totũ corpus perungere, caputque chamæmelino, vel anethino oleo, in quo spõdiliũ decoctum sit vel calamintha: mulsaque instillatur, & ea quæ odore mouent, naribus admouentur, vti opopanax, vel sagapenum, & galbanum, vel castoreũ. Oportet autem & ori per vim aperto digitũ, vel pinnam oleo madefactã inserere, ut ea quæ ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis quæ flatus educunt, perungenda est: mulsæ vel oxymel

po

potioni dabitur. Quinetiam apophlegmatismis ex thymo, vel origano cum aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibus mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si vox nondum redit, & vires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione defiguntur. si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitant, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducetur. Cæterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. vetus apomeli cum micis panis, vel alica dabitur: mox pauxillum ex hiera. Post vigesimum primum diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerum calente aqua temperatum potui exhibebitur: ac reliquo tempore vires balneis & vunctionibus reficiendæ sunt: degent autem ægri in locis si fieri potest, mari vicinis.

† Melius hic locus descriptus est in veteri *ἡγὶ δῖνον παλαιὸν δόσοισιν πιῖν*, id est vinum vetus &c. quāquam hæc admodū leuia sunt cū nemo tam stupidus sit qui *δῖνον ἀπαλὸν* nunquam dici non sentiat.

Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.

A T si principis animæ functionibus liberis, omnium particularum aut quarundam remissio acciderit, etiam hic qui molestat humor, qualiscunque ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoque pars sit adiecta, dabitur: per initia drachma semissis, cum tantillo mellis, & aqua calente soluta, vel per se, piperis quoque dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc vna & semissis, postea duæ, atque tres. Rursus totidē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri vires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autem, medicamenta quædā discutientia, & ea quæ cutem possunt cruentare, imponuntur: addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbiū. Prodest etiam eis oleum rutaceum, vel sycionium, vel vetus superfundere. Cibi conueniunt frumentacei, sorbiles, vel alioqui ad concoctionem expediti: nec recrementicei. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinantur, si multæ fuerint, distinctim, si pauca, vni: post cucurbitulas delinuntur medicamenta ex pice, vel rasina, vel manna. optime autem facit cum artemisia simul incocta calamintha, & cunyla, & ni-

trum ex aqua modica, quæ inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, vel polypodio, vel scammonia, vel ex pulte diacolocynthidos. vnctioni vero accommodata λιπάσματα græci à pinguitudine appellâr; huiusmodi habentur vetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuerit. Si huius copia nō est, duas scillæ vncias in oleo coquito, illinitoq; vel cachry similiter præparatum, miscēdauero & ceræ vncia, ne illita diffluant. At si galbani, castorij, euphorbij, adarce, & nitri singulorum vnciā semissem acceperit, multo erit medicacius. appōitu etiam conuenit ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolatum intabescat. Portiones erūt castorei circiter drachma: opopanax succus fabæ instar deglutitus. Mirifice facit etiā sagapenon ad erui magnitudinē, ex mulla, & castoreū cum opopanace. item liquoris cyrenaici milij instar: Auxiliatur & antidotū ex triplici pipere, quod dyatriō pipereō dicitur græcis. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmatismis. Post diem quartūdecimū solidioribus vtī cibis expedit, & auxilio multum proficiente, in balneū deducere. A trigésimo dropacem adferre conuenit, & balineis committere: reliquo tempore sinapi cataplasmatīs modo obducere, in quibus & motus & sensus perit: attendentes ne ideo quod non sentiūt magis quā par est vrantur. In iis autē qui sensus compotes sūt, cutis ruborem dūtaxat oportet excitare post tumorem factum ad lauacrū mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna conueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes, sella, aut lectica, aut vehiculo: postea ducentur ad balnea naturalia. Viſtus sicior vtilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur siccos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

De ijs qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.

Q U O N I A M resolutæ partes vel cōuelluntur, vel laxantur: idque vel à repletionē, vel inanitionē, atendendum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim nō. Deinde in relaxatis quidem mēbris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictiōē intensam moliri cōuenit. In contrariis, laxantibus dūtaxat vtendū, frictiōe simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulū & fæculę contritum adiciatur. fœtus erunt ex aqua vehemēter calida, & potissimū marina, in qua decoctæ sūt lauri, vel viticis germina, vel
sam

samsucus, vel aliquid huiusmodi. Si autem æstas fuerit etiã natationes in mari: rubores autem in cute excitati his maxime conferunt. Itaq; cedantur etiã particulae ferulis, vel vrticæ ramis: Quod si perseveret resolutio, carnem, quæ intra articulos resoluta est, attractam ferris oportet candentibus exiguis tenuibusq; transmissis adurere. Contractis autem membris dropacem continue superiicere commodum est.

De resolutione quæ unamquamque particulam obsedit.

Quæ à nervi diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ vero ab intemperie, vel humore quodam contrahitur, cõmune quidem ex remediis commemoratis præsidium recipit. sunt autẽ peculiaria quædã singulis ipsorum dicata, quæ subiungemus. In iis igitur qui canũ more conuelluntur, æqualiter in oppositũ capistro appellato deduces. Profuerit etiam sanguinis detractio, ex vasis linguæ subiectis: item cucurbitulae priori vertebrae defixæ, tum apophlegmatismi & per nariũ clysterem facta purgatio. Sciendum itaque est non eam maxillã quæ perversa esse apparet sed oppositã resolutione infestari. Gutturæ autem resolutæ, cucurbitulas mēto agglutinabis, perũgēsque medicamentis ex castoreo, sagapeno, & liquore partico. auxiliatur etiã gargarizatio ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, venæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitulae mento admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi vtendum est, & linguæ exercitiis. Si vocis instrumenta resoluta sunt, thoraci præsidia adhibenda sunt, spiritus retentione, & vociferatu vtendum. In superciliis autem palpebrarum inũctiones similiter profunt, iana & futura proficit. Vesica vero resoluta siue vrina impediatur, siue præter voluntatem excernatur, inferiori ventris ab umbelico regioni, & ei quæ scrotũ & anũ intercedit medicamēta applicanda sunt: sedi autẽ immitēdum est oleum rutaceum, vel sycionium cum butyro, castoreo, galbano, vel opopanace, vel liquore silphii: vesicæ porrò hæc per colem transmissa valde profecerunt, vel sola etiam suffecerunt: ex centaureo autem, & colocynthide cū sycionio clysteres etiã intestinis vtilis sunt. Benefaciunt & medicamina vrina ciētia potui data, & castoreum consimiliter. In primis iis, qui nihil vrinæ reddūt, per reſtos siphones, quos catheteras dicunt, in vesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus insidebunt, & eisdem cataplasmatibus forma oblinētur.

Qui

Qui præter voluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibus siccis, potione frigida ventur: ubi se recolligunt, summæ cutis ad ruborem vsque exasperatione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis ventur. Eos autem qui resolutionem experti sunt ob spinæ vulnus, aut casum, aut vertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatentur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, us quæ in vesica dixi, vtendum: in eisdem partibus & lumbis: item quæ intendendi vim habent, vsurpabimus. non conuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliq; olera. Longanone vero soluto, in quo nonnunquam citra voluntatem stercus erumpit, nonnunquam cohibetur ~~is~~dem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: aliàs astringentia, vt cupressi decoctum, lentisci, rubi: aliàs laxantia, vt adipem suillum, & anserinum, vitulinumque, & oleum: interdum rodentia, qualis est muria, vel cucurbitæ syluestris, vel similium decoctum. Neque enim quicquam sic motum promouet, veluti varia agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturque, in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

De resolutione ob colicum dolorem contracta.

NOSTRA ætate colicus quidam dolor inruduit: ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, vt videbatur, incolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, vnde motus plerisque spatio temporis sponte rediit. Qui vero difficiliore curatu exitere, etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipue autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum: item quod abiete constat. Sed quæ roborandi vim obtinent, ac modice refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

De conuulsionibus.

CAP. XIX.

POSTquam de resolutione tractauerimus, proximum est, vt de conuulsionibus agamus quoniam neruorum vterque affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicetur. Cum igitur statim ab initio, vel nō multo post morbi principia

cipia exorientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionem ducunt originem. Vbi verò sudores largos, aut vomitum, aut deiectione, aut sanguinis profluvia, aut vigilias, aut famem, aut motus, tum multos, tum vehementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est. At si vniuersum corpus, neruîq; ex febribus perardentibus inaruerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sanè hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaque partes quæ contrahuntur, valenter vincienda sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut veteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquam mulsam potui præbere. Eos autem qui ex inanitione conuelluntur, oleo, vel hydrelæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad laucrum deducere, temperatôq; solio vti, cum oleo & frictione lenissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, vinoq; tenui & quod facillè distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumq; accersemus. Iam verò ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem verò propriis ipsi præsidis discutias. fit etiam conuulsio, cum vomentes vehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthij radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui nō modo potui dato castoreum, sed etiam à foris cuti vnâ cum sycionio illinito. Si vero malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cum scarificatione ad mouere prodest: si crura contrahantur, coxis, & postremæ vertebræ: si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius vertebræ, tum ei quæ humeros superiacet. In vniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, quod maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ videantur. In his itaque sanguinis ex occipitio, & primis vertebris detractio rectè adhibebitur.

De tetano eiusq; differentijs.

C A P. X X.

TEtanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, à frigido humo-

re

re intus & foris infixo ceu congelatis : ideóq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verū cum particulæ corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos : cum in alterutram partem æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc vitia tensionem vocat, & contensionem musculorum cervicis, neruorūmq; per quos caput inclinat, renuit & circumuoluitur. At si circa posteriores cervicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si vtrinque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu, & aëre crasso, nebulofoq;: quem impensè frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, vnde etiam sicca potius quàm humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quidem tetani differentię sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaque præsidium ipsis est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horum sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam: item aluus siccescit, vigiliæ magis vrgent, crebroq; à conuulsionibus periculum est, ne lecto agri excidât, qui etiam singultire incipiunt: indolentq; alij capite, alij clauiculis, & lumbis, quidam ipsorum subrenuli quoque euadunt. Porro facit affectum (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, ponderis eleuatio, casus, vulnus, ardor, ietus, & alia quæ eandem neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionibus ob inanitionem generatæ, solent.

Curatio tetanorum.

QUIBVS ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoque, cum veteri contegendæ, aut vesicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferant, item cernicibus nonnunquam cucurbitulæ desigentur, & vtrique spinæ parti, adhæc pectori, quæ est musculosius, & præcordiis: interim vesicæ regioni, & renū. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non vniuersim id fiat, sed particulatim & per vices. Sudores lanis oleo

oleo madentibus abstergere, ne imprudentes refrigescant. Quod si tetanus in vetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, nō tamen diutius immorari: quippe in oleum descensus, maximē vires conuellit. Potus erit hydromeli spissius ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent: sin minus, tres obolos, vel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho inimicum habeat suspectum, ammoniacum quoque exhibeatur, vel liquoris cyrenaici instar erui discocto melli circumlitum deuoretur, & laserpicij radicis duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, vel ipsius decoctum exhibentur, vel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto: sed omnium securissimum expeditissimūque est duo, triūve castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per vices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus vero ipse præter alia tum paulatim, tum modicē assumetur. Nam dum ægre potionem transmittunt, in nares ipsam propellunt, unde vehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigida superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) maximē temeraria, † eoq; posteris, credo, vituperata, & nos damnamus, deuitamūsq;e. Vnguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ vnciæ duæ, folij, amomi, styracis, mastiches singulorum vncia: castorei, adarcæ, euphorbij, piperis singulorum vncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

† Hæc ita scripta sunt in veteri codi. τὴν ἢ τὴν ψυχρὴν κατὰ χύσιν, ὡς ἰπποκράτης φησὶν τοῖς μὲν τὰ τὴν εὐσάρ καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μεταγενέστεροις οἶμαι, παραλειφθεῖσαν, frigida autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maximē temeraria sit, & ob id à posteris prætermissa vitamus.

Potio opisthotonicis accommoda.

PANACIS radicis, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerula modo somnum capturis: benefacit etiam orthopnœicis. Porro victus erit tenuis, qui expeditē distribuatur, & recrementis omnino vacet.

De

Tremoris origo in vniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod aetas senilis palam testatur: priuatim vero plures causae ipsum efficiunt: nempe frigida intemperies, frigida potio, & praesertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi, glutinosi; humoris redundantia, & vini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifeste tremunt, à noxiis abstineant. At si perseverat etiam diu in febribus tremor, primum corpus totum oleo sabino perfundatur: ubi autem accessiones remittunt, veteri, aut sycionio: summa vero corporis membra lanis mollibus prius tamen praeruncta contegantur. Deinde cucurbitula à priori vertebra usque ad spinam, lumbosque agglutinentur, sic ut particula prius cum praecordiis cruda hordei farina *ωμηνύσιμ* Graeci vocant, delinantur. Iam haec quoque partes lanis ex veteri, aut sycionio oleo respersis operiantur. Quod si febres inueterauerint, die vno interposito in oleum, aut hydrelaeum tremuli descendant, utanturque frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspicionem, mulsa, castoreumque; potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox volatiliū, & piscium, qui molli carne sunt praediti: febribus solutis lauandum est, sed vitari debet frigidum solium, vini; potio. Porro si crassorum, viscosorumque; succorum copia fuerit, uti conuenit iis quae incidunt, extenuantque; verbi gratia, rutae ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit, castorei, & nitri singulorum obolis duobus: Datur quotidie cochleare vnum cum oxymelite ad tres usque dies ieiuno, vel panacis, & piperis grana quinque ex mulsae cyatho. Simplicia praesumpta trementes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althaeae radice decoctum, damassoni foliorum drachmae quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi vngue, item acopis ad resolutionem conscriptis, vnctionibusque; & cutis ad ruborem usque exasperatione, phanigmon Graeci vocant, utemur: praeterea exercitiis, perfrictionibusque. iis vero qui ex vini potu tremunt, vinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fuerint liberati.

Ocula

Ocularia, & primum de dolore ex Galeni commentarijs.

C A P. X X I I.

CVM in oculis vehementiores oboriuntur dolores, considerato, quam ex affectione corporis dolere ipsis in inflammationibus accidat. Vel enim, dum ab influentium acrimonia vehementius eroduntur, vel quia tunica succis repleta tenduntur, vel quod crassis succis, aut spiritibus flatulentis quodammodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Rosiones igitur purgantibus curare praesidiis, noxium humorem vacuando par est. item candido oui liquore in oculos infuso. Vbi vero concocta iam fuerit inflammatio, corpusque superfluis vacuū balnea ipsis aptissima sunt.

Ex repletionem autem contractas inflammationes sanguinis detractione, alui ductione, & partium inferiorum frictione persanare conuenit. Intensionem autem, toto prius corpore vacuato: item humoribus qui sursum tendunt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectionis remediis, quae discutiendi facultatem habeant. fomenta itaque adhibenda ipsis sunt, & scoenogræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum venulas intendit, sic tamē ut corpus totum plethoricam affectionem non præ se ferat, vini usus est, quod possit excalfacere, vacuare, & meatus aperire.

De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam graeci vocant.

PERTVRBATIO humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, ut à sole, fumo, puluere, oleo: quare etiam occasione ipsius separata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: verum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuorve, aut quinque dies plerumque durat. facillime discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accedentia turbare lumen possint, item parciore cibo, aquæ potu, aut inambulatione, & aluo ex facili respondente.

De inflammatione.

CVM inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis vacationem, perungendi sunt iis quæ imperus humorum possunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum authorem refertur, diarodon, vel etiā Me-

k

diacum, Nardinumq; Vbi membrana adnata inflammatio-
ne tentatur, medicamentis utemur, quæ græci ab vno die mo-
nemera vocant, cum oui candido infusis. Die infecuto nisi
inflammatio crescat, nardino delinentur: fetu ex meliloti de-
cocto vti cōuenit. vbi verò crassus humor est, qui lippitudi-
nē facit, medicamenta accommodantur, quæ neq; infarciendi
vim habent, emplastica græci vocant, neq; humores increas-
cent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea
sunt, quale est Chiacū. At si humores in capite fuerint impa-
cti, cucurbitulā occipiti admoovere oportet, vel scarificare,
vel hyrudines fronti qua oculus dolet, adhibere, panēque
purum aqua maceratum cum modico rosaceo, aut polentis
incoctis caput papaueris decocto, similiter cum rosaceo,
superdare. efficacior autem utendum est cataplasmate, ex
croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris coriandri fo-
liis ouorū luteis tostis micis panis in sapam intinctis, rosa-
cei momento, & papaueris caput contritorū decocto. In-
terdū sēmen quoq; ipsius ad leniendum dolorē miscetur. Si
magna doloris necessitas est, etiā opij pauillam adiicitur:
vbi dolor abest, stupefacientia græci *κατακλιμα* appellant vi-
zari debent. Quod si mediocri inflammatio infestet, aloen per
se, vel aqua vel oui albo dissolutā illinito. vt autē expeditius
sit auxilium, croci drachmas sex, aloē drachmas sedecim,
gummi drachmas nouē coniecta in vnū aqua pluuiali exci-
pito, fingitoq; collyria. † Iam quæ vocantur diacrocū lippit-
udinum initiis sunt idonea: in quibus verò tumor œdema-
todes hoc est mollis cedensq; & exalbidus habetur: tum cir-
ca palpebras, tum membranā adnatā sine tunicarum
offensa, benefaciunt etiā liquida collyria (Græci hygrocōl-
lyria vocant) & ex croco, & atramento sutorio & melle
præparata. hoc autem est laudatissimum.

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, *ὅτι τὰ διακροκὰ ἢ προ-
σαγορεύονται πρὸς τὰ κακὰ ἐφ' ὅσα μὲν εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὀφθαλμοῦ, id est, quæ dia-
croca appellantur oculorum conturbationibus sunt accommodata.*

Liquidum collyrium quod dolorem leuet ano-
dynon appellatum.

CRETAE sutoriæ, mellis atticī, succi fœni græci singulo-
rum pares portiones incoquito, donec mellis spissitudinem
habeant. deinde specillo duos angulos attingito.

Ad

Ad defluxionis impetum, qui epiphora grecis dicitur.

Ad fluxionum impetus, per initia quidē conuenit inedia, aquæ potus, & multo magis veneris abſtinentia: Aluus ſub-
duci, facies poſca aquoſa collui debet. præſertim ſi feruens
fuerit fluxio. ſin minus, atramento ſutorio cum melle frons
& palpebræ delinantur. Nonnulli atramentum ſutoriū aqua
diſſolutum ad collutionem exhibent. Porro qui de fluxu ci-
tra inflammationē vexantur, vel etiam cum inflammatione
quidē, ſed ita vt ſupra os caluariæ affectus conſiſtat, agglu-
tinamentis vtendū eſt in fronte: ſimplicibus ſanē, viridibus
vitis ſoliis, vel rubi ſucco, vel portulacæ, vel cotoniorū cum
polenta tenui, vel galla leui cum vino, & polentæ polline,
vel cicuta, vel pſyllio cū aqua, vel ſolano, vel cochleis cū te-
ſtis ſuis in puluerem redactis, à tempore ad alterum tempus
illitis: In vniuerſum iis quæ astringunt, refrigerantq;. Cōpo-
ſitis autem his: pollen frumentaceus, & myrrha, vel thus cū
oui aquato illinatur, vel ſamia terra cum myrrha, & manna
ſimiliter vt oui albor inungetur. In frigidioribus autē hu-
morū curſibus ſulphuris viui, bituminis, picis, colophonie ſin-
gulorum drachmæ duæ: item Muſæ paſtillus, & Aſter, ſimi-
liaq; probe repellunt. Iam verò Theriace vino astringente
diſſoluta, fronti quæ illita frigidos humorum influxus ſiſtit.
quinetiam eadem pota vehementer his ſuccurrit. Ipſi verò
oculo, lana, aut panniculus tenuis, oui albo madens imponi-
tur, item caſeus recens ſimiliter oculo applicatus, acres ma-
xime influxus cohibet. tum collyria à reprimēdo dicta ſtal-
tica, ſi illinantur, inſtillanturq; ex oui aquato idē efficiunt.
At ſi in imo, & ſub oſſe hæreſcens humor longiore ſpatio
duret poſt generales corporis vacuationes, medicamentorū
uſus eſt quæ per nares atque os pituitam eliciunt, errhina &
apophlegmatifmos appellant: caput radetur, & rubor in cu-
tæ excitabitur. Porro in his etiam curandi rationes, quas in
capite manu adminiſtramus aſſumunt, nempe Angiologiā,
arteriotomiam, hypopſatiſmum, & perſcyphiſmū, vti graeci
appellant: & in vertice uſq; ad os aduſionem. Iam cucurbi-
tulæ occipitio incifa cute admotæ, impetum ſtuoris poſſunt
reuellere. Fluxiones extra caluariā notant, vaſa in fronte &
tēporibus diſtēta, & capitis veluti vinculū, tum quod ex ag-
glutimentis ſicca præſidio ſunt. Si hæc deſint, & ſtuoris im-
petus prorogetur, & ſternutamenta nonnunquam moleſte

elidantur, humorem sub caluaria teneri, censendum est,

De chemosi.

CHEMOSIN appellant, cum utraq; palpebrae ex vehemēti inflammatione inuersae fuerint, ut vix oculi ab ipsis cōtegantur, & albus oculi nigro sublimius euaserit, rubrumque etiā magna ex parte nigrum occupet. Curatur venae sectione, medicamine purgāte, collyrio diarodō albo, & quod à cinereo colore vocatur *σποδιχνὺς*, cum lacte, vel oui aquato. Eodem verò palpebras, tempora & frontē illinere oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus uti. cū autem remittit inflammatio, acrioribus, quale est etiā viride diarodon.

De hyposphagmatis, & emphysematis.

HYPOSPHAGMA venarum adnatae membranae ruptura dicitur, ex ictu potissimum eueniens. Instillatur itaq; ipsis sanguis palumbi, vel colūbae, vel calido lacte muliebri thuris paululum conterens, vel muria, & praesertim ex sale cappadocico: fotu utitur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, oedema vocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca continuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic specularium combustum, & stercus colūbae aquis portionibus, vino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens vel raphani cortex, vel vicia passa sine acinis, singulatim ex posca, vel mulla applicantur. Eadē faciūt ad Emphysemata.

Ad emphysemata pruriginosa, & psorophthalmias.

EMPHYSEMA palpebrae tumor est, oedemati similis: psorophthalmia autem pruriginosa eiusdē scabies, ex salso & nitroso humore contracta. Conuenit ipsos fouere, posca, lenticula decocto & rosarum. Hygrocollyrium autem hoc, aris drachmae sex, misyos tosti, myrrhae singulorum drachmae tres croci drachma una semis piperis drachma vini Chij & passi cretici singulorum cyathus unus, & dimidius: incoquantur quoad mellis spissitudinem habuerint. Hec est Erasistrati compositio, quae panchrysos vocatur: facit etiam ad anginam, vlcera oris, pudendorumque, & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, somnum inituri. Ab acidis, salis, & acris abstineant.

De sclerophthalmia, & xerophthalmia.

SCLEROPHTHALMIA, durities oculi, & difficilis motus est cum labore, ruboreque citra humiditatem. fouere igitur ipsos crebro, spongiis aqua calida imbutis ex usu est,

est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo: vel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant vitanda: caput velandum, vngendūque, aluus ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est sine fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & victu probi succi: vtriusque verò communiter conueniunt medicamenta acria, vt vel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistra ti quoque panchrysos, & quod dicitur Dicenteton. item cui nomen est Stratiotico.

De ectropijs.

HIC affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut excrescentiam carnis nascens. In quibus igitur excrescentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam cōterito & admoueto, † vel plumbo vsto cum sulfure viuo, & loto vritor, vel vtriusque paribus & æruginē & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἢ μολίβδω νεκρῷ μένῳ χρῶ μετὰ θύρις ἀπύρις ἡγεῖ πεπρωτός, id est, plumbo vsto vtere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

De ægilope, & anchilope.

ÆGILOPS abscessus est, qui inter maiore oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, vsq; ad os in fistulam dehiscit. priusquàm verò abscessus in vlcus erūpat, Anchilops vocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus vna cum perditij herbarū succo imposita. crebro autem variare oportet, & neque in vomica eruptionem degenerabit. A L I V D. Halica cocta in aceto & probe trita, non solum incipientes, sed etiam in vomicam mutatos persanat, rumpitq; & vsque ad os penetrat. Hoc vsus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. A L I V D. Ruta satiuā vna cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, cocta q; & imposita pulchre admodum ægilopas emendat, & adusque os permeat, initio erodens, postea non ita: ac mirum est, quòd ne cicatricem quidē indecoram hoc præsidium relinquat. A L I V D. Cochleas cum testis suis tritas imponito. interdum aloë, vel myrrha admista. Præsidium hoc antequàm ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, cum desiccet. A L I V D. Cum manus opera ægilo-

pa & anchilopa aduris, hoc vtere cataplasmate, lēticulas decoquito, & cum melle vtitor, vbi crusta exciderit, vnam passam excipiēs liquida terebinthina, vtitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricē inducit

De trachomate.

TRACHOMA internæ palpebrarum regionis asperitudo est: harum intēō, vt veluti incisuras habeat, *σύννεος* à fici similitudine græcis appellatur. Cum inueterauerit vitiū, callosque contraxerit, tylosis vocatur. Collyriis igitur vten dum est tum eo quod ex vino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoque hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur: Hermatioque cum Cygnarij modico. Adhæc diacrocu collyrium pariter p̄sorophthalmiis citra exulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illicitum. At si durior callus, his non cesserit remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepia testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpebrarum rasura blepharoxiston græci appellant.

De chalazis.

CHALAZION, otiosi humoris in palpebra colluies est in qua ammoniacum aceto detritum simul cū galbano inungitur. facit etiam terebinthina pariter cum cerato excepta.

De cruthe turberculo.

CRITHE, paruulum abscessus tuberculum, oblongum, palpebræ cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet: muscæ capite abiecto reliquo corpore infricari, vel hordei diluto perfundi.

Ad palpebrarum pediculos.

EXPURGATIS prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbe pediculariæ parte vna, tritis vtitor.

De madarosi, vel milphosi.

HIC affectus palpebræ pilorum defluuium est. Ad quod cura prius vniuersi corporis habita, smegmatis vtere, quibus ab honestandis palpebris nomē est calliblephara. Terræ amplitidis, croci gallicæ, ladani, singulorum pari portione contrita vtitor. ALI V D. Stimeos tosti lotique drachma, plumbi combusti & eloti drachmis quatuor, croci totidem nardi indicæ drachmis tribus, in puluerem redactis vtitor.

ALI

A L I V D. Palmarum ossium combustorum tribus drachmis, nardi gallicæ drachmis duabus: leuigatis vttere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. **A L I V D.** Neapolitæ ad palpebrarum defluuia, *μυλφώσος* appellant, longosque palpebrarum affectus. Stimmeos, cadmiæ, chalcitidis, misyos xenici singulorum pares portiones. crassiuscule contundito, & melle respersa torreto: leuigatis vtitor.

De pilloso.

P T I L L O S I S, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit sæpe pilorum etiam defluuium. Præter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ combustæ, & melle contritæ, inunguntur.

Ad superciliorum defluuia quæ madarosis dicitur.

P L V M B V M digitis oleo, vel adipe anserino vnctis detritum illinitur. **A L I V D.** Hoc etiam subnigros reddit: nuces auellanae exustæ simul cum adipe caprillo, vel vrsino infricantur. **A L I V D.** Hoc efficax est etiam barbæ alopecii. Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drachma, polytrichi drachma irini vnguenti cochlearia quatuor. Tritis perbelle vnguentum admiscetur. fortiusque prius adhibito illinitur. quod, si rasa pars ante fuerit, magis proficit.

De palpebrarum pilis oculum irritantibus τριχίασις appellant.

P I L I S qui oculum pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ per se inungitur, vel cum cinere chamaeleontis albi, vel sanguis cunicum, vel fumariæ quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, vel tellinarum falsarum cinis cum cedria, vel loti cinis, vel alumen liquidum quod phorimon appellant, vel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

Pilorum glutinans medicamentum.

C O N G L U T I N A N T pilos infractos bitumen, massiche, colophonia, gummi, cochleæ par glutinosa.

De enchanthide & rhyade.

E N C A N T H I S naturalis in maiore angulo caruncule ex-crescentia est. Rhyas autem huius imminutio. Enchanthidas igitur iis quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusque vrēdi vel exedendi facultate præditis, hæc *enchanthis* illa *ρῥυάς* greci nominant, absumes. sed non totas, nec eius loco Rhyas subnascatur, verum ad naturalē vsque magnitudinē. Rhyadas, cariosa parte in totū, vel rudi manus opera, vel medicamentis

absumpta, insanabiles existimato. Quòd si pars ipsarū im-
minuta fuerit, iis quæ mediocriter astringūt, carnemq; cre-
antibus reficitur: qualia sunt medicamēta ex croco, glaucio
& aloe confecta. item collyria diacrocu inscripta, necnō al-
tercum prodest in vino coctum, impositumq; & aluminis
ex vino pauxillon.

De vlceribus.

VLCERVM in oculis genus quidem vnum est, differentiæ vero speciales diuersæ. etenim in cornea mēbrana quæ græcis ceratoides appellatur, vlcus cauum, angustum, & purum, à fossula botryon græcis dicitur. quod autem latius botryo est, sed minus altum, caloma nūcupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambientia cōprehendit, vt etiam in exteriorē pupillæ parte rubicundum, in interiorē candidum appareat. Epicauma vlcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Iam vero alix plures vlcērum sunt differentiæ, de quibus dicemus communius. Si igitur vlcus simul cum inflāmatione obortum fuerit, curationem ex iis quæ inflāmationē lenire possunt, & cōcoquere, moliemur, nō neglectis iis quæ ad vlcus propriè pertinent. Talia verò sunt collyria, libanium. cygnus, & pelaria vocata, item aster & similia: insuper quæ ex amylo, terra samia quæ ἄσκηγος dicitur & cerusa constant: omnibus autem magis leniendo dolori esse Ilamonem nouimus, verum diu ei insistendum nō est, eo quod admodum stupefaciat. Laudatissimum verò & quod diazematōn à decoctione dicitur, vt quod stupefaciendi vim non habeat. At si cum fluxione vlcus infestarit, collyriom aliquod illi admiscebimus, quale est diahydras, & Chiacum, præterea Cygnus fuluus & quæ repellendi sine rosione facultatem obtinent. Sin autem vlcera sordida fuerint, multa mediocriter aquata, & fœnugræci decocto vtemur per se, & cum aliis ad id dicatis collyriis. † Si acriora sint albis, seberiano & fœnugræci diluto: si nō acria, diasmyrnes, & nardinis. Purgata vero vlcera medicamentum Cleo probe potest cicatrice obducere, eamque præterea concolorem reddere.

† Exemplar græcum typis expressum ita habet *Ἀριμνέων ἑλκῶν*, id est, si acriora sint ulcera &c.

De oculi procidentia quæ πρὸς Ἰωάν. is dicitur.

PROPOSITIS tunicule que gracis ab vna acino παροδός
dicit

dicitur, procidentia est, quæ erosa ruptæve cornea tunica accidit. Ea cum nondum creuit quod muscæ capiti similis sit, myocephalon nominatur. Cum vero amplius & eo usque succreuerit, ut acinum vix repræsentet, staphiloma, quasi vuatio dicitur: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras transfiliat, melon, hoc est malum. Si vero obcalluerit, elos, id est clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon ferè oculi procidentia degenerauerit, repellentibus constringentibusque ipsum medicinis utendum est: Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodorio. item eo quod dia thallias, & quod diaceratos vocatur. iam vero spongiam leniter ipsis posca, aut vino adstringente, aut rosarum decocto imbutam, super dare commodum est, aut splenium. Principatum vero obtinet ad procidentias omniaque vlcera, medicamentum cui nomen est Olympiacum, vel Olympus, cum succo oliuæ, vel polygonij, vel polij. Eadem hæc etiam clavis conueniunt & staphilomatis, priusquam inalbescant. Vbi vero alborem aut callum contraxerint, nullus remediis locus est.

De oculis purulentis.

ALIQUANDO membrana à cornu dicta ceratoides, purulenta efficitur, nunc altius nunc in superficie, ita ut pus habeat unguis figuram, quæ causa est ut hoc etiam malum unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat curationis ratio ut vel pus discutatur, medicamentis mediocriter in id efficacibus quale est aqua mulsa, & fœnugræci succus, ex eoque collyria, similiter libani, & quæ ex thure cōfiunt, dia libanu inscripra: vel rûpatur vomica, & vehemētioribus repurgetur, quod genus sunt diasmirnes, & hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationem coierit, etiam hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorij, croci singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterum phlyctæna cum sit ceratoidis membranæ excrescentia, ex humore quodam tunicas ipsius excoriente, purulentorum curationi subiicitur. Hygra, hoc est liquidum medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios vocant: Bassi croci, aloes, myrrhæ singulæ uncia, vini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex vino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in vitreo vase reponuntur: uti licet bis quotidie, aut

si necessitas urgeat, ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem, cicatricemque inducit.

De cicatricibus & albuginibus.

QVAE per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alij verò nubeculas. Altius autem delitescentes, albugines, medicamentis absterforiis, extergentibusque discutiuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurij succus cum melle. Verustiores autem cedria extenuat: & æs solum aqua tritum modo collyrij, ad hæc quæ detergent collyria: quale est quod cornu ceruino cõstat, dia ceratos elaphiu dictum: item Rhinarium, Hecatombæ similiaque. Albugines vero nitrum cum oleo veteri detritum diligenter, & inunctum probe, extergit. Item sepiæ testa combusta, cum melle leuigata. Inter collyria hoc bene, & leniter abstergit. Collyrium. Mammiræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ troglodyridis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera. in collyrium coactis vtitor, vel crocodili terrestris finum ex aqua leuigatum illinito, in collyria redigens. Recte autem sal cappadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluens insullabis.

Quomodo cicatrices tingantur.

GALLAE, acaciæ, singulorū drachmæ quatuor, atramentum sutorij drachmæ duæ illinentur. Collyriū autē hoc proficit, floris mali punici, cytinorū, atramenti sutorij, acaciæ, gummi, singulorū drachmæ quatuor, stimmos, gallæ, singulorū drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali granati delidetur, interius mēbranosum quod grana intercedit, misceto.

De vngui oculorum, quod pterygion græcis vocatur.

VNGUIS quod pterygion græci vocant, nervosa membrana adnatæ excrescētia est, quæ ab angulo quidē oritur, sed ad usque oculi coronā peruenit, vbi verò supramodū fuerit adaucta, pupillā obtegit. Magni igitur & inueterati vngues solam manum expostulant. Recentiores vero & magnitudine mediocres, præsiidiis eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. inter simplicia igitur æs combustū, vel atramentum sutoriū simul cum porcino felle pulchre faciūt. Efficacius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorij pars vna, gummi pars se mis-

tis

sis: vino leuigata illinuntur. vel etiam collyria formantur, nonnulli vero caprinum fel melle mistum inungunt.

Ad vngues oculorum, suppurationem, & hebetudinem. Oribasij.

LAPIDIS magnetis, æruginis rasæ, minij sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis attici cochlearij dimidium. Idem valet aduersus albugines.

De carbunculo & carcinomate.

CARCINOMA tunicæ ceratoidis affectus est: cui dolor adiit, distentio, rubor tunicarum, cruciatus punctorius ad vsque tempora magisq; si moueantur, cibi torquet fastidiũ, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibus frumentatiis & alioquin probi succi, omnĩ acrimonia liberis. Collyria lenia infundantur, vt spodiæcum, seberianum & consimilia. † Cæterum bonæ totius, corporis temperaturæ prospiciendum est. Carbunculus autem, & ipse malignum ac contumax vlcus est, crustatum aliàs bulbo, aliàs palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaque in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primum, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, vel triticeam ex aquæ mulsæ decocto obducere instar cataplasmatidis, nonnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si vlcera serpẽdo depascent, lenticula cum melle, vel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatidis obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis cleæ decoctis, vel malicorio in vino cocto leuigatq; ex melle. At si cessent proserpere, crustaq; medicamento quod subiungetur, imposito, exciderit, & vlcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigatq; cum croco & melle cataplasmatidis modo inducentur, quousque ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodij drachmæ quatuor, myrrhæ non nimis torrefactæ drachmæ treis, totidemq; oboli. Detritis in vino amineo quousque inaruerint, passum creticum verus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide sicili excipiuntur, subiungunturq;. Ad palpebrarum vero carbunculos malum granatum acidum, totum frustatim concisum aceto incoquito. Vbi intabuerit probè, in leuoremq;

uoremq; detritum, illinito in lintheolum ac vtor, bis tēve quotidie immutans, noctu semel.

† Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. προνοεῖται ὅτι ἐν τῷ τοῦ σώματος εὐφραδίας πρᾶντος ὅτι τὰς ἐδύνας τῆς κινήσεως ἀφαιρέμα φανὲν ἐγκυματισμῶν ἢ χυλῶν πολυγόνων ἢ ἀφρογλώσσων, ἢ ἀνδράχων, ἢ ἀνδράκων, id est, bonae totius corporis temperatura perspicendum est. Carcinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, vel succus polygoni, vel plantaginis, vel portulacae. Quam veram esse scripturam ex Actio facile intelligi potest.

De mydriasi.

C V M pupilla colore quidem nihil magis euariet, sed multo est quam naturalis status exigit latior. interim ex toto visum impedit, interim permultum, & omnia quae conspiciuntur ab ipsis minora quam sint videntur esse, Mydriasis quidem affectus est, causa autem ipsius humor quidam excrementitius, itaq; curationem ipsius sanguinis emissionem à cubito, vel purgatione tentabimus: sin minus, venas in angulis oculorum diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio ad mouere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, vel posca. Medicamentis autem iis vtendum est, quae etiam ad pustulas conducunt.

De phthisi & atrophia.

P H T H I S I S affectus est, quo pupilla fit angustior, obscurior, rigosiorq;. Res lumini obiecta, in his maiores apparent. causa vero est densatio, quae siccitati potius fertur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, quod illa angustio rem pupillam, haec totum oculum minorem, humilioremq; reddat. Mederi his conuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione: Adhuc aquae in faciem superfusione & vngue quodam calfaciente in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infra scriptum. Ammoniacy drachma, crocomagnatis drachmae quatuor, croci drachmae duae, eruginis drachma. Tritis in aqua, formatisque vtor.

De nocturna cecitudine quae nyctalops dicitur.

N O C T V R N A caecitudo, qui Graecis Nyctalops dicitur, vitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito,

bito, & oculorum angulis vacuato, mox purgatione, vel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hyssopus potui, vel ruta dabitur. Si his remediis morbus non cedit, iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo: oculi vero melle despumato illinentur, claudunturq; , premendo liquamenta, continendóq;. Aluminis combusti partes duæ, salis fossitij pars vna. Trita cum melle sublinuntur. A L I V D. Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaq; inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctiq; vapor oculis excipi a pertis præcipitur.

*De glaucomate, & suffusione quod hypochyma dicitur ex
commentarijs Ruffi.*

GLAUCOMA, & hypochyma veteres vnum quoddam mali genus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem crysalli *κρυσταλλοειδης* appellatur, vitia, præ humiditate in glaucum colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem, & crystalloidem concresecunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia. proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, veluti ex centaurij, aut cucumeris amaræ decocto petitis, & alui solutione crebriore, cucurbitulisq; occipitio cute incisa admotis. Caterum aquæ potus toto victus curriculo competit, cibisq; vti qui extenuant. Proderit autem temporis spatium, & apophlegmatismis diebus aliquot vti. Quibus verò ceu culices, oculis obuersari perperam videntur, ex quadam humorum prauitate, vel biliosioribus vaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde, vel etiam inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus vtendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaici, veratri albi singulorum drachmæ sex. Alij addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto vtetur, calidis succi, chamedryos, sanguinariæ singulorum æquis portio

portionibus contritis. Benefaciunt item collyria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thalasserus, & diopobalsamu, & quæ ex his præparantur, præiudicio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuuat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo veteri, & similibus.

*De glaucomate & suffusione, ex commentarijs
Demosthenis.*

FLORIS æris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatididis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

De obscuritate, & hebetudine.

OBSCURITAS, quam amaurosim Græci vocant, est totius cernendi visus plerunque absque manifesto oculi affectu impedimentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum lingua vocatur) obscuritas visus est, ab occulta quadam causa proueniens. Curatio communis sanè est ei quam in suffusis diximus: Priuata vero est, ab angulis sanguinem mittere, hirudines ad mouere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tempore etiam iis quæ sternutamenta prouocant, vtendum est, tum vomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei æqua portione, deinde composito quod subiungitur. Croci obolis duobus, felis hyenæ drachma, piperis communis granis octogintaquinque feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo, mellis cochlearia quatuor adiiciuntur. Præparata excipito area pyxide & vitior. priusquàm verò illinantur oculi, in marinam calidam demerli fovebuntur.

De strabismo.

INFANTES ab origine strabones curantur larua faciei circumposita, vt in rectum videant. Nam strabismus conuulsiora musculorum qui bulbum mouent, dispositio est. & lucerna è regione posita, & non à latere elucente. Præterea cum ad nares conuiuent oculis floccos rulos agglutinare vincit angulis qui circa tempora habentur: vt visu ad hos inconiuncter directo, oculos emendent.

De oculorum expressione qui ἐκτινικὸς appellatur.

EXPRIMUNTUR oculi nonnunquam, vt exerti perseuerent.

uerent. quibus sanè strangulatus, mali causa est, ex cubito venam incidere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamento purgare, veratro nigro, vel scammonia. Ex doloribus autem contractas oculorum expressiones, quæ frequenter sane etiam ex partu accidunt, vteri purgationes solvunt: unde has promouere conuenit. in viris autem post sanguinis detractionem. si non remiserit vitium, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cum aqua, superq; duplicatum lintum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

De confusione.

CONFUSIONES ex ictu, curamus sanguinis detractione à cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam columbæ replemus: deinde lanam mollem in ouum cum vino, rosaceoq; contusum demersam imponimus, illigamusq;: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusq; idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad veteres affectiones inscribuntur: quale est Chiacum.

De myopia.

MYOPIÆ dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima natali die propinqua sanè vident, remota vero non item. Insanabilis est huiusmodi dispositio vt quæ ab imbecillitate spiritus visorij proueniat. Contrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non videant, procul disita assequuntur.

Auricularia & primum de aurium dolore. CAP. XXIII.

AVrium dolorem ex frigiditate contractum, vbi ex annunciatione, præcedente victu, vel agrotantis quoq; percontatione: an ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quòd dolor alte citra grauitatem, vel distentionem, vel ardorem fixus sit, calfacientibus curabitur præsiidiis, nempe oleo rutaceo, calido vel nardino, vel laurino calido, vel amaracino, vel phuliato, vel spicato, vel communi, cum euphorbio, vel piperi, vel castoreo, vel commageno, dicto vngvine, vel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam vero oleum in quo allium decoctum sit, vel cepa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intempe-

rie

rie dolorem, in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu
tensione sensus est, contraria medicantur oui albumen sub-
actum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibe-
mus, lac muliebre cum quodam collyrio, quod dolorem le-
nit, vel succo perditij herbae, cum modico rosaceo: ipsumq;
rosaceum, vel oxyrhodinum, vel succus solani, vel corian-
dri, vel hastulae regiae, vel oleum in quo lumbrici, vel aselli
qui sub aquariis stabulantur, incocti, vel oleum amygdali-
num per se, vel buccina viua numero tria, in eo decocta na-
turaliter proficiunt. Quod si glutinosi, crassiq; succi dolo-
res fecerint, capitis, ipsiusque auris grauitas, & praecedentis
victus ratio testatur. sola vero citra grauitatem distentio
ipsius auris spiritum flatulentum, cui exitus non patescit, in-
dicat. Itaq; in ambobus vitis vtere medicamentis, quae ape-
riunt, inciduntq;, cuiusmodi est aphronitrum cum aceto, &
melle. Item fel ouillum cum oleo communi, vel amygdali-
no: praeterea porri & cepae succus tepidus cum melle, aut
origanum tritum, cum melle & lacte muliebri instillatur.
Ad vehementiores aurium perfrictiones fel caprillum cum
succo porri inditur. Verum in iis quos multus dolor, longus
que vrget: & grauis simul auditus existit, haec quoque vsur-
pari debent, cuiusmodi dracunculi succus est, ari, brioniae, &
similia. priuatim vero qui ob flatuosum indolescunt spiri-
tum, cucurbita ex aqua calida fotu prius facto, circa aurem
fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, simulq; ca-
lor, & dolor pulsatilis, aut etiam febricula oboritur, inflam-
matione aurem laborare censeo. Atque ante omnia hic san-
guis emittendus est, † deinde fotu frequenti vtendum ex
oleo dulci calente per specillum lana inuolutum, meatui ve-
ro adeps anserinus, vulpinusve, aut medicamen basilicum
cum rosaceo, vel cyprino, vel irino debet instillari: extrin-
secus ea quae dolorem lenire, & concoquere possunt, cata-
plasmatis modo superaccommodare. Si dolor violentus est,
iis vtere, quae leuiter sensum stupefaciant: non enim medio-
cre periculum est, quod cerebrum neruo per quem facultas
audiendi erogatur inflammato, vicinum sit. Probe igitur
hoc dolorem lenit, opij pars vna, castorei partes duae, cum
lacte muliebri, vel oui albumine, aut vino dulci tepido in-
stillantur. Iam pastillus Crocodes, Aster, Philonis antidotu
frequenter his pro fuerunt. verum conuenit crebro fouden-
tem

tem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanam, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita ut partes inflammatione tentata quam fieri potest minime attingantur. At si dolor in vetustatem incidit, ac in pus degeneraturus est, medicamento utitur, quod ex lini seminis succo conficitur, vna cum rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatur. Cum autem aqua medicata, meatu recepta auditorio dolorem parit, si quidem copiosa fuerit, ore, vel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto extergens, oleum quoddam instillabis quod sit partium tenuium, aut rosaceum, aut oui album, aut lac muliebre. Calida verò omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

† Hic locus magis expressus in veteri exemplari in quo ita est descriptus. *ἡ δὲ οὐχὺς πυρίων λα. ἢ τῷ κοίνῳ ἰλαίῳ, ἢ τινὶ τῶν δερμῶν μύρων χηνοδα. ἢ ἡγεὶ ἔργον ἐν αὐτοῖς τοῖς βίβρυμλοῦ ἐν τῇ δυνάμει τῇ ἀνοῇ, id est, oportet autem assidue fouere & oleo communi, vel aliquo medicamento uti, atque eo madefactam lanam auri imponere.*

Ad vlcera quæ simul cum inflammatione affligunt.

LICIVM & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.

AMYGDALARVM quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opij drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma. Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo diluta: sin autem pus profuit, mulso, vel oxymelite: si grauitur audiunt, aceto recentia vlcera glaucium solutum aceto, persanat: item ex eo collyria, tum quæ appellantur diarodō, diacrocu, & diasmirnes. quemadmodum rursus suppurantes citra dolorem ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

Ad sordium duritiem.

NITRO aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumque fordes deterfæ sunt nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

Aliud ad fordes.

CARDAMOMI & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collyrij formam redactum, auriculæ committitur. Terrio quoque die educitur. Copiosas

enim sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit hoc etiā aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloës, thuris, myrrha, singulorū drachmam, myscos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cū vsus requirit, aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Heræ, & Musæ.

Ad diuturna vlcera.

CEDRIA melli admista illinitur. ALI V D. Myfi vstum & in puluerem redactum inspiratur. Per clysterem verò auricularium eluuntur aures posca, vel oxymelite, vel mulso, vel decocto quorundam repellentium (verbi causa) lenticula, vel rosarum.

Ad aures cruorem fundentes.

LENTISCI decocto auris illuitur, polygonij verò succus cum paucissimo aceto instillatur, vel lycium, vel amurca, vel acacia, vel porri succus.

Si caro excreuerit.

NITRO ex aqua calida, simul cum squama aris, & sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam acceperint, melle repurgato.

Aduersus aurium vermes.

ABSYNTHII decocto, vel centaurij, vel porri eluuntur: capparis autem foliorū viridium, aut fructus succus instillatur, vel cedrinus liquor, vel vrina humana verus, vel albū veratrum cum melle, vel calaminthæ succus, vel scammonia cum aceto, vel succus absynthij: oleum verò meatui inditū vsque ad superiora, exire ipsos compellit: potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula vtitor.

Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt extrahenda.

SPECILLVM auricularium lana inuolutum in resinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum intingendum, idque in aurem iniiciendum, ac quod in ea est protrahendum. Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si ne sic quidem exciderit, aut comprehensum fuerit: aliis quoque vtitor modis: vt in parte chirurgica docebimus.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

SI in febribus, aut harum crisibus sonitus aurium euenerit: nullum ei negotiū facessere oportet, quippe statim magna

gna ex parte finiuntur. Sin autem post morbum perseuerauerit, absynthij decocto vbi aures foueris acetum, rosaceūque infundi debet, vel raphani succus cum rosaceo, aut veratri nigri cū aceto. Ad veteres autem sonitus, qui ex crassis glutinosisque humoribus creantur, inde verò illos cognosces quod non subito, sed paulatim crescunt, nascunturque; aceto, nitro, & melle aurē illinito. A L I V D. Veratri albi drachmæ duæ, castorei totidem, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim. ex aceto cōtrita, in pastillos digerito ac vtitor.

Ad veteres sonitus, & tinnitus.

EUPHORBIVM cum cyprino oleo leuigatum, calefactumque; vsurpato, in quibus autem ob multam sentiendi facultatem vapores, & flatus sursum distribui percipiuntur, castoreum, & cicutæ semen tritum cū aceto instillatur.

Ad grauem auditum, & surditatem.

QVAE ab origine quidem, vel etiam post natalem diem, sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio illidi possunt. Quæ verò non absolutæ quidem, sed diurnæ tamen, & ipsæ curationem non recipiunt, aut certe difficillimam. Quæ ob biliosum humorem sursum vergentem nascuntur, vacuationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur, quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, vel grauem auditum, venę incisione curato, aut omnino purgatione, ex Hiera, tum apophlegmatismis & errhinis. item balneis sua sponte scaturientibus, vel ex aqua marina. Porro in meatum vbi facultas audiendi est, conuenit instillare, quæ ad sonitus tradita sunt. Priuatim verò hæc: vrinam & fel caprillum, aut seorsim fel, aut rutę succum cum melle, aut castoreum, cum oleo anethino: & hyssopum medicamentum cum nardino vngvine, vel caprillum fel cum galbano: vel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, veratri albi singulorum drachmam.

Ad contusionem aurium quæ θλάσις dicitur.

HIPPOCRATES quidem nihil ipsis adhibendum præcipit. Cum verò sæpe ab agrotis cogamur, vtendum est his. Myrrhæ, aloës, thuris, acaciæ, pari singulorum modo: ex aceto inunguntur aut panis calidi pars interior cū melle in

pila contusa obducitur: aut hoc: bituminis, thuris, aloës, cochlearum carnis, bulborum polentę par modus, ex aceto leuigata imponuntur. Quod si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, vel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deligaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris anfractui demittatur.

De parotidibus.

PAROTIS glandularum iuxta ipsas aures affectus est, materia morbi illic eructante, alias à capite humoribus videlicet in eo impactis: aliàs à reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari præsidiiis, quæ coactas sordes extrahant, vel etiam cucurbitula agglutinata, vel crebro fortuum vsu. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsequiturum est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigietur, è contrario iis quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, aut triticea, aut semine lini cū mulsâ, aut fœnugræci, aut althę, aut chamæmelorū coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi videatur, prius ipsum venę sectione vacuabis: modo vires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouendo sunt, nempe farina triticea cū pinguium ficorum decocto, vel oleo, tum medicamento quod ex poliline, & quod ex fermento confectum est. Vbi iam abscessus, ad suppurationem spectarit, vel cute ferro discissa pus excernetur, vel acri medicamento rumpeatur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis præparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam focus ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sanę etiã pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorū, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, vel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, vel marrubium cū sale. Induratas autem iam emollit & medicamē Mnasei, & Ariobarhanos. optimū etiam quod ex succo lini seminis præparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, vel seuo taurino,

no, vel bdellio, vel styrace, vel medulla ceruina.

Denarium & olfactus vitij. CAP. XXIIII.

Olfaciendi facultate oblata, si vox seruetur incolumis, ad priores cerebri vetriculos morbus refertur: qui aut ex intemperie sola noxam conceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem vox quoque mali contagiū senserit laboriosior quodammodo reddita propter ossa quæ à colatu ethmoide græcè vocantur, obstructa, affectum rursus malis quibusdam succis contractum esse censeo. Itaque cerebri intemperies, vbi ex notis sæpius à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remediis. humores autem apophlegmatissimis euacuare oportet: maximè verò vitior medicamentis quæ per nares valide educunt. & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas *ναλάρρως* græci vocant, adhibeto. Cum autem totius corporis humorum copiam suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera vacuatur. Ita quoque in polypode, & ozena faciundum est, deinde loco etiā affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Caterum polypus, tumor præter naturam in naribus oritur, substantia respondens polypodis caruncule: eiusdem verò naturæ est & sarcoma. Ozena verò vlcus est, putridum ex humorum acrium illuue creatum.

Ad polypodas & Sarcomata.

S Q V A M AE aris drachmæ octo, atramenti sutorij drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, veratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In vsu hoc est laudatissimum, nam tredecim diebus, insigne affert præsidium. benefacit & atramentum sutorium cum aceto. **ALIUD.** Malicorij drachmæ duodecim, atramenti sutorij drachmæ decem: chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubij, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, veratri albi drachmæ quatuor. sicco vitior. **ALIUD.** Diphrygi trito nares, linamentoque ex ellychniis contorto attinguntur, dilatanturque.

Ad ozenas.

M I S Y O S, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorij drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ aris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma vna, aceti sextarius. to-

tum in vase aereo coquitur. Vbi ad mellis spissitudinem venerit, ex carptis linamentis vitior. **ALIUD.** Aeruginē & aris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

Ad fædum narium odorem.

MYRRHAE, acaciæ, amomi singulorum drachma. melle cocto excepta summo nariū intersepto iubeto agglutinari. **ALIUD.** Amomi, myrrhæ, rosarum siccarum partes æquales, nardino vnguento exceptas illinito. Item benefacit aduersus fæditatem odoris, & malagma hedychoë cum vino admotum.

Ad narium ulcera.

CERVSÆ libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantundem, vel plumbi combusti. omnia verò lota esto, excipianturque vino, myrræoque oleo.

Ad ulcera quæ vocantur glycea.

ARGENTI spumæ drachmæ quatuor, ruta nouella totidem, aluminis scissilis drachmæ duæ. Myrræo oleo acetoque excipiuntur.

Quæ sternutamenta ciunt.

VERATRVM album, vel castoreum, vel piper, vel struthium, vel simul omnia: nō autem oportet inspirare, sed pinna, vel digito penitissime, in nasum demittere. vbi sternutamentum frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinū, vel rosaceū, vel glycelæum. Iam quæ odore mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desiccandum est. smegmatis ex nitro & pumice factis, vel etiam asclepio vocato vtendū, & Constantini sapone, & sale cappadocico, similibusque.

Ad sanguinis eruptionem, è naribus.

SANGVINIS è naribus profluuiū, quod febribus superuenit, secūdo volumine inter illas sum executas. De eo autē quod alia quacunq; de causa accidit nulloq; sisti potest remedio, in præsentia tractabimus. Chalcitidē cōtritā linamento ex ellychniis cōtorto, aqua imbuto, vel eo quod à genitalis humani forma priapifcon appellant exceptam, narium foraminibus demittes. Vel testam oui exustam admiscebis, & dimidiatam gallæ partem, vel lycio indico attinges. Vel fimi asinini cinerē inspirabis. Vel eius expressi succū instillato, vel molaris lapidis aceto extincti, vapor naribus attrahatur. Vel hoc quoq; medicamento obstruenti vitior,

Man

Mānnæ, thuris, partem vnā, aloës partem dimidiam. Candido oui liquore excipito: ac vtitor, per linamentum ex el-lychniis contortum, extrinsecus leporis pilis vnctiōi impo-sitis. Vel funiculum lucernarum in nares conicito. Vel cu-curbitulam leuē directē, quā sanguis profuit præcordiis magnā affigito. præcordiis autē magnā, & perseueranter admoeto. Vel aures valide obstruātur, frōs spōgæ ex aqua frigida foueatur. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur: cū sanguinis detractiōe: interim etiā venam incidere, si ni-hil prohibet, & summas partes vinculis excipere, præsertim brachia, & femora, sicut in venæ sectiōe fieri solet. Eadem motu cōcuti iubeto, manus verò fricatione, pedes autē ob-ambulatione. Nam venis indidē sanguine repletis, nariū va-sa deplentur. Item spongia in poscam frigidam demersa, na-ribusq; profluentibus à foris strictim adnota: id quod requi-ritur, subinde perfecit: melius autem proficit longo ex li-namentis intortis penicillo naribus prius subiecto.

Ad faciei vitia.

Quomodo facies à rugis asseratur. CAP. XXXV.

THuris drachmæ quatuor, fuci quod φῦχον dicitur græ-cis, drachmæ tres, argenti spumæ, piperis, singulorum drachmæ octo, omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto sol-uuntur, in pastillos redactis vtitor. A L I V D. Eburnei scobis drachmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portio-nes. Vtitor, quemadmodum est prædictum.

Ad faciem nigritias.

I R I D I S, vel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis ammoniaci, cornus ceruini combusti, thymiamatis am-moniaci, singulorum vnciæ duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac iterum aqua trita ante balneum illinuntur. A L I V D. Ptisanæ, erui, thuris, iridis illyricæ, aphronitri, sin-gulorum chœnices duo, costi, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ viginti. Quorum albumine, lacteque asinino subigito, ac vtitor veluti prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos.

Ad ephelidem & lenticulas.

T E R R A E cimoliæ torrefactæ, semicongius, aphronitri to-ssi drachmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, fel-lis taurini, eburnei scobis singulorū drachmæ octo. Leuiga-tis facies defricatur. A L I V D. Fecis drachmæ decē, erui farinæ

drachmæ decem, lomenti drachmæ decem, veratri albi drachmæ quinque, aphronitri drachmæ decem, alcyonij drachmæ decem, tritis abstergito.

Ad suggillata.

PER initia decocto fœnugræci postea & meliloti oculi fouens, Nilei collyrium diarodō aqua solutum illinito: deinde diasmirnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribitur, combustum, perungito, vel hyssopū cum aqua applicato. Vel hyssopo in panniculum illigato & calida aqua respersa foueto: vel acri muria, item raphani corticem cum melle detritum impones. hoc etiam veteribus efficax est. Porro ad verusta faciei suggillata, & liuores tordili partes duas, terræ samiæ partem vnā cum melle admoueto, cura adhibita ne exulceretur.

Aliud deterforium.

HYSSOPi, thapsiæ, calicis singulorum drachmas duas, ceræ tantundem, terebinthinæ drachmam iniicito, cauens ne exulcerationem excites, eoque frequenter tolles.

De varis.

EXIOVI sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illinito, vel argenti spumam cum terebinthina, aut olei candidi momento tritam infricando perunges: vel alumen fissile cū terebinthina, vel amygdala amara aceto macerata infricantur. In callum vero cōcretos varos, saponis gallici drachmis quatuor, thuris, thymiamatis ammoniaci singulis drachmis, aqua dissolutis perungito, & post horam eluito.

Ad varos, pilos, & aspredinem faciei.

CERAE drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, visci drachmæ duæ. Liquato vnā oleum superinfundens atque hoc medicamēto faciē abstergito, tollit enim radicitus. ALIUD Papauer detritum, vel pulegiū cum sale. acetōque applicato.

Ceratum thandis quo facies rubescat.

CROCI, erythrodani radices, faci, thuris, myrrhæ singulorum drachmæ duæ. Adipe vitulino, oleoque masticino excipiuntur: deinde illinuntur. Interposito tempore, spongia ex calente aqua facies abstergitur. Cæterum faciei remedia, etiam reliquo corpori conuenient.

De oris affectibus, & primum de dentium dolore. CAP. XXVI.

DENTium dolorem siue gingiuarum inflammatione, interim in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui

qui ad ipsos pertinet, oriri contingit. quapropter valentissimorum in hoc medicaminum vsus est. Atque inde plurima ipsorum quàm acerrimo aceto præparantur. At gingiuis propter inflammationem dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinum, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens. nam vetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, vt humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

Ad dentium inflammationem.

Os colluatur aceto, in quo decocta sit galla, vel halicabix radix, alterci semen, foliæve, vel pulegiū, vel solani succus, vel capparis radix, vel myrti folia, vel polium, vel cucumis sylvestris radix, vel rutæ folia cum oxymelite, vel cornu ceruinum, vel acetum scillites, vel pyrethrū, cum hyssopo. At erosionem experto denti, styracem cum opio imposito: vel sulfur viuum cum lycio: vel alterci feminis vaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborent dentes, myrti, lentisci, & gallæ decocto colluentur, vel rhus syriaci, balauſtij, vel malicorij. applicantur autem salis partes duæ, aluminis vſti, & aceto extincti tritiquæ pars vna: deinde vino perluuntur. porro gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, vel aloë cum vino eluuntur: vel rubi radice vino decocta: vel rhu syriaco. cruentis autem & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur, puluere attingito. At mobiles stabilit aloë inspersa, vel rhus syriacus, vel alumen scissile, vel galla, vel rubi radix per se, aut cum vino incocta.

Aliud ad dentes.

N V C I S viridis corticem terito, eiusque ius, cum habes, in id coniicito myrrham veram, & alumen scissile, vbi omnia in vnitatē coegeris, in vsu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & perſanabis. A L I V D. Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphis agria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes versans humorem in capite contentum elicies, dentemque sanabis. A L I V D. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniāq; oris vlcera depaſcentia Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo. vtitor sicco, aut

cum aceto, sine dolore dentes tollit, farina cum liquore tithymalli imponitur, & super hederæ folium accommodatur, ac per horam finitur, sua enim sponte dens conteretur. Dentium smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis latercularij triēs, salis ammoniaci tantundem, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum drachmæ quatuor, piperis grana octoginta.

Ad parulidas.

S V L F V R I S viui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingivarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppuratione cōuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis insertis distendetur. Epulis autem carnis excrescentia est quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet: nonnunquam cum febris & dolore. Quoniam igitur reprimi debet, utendum est, æruginè rasa priuatim: vel cum pari galla, vel fori combusto, vel alumine quolibet cremato, vel galla per se vel squama æris cum aceto diebus fat multis leuigata desiccataque.

Smegma dentium.

A R I S T O L O C H I A E radix combusta, cerui cornu combustum cum mastiches momento, sal candidus melle respektus & fici foliis inuolutus exustis que donec in carbones mutantur. A L I V D. Buccina sale respersa, vltaq; cochlex terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum modico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotundi flos, vel nardi spicæ, vel folium malabatri, vel iuncus odoratus angulosus, vel iris.

*Dentium candorem concilians, & oris suauitatem faciens
gingiuasque reprimens.*

P V M I C I S, salis costi, iridis singulorū drachmæ quatuor, iunci odorati angulosi drachmæ quinque, spicæ nardi drachma, piperis drachmæ sex. Tritis vtitor.

Ad stuporem dentium.

S T V P O R I benefacit portulaca commanducata, vel oleū quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, vel amurca in æreo vase cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem habeat. atq; vetusta si perungatur, magnū affert momentum.

Ad dentes attritos.

D E N T I B V S attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolo

stolochiæ sarmentorum quæ clematidis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

Ad gingiuas corrosas.

ROSARVM floris drachmis octo, gallarum drachmis quatuor, myrrhæ drachmis duabus, si gingiæ erosæ, & humiditatis vitio flaccidæ, colluantur, sanescunt. Idem præstat lac asininum, oliæ foliorum decoctum, acetum scillites: arida verò admota, ærugo ferri, cytini. Tumidas excrecentesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colymbadibus oliuis, calidum. calidum, vel lentiscinum, vel melinum amurcæq; discutit: sicca autem, ærugo ferri, vel æris, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum futorium tostum, cytini.

Ad disrupta labra.

AMVRCA cocta illinantur: vel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.

BATRACHVS tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maxime in pueris: itaque locus misyos, æruginis rasæ, pari pondere sicco perfricatur. Mento autem adhiberi debet medicamentum. Anthera, vel sphærion, vel ex ouis parygrum. In adultis remedium est venas sub lingua diuidere. ALIVD. Valet etiam ad oris vlcera, quas Græci aphthas vocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorum æquale pondus cum passo. os etiam his colluitur. ALIVD. Erui farina cum melle prius absterlis, delinitur, galla læuis cum melle, vel rosarum flores similiter. Vel oliæ foliorum decocto colluant.

Ad tonsillarum inflammationem.

SI in febris tonsillæ, & columella inflammationē senserint, gargarizare conuenit decocto furfurum, aut rosarum, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cum verò inflammatio remittit, consistitve, mel ipsis adiiciendum est, quod per initia facere non oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionem quandam concitent. Vbi in suppurationem conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsæ vel lenticulæ decocto, vel rosarum: idq; faciundum est, donec in totum soluatur: aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si pestifera tonsillis vlcera oboriatur, vtendum

dum quidem & præscriptis, sed priuatim exhiberi debet medicamen diamoron, ex aqua calida, vel aqua mulsa, quæ rosarū inspersum florē obtineat, vel costum, vel rhus sicca, vel decocta, vel glauci foliorum aridorum decoctum quod amarum est. optime autem facit, si succum, vt ad collyria vtimur, in mulsa dissoluis. ipsius autem fruticis sicci, si inspiretur, vsus est laudatissimus, aut si digito admoueatur. cura vero habenda est ne prorsus attingatur, aut certe leniter admodum. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritantiæve gargarizatur ex medicamento, quod ex dulci radícula quæ glycyrrize dicitur, constat: aut eo quod croco, vino scybelite, terra chia, & myrra componitur. deinde amylo, & tragacanto. Vbi iam constiterit vlcerum depastio, gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto. A L I V D. Ad tonsillas quæ post inflammationem induruerunt, *ἀντιάδας* græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius partes sex, mellis vni mistæ coquuntur, donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur. A L I V D. Gallæ omphacitidis vnciæ duæ, aluminis scissilis vncia, salis ammoniaci tosti tantundem. Puluere attingito. A L I V D. Gallæ drachmæ octo, mysos drachmæ duæ, salis tosti drachmæ quinque vtitor puluere. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirrum præferens.

De vua.

V V A si inflammationē experitur, gargarizandum ex iisdem, quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus, qualis est mali punici succus per cochlear, vel instrumentum, quod ab vua attollenda staphileparton appellant, subiectus, tum per se, tum cum melle affatim cocto: vel dulcis radix, mali punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radice cum melle illitus. iam hæmatites lapis vnam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum horum aliquo. Item spinæ ægyptiæ succus & alumen scissile. rosæ vero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, tragacantha, sarcocolla, amyllum: quibus vtendum dum magis vua prematur ab astringentibus cōstricta. vbi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod
viciū

vitium iam vnam Latini, *λύβρα* Græci propriè dicunt, gar-
garizationibus fidendum etiam iis quæ ex myrrha, & cro-
co, & iunco anguloso fiunt. Contusiones autem cauendæ
sunt. ob quod pinna potius perungere conuenit. compo-
situm vero hoc vtile est, rhus syriaci drachmæ octo, croci
drachmæ quatuor, costi drachmæ octo, rosarum seminis
drachmæ quatuor. Præterea gingiuis benefacit, linum ex
purpura marina, quod viperæ collo circumdatū ipsam stran-
gulauerit, deinde circumadigatur tonsillis, & colli vitiis, mi-
rabili quodam modo opitulatur, vt Galenus author est.

Ad sanguinis ex ore profluvium.

PORRI folia contusa imponuntur, vel sponsia recens
in picem crudam mersa comburitur, in puluerem coacta vi-
tor, ac valde vtile est remedium, & collutiones oris ex
rois siccis, aut viridibus. Ad hæc decoctum frigidum, vel
pampinorum vitis, vel lentisci foliorum, vel rutæ, vel ma-
lorum coroniorum, vel rosarum, vel vuæ acinorum, vel
lenticularum.

*De angina, eiusq; speciebus: vbi etiam de strangulatis: vel alio mo-
do suffocatis agitur.*

CAP. XXVII.

INterioribus faucium, pharynga Græci vocant, musculis
inflammatis angina accidit, quæ synanche Græcis dici-
tur: exterioribus, parasyranche. Eodem modo & in superio-
re gutturis parte, *λάρυγξ* Græci nominant, habet: cuius si
interiores muscoli inflammatione conficiuntur, cynan-
chem: si exteriores, paracynanchem efficiunt. Hæc autem
comitantur omnes. recta ceruice spiratio, dolor cum diffi-
cultate spirandi, nonnullis etiam febricula oritur, faciei ru-
bor, ceruicisq; & tumor in quibusdam os ægri apertum ha-
bent, & deuorare nequeunt. Cynanchicos vero strangula-
tus quoque interdum secutus est. Pueris raro talis affectus
oboritur, cum scilicet ceruicis vertebræ affectæ loco suo
excidunt. Verum illis ceu curationem non recipientibus,
ac deploratis, manum admoliri non oportet. Reliquis au-
tem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non subi-
tò ac semel, verum pluribus interpositis vicibus euacuabi-
tur. quippe cumulata, semelq; facta vacuatione, anima ipsis
deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum mate-
ria in affectam partem collectim prorumpit. Si per hæc non
leuantur, eas quoque venas incidere conuenit, quæ sub lin-
gua

gua sunt, vel ipsa quoque lingua scarificanda, si propensior
 foras cum tumore appareat. Aluus acriore clystere subdu-
 ci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes valide
 deligari, collum lanis succidis, vel etiam oleo imbutis con-
 regi, crudaq; farina ordeacea, quæ Græcis *ὀπὺν ἄβορον* dicitur
 modo cataplasmatibus obduci. gargarizandum verò per initia
 ex eis quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, vel sim-
 plici diamoron, † cum rhus decocto. Potius autem est dia-
 moron, quod sylvestribus moris conficitur. Deinde & com-
 posito diamoron, vel eo quod diacaryen à nucibus vocatur
 perungantur. Cum autem morbus viget, consistitq;, & nitri
 momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris viui, nisi
 acrimonia quædam prohibeat. item stercus caninum ari-
 dum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum
 est remedium: idque album maxime, item sylvestrium hi-
 rundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius pro-
 rogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc vires
 ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intenden-
 tes. Cucurbitula quoque, vel hirudo sub mento, & circa cer-
 uicem admoueri debet. utendumq; gargarismatis ex iride,
 hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus
 in mulsa decoctis, vel rutæ succo cum lacte, vel sinapi cum
 oxymelisse. Sin autem ex his quædam acrimonia percipia-
 tur, oleum ipsis quàm optimum calens exhibetur, aut rosa-
 ceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœnugræci gar-
 garizandum. Cibus sit triduo aqua mulsa, inde ptisanæ cre-
 mor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea
 perliquida, ac sorbitionibus utendum ex chondro, ubi deuo-
 rare melius cœperint, & cibus qui ægri viribus respondeat.
 Cum morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus
 & balneo credentur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo o-
 perietur, reliquaq; virium recolligendarum ratio, ut par
 est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam
 circa os emanat, manus admoueri non debet: si Hippocratis
 consilio acquiescimus. Alij verò vitæ restituuntur, aceti in-
 fusione & piperis, vel vrticæ seminis in aceto triti acerrimi.
 Verum quia ægre magnoq; negotio assumunt, compellere
 eos ratio est. Discussis autē colli ruboribus, statim sursum
 respiciunt, & ad se redeunt. simili modo in his qui naufra-
 gium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur.

Nam

Nam ita horum calor recreatur, refocillaturq;.

† In nostro codice est *ὅν ἀπεψύχτε ποίᾱς*, id est, cum decocto mali punici.

De grauedine, destillatione, raucitate, & tussi.

CAP. XXVIII.

Communis est hisce vitiis, excrementitij humoris ex capite in subiectas partes descensus: si in nares decumbit *λόρυξ* Græcis, grauedo Latinis appellatur: si in fauces, & palatum, simplici vocabulo *λαδάρρος*, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, vt etiam membranam internam quæ hanc integit, exasperauerit, rauca vox efficitur, vocaturq; malum Græce *βρόγχος* & *ἀσθρίκνον* Latinis raucitas: In quibus non solum ex capite, sed etiam vehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseveret, fluxioq; in pectus, pulmonesque defertur, tussis oboritur ipsis maligna, ac contumax. Iam & propter intemperiem subinde tussis accidit, interim ob calidam, vt in febribus: interim ob frigidam, vt aquiloniis diebus, eaq; magis sicca est. Iam vero aliis quoque morbis tussis nonnunquam symptoma efficitur: verbi gratia, pleuriticis, iecorariis, phthisicis, pulmonariis: Galenus itaque in diuturna tussi grandines quasdam ex pectore educi memoriam mandauit. Alexander autem calculum quendam grauem, qualis in meatibus vrinariis nascitur, post longam tussim expulsum: ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni vidimus, quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, vel destillationem concipiunt, his calor sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisq; humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesq; rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput vndique & frons distenditur: meatusq; ossium quæ à colo ethmoide vocant, clauduntur, ne vox deorsum per nares transiret: si verò longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc viridis. Quibusdam & febris superuenit: quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

Curatio destillationis, & grauedinis.

¶ *Y B I* calida præpollet intemperies: iis pugnandum est præfidiis

fidiis, quæ dolori capitis ex tali causa contracto cōueniunt. balneo vtendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi vero his proderūt ad sorbitionem aptati, oua forbilia, amyllum, liba dulciaria, quæ itria dicuntur, sesama, necnon amygdala. item nux pinea, & quæ ex lacte sunt bellaria: vina dulcia, non vetera. medicamentum diacodion linctu assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico vtendum cibo est, caput calefacientibus, tenuiq; substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum verò non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: intus nares thure, & myrrha cum oleo perunguntur, præsertim si perfriçtio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, vt lacineæ panniculorum combustæ, vel melanthium, vel cuminum vstum, illigatūque in panniculo. Iam cyphi silenaicum, id est lunare olfaciant, fronti que illinatur, cui simul vnum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutinabitur. Exempli gratia, Icesium, vel Oxera, vel Barbarus, vel Athena. Ad distillationē vero ex frigore ortam, & cyphi potus vtilis est. Thorax autem balsami liquore illinetur idemq; per lanas succidas cum styrace, & irino, vel anethino circumfouebitur. Cibus calidioribus, & ad concoctionem promptis vti commodum est, vbi iam materia concoquitur medicamen quod pituitā per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapa, atque eius generis consimilia.

Rauicitatis curatio.

RAVCITATI quam arteriacum & branchum appellauimus, competent quidem superius comprehensa, verum priuatim vbi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflammatoriam quandam affectionem experiuntur, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis per initia vtemur, donec inflammatio remissior euaserit: talia vero sunt quæ ex passo cretensi, tragacantha, gummi & amylo constant. Item pinguium palmularum decoctum. & dulcis radice cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirit. Item compositionum quas quod sub lingua teneantur, ὑπογλωττῖδας appellant vsus est. Ante omnia vinum hoc tempore circuncidendum: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, vinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte,

laſte, cum amylo, vel pane ſiligineo. Adhæc ſorbtiones ex amygdalis, butyrūmq; vtile. At ſi humor in particulas ſe receperit: tranſeundum eſt ad ea quæ valentius abſtergunt, cuiuſmodi eſt ferculū ex faba freſa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde braſſicam & porra probe cocta. medicamenta vero calidiora & ad tuſſim accōmodata proſunt, quæ conſtant ſapa ex ficis pinguibus confeſta, thure, iride, terebinthina, ſtyrace, galbano, pipere, cinamomo, caſſia & his ſimilibus.

De tuſſi.

TUſſiſ quoq; eadem ratione curanda. hoc ſolum inſpicitur num aliarum particularum conſenſu fiat vt gurgulionis diſtillantis, vel capitis, an aliis morbis coincidat. His ubi quàm fieri poteſt optime erit proſpectum, quemadmodum à me comprehenſum eſt, dicetūrq; in poſterum, tuſſiſ curationem molire. Compoſitorum vero præſidiorum enumeratione hic ſubieſta eſt.

Catapotia ad diſtillationem in fauces & tuſſim.

STYRACIS, myrrhæ, opij, galbani ſingulorum pares portiones. paſſo excipiuntur, vel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternave aut quina, noctu dormituro dantur: paſſumque ſuperbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem valent.

ALIVD. Alterci ſeminis drachmæ duodecim, nucleorum pineorum drachmæ ſex, croci drachmæ duæ. ſapa, vel paſſo in uſu excipiuntur.

Eclegma.

MELLIS vncia, butyri ſemuntia, ſimul incocta exhibentur: item ex hyſſopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctū ſorbetur.

Catapotia ad veterem tuſſim accommodata.

STYRACIS drachmæ ſex, myrrhæ drachmæ duæ ſemis, terebinthinæ, galbani, opopanacis, iridis ſingulorū drachmæ duæ, piperis albi, nitri, ſeminis alterci, lachrymæ papaveris, ſingulorum drachma, ſine vlllo liquore in pila tuſa in catapotia rediguntur: vtitor vt prædictum eſt.

Ad aſpredinem gutturis, tuſſim & ſputum cruentum.

AMYGDALA amara, quibus cortex ſit detractus vigin-
tiquinque, ſeminis lini torrefacti drachmæ quatuor, traga-
canthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti,

luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum vero passum excipitur: si verò & sonus vocis fuerit oblatus, mel miscetur in passu vicem, & praesertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

Arteriae quae quod sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad abscissionem vocis, raucitatem. item ad eos qui agere reijciunt, anaphoricos graeci nominant.

TRAGACANTHAE drachmae sex, gummi tantundem, myrrhae drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana viginti, croci drachma una, dulcis radice succi drachmae sex, palmularum trium caro, passu cretici, quantum sufficit. Atque succus tragacanthae solus ipse sub lingua loco dulcis radice succi retentus. Eiusdem decoctum dum spissitudinem habeat quadruplum inditur.

Arteriae, ad abscissum vocis sonum conuenit, & eos qui vocis exercitio vtuntur.

PORRA sex coquito, usque ad tertias, atque ipsa proiicito, iuri ipsorum succum alicui admisceto, mel & ouorum prius decoctorum lutea tria simul incoquito, circumagittans anethi ramusculo.

Compositio ad tussim, graece bechicon appellatur.

PVLEGIJ sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini seminis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto excipiuntur. ALIVD. Hyssopi, pulegij, piperis singulorum uncia, petroselini semuncia.

Medicamentum tussim veterem concoquens.

MELLIS drachmae sedecim, terebinthinæ drachmae duae, galbani drachmae quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabae magnitudinis, nucisve auelanae, atque ex his delingitur. ALIVD. Aridam tussim curant tum arteriacae medicamenta, tum aquae nonnunquam feruentis sorbitio. nam dum propter pituitae crassitiam non creant, reijciuntque, humectantibus aliquantulum iuuantur. ceterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinci nuclei decoctum.

Pastillus à fumo dictus capnistos ad tussim continuam.

STYRACIS, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam, sandarachae scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proiicito fumumque excitato, ut tussiens hunc

hunc per infundibulum aspiret. conuenit & qualemcunque perfrictionem expertis.

De orthopnœa, suspirio, & spirandi difficultate.

C A P. X X I X.

Qui febris expertes, crebro veluti à citatiore cursu respirant, ab accidenti quod superuenit nostris suspirio *ἥ*, Græcis *ἀσθματικὴ* appellantur, idémq; hinc quòd omnē figuram totius thoracis rectam seruent, strangulari metuētes, orthopnœici dicūtur. creatur hoc mali cū fistulosæ pulmonum cartilagine crassis, glutinosisq; humoribus fuerint infarctæ. spirandi autem difficultas cōmune est symptoma, quod & his, & aliis cōpluribus affectibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est, vt per extenuantia, abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor, & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites, & oxymelitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta læuigataq; cum melle. Ex antidotis hiera, & purgatio cōtinua ex validissimis medicamētis petita, à radícula vomitus, aristolochia rotūda pota, cētaurij magni radix, spondylii semē, radixq;, calaminthæ semē hyssopus, iris, melanthiū: asellorū qui sub aquariis vasis agunt sextarius in vas fictile cōiectus, carbonibus subditis frigitur. Vbi candorē acquisierint, terūtur, & melle cocto excepta mystri mensura ante cibū secundūq; ipsum datur. Quòd si necessitas vrgeat, etiā vena ante hæc omnia incidetur, & quantū vires patiūtur sanguinis detrahetur: aluus clysteriis sollicitatur, Thorax aforis, ficubus & lolij farina obducendus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Inspergatur autem ipsi iris & manna. Non inutilis est & farina ordeï cruda, cum resina, cera, iride, & manna. vnguentis autem vtendum calidioribus, irino, anethino, rutaeco. Sed quod subscribitur medicamentum, huic vitio propriè dicatum est. pumicis pars vna, fæculæ, quæ est vini fæx combusta, partes quatuor, auripigmenti pars vna, iunci rotundi floris partes duæ, alcyonij pars vna, aphronitri partes duæ. Contusa incernuntur, vnguentisq; excepta, thoraci infricantur. Malagmatis vtendū est quæ serosas superfluasque sanguinis humiditates, græci *ἰχθυῖς* nominant, possunt extrahere.

Potio suspiriosis apta.

P O L I I, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammo-

m 2

niaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur, **ALITER.** Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIUD.** Aphronitri drachmæ nouē, piperis drachma, silphij drachma semis. Cochleariū ex aqua datur. **ALIUD.** Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorū drachmæ sex, piperis grana viginti, passo excipiuntur. Instar fabæ cum mulsæ exhibetur. **ALIUD.** Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterij semiobolus. Totum in pastillos octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui prefocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumentur, ac cum cardamomo nonnunquam, subito auxiliatur. benefacit etiam coxendicibus.

De peripneumonia.

CAP. XXX.

Peripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimū ex valentibus in eam partem distillationibus, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide aliūve morbis contrahitur: Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens, grauitas distensioq; pectoris tumor & magna repletio faciem occupat, materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum nutant, tunica oculi ceratoides, ob cornus imaginem dicta, in pinguedinem languescit. Cum vera signa ad æstum flagrantiorē declinare videntur, pulmonis inflammatio Erysipelatis naturā resipiens, subesse existimabitur. In iis igitur qui ex aliis morbis huc decidunt, sanguinis detractio vitanda est, maxime si diu hoc in statu fuerint, vel si per initia sanguinem dimiserint. Verū alius in morbi remissione clystere ducenda est, si ægre respondet, aut cucurbitulæ, ubi nihil obstat, pectori, & lateribus admouendæ sunt, eaq; prægrādes, & multæ, cute incisa. Sin autē peripneumoniæ affectus statim ab initio inuaserit, sanguinē mittere, suffragantibus qui huc requiruntur, numeris, ex vsu est: sin minus, cucurbitulas certē defigere: quibus tantū elicietur sanguinis, quantum vires patiuntur. Quod ad cibū vero attinet, danda est sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle, vel ex amaris amygdalis cū similagine, aut chondro, dulci quadā portione admista, hydromalo, vel apomelite, vel hydrosafoto. Rectē sumitur & recens butyrū, cochlearibus circa tribus.

bus. Propinatur autem ipsis ficuum cum hyssopo decoctum, vel iridis in mulla cocta, vel leuigata instar duum cochlearium mulsæ insperforum. Hoc itidem, ab inferioribus partibus expurgat. At virtutis tuendæ gratia, crebrius potui assumetur, mulla per se & cum nucleis pineis, ac cucurbitulæ vniuerso thoraci lateribusque agglutinabuntur. Ceratum verò cyprinum quod contineat iridem insparfam, imponetur, vel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, vel epithema ex cera, resina medulla ceruina, butyro, & sypo medicamento, iride sicca, & nardina vnguento.

De cruentis sputis.

CAP. XXXI.

CRuentum sputum si disrupta vasorum commercia excitant, multum sanguinis euacuabitur. Et quidē modo manifesta ex causa, vt alto delapsu, clamore, & consimilibus, modo ex occulta, veluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id venis rumpendis esse habile scribit Hippo. Si verò exesa parte aliqua sputum cruentum æditur, nō cōfertim sed paulatim sanguis reieicitur, sic vt acres quidā prauiq; cibi, vel inedia, vel acris ex capite destillatio præcesserit. At si ex adaperitione, ἀναστέμνωσις appellant, nullum quidē ex prædictis, præterquam plenitudo interdum præcedit, sed victus humidior, calidiorq; balnei immoderati vsus, calidī nimis loci inhabitatio morbum facere videbitur, & neque inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur: sicut in iis euenit qui exeso vasorum corpore, διαβρωσις appellant, sanguinem reiciunt: Imo contra leuius faciliusq; agent (vt verisimile est) euacuati. Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua, nō respōderint, etiā periculis, erumpens sanguis subtrahet. Idem verò hic pariter iis qui ex vase plenitudinis causa rupto vacuantur, satis ad valetudinē proderit, nisi ex vlcere, aut immodica vacuatione noxam senserint. Quæ verò exesis vasorum tunicis sanguinis sit euacuatio nunquam cōmode cadit, facitq; valetudini. Quod si per vomitum excreetur, clarū est eum ex stomachi, aut ventriculi regionibus procedere. In quibus & per annū infra descendens nonnunquam vacuatur. Si cum tussi, ab instrumentis respirationi dicatis prodit. Iam verò si spumans & subalbidus sit ex interualloq; reieicitur, vt dolor absit, & pressio, ex pulmone ferri notum est: In quibus temporis spatio, febris sequetur cōtinens, præsertim iis quibus ex erosione profluit,

& non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriae asperae circulus qui *βρόχιον* dicitur, aut vena egeratur. Notus certe quidam mihi est ex iis qui sanguinem è pulmone reiciunt temporis processu maxima cum tussi, & sanguinis copia, calculos quatuor, aut quinque; expuisse asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est. paulo post tabe consumptus interiit. Porro si pituitosa cum tussi leuiore, vel scretu quoque; adantur, eaque; spumosa leuiorque; ex aspera arteria prodire scito. Si vero ater sanguis & in grumum coaceratus fuerit dolorumque; in loco restetur, ex thorace educi significatur, per pulmonem arteriamve translatus: Qui vero scretu, ex faucibus per palatum educitur. Ceterum si quando a capite destillet, cum irritatione quadam, & tussi aditur, ut qui ad asperae arteriae caput defluat: iterumque; sursum feratur. haec acris plurima ex parte distillatio, vel capitis dolor, vel grauitas praecedat. Accidit autem nonnumquam per palatum sanguinem vacuari, & propter hircudem deuoratum, & alicui indidem particulam adhaerentem. Verum de hac in libro de venenis pertractabitur.

Curatio.

Quibus distillatio cruentum sputum concitauit, vena protinus debet incidi, nisi vehementer acris humor destillauerit, ac pro virium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque; veteri calido. vel sycionio praeter caput perfricari. cibis adhiberi. frumetaceus cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granati, pirorum, malorum, vel illa eadem simul incoquatur. dormituro ex pastillo diaelectru datur tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si morbus longior haec vicerit, capiti raso medicamentum, quod ex fimo syluestrium columbarum constat, imponis, & post tres horas medicamento deposito, balneo egrum committis, sic ut caput nequaquam inungatur. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnum capto, Theriace antidotum datur, iterumque; die insequenti, ubi dederis, similiter totum corpus, praeter caput perfricato. huic autem ceratum ex thapsia, aut aliud quoddam iniicietur. & rursus utendum sorbitionibus. Quod si malum in vetustate incidit, cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio, sanguinis detractio caueri debet: alimentis autem & praesidiis iis tum quae supra, ubi de distillatione egimus comprehensa sunt, tum,

rum quæ mox dicentur, vtendum. Qui ob frigoris iniurias sanguinem spuunt, thorax illis fouendus est remediis, quæ calfaciunt ipsum simul & desiccant, quod præstat medicamentum diadyopeperion, id est, quod duplici pipere constat, vna cum pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitum. Atqui ex respiratoriis sanguinem reiciunt disruptis oris venarum aut patefactis, venam iis secare conuenit, nisi sanguinis copia prorupat. omnes autem quos hoc vitij premit locis aëri expositis decubent, lecto immobili, figura sublimi, cauentes ne vehementer respirent loquanturque; imponenda autem extrinsecus supra partes affectas, spongia ex repente posca. A septimo die lana succida cum rosaceo, vel myrteo, vel lentiscino, cui interim acetum interim vinum austerum sit additum: si copiose effertur, farinam pollinem, & mannâ thuris cum aceto superaccomodamus; vel alumen, vel acaciam, vel malicorium, vel gallam cum aceto, vel palmulas cum polentis, & malis cydoniis in vino austero decoctas. post hæc autem & emplastrum diateon hoc est ex salicibus iniiciendum, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta proficiunt. portulaca commanducata benefacit. efficacior autem succus ipsius epotus, balauftium, rubi fructus & flos; quercus membrana cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tunica, maxime vero cocta ipsa vtuntur: fagi autem & ilicis membrana præstantiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad omnem sanguinis reiectionem. Item lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimum pollinem detritus cum succo mali punici, vel polygonij. pondus autem lapidis erit scrupulus vnus. Composita medicamenta hæc prosunt, pastillus diaelectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur. item puluis confectus ex terra samia quæ ἀστὴρ dicitur, lemnia sphragide, corallio, simphyto, amylo, omnibus pari modo. In his autem qui corrosis partibus expuunt sanguinem, idque potissimum, vt desillatio præcesserit & opij partem semissem adiicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samij asteris, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus plâtaginis succi cyathis. A L I V D. Lemnia sphragidis drachmas sedecim, samia terræ, quæ aster dicitur drachmas octodecim, amyli drachmas octo. sarcocollæ drachmas quatuor gummi drachmas duas, pulueris cochleare vnum cum decocti palmarum

larum cyathis duobus. Superbibant autem etiam poscam frigidā, vel palimularū, vel malorum, vel pirorum, vel pampinorū vitis, vel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur vero, si vires quidē requirant, ad secundā tertiāve horam, sin minus circiter quartā. Panis sit lotus ex aqua frigida, vel alica, vel chondrus, cū quodā succo refrigerante, puta mali granati, vel myrti, vel omphacomelitis, vel ova sorbilia, vel aliquod ex lacte bellarium, cum quodam astringente. Inter olera, seris, cichorium, plantago, cum oleo immaturo, acetoq; incocta. Ex fructibus mala, pira, mespila, malum granatū, corni fructus potus erit si febris careāt, vinum aquosum, modicū: si febris adest, ex prædictis quædā potio, vel hydromalum cibariticū. Porro qui vomunt sanguinē, iisdem sustē tandi, sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumāt: quippe ex facili curantur: quandoquidē auxilia etiam quæ bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam appropinquant. At sanguine in ventriculo grami instar concreto, coagulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuium ex fici cinere, cū aqua, vel thymū, vel satireia cū aceto, vel etiā ex lacte scissili vacuari debēt, aut ex aloe. Rursus qui per palatum scretu sanguinem reiiciunt, gargarizabunt ex astringentibus, frontique & capiti admouenda sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Hęc eorum qui sanguinem expuunt curatio est, quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica vacuatione periculum: siquidem copiose vacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert præsentaneam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, vt postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor substituerit, vires ipsis recolligendæ sunt, roburque adhibendum, ac recentium porculorum petunculi ac cerebella huc faciūt: corpus perfricari debet. vitari autem, balnei frequens vsus, & vini potio, ira & venus.

† Scriptura quæ est in veteri codice est multo verior, *μετὰ τινος τῆς σφόντων χυλῶν οἷον ροιᾶς ἢ μύζων* &c. id est, cum aliquo succo adstringente.

Depurulentis & tabe quæ phthisis dicitur.

CAP. XXXII.

Pris illuies quod *ἐμπύημα* græcis dicitur, in va cuius thoracis regionibus, vel membrana quæ costas succingit, colli

colligitur. interim propter sanguinis educationem, vlcere ad cicatricem non perducto, quod etiā tabes statim comitatur si ex pulmone fiat reiectio: Interim ex inflammatione suborta: quæ deinde in abscessum conuersa, rupta que fuerit, quæadmodum & in laterum doloribus, quam pleuritidem vocant, nonnunquam accidit: vel propter confluxum ex capite manantem. notæ igitur empyematis adhuc consistentis erūt, grauitas thoracis, tussis valida, siccaq; cum dolore, aliquando etiā cum humiditate, ob quā releuari quoq; videntur, febriculæ per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam vero abscessus ad vomitum inclinauerit, vehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate conturbantur, spiritu molestati. Rupto abscessu, pus educitur, nunc purum, nunc faculentum. & nonnunquam sursum abscessus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Ac ea quæ inferius tendunt, partim in ventrem & intestinum transsumuntur, partim in vesicam traductione per vasa quædam administrata. semper autem febris hæctica laborant, quoad sursum omnia fuerint educta. In quibus, nisi summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio in rabem quam phthisin græci vocant transit, pulmone exulcerationem sustinente. In qua iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desudationes in fronte, ac ceruice fiunt, carnes colliquantur, vngues curuantur, pinguesque & exalbidi vel pallidi apparent. Malo iam vincente, venter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos magis conficit, cibi que fastidium vrget, & id quod sursum vergit, vehementer fædi odoris est.

Curatio.

PRIMUM igitur puris collecti concoctio adiuuanda est fomentis per spongiæ, & cataplasmatibus, ex hordei farinis cum sicis pinguibus incoctis, resina modica, columbarum fimo, nitro, & hibisco. Rupturâ vomitæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autem sorbitio interposito tempore, & prisanæ cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thimi cum melle. opitulatur etiam rupturæ, & salsamentorum esus, & catapotia hieræ diacolocynthidos dormituro data. At vbi pus excerni cœperit, iterū dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis decoctorum

in mulsa potio, vel dulcis radícula cum sisamo detrita. Item pollen, mulsa & oleo incoctus superaccommodatur. Quod si vlcus agre possit sursum repurgari, compositis vtendum est, puta medicamento dia prasiu, hoc est ex marrubio, simplici & composito. item, dia orobon, id est, eo quod eruis constat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verū in tabem quæ phthisis dicitur prolapsis, porra capitata, quæ in chondri & ptisanæ sorbitionibus contabuerint, exhibentur: quæ simul per se bis cocta offeruntur. Potus autem aqua cœlestis erit, atq; mulsa inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem remissionum, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto fœnugræci, vel maluæ, olei, mellis & foliorum althæe. temporis autē processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride trāsitus est. quin & emplastri Mnasei vsus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectum recte imponitur. atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaque composita ipsis propinātur. Tussi vero grauitè affligente, thymum, hyssopum cum succo radiculæ dulcis melle decocto excepta, formataque, sub lingua tenenda dantur. Cæterum conueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod viperis constat. Optimum vero auxilium est, & boli armeni potio. item Esdræ Antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

De laterali dolore, quæ pleuritidis dicitur. CAP. XXXIII.

Pleuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflammatio est membranæ, quæ costas succingit. Huic si mul accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor vsq; ad iugulum & præcordia pertinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua etiā omnia modo comprehensa apparent, his notis discernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adsit, tussis aliàs sicca, cum & crudus morbus significatur, aliàs cū spūto, quod humoris qui morbum facit index est. Rubrum siquidem & subcruentū æditur, cum sanguis superat. Flauum vero & subpallidum, cum flaua bilis: quemadmodū rursus album, & leuiter spumofum, cum pituita. Ob melācholicum vero succū: nigrius pulsumque durum & ferræ modo inæqualem obtinēt. Iocinoris autem inflammationi, neque punctorius dolor, neque pulsus adeo durus superuenit, verum tussis perpetuo
sic

sicca & quæ nihil emolitur, male habet : facies pallidior apparet. At quibus pleuritides ex musculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ proprie pleuritides non sunt, iis cum eò quòd sint sine tussi, sine sputo, ac sine pulsus durtie, ad manus tactum locus affectus indolescit: atque si tumor purulentus non fuerit discussus, extrinsecus incidi postulat, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eò non feratur. Illa nanque, nisi vel extra, vel intus, expurgetur, purulenta colluies empyema Græci vocant, multo citius in peripneumoniam degenerat.

Curatio.

I T A Q U E si dolor ad iugulum vsque peruenit, remediũ est sanguis dimissus. sin autem ad præcordia descendat, purgatio. Recetiores autem omnibus venã incidunt, veriti, vt opinor, turbationem, quã purgatio solet accersire. Quod si vires non patiantur, neutrũ facere oportet: clysteribus acris vtendum: & si quidem dolor fuerit mediocris, aqua mulsa, & ptisanæ, vel chõdri cremor propinari post illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porrum cremoribus recte iniicitur, vel calamintha, vel pulegium, & vrticæ semen, cum melle delingitur. Porro vehementes dolores à corporis vacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulfurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in vesicula. Lana sçq; succidas imponere vtile est cum oleo & vino ex marina præparato. Vel sal iniicere, vel cataplasma diaspermon id est quod semini- bus constat ex decocto chamæmeli, altheæ, vel ficorum pinguium, iridis, absynthij, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momento à septimo autem linctus ex amygdalis, & vrticæ semine, ex melle simul contritis dabitur, vel eclegma quod ex butyro, & melle coctũ est, vtẽdumq; medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci vocant hypoglottida. Epithemata cõuenient cũ quod à graui odore dysodes nũcupat, tũ diasampsuchu, id est quod cõstat amaraco. Itẽ emplastrũ peganera dictũ, locis dolentibus vtiliter accõmodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequẽter fuerunt abunde. Aluo iniici debet ab inferioribus partibus butyrũ & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu pices.

piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent vigiliæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & aliis ad hoc compositis vtetur. Post quartūdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admodueri, tenuiorq; seruari victus debet. Deinde morbo inclinante balneo æger credetur, frigus vitabit, solidiore vtetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire videatur, supra commemoratis vtendum.

Ad laterum dolores sine feбри.

LATERVM doloribus sine feбри, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarū cineri adipiq; mixta. Nam id medicamenti affatim discutit.

De cordis affectibus.

CAP. XXXIIII.

CORDIS affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortē præcipitat: nempe cum inflammationem, erysipelata, & interperies validas in acutissimis febribus ipsum experitur, vel sanguinis profluum ex sinistri potissimum ventriculi vulnere. At si consortij lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore ventriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq;, & alias plerasq; causas, syncopen appellatam, quæ subitus est viriū collapsus sustinebit, quæque indicatur, animæ defectu, pulsuum paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circumfluo. Quæ inquam syncope, si valida est, medicinæ locus non est. Si vires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Itidem valentes cordis palpitaciones sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem vero cor si incaluerit, magnam crebramq; addit respirationem. si perfrixerit, paruam & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emendari, secundo volumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum vero hic adiciendum est, si symptoma euincit, postquam extrema perfricata fuerint, inunctaq; & post puluerem ex pauimento iniectum aliaq; virium recreationi apta, particulis sudore diffatis iniicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, vel cimoliam cretam, vel succinum, vel malicorium cum manna, vel terram samiam cum gummi. Extremis autem frigentibus adusque inguina & alas sinapi,

pi, vel pyrethrum, vel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua, aut vino frigido temperato, suum petunculi, articuli, rostra, alæ, omniaq; frigida. Capiti frontiq; omphacinū, aut astringens aliquod cum gummi, vel rosarum decocto imponetur. Præcordiis & stomacho cataplasma admouebitur ex palmulis, rosis, cœnanthe, acacia, hypocyfide & alumine.

De palpitatione cordis.

NOVI (Galenus inquit) qui annis singulis verno tempore, cordis palpitatione affligeretur. Aduersus quam venæ sectionem triennium expertus commodam, quarto anno sanguinem prius misit quàm symptomate corripere, atque ita securus fuit, eoq; modo multis subsequentibus annis factitauit, & cōuenienti victus ratione vsus est. attamen & hic ante senectutem, fato functus est, quemadmodum alij quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierunt. alij ipsorū etiam citra synopen, veluti apoplexia tentati repente diem obierūt. Complures ita affectorum ætatem egerunt, minorem annis quinquaginta, maiorem vero quadraginta.

De mammillarum affectibus.

CAP. XXXV.

Ac à partu sæpe casei modo coactum mammillis inflammationes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. Spongia mollis posca tepente imbuta, expressaq; loco appositè superaccommodatur illigaturq;: vel palmulæ cum pane ex posca in læuorem contrita, vel ouo toto vtendum est cum rosaceo, & cerati momento, vel alumen, psylliumque cum coriandro, vel portulaca applicato. Vel lapis pyrites tritus cum cerato impositus illigetur. At distentione oborta, vel lacte in grumos concreto, panis ex hydrelæo, aut mulso instar cataplasmiatis iniicitur. Aut panis cum perdicij herba viridi simul cum cerato, bis quotidie, aut lomentum cum hydromelite, vel sapa applicatur. Quòd si vero pòdus ferre non poterint, superfusione vtendum est ex dulci oleo calente, per lanas deliciores. Fetus autem adhibendi ex vapore calidæ aquæ, vel decocto fœnugræci, vel altheæ, vel apij seminis. Delinere vero māmillas conuenit polline farinaceo cum semine lini, aut fœnugræco cum hydromelite, aut sesamo quod cum melle aut butyro sit leuigarum. Cæterum ne lac exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc citabitur. Inclinante autem inflammatione,

*ad sac
est m. v. d. g.
ad m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.
et m. l. l. g.*

matione, cerata hæc recte induces, betam oleo incoctam quoad intabuerit, ipsam quidem proiicito, oleo autem ceræ modicum iungito, ac vtitor. *ALIVD.* Quorum crudorum lutea decem, cerato miscentur, cui vnciæ duæ & semis ceræ, rosacei vnciæ quatuor sint adiectæ. Postquam radícula agitaues, muriæ quantum recipere potest indito, & rursus vbi permoueris, vtitor. Porro ad mamillarum duritias, facit & medicamentum ex melle: tum omnia medicamenta molliendi facultate donata. Cum vero in abscessum vertitur, iis vtendum est, quæ in parotidibus comprehensa sunt, item illis, quæ, vbi de ascessibus tractandum erit, enumerabimus.

Archigenis de erasione mamillarum cum malignitate.

VINI Adriani boni sextarij viginti, rhus quo coriarij, vtuntur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacinx nigrae selibra, casia tantundem. Contusa vino diebus decem commadescant, deinde coquuntur agitata cupressi rudicula, donec dimidia ferè pars fuerit absumpta. atque tunc herbæ proiciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde vitreo vase reconditur. In vlceribus depascentibus mero vtitor. Sin autem crassius fuerit medicamē, vino liquari debet: vt applicetur mamillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis ex humiditate putridis, intestinorum torminibus. Idem vero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammaram exulcerationes communem reliquis vlceribus curationem recipient.

Quomodo mamilla conseruentur.

CVMINVM cum aqua tritum mamillis obducitur, deinde spongia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cumino deposito, mamillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idq; ter mense facito. *ALIVD.* Cicutæ in pollinem detricta, ad nouem dies imponitur: spongiaq; extrinsecus, sicut comprehensum est: pauculis diebus interpositis idem facito: *Quin & Naxiæ* cotis detrimentū, virginum mamillas conseruat tueturq;.

Ad fædum axillarum odorem, sudationesq;.

ALVMINIS liquidi partes duæ, myrrhæ pars vna. Vino dissolutis vtitor. *ALIVD.* Plumbaginem combustam, vinoq; odorato extinctam, ex vino terito, myrrhæ momētum iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac vtitor. *ALIVD.*

Argen

Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duæ, amomi drachma. vino excipiantur. ALIVD. Aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. vino leuigatis vtitor.

De stomachi, præcordiorum & ventriculi affectibus.

CAP. XXXVII.

DE cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quam Græci bulimon vocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, vbi de febribus tractatū est, abunde disseruimus. quare de eisdem rursus dicere opportunum non est. At inflammationes oris ventriculi, & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nam si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, vitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adiicitur astringēs aliquod, verbi causa, absynthium, vel nardinum unguentum, vel melinum, vel & malum cotoneum incoctum. Ceratum vero eius notæ est quo subinde vtimur, ceræ candidæ vncia, per æstatem drachmis septem, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, vel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in vsu satis est. Sin maiorem requirat astringentiam, vbi tam fuerit imbecillis, vt ne cibus quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacij drachma, aut absynthij succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, cenanthæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionem respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indurescitq; , varia iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis nonnihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato *ivvñlis* dicitur, & viridis iaspidis torques à collo suspensus, vt stomachum contingat magno est præsidio. In calida autē stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, vel animæ defectu, vel quodam cibi fastidio, ex quacunq; tandē occasione, præterquam febri, aqua frigida cum vix acerbæ succo propinatur, vel malorum cotoniorū decoctum, vel pampini vitis, vel semen cucumis leuigatū cū frigida. Verum stomacho vesicā aqua frigida repletam, vel
cucu

cucumeris ramēta imposito. Catapotia quæ siti restinguenda sunt, danda, ut supra de siti à nobis dictum est. Porro medicamen quod stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigeret confirmetq; , istud est. Rosarum viridium foliorum drachmæ sex, dulcis radiculae succi drachmæ quinque. vino dulci excipiuntur, & ut sub lingua teneri possint, formantur. Cæterum in quibus crassior pituita calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentum proficit, fœniculi radicis corticis vnciæ duæ, aceti sextarius vnus & dimidius, aloes quadrans, mellis libræ quatuor. Radices cum aceto coctæ exprimuntur, abiiciunturq;. Mel autem inditum ad spissitudinem vsq; coquitur, & tunc aloë trita inspergitur. Tria huius cochlearia cum aqua sumuntur. quidam vero sine aloë ipsum præparant. iam vero medicamentum diacalaminthes his idoneum est. Quibus autem cibus acescit, coriandri seminis drachma, polentæ modo inspersa commode bibitur, vel mastichæ cochlear, vel lactucæ albæ seminis cochlearia duo. Compositum autem hoc est, piperis drachma, anethi drachmæ tres, cumini drachmæ quatuor. trita cochleari vno noctu sub somnum ex vino temperato præbentur. Porro in quibus atra bile vitiosus est stomachus & inflatione laborat spongiæ in accessionibus oleo acerrimo imbutæ applicentur. Deinde si malum remanserit, alumen cum are læui, melle exceptum admouetur, sereos succus bibitur, vel menta potui inspergitur. Si flatibus turgent stomachus, & distenditur, calaminthes decocto, mediocris mellis piperisq;, mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleorum succi partes tres, mentæ succi pars vna. Vbi coxeris quoad in vnitatem coierint, ante cibum, mystrum vnum dato.

Ad stomachi salinam.

ACETO scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut summitatis oleæ decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ipso deuoratur. Inter omnia præsentissimum est, aloë aqua diluta. Ad eos autem qui cibum non continent, quos veteres proprie stomachicos nominant, fœnugræci farina melli mixta, & malux semen tritum aridum applicatur. ceratum vero ex cera, irini olei facce & castoreo.

De cibi fastidio quod Greci ἀρεγξία vocant.

FASTIDIUM, quod anorexia dicitur est, cum stomachus

chus aut intemperie viciosus, aut humorum redundantia pressus cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosi, oletosiq; ructus, si cibus quodammodo præter voluntatem sit assumptus. item si frigidiora potius & elaboratu peruicacia, hac detenti queant concoquere. Frigidam contraria indicant. neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frigida susinent, & acida nonnunquam eructant. Qui humorum vitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem ac rosionem illorum ita laborantes, ventriculi demorsu torquentur. nauseaq; magis & siti conficiuntur. Quibus autem humores cõputruerint, interdum ij etiam febricitant. At quos crassi viscosiq; succi male habent, ij plane nec rosionem ventriculi, nec sitim experiuntur. communiter autem omnibus superuenit nausea. porrò si in ventriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos euomunt. si vero, infarcti vel etiã imbibiti tunicis adhærescunt, nausea solũ, non vomitu premuntur, præterquam cum cibos assumpserint. Qui igitur ex calida intemperie fastidio laborant, refrigerante victu curantur, præcipue qui ex aceto assumitur. Panis ergo posca imbutus elui, ipsaq; posca potui datur. Item ozigala, & quã Romani melcam appellant, quod ex lacte quoddã est opsoniũ, intybi & portulaca, interim etiam aqua frigida, omniãque mediocriter secundum eius quæ subest intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum vsus, non modo nõ iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrariis medicari conuenit, vino veteri & condito, hydrogaro, item anisi, rutæ & petroselini decocto: iam pipere ex aqua calida communi, vel etiã ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon, vel cui nomen est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex viperis cõfectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimēti & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem humorum abundantia fastidium excitarit, tenues, mordacésq;, aut vomitu, aut per aluum euacuabis. facilem itaque vomitum reddit aqua tēperata, vel mullā dilutissima præbibita. Satiùs fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, veluti ptisanæ cremorem, vel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili vomas, priori libro est expositum. At si difficilius ager vomat, præstat materiam ad aluum elicere copiosiore tem-

peratoq; alimento his prius humectatis. Purgans vero medicamentum esto, vel picra ex aloë, vel ex malis cotonis præparatum, cui adiectum sit aliquid scammonia, vel quod cõstat rhodomelite. Si verò citra scammoniam aloës potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eò quòd illa stomachum offendat. Quibus crassi humores viscosiq; fastidij authores sunt medeberis extenuãdo ipsos incidendoq; , tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & muria cõponuntur, vt capari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie fastidientibus consuluimus, maximè post vacuationem, quæ nimirũ fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus vtendum quæ calfacere stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur diaomphacos, & Marciatum aliaq; consuetu vnguina: insuper epithemata, Bailũ & Euodes huiusq; notæ reliquæ: his addentur exercitia & frictiones potissimũ. Adeos qui frigidi humidiq; humoris, vel talis intemperiei vitio difficulter concoquunt, cibũmq; respuunt, ea quæ ex malis cotonis confiunt, pertinent. Dico autem quod vocant meloplacuntion, item quod ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat. præterea dia citriu, idest ex cytrio cõfectum. Malagmata vero, Marciatum & quod ex acerbæ vux succo componitur, item Baion, Polyarchion, atq; his finitima. Sin vlcus fuerit in stomacho, aut ventre, omnibus acribus & cibis & potionibus abstinere oportet, vti vero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tum iis quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, vel melle paucissimo conficiuntur, vt etiam purgent citra rosionẽ. Epithema facies ex palmulis cotoneis, & polenta. Ceratum ex melino, vel rosaceo cũ ammoniaco & thure. Ad hæc Nelei epithema conducit, & emplastra ex falicibus, & Icesion. Notæ vlcis sunt vomitus sanguinis, vel puris, vel etiam ramentorum.

Ad solutũ imbecillẽmq; stomachũ, & ob hoc cibũ nõ cõcoquentẽ, valet hoc; Aloës, masuche, mastyches, styracis singuli sextantes, absynthij triens, cœnanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrãs vini quod satis est. Nõnulli etiã cyphæos & rosarũ singulos sextãtes miscent. Hęc in leuorẽ reducta, purpura, vel lana, excipiuntur, ac stomacho imponũtur. Quidã cerẽ selibrã adiungẽtes, epithema ipsum faciunt.

Ad

Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est vehementes & conuulsorios dolores.

OPTIME facit pastillus Amazonū: inuenies autē huius scripturā, tum aliorū ad stomachū compositorum materiā ad calcem libri de medicamentis compositis explicatam.

De flatu ventriculi.

CAP. XXXVIII.

FLatus in ventriculo generantur, humoribus, vel cibis, exigua caliditate in vapores dissolutis. nā frigiditas hoc nomine quòd extenuare ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum nō tantū extenuet, sed etiā discutiat, flatus generationem impedit. minor verò caliditas diffundit quidem & transmutat alimentum, verū minus quā opus sit: vnde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & api, & spondyli, & dauci, in oleo decocto. Vbi verò adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculū oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum. At si inflammatio dolores comitetur, in vicem calefacientium laxantibus vteris, acetum decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam verò polij fasciculus, vel calaminthæ decoctum cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaque, dum vehemens dolor inciderit, adhibenda consulo. dum mediocris, etiam fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum vndique comprehendens toto symptomate frequenter subito liberat, castoreūque ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cū oleo hieyonio appositum, vel si cum tormine intestinorum flatus incidant, medetur. Item talus suis combustus, potusq; tormina & flatus tollit. Idem facit aristolochia rotunda. Iam verò aduersus dolores flatuosos ex ventris obstructione, vel crassitie, vel perfriktione obortos, vinum meracius, à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiam ex toto leuat affectos.

De cholera.

CAP. XXXIX.

CHolera est immodica ventris perturbatio suprā infraq; ex continua ciborum cruditate proueniens. quæ inquā cruditas nonnunquā ex magna alimentorum prauitate, interim ex vitiosorum humorum superfluo contrahitur. Si igitur nauseabundus ager est, & turbatur, cibis etiamnum

crudis in ventriculo manentibus, aqua tepida propinari debet, deinde vomere oportet, digito, vel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est. Vbi verò hæc exinanita est, conquiescere, & præcordia oleo dulci cum vini modico, vel mastichino, vel etiam nardino si hyenis fuerit fouere cōueniet, somnūq; permittere. Vbi iam exacta apparuerit concoctio, balneis & probi succi cibo vtendum est. At si inani- tio fiat immodica, sufficient quidem initio vel ea quæ secūdo libro de ventris perturbatione comprehensa sunt. Sin autem perseueret euacuationis impetus, venter concidat, pulsus minor crebërq; euadat, cataplasma adhibendum ex palmulis cū cenanthe & acacia, item hypocistidis & malicorij succo. Adhæc offerendus est ad sorbendum aquæ medio- criter frigida cyathus. Præstiterit rosarum, vel cenanthe, vel rhus, vel vitis capreolorum decoctum, vel mali granati acidodulcis succus, cui mentæ paxillum sit inspersum. Por- rò si excrementa fuerint acriora, vexetq; ardor, & litis, cu- curbitæ semen cum aquæ cyathis tribus, tum intybi, & por- tulacæ in posca coctæ alimenti nomine exhibeantur. Verū si fluxio si si nequeat, vinū quoddam austerum, potui dandū est. si febris absit, palmatianum, vel aminæum, vel spathites, vel omphacomelites. Sin absit, rhoetes, vel myrtinum, vel cibyriticum hydromalum & potui, & cum mica, vel halica, vel chondro. At si respuant cibum frumentaceum horarios seu fugaces fructus mandent, mespila scilicet, vel pira, vel mala cydonia, vel punica: quod carnosum est & durum ex- puant. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, extrinsecus contra ventriculum ipsum, cucurbita leuis quam maxima admouenda est. Dum autē ipsa adhæret cibo aliquo ex præ- dictis ali debent. Ad conuulsorias autem contractiones cali- da linimenta, oleo, imbuta, musculis circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid castorei & sicyonij. Ante hæc artus aqua calida superfundendi. At si vi- giliæ torquent, somnus, iis quæ aduersus illas prodidimus, conciliabitur. Si vires autē non prohibent, etiā medica men- tum diacodion ipsis propinabitur: vbi morbus inclinauerit, ad balneū deducuntur, cibus ad refectionē, pulli gallinacei erunt, colūbæ, vel suum petunculi, similiave. Alui profluuiū, *διὰ πύλου* græcis vocatur, quod ciborū corruptela est, plerūq; sua sponte cessat, ægris nō citius alimentū sentiētibus quàm abso

absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio: sin autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur & cœliaco affectu.

CAP. XL.

CVM lienteria duplex sit species, vna sane ex superficiali-
cria intestinorū exulceratione: secundū quosdam verò
etiam ex cicatrice, quā dysenteria magna ex parte, vel aliæ
fluxiones excitant: altera ex facultatis cibum in ventre cō-
tinentis imbecillitate, secundā opinor differentiā cū cœlia-
ca dicta affectione cōmisceri confundiq;. Etenim in hac cū
venter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere & di-
stribuere, lauia, cruda & perliquida redduntur, † aluo in o-
mnib⁹ fluida. Verū in lientericis celeriter, quæ assumpta sunt,
egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assumpti
genus aperte cognoscatur. atq; hac nota potissimum à cœ-
liacis discernuntur. Itaq; semen lini cum palmulis ipsis ob-
ducitur. Summe autem facit lentiscus, rubus, oxymelite in-
coctus: cum adest inflatio cuminum miscebitur, anethūmq;,
& ruta: augescente verò profluuiο adiungemus mala coto-
nea, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallam, vel
quædam, vel omnia. Cerata ex oleo myrteo cum vino quo-
dā astringente. Epithemata calidiora quidem ex baccis lau-
ri, & quod ex seminibus constat. Astringunt autem magis
diacœnanthes, & diagigarton, id est ex acinis malorū punico-
rū: Itē quod ad Antyllum authorē refertur, & Erythrij miri-
ficū: si verò morbus in vetustatē incidat, etiā vētri rectē ap-
plicatur & ceratum ex sinapi, ipsumq; sinapi. Portiones cōue-
niunt, simplices quidē, plantaginis, vel rumicis, vel mali gra-
nati cortices, vel sorba arida, vel immatura, vel omphacium
ficcum, ex vna aminæa, tribus obolis potum. Qui febris ca-
rent cum vini austeri cyathis sex: febricitantes autem cum
aqua pluuiali sumant. Porrò aluus arida gallinarum potui
inspersa, stomachum minus attingit, tum ea quæ vrinam ci-
rant, exempli gratia, apium, adianthum, similiaq; epota de-
riuationē moliuntur. Cōposita verò sunt polyide sphragis,
pastillus ex succino, item ex spina ægyptia confectus, insu-
per clidium appellatus, & diaspermation. Item hoc est præ-
stantissimum quod sequitur, rumicis syluestris seminis ses-
cūcia, plantaginis seminis vncia, † hypocistidis succi drach-
mæ sex, gūmi vel acaciæ drachmæ tres. Excipiūtur cotoneo-

rum ad tertias decoctorum liquore. A L I V D. Cumini, piperis, rhus syriaci, balauftij singulorum fescuncia, malicorij vncia, laseris fescuncia: aut eius pulueris drachma potui inspergitur, aut oxymelite macerata dantur mane & vesperi. A L I V D. Myrti nigrae cochleare, eiusq; dimidium, anisi, rosarum siccarum, cœnanthes singulorum cochlearis dimidiū, palmulas viginti, in pastillos cogito, & drachmam vnā cū aqua aut diluta vini potione porrigito. iam Theriace ex viperis optimum his est præsidium. Cibus autem, si acris & biliosa sit deiectione, ex chondro, oriza, halica, & similibus erit: quibus cum astringens aliquod decoquetur, pirum, malum cotonium, mespilum, & id genus alia, item lac decoctum probe his proderit. Potus erit, aut vinum aquosum, tenue, aut, dulcis quedam potio. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibus exhibetur, nonnulla stomacho grata admiscuntur, anisum, cuminum, vel apij semen: Adhæc lenticula bis cocta plerunque ipsis profuit, cum aceto modico, vel oxymelite commanducata. Præterea brassica & ipsa bis coctionem experta: præstat autem secundam ipsorum coctionem in posca fieri. Vinum assumetur vetustius calidiūq;.

† Rectior est scriptura veteris *κοιλίᾳ ἐπιπλεονέχοντι* ἢ *ἐπιπλεονέχοντι*, id est, ventre omnino fluxionem abunde accipiente.

† Veteres libri hoc loco hanc scripturam habent. *ὁ πεντείδς ὁ χυλὸς 3.6. ἡμῶν* ὅτι *ἀνακίας ἰσχυρῆς*, id est, hypocytidis succi drachmæ sex, gummi vel acacie par modus.

De tenesmo.

C A P.

X L I.

Tenesmus interdum dysenteriam præcedit: sæpe verò & ipse solus paulatim generatus, desinit. Est autē affectus hic, implacabilis desidendi cupiditas, quā nihil præter modica cruenta, vel mucosa, egeritur, quæ totius prope mali causa est: factaq; in loganone inflammatio œdematodes hoc est mollis & cedens hærentis illic stercoreis opinionē, & deiiciendi ea desiderium mouet. Galenus memoriæ prodit etiam calculum quendā in tenesmi affectione per anū fuisse excretum. Subinde verò obstructionem stercoreis in tenui intestino coacti, tenesmus secutus est, qui astringentibus quidem obturantibūq; remediis magis increuerit: clysteribus autē acrioribus, nempe mulsis cum sale, vel medicamine quod

quod emolliat, per os assumpto, ut damasceno, vel pingui-
bus ficis, rore marino sero lactis stercore excreto, confestim
finitus est. Quod si igitur citra talē causam, tenesmus obor-
tus sit, conuenit inflammationem, cruda ordeī farina calida
& fotu ex vino, oleo myrteo, vel rosaceo, vel omphacino lū-
bis & inferiori ventris ab umbilico regioni adhibito lenire
ad ea vero quæ longanoni mucosa impacta sunt, mulsā in-
dita aluo abstergēdo muriāq; sæpe demissa auxiliū fuit abū-
de. Sufficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calēntis he-
mina. Porro dolores intentionēsq; leniuntur infessu fœnu-
græci, vel maluæ, vel seminis lini. Alij autem frequenter hūc
quoq; infessum felicem sunt experti, rutæ, myrti, cytini, lau-
ri, cupressi. æqua singulorum viridum portio in aqua co-
quitur: est autem Marcellium. Vbi alte affligit inflamma-
tio, irritationēsq; iniici debent ab inferioribus partibus cre-
mores frumētacei cum quodam astringēte decocto. oleum
vero dulce inditum retentumque dolorem soluit. Cum au-
tem crebra desidendi est cupiditas, etiam Agatidem spif-
samentis calidis sedi apponent, aut furfures calidas in fa-
scia, aut spongiam, aut aliquid huiusmodi.

De torminibus quæ dysenteria dicitur. CAP. XLII.

Cum intestina intus exulcerantur, latini tormina, græ-
ci dysenteriam appellant, quæ nunc ex tenesmi muta-
tione, vel quadā ex prædictis alui turbatione prouenit, nūc
per se incipit. in qua excernuntur primum biliosa, varia. de-
inde leuiter subcruenta, postremo saniei similia cuiusmodi à
mortuorū cadaueribus solēt profluere. At quæ à bile nigra
oritur, exitialis est: ut quæ cancrum cum exulceratione re-
stet. Si igitur ab exulceratione, cruēta stercore commista
deici cum dolore & torsionibus cernantur, vlcus tenuia in-
testina obsidere nota est, quod per os potissimum remedia
desideret. Sin autem syncerū stercore descendat: crassa, quod
enematibus magis cedit. Porro cū multū sanguinis seorsim
excernitur: affectū cruentā dysenteriā appellāt: quanquā
interim sanguis etiā nigrior, quam naturaliter esse debet, &
splendescens deiciatur, cum scilicet iecur alimentum distri-
butum non probe conficit. Iam vero cum retentrix ipsius fa-
cultas, vel alteratrix imbecillis est, sæpe eiusmodi descen-
dūt ut recēs in eis caro lota esse videatur. Atq; hanc iecora-
riam vocāt dysenteriā, de qua in iocinoris affectu agemus.

Itaque vtendum est communiter iis quæ in cœliacis & aliis præter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt, lemnia sphragis, quæ etiam depascentem modo dysenteriam per sanat, & pota & in aluum data, si intestinum multa prius fuerit absterfum. Deinde muria & lactucæ succus potus conuenit dysentericis: ipsaq; lactuca inposca cocta esui idonea est, item plantago, rubi tum fructus, tum folia, & althææ radicis decoctum, hippuris ex aqua, vel vino bibita, eiusq; succus prodest. Mori succus immaturus exiccatus, atq; hoc magis batina mora similiter resiccata. siccant etiam vêttris fluorem oua ex acetô cocta comestâq;. Satius fuerit, si cômista quibusdâ ex iis quæ ad dysenteriam faciunt, frixâq; esui exhibeas. Vtilissimum his est omphaciû, rhus rubrum, eiusq; succus, malicorium, galla, acini vuæ, mespila, myrta, corni, cochlearum integro tostorum cinis. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem vnâ in puluerem redacta obsoniis inspergito, vel ex aqua, vel ex vino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondû vlcus putre occupauerit, & canum ossa vorantium stercus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis iniectis potatum. composita vero ex ægyptia spina pastillus, ite Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhæc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonem refertur. Iam catapotia ex macere admiranda. maxime autem commendatur & hoc: opij, croci, lycij indicij, acaciæ, rhus, thuris, gallæ hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloës, æquales singulorû portiones, nempe tres obuli ex aqua propinantur. A L I V D. Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorij, singulorû drachmæ quatuor cochleare vnû ex vino datur. A L I V D. Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorû drachmæ duæ opij drachma. Exhibetur drachma ex vino temperato. Hoc autem elegma ipsis conueniet. Myrtorum nigrorum, rhus syriaci singuli sextarij, palmularum thebaicarum duæ libræ, malorum cotoneorû carniû libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, vini astringentis sextarij duodecim, ad tertias decoquuntur. Percolatis libræ sex mellis iniciuntur, & ad spissitudinem iam incocta linctu exhibeto. Notum vero est cataplasmata quoque ex astringentibus cõponenda, quorû materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysentericis

pro

propter tenesmos infestantes, exusu fuerint, cremor orizæ, vel chōdri, vel huiusmodi alterius cū adipe caprillo, vel hircino, tū ea quæ capite de tenesimo diximus. Si autē sanguis profluit, ex inferioribus partibus infundere oportet succū polygoni, vel plātaginis cum acacia, vel hypocistide, vel id genus aliquo. Sin vrgeat fluxus, etiam quod sanguinē cohibeat quoddam iniiciendum est. vt cinis lanæ succidæ, vel spōgiæ inanis, pice liquida, vel sanguine bulbulo imbutæ vel alumine liquido, cōbustæ, vel asinini stercoreis succo. Huic & Andronis pastillus præstās est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac per similes. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deiectionem fiunt. Vbi vero vlcera intestina depascan- tur quæ tum fædo excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis inter- uallo, agnoscimus, enematis quæ crustam inducunt ute- mur, cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item dia- chartu id est ex chartha inscriptus, ac Bitynius, Theonius- que: Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticulæ deco- cto, vel cuiusdam astringentis, iniecti. Atque hoc enema est ex iis quæ admodum expertus sum, glandis caliculi combu- sti (Est autem calyculus concavū illud unde querna glans prodiit, quo coriarij vtuntur) Auripigmenti consolidæ, rhus syriaci, æquales partes. his contulis, duo cochlearia ex- cipito cremore orizæ & succo anchusæ quæ folium habet spinale, amplum nigrumq; quod chærospileton appellant. Item ouorum candidi liquoris similiter ad uncias duas ter- nāsve immittito. Epithemata vero in cœliacis enumerata sunt. Item ventris inunctiones quæ astringentia ac siccante constāt matēria, glutinatorio quodā adhibito, gummi, thu- ræ, taurocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum ha- beant. † Alimento his erit per initia, pulicula ex ovo & lacte. deinde sorbitiones frumētaciæ per se, & cū lacte, item lac mediocriter coctū maxime cōmēdatur. holerū vsus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctā, intybū, plantaginē, brassicā bis coctam, poma quæ *ἰπῶρα* dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, vel aliis quæ asperare intestina possunt. Verū si multa sit calo- ris intēperies, etiā intybus cruda esui danda est, & aqua po- tionis frigida. Alia vero potabilis aqua cœlestis esto: si vero

laborauerit stomachus, vinum quoque propinandum est. Postea ex aucupio sicciora & concoctioni morigera sumantur: balineis dulcibus vrentur, à quibus si fluxionem experiantur, spongiam magnam, vel panis filiginei micas vino ascalonite, vel quodam astringente calido imbutas, toti ventri imponere oportet, contra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

†Hoc loco vetus cod. habet, τὰ φη δὲ τοῦτοῖς ὡς πλὴν ἀρχὴν ἔστω, id est, alimentum per initia his sint ova. Sed vulgarem scripturam bonam esse ex Aëtio quivis intelligere potest, apud quem vox ὡγάλα est, quam interpres ova lacti mixta reddidit.

De morbo intestini plenioris, quem greci colicon appellant.

C A P. XLIII.

Colon, cum pars sit intestini crassi, à dextra ilium regio ne procedens, ad sinistriorem cincturæ modo pertinet. Huic dolores gravissimi plures ob causas suboriuntur. vel enim ex crasso pituitosoque humore intra tunicas ipsius recepto, vel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitum, vel propter inflammationem, intestini, vel ob acres mordacésq; humores. Qui ergo ex humore crasso, ac pituitoso dolorem concipiunt, hi per totum abdomen in alto ex cruciantur, præsertim sensu, qua parte colon situm est, ceu cerebra pertūdatur. Hos torsiones quoq; affligunt, ructus, nausea, vomitio cuiuslibet humoris, potissimum pituitæ. Aluius graviter impedita nihil reddit, ac ne spirituum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretum, bouino simile videtur, leue & flatus plenum. Præcedens horum causa est magna ex parte, continuus ciborū frigidorū, crassi; succi, visus, repletio, cruditas, otium & his finitima. Qui autē ex spiritu flatulento indolescunt, iis tensionis magis sensus obuenit: qui autē ex inflammatione, iij feruorem internum percipiunt. & febris non ignava, vrinae retentio simul & stercoris: pulsus in vētre molestat, sitis, ardor, nausea, bilis potius vomitiones quæ nihil leuant malū, summam inter colicas affectiones. hæc est gravissima, quæ in Ileum transitionē minatur, at quibus acres rodentésq; succi dolorē movent, sicut etiam qui ob inflammationem dolent, hos ardor sitis & vigilia torquet, †febricitant autē omnino vel minus quam illi, vrina redditur acris, & biliosa per aluū descendunt.

Sæpe

Sæpe alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti. Itaque doloribus quos frigidi & glutinosi ac crassi humores contraxerunt, medebimur sic vt non vehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quæ nimis excalfaciunt, præfidiis funduntur, ac in spiritalem potius substantiam rediguntur. Quapropter & incidi, & concoqui medicamentis debent, quæ non inflent, sed extenuent desiccantq; , nec per morbi initia valde calefaciant. Prius itaque aluo stercore leuata, cōgrui clysteres ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, vel ruta cum adipe anserino, vel gallinæ, aut cucumis sylvestris radicum decocto, & myrrhæ drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo sicyoneo. Iam vero commune oleum iniectum, sæpe vitream simul pituitam expulit, ac dolorem subito finiuit. At si ob doloris vehementiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle, cumino, nitro, rutæ semine sicco, brassicæ caule probe polito & muria madefacto, vel cinere brassicæ melle consperso, vel cucurbita sylvestri trita cum melle, nitro & cumino. Glandes autem digitorum sex erunt, vt strictiorem ani musculum quem *σφιγκτηρία* vocant, exuperent, sedemq; ungere oportet, ciclamini succo cum melle & nitro, vel centaureo cum melle & nitro. Si dolor non remittitur, enema præter commemorata sit. Resinæ terebinthinæ vncia, vel opopanacis drachma, vel galbani drachmæ quatuor, bituminis tantūdem, cum nitri drachma, & aquæ vncia, olei rutacei vnciæ quinque, aut amplius. Fetus autem partibus indolentibus superaccommodandi sunt ex cumino, vel anethino, vel sicyonio oleo. Cataplasma admouendum, trispermum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apij semine. Epithemata vero conuenient, diaspermaton, diadaphnidon, adde diamelilonton, & Poliarchion. Infessus autem utilis ex decocto fœnugræci, althææ, chamæmeli, artemisiæ, anethi, lauri, & similia. Item in oleum calidum, aut hydrelæum descendere alienum non est. potui offertur absynthium, & cuminum aqua portione, vel panax cum aqua, vel castorei, anisi, piperis, singulæ drachmæ cum oxymelite. Quod si dolor non conquirit, propinatur ipsis medicamentum diatrion pipereon, vel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remissione doloris vtendum est, ac balneis naturalibus: 4 à balneis

neis autem aquae potabilis abstineant, nisi doloris circumstantia compellat. Vbi iam praedictorum aliquo medicamento facta prius fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incallescantque laconico intra ignitos parietes inspergendo nitrosa quaedam smegmata. Cum dolor est vehemens, mediocriter lenientibus uti convenit, qualis est pastillus ex castoreo, cum alio ab inferioribus partibus inditus, tum porus, similiaque his medicamina. Nam quae valenter stuporem inducunt, vitare oportet. quippe paulisper quidem leniunt, sed longiorem affectionem reddunt, dum materiam incrassant, meatusque intestini condensant. Porro ubi iam pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amarescente, vel his catapotis: Aloes, euphorbia, cocci gnidi, scammoniae aequali singulorum modo. dantur duobus scrupulis. Victus utilis erit calidior sicciorque: per initia morbi, a cibo abstinetur. deinde acris assumuntur. Porro igitur ipsis exhiberi cocta cum condyto debent, apium, asparagus palustris, cruda allia, & maxime iis qui talibus non offenduntur, ipsumque: vero conditum bibant panem vero cum ipso assumant. Insecutis diebus etiam reliqua boni succi alimenta concoctuque facilia dabuntur, sic ut repletio cruditasque vitetur. At si flatulentus spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres qui flatus discutiant, portionesque, etiam cucurbitae quam maximae cum flamma ac leues toti abdomini defixae, frequenter abunde auxilii praestiterunt. Porro cum inflammatio intestinum exercet, vena in cubito aperta est. si urinae difficultas distorqueat, etiam ex talo sanguis detrahi debet, & praedicta admoveeri praesidia, * praeterquam quae acris sunt & valenter purgant: utendum vero iis quae magis leniunt, enematis, cataplasmatibus & superfusionibus, in oleumque descendendum, ac cucurbitulas ipsis defigemus, ceratum abdomini applicabimus quod habeat cerae quincuncem, olei chamamelini uncias duas, rosacei tantumdem, lomenti semunciam, vitella ouorum quinque. Haec succo lini seminis solvantur. Victus tenuis ac febricitantium proprius ipsis convenit, quousque inflammatio discutatur. Atqui si propter acreis rodentesque succos dolitant, oleum ipsis ab inferioribus partibus iniicietur, in quo fenugracum decoctum sit, vel althea cum tenera adipe recenti anseris, vel gallinae vel etiam cremore prisanae cum rosaceo, vel succo quoque lini seminis. Propinandumque ipsis Antidotum picra dia aloes, & balneis
utem

utendum ex dulci aqua, cibo forbili ex chondro, vel prifana, piscibus saxatilibus. In summa vniuersus victus humidior erit, & frigidior. Abstinentum acribus omnibus, cum cibis, tum medicamentis, potuq; ex asperginibus, & cataplasmatis, vini potione & potissimum veteris. Cum autem dolor præpollet, etiam iis utendum est quæ sensum obtupesciunt, nam offendunt minus aliis huiusmodi affectiones medicamenta quæ tenues, mordacesq; humores incrasant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affectionem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse humoribus, quæ ab Italia quidem regionibus incepit, in aliis autem multis Romanorum Reipublicæ locis pestiferæ cuiusdam luis modo sit grassata: ex qua pleriq; in morbum comitiale, alij in artuum resolutionem sensu incolumi, nonnulli in vtraque sunt prolapsi: ac eorum qui in comitiale morbum inciderunt: plures interiire. Ex illis vero qui in resolutionem, plures euaserunt, tanquam in crisi, causa aliorum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur laborantes, medicus quidam in Italia curauit victus, quadam ratione infideli refrigerante & maxime temeraria. lactucas enim non coctas refrigeratasq; ipsis porrigebat, intybumq; similiter supra satietatem comedendum. Item vuas, mala, pisces dura carne præditos, omniaq; crustacea quæ vocant Græce ὀστρακίσματα, pedes bubulos, bulbos & similia, non solum facultate, sed & tactu frigida. vinum raro præbebat, cum autem dabat frigida miscebat, ipsamque frigidam vel etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido, & medio cibo abstinens. Atque plurimos sic præter omnium opinionem persanauit, imò nonnullos qui iam in morbum comitiale, vel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

† Veteris Cod. hæc est scriptura, πύρετοι δὲ οὐδὲν ἔλως ἢ ἐνέχυρον ἔχον. Sed vulgare lectionē, vel eam quam habet codex Orosij πύρετοι ὁμοίως, meliorem esse ex Alexand. Tral. intelligere licet, qui scribit, eorum qui colico dolore laborant, οὐκ ἄνδρ πύρετὸς διατελεῖται τὸς πλείους, id est plurimos non esse sine febre.

‡ Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. τῶν δὲ δι' ὑδάτιος πόσις λούβρον ἀπεχιδωσαν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν περιττασίαν τῆς λύνης ἀναγκάσειν, ἢ νύκτα δὲ πρῶτος ἐν νύκτι αὐτὸς τινὲ τῶν ἐρημένων φαρμάκων λούβρον ἢ πυριᾶσαι λιλευμένον τοῖς διαπύρετοις τοῖς,

παις, id est, à balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio compellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incallescantq; laconico in locis ignitis.

* Hæc scriptura est in veteri codice *ωλὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν*, id est, praterquam quæ acria sunt & multum calfaciunt. Quæ scriptura rectior est.

De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur.

C A P. X L I I I.

Ileos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauius. Qui enim hoc malo sunt oppressi, miserabili morte pereunt, ad vitæ finē, stercus per os reddentes. Contrahitur id vitij cruditatibus, & obstructo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt: ex letalibus medicamentis, cunque in scrotum prolabantur intestina, & cum inflammationem sentiunt, colica affectione plerunque præcedente, causamq; adferente. Pueros itaque superfusionibus, cataplasmatibus, enematis, glandibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est, curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indubitatò sanguinem detrahère: sin minus, vincit multas ac leues cucurbitulas toti abdomini admouere: Loco autem dolenti, etiam cute incisa: item perfricare & deligare artus, & tunc efficacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota purgationesq; assumere, breuiter omnia adhibere conuenit, quæ ad colicos scripta sunt, præter eos qui ex acris, rodentibusq; succis indolescent. Mirifice autem ipsis facit etiam si vomuerint, anethum coctum, potumq; à potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum incallescunt. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut vomant compellendi aquæ calidæ potu. Noxiorū autem medicamentorum notas, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens propinari debet, vel iura pingua ut denuo vomant. Diebus aliquot interpositis, theriace potui detur. At si obstructio perseueret, lacte scisso cum scammonia, vel aloës, vel cuiusdam purgantis momento, aluum inanire confert. Si ex intestini prolapsu in scrotum affectus processerit,

figur

figuratis statim ipsis sublimibus in inguina cōpelleretur de-
lapsam intestinum, fasciaq; deligabitur.

De renum & vesicæ affectibus, & primum de calculo.

C A P. XLV.

MOrborum cognatio, ordinem disciplinæ transgredi
nos compellit. nam communis est Colicis, & lapidem
in rene habentibus aluus initio astricta, vehemens dolor, fa-
stidium, cruditas, & tormina. Propria vero, colici habent o-
mnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis qui-
dem in dexteriore potius ileum parte dolor excruciat, &
vsque ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, aluus omni-
no cohibetur, adeo ut ne spiritus quidem infra transmitta-
tur. Cum verò necessitas stercus expellit, flatulentū bouilli
modo est. Interim etiam vitrea pituita excernitur, vrina co-
piosior pituitosaq; redditur. verum nephritici grauē in ipsis
renibus infixū dolorem impacti pali instar sentiunt, eius-
demq; lateris ac è directo subiectus testiculus indolet, fe-
mur eiusdē partis directe obstupefcit, excernitq; etiā sponte
quidem raro, omnino autem clysteriis aluus citata, flatus,
stercusq; biliosius egerit. vrinæ paucæ, & arenosæ magis
prodeūt: meatus per quē vrina distillat, astringitur. hæc in-
dicia calculos in renibus esse fatētur, quæ adultis potius ob-
oriuntur. in vesica autē pueris magis calculus solet concre-
scere: notæ harū sunt cruda & subalbida vrina cui subsideat
arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contrectāt puden-
da, intenduntq; , & continue ad vrinam reddendam vrgen-
tur, ac stillicidio vexantur. Materiam igitur calculis crean-
dis suppeditat crassus, terreusq; humor. Effetrix ipsorum
causa est ignea renum, aut vesicæ caliditas. At in renibus
quidem medicamentis uti conuenit, quæ calculos confrin-
gunt dissecantq; , non autem manifesto calefaciunt. Talia
habentur basilicorum asparagorum radices rubiq; , vitrum
combustum, graminis radix, adianthum, bdellium, lauri ra-
dicis cortex, althææ semen, cicer nigrum arietinum spon-
giarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, car-
pesion, saxifraga. sion vero, & esu, & potu prodest, cardui
radix, erysimon, & prionitis. balneis autem crebro vtan-
tur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant.
Cæterum superfusiones, cataplasmata, fots, infesss, rela-
xantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit.

Com

Compositae potiones sunt, rutae sylvestris, maluae sylvestris, apij radices. incoquantur vino, & liquor inde expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegij sicci, maluae sylvestris seminis singulorum pares portiones, ubi contusa fuerint, † cochleare inde cum vini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadae siccae sine pennis pedibusq;, lapis iudaicus, qui recolithos dicitur, ex mulso in calido balnei solio offertur. tum medicamenta composita, quae ex ipsis praeparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissimum remedium troglodytes: est autem passerulus omnium avium minima, ea sola excepta, quae Regulus appellatur. Hoc enim solo paulo maior est, cuius similis colore inter cinerium & viride, tenui rostro, in muris maxime & sepibus degens. ~~Hic inquam totus sale conditus~~ crudusq; frequenter commanducatus, calculos iam creatos per ~~urinam expellit in posterumq;~~ generari prohibet. Combusu integri cum pennis cinis uniuersus per se & cum pipere, phylliq; momento ex mero & melle potus, idem potest efficere. Ad dolorum vero acumen & vigilias bona sunt remedia Sotira, & Philonis medicamen. iam sanguinis missio adhibita dolorem saepe lenauit, celeriter calculum emoluit. Tuetur à calculis, ne fiant, primum sane cibus boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminum omnis generis, frumentaceorumq; vltus, item casei abstinentia, lactis, & quae ex ipso praeparantur, obsoniorum, vini nigri, carniū copiae, & omnium summatum crassi succi, ac nimis calidorum acriumq;, hydrogarorum dico, & conditorum & similia. Haec enim si obseruentur, non solum lapides nondum creatos prohibent concrefcere, sed etiam iam factos, confringere, vel excernere idonea sunt. bibant autem oxymeli cum quodam simpliciore urinam citante, veluti adiantho, apio, graminis decocto. A balneo ieiunus ante vinum aqua temperatam potet. ac in medio prandij frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prauū humoris copiam persentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione vacuentur. Omnium vero praesentissimum est ad calculos arcendos secundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam vinum, aut aliud alimentum assumas: ac vesicae calculos in pueris,

pueris, valentioribus emolire præfidiis, delectu ex supra cō-
prehensis habito. Quod si impendio excreuerint, aut cerui-
ci vesicæ impeerint, iniectione recti syphonis, catheterismū
vocant, per quassatum vtendum, aut etiam calculi incisio
adhibenda, vt in parte chirurgica dicetur.

De inflammatione.

At si inflammatio renes, aut vesicam exerceat, quam hæ
notæ restantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, fe-
bricula, mentis alienatio, vomitio bilis sincera, vrinæ red-
dendæ impotentia, & præsertim vbi vesica inflammationem
experitur: sanguis statim derrahendus est, vtendūque su-
perfusionibus, quibus leniendi potestas est, & cataplasmatibus
ex ruta, anetho, fœnugræco, altheæ radice, clysteriisq; mol-
libus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino. In
vesicæ affectu etiam, opij semibolum cum myrrha, croco,
& oleo, in aluum demitti, mulsaque potui sumi debet, ab iis
abstineri quæ valde vrinam citant, ac multa potio vitanda,
nisi acris biliosusq; humor superet, tunc enim potui quoq;
liberaliori indulgendum est, ac vna vice cumulatim, qui ex
aliquo citra rofionem, vrinam mouente, sumetur. Seminis
lini partes duæ, amyli pars vna, cochleare ex aqua datur, itē
cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneum renes
sentiunt, linamēta ex vino & oleo rosaceo, vel aqua & oleo
rosaceo, vel melino super accommodantur, aut ceratum ex
cera & rosaceo, chamæmelinoque vel melino & luteis ouo-
rum confectum cum aceti paululo, vel polygoni succo im-
ponatur. Postea etiam emplastrum quod à succis diachylon
dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida autem nimium
vitanda, ne puris generationem suscitent, item quæ impen-
dio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrum indu-
rescunt. Ad hæc balneis. cum inflammatio instat, abstinendū
victus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione
arcenda nomen aphlegmantion sortitur, vtiles est.

† Hic locus sic descriptus est in veteribus codicib. διδς ποχλεάριον
μετ' εἰνς κικραμὲνς κινάδων. β. id est, cum vini temperati duobus cy-
athis.

† Locus hic integrior est in vetustis codicib. πλὴδς ἡ καὶ κακοχ-
μίας σωματικὰν ἔχει διὰ φλεβοτομίας ἢ κατάρσεως κινούδων, id
est, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detracto aut purga-
tione vacuentur.

De abscessu & exulceratione partium per quas vrina descendit, οὐρη-
τινὰς, greci vocant.

DOLORS circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris
inordinata, abscessum in renibus fatentur. In vesica autem
præter commemorata, loci cruciatus testatur. Cæterū affe-
ctus renum, hac nota deprehenditur. si homo in sanum recū-
bens latus, in opposito percipiat dolorē ceu è sublimi rene
suspensio. In quibus vtendū est incessu ex hydreleō, itē cata-
plasmatis ex polline, oleo & resina, vel erui farina, cū melle,
vel cardamomo, vel columbæ stercore, cum ficis pinguibus.
Pus autem per vrinas confarctum excretum, abscessum esse
ruptum, & vlcus in particula ostendit. Quoniam verò etiam
sine abscessu, instrumenta per quæ vrina fertur exulceratio-
ni patent, vase, aut rupto, aut exeso ex materia acri vel lapi-
de perradente, distinguenda est renū exulceratio, ab ea quæ
vesicā exercet, vel meatus quos οὐρητῆρας vocant, hoc pacto,
Renibus quidem exulceratis in lumbis dolor exercet cum
grauitate & sine impedimento vrina redditur, cui pus mixtū
reperitur, carnosus particulis innatantibus. Vesica aut exul-
cerationem experta, tormentum vehemens in pectine imoq;
ventre mouet, vrinæ difficultas vrget, pus vbi reddita vri-
na est, sub fidet, squamulæ fædi odoris, vel laminis similes in-
sunt. furfuracea autem subfidentia vesicam scabie laborare
notant, si verò meatus vrinarij sint exulcerati, etiam puris
mixture medio quodam modo habet, & pilis similia potius
in lotio feruntur, dolorque mediam inter renem & vesicam,
regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, id-
que citra vrinam, nullius particulæ ex prædictis, sed puden-
dorum exulceratio significatur. Itaque cum vasa vrinæ di-
cata exulcerationem sentiunt, aqua mulsa bibitur, aut fœ-
nugraci decoctum cū melle, aut cucumeris semen cū passo.
Pus reddentibus per vrinam, bolus armenus datur, aut fe-
ricularum combustarum cinis, quantum tribus digitis com-
prehendi potest, ex passo, item lactis potio vehementer his
auxiliatur. Composita autem hæc, seminis lini, seminis cu-
cumeris, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ: pastilli
singuntur. ALIUD. Nuces pineæ numero viginti, cucu-
meris domestici seminis grana quadraginta, amyli drach-
ma. Excipiuntur heminis duabus decocti nardi apij semi-
nis. Archigenes in epistola ad Atticum iubet, cum vrinæ
diffic

difficultas vrget, papaueris albi torridi seminis detriti drachmam vnam capi. quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis radicis inspergatur. Dolores autem ex vlcerebus contractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuces pineæ duodecim. amygdala amara corticibus exuta triginta quinque, croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quotidie assumet cum lacte, aut passo. Mirius erit si pro nucibus pineis maluæ seminis æqualem modum iniicias. Elidere autem potest (inquit) vesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta. Ego vero in verustioribus hoc vsus, nunquam aliud magis varium desideravi: chamædryos, chamæpyteos singulorum drachmæ viginti quatuor, asari, piperis albi singulorū drachmæ septem, cinnamomi drachma: optime detriti cochlearia duo ex passo, cretico, porrigo, si febris adsit, ex aque cyathis tribus, ubi verò mordax est exulceratio, etiam amyli duobus cochleariis & cucumeris seminis granis quindecim adiectis, voti compos euasi. Hæc quidem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, id est ex halicacabo, & antidotum ex sylvestris maluæ semine, nec non ex tragematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum, nec non inferiori ventri, cerata imponuntur ex æsypo lota, butyro, adipe anserino, styrace. In vesicam autem infunditur clysterio mulla aquosissima, vel lac cum paululo mellis, vel cum cucumeris semine, vel candidus oui liquor cum pompholyge, vel dictorum medicaminum aliquo. Si vlcus pascendo serpit, pastillus ex carta iniiciendus est, aut Bithinius: & cataplasma ex palmulis & vuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

De sanguinis renum profluvio.

RENES infirmi lotiū subinde retinere nequeunt, sed patientiores redditū sanguinis nonnihil ex vena laxant, aliāsq; crassicies remittunt. Sæpe renes etiā iuxta circuitū quædam modū hæmorrhoides, sanguinis profluvio laborant. Inaniti verò subleuantur, in quibus nihil subito tentandū est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseveret, vena in cubito aperitur, ac medicamētis quæ ad sanguinis spurū, aliāsq; sanguinis eruptiones inscribuntur, in renibus ac vesica sanguinē fundēti, vtēdū est. Maximè verò dari debet symphyri

radix, & tragacanthum vino maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma, tragacanthi drachme duæ, gummi oboli quinq; ex passo assumetur: item cataplasma ex ordeï farina cruda cū posca & rosaceo, aut ex pal- mulis & pane filigineo cum acacia, vel hypocistide, in vino astringenti, vel posca decoctis obducitur. Cū vesica sangui- nem fundit, etiam cucurbitulas in iliis & coxendicibus de- figemus. Cæterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quod sanguis urinae misce- tur, aut e contrario, veluti in pure comprehensum est. Con- cretus in vesica sanguis inde adeo deprehenditur, quod post illum urina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (vt verisimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui artemisiæ decoctum, heliochrysiq; vel cunilæ, vel raphani semen, vel liquor laseris, vel cyrenæicus, vel apij succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hœdi in oxymelite, aut lixiuium cum oleo: spongiaq; à foris ex muria, vel lixiuio calido accommoda- tur. Quod si vitium his non abigitur, secatur locus inter anum & penem, quemadmodum in calculosis: ablatisq; gru- mis commode curantur.

De renum duritia.

QVÆ durities in renibus cōtrahuntur, nullum sane do- lorem mouent, sed videntur renes ipsi tanquam ab iliis su- spendi, coxæ stupent crura impotentia vacillant, urina mo- dica egeritur: Totus deniq; habitus duricie renum laboran- tium iis potissimum qui aqua subter cutem laborant, simi- lis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis, frictioni- bus & fomentis. Ad hæc quæ urinam cient, assumuntur, aluiusq; subduci clystere deber.

De diabete.

CVM poculenta, statim qualia assumpta sunt per urinam transmittuntur, diabetes vitii appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti cōficiuntur, vnde quoq; displacō græci affectū nominant: qui ex retentricis sane renū facultatis im- potētia cōtrahitur, attractricis autē maiore robore, vt totū corpus ob immodicum calorem exhauriat exugātq;. Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quiq; difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremus, veluti alicam cum rosa

rosato, vel rhodomalo, vel hydromalo, vel vino non vetusto, vel alijs quodam calido. Ex oleribus autem intybum, serim, lactucas. inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, vuluæ, pira, mala, punica mala, & frigida potio. Item polygoni succus, heleniumq; recte ipsis propinatur ex vino nigro, palmularumq; & myrti dilatum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & rosaceo, folia vitis cotyledonis, parietariæ, portulacæ. sudores excitandi, vomitusq; à potu frigidus, omnibus quæ vrinam mouent, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

De stillicidio vrinæ & eius difficultate.

CVM neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quippiã ex prædictis infestat, vrina autem acris est, totusque habitus, vel etiam reliqua signa, bilem testantur, ex hac vel vrinæ difficultas, vel stillicidium contrahitur. Quare ex vsu sunt quæ hanc inalterant contemperantq;, ptisanæ cremor, pisces, balnea, victusq; idoneus: acria vitanda sunt, vinum, exercitia, ira & tarda comestio. Quod si vrinæ tenuitas, alborque & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, conueniet vinum calidum, condita, tum quæ vrinam cient & medicamina & cibi. adhuc infestius calidiores. At si præter alborem, etiam crassities in vrina appareat, pituitosus humor cæsendus est, qui ceruicem vesicæ obstruxerit vbi vrendum est oxymelite, tum iis quæ constant ex hyssopo, pulegio, vel thymio, vel silphio, aquæ mulsæ incoctis, item superfusionibus calidioribus. siue autem humor crassus, siue calculus, siue grumus, vel eius generis aliquid obstruens, vrinæ transitum impediat, siphonẽ rectum catheterẽ appellaut, indere ex vsu est, nisi particulæ inflammatio prohibeat. Porro in febribus vrinæ difficultati medemus, super fusso rutaceo, vel anethino, vel veteri oleo. Si aluus ascripta est, innicietur ab inferiori parte decoctum fœnugræci, vel maluæ, vincitq; intidere agrotantes supra comprehensos in hydrelẽum, vel aliquod dictarum specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, sylvestris maluæ radices in hicyonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant. ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorij quantum sufficit.

De vesica resoluta.

VESICAE resolutionem nunc vrinæ difficultas, nunc

spontanea ipsius emissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

De vrine incontinentia.

M V S C V L V S, qui ceruicem vesicæ ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiâ maxima ex parte solet accidere. Communiter itaque roborantibus potissimum uti cōuenit, ut œnelæo calido & similibus: abstinendum iis quæ valide refrigerant: calidis fouendi potius egri, quatenus fieri potest. Etenim frigiditas veluti resolutionem representat, naturaliter autem hæc opitulantur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, vel leucanthemi flores similiter, vel leporis testiculus densus in vinum odoratum, contra hæc vitia bibitur, † vel calamintha myrrhaq; ante cœnam propinetur, vel rutæ sylvestris semē torrefactum per triduum potui exhibeatur. Caterum pudenda eius qui hoc detinetur vitio, cimolia cum succo herbæ perdicij perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio in veteri, ἢ καλαμίνθω ἢ σούρναρι ἁέσι πιεῖν, id est, vel calamintha myrrhaq; in vino ante cœnam detur.

De iocinoris affectibus.

C A P. XLVI.

I Ecur pluribus vitiis opportunum est. nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, vlceribus & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, à qua proprie iocinorosos nominare agrotantes consueuerunt. Si ergo alius in succum quidem conuersa verum liquidiora deiciat alimēto minus probe, aut neutiquam in iecur distributo, sicut tamen ut venter à noxa sit immunis, attractricem visceris facultatem infirmari suspicio est. Si verò in eis recens caro lota esse videatur, alteratricem, tum eā quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intemperie sit, imbecille, recrementum alui temporis spatio fœculentius apparet, valdeq; fœtidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam verò etiam quando iecoris substantia cū ea colliquatur, & totū corpus cōsumitur & febris vrget, cibiq; fastidiū, & biliosus vomitus. Cum autem frigida affligit intemperies, neq; frequens, neq; copiosa alius est: quippe affectus longius prorogatur, & certis diebus venter cumulatius deiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi fæcē, ut propè atra bilis videatur. Itē plures & varij

uarij deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in qua febris languida apparet, facies non collabatur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierū alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora & pauciora, magisq; ægri sitient: si vero humida, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat. omnibus quidem ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemque ad iugulum supra, ad vsque costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra: bilis euomitur, & aluus non respondet. Quum autem similia in pleuriticis signa existant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comprehensum est. Si vero Erysipelate iecur conflictetur, flammæus ardor gliscit, vrunturq; ægri, & marcor sequitur, qui *μαρμαρίς* græcis dicitur. Priuatim vero cum caua quidem iecoris inflammationem experiuntur, nausea adest, vomitus, cibi fastidiū, & flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpe membra perfrigescent, ut aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia superius commemorata, tumor quoque manifestus in superficie oculis & tactui conspicuus est. hæc quidem validam grandemque inflammationem testantur. Sin obscura quedam fuerit, iubebimus egro, magnā ædat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolere dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammationis tumor, qua parte musculi incūbunt, appareat, sed ita ut nullū ex prædictis adsit, illos ipsos eadē inflammatione occupari noscemus. Grauitas autē cū distictione, & doloris, dextra præcordiorum parte sensus, nullo substante tumore, nulla febris vrgente, venarum signatur obstructio, qua venæ portas & concaua iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsius excurrunt, cōmittuntur. Itaque si in abscessum degenerat: inflammatio, dolor & distictio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt, dolentesque iocinore, in sinistrum magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, vel per vrinas, vel per aluum cumulata puris subluuies prorumpit. At si tumor in scirrhosam affectionem deciderit, dolores quidem remittunt. sed tumor cū duritie est conspicuus, quæ ambiunt partes extenuantur.

& tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaq; aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quæ viscus mediocriter confirment, vti consilium est. id autem præstat seris & cichorium, interim crudum, interim coctum cum coriadro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non solum, verum & puluis ipsius mulsæ inspersus & calidis, & frigidis iocinoris vitiis opitulatur. Adhæc intybum troximum & sonchus eiusdem sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cyathus in aquam mulsam demissus, similiterque filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex vino quodam tenui, & quod vrinæ mouendæ est, porriguntur. Catapotium vero quod recipiet radices cichorij drachmas quatuor, chamæpyteos radices drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinem, quibus aqua calidam superbibere conuenit, iam ex opio & semine alterci confecta propinantur, ipsumq; Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiam rosaceum primi meriti ipsis, vel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, vel chondri cum hydrosato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci potione. Et summatim cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: vinum omnino circūciditur, nisi alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirât, tū enim ex tenuibus & iis quæ græci *δαρυσφόρον* vocant, aquosum aliquod exhibetur: Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. Porro in frigida intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur rectè cum vino assumitur, item brassica bis terved incocta, castaneasq; esse confert & vuas passas tum ex gallinis quod satis est: vinumq; bibant: sed prius ipsis eupatorium, vel asarum, vel medicamentum diapedereon propinari debet. Iam ex iis quæ prius ad cœliacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deligi debent: cyphoides autem appellatae compositiones, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt. nisi modica quædam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad frigidas autem optima sunt remedia, magisq; si cū humiditate, aut iecoris obstructione euenierint. Si vero obstructio ex crassis glutinosissq; contracta humoribus fuerit, corruda & præsertim huius semē datur, item

item lauri radice cortex. eupatoriumq; ex oxymelite, vel lupinorum amarorū decocto cum ruta & pipere. Ad hæc farina lupinorū pota, & capparis radice partes duæ, costi pars vna cum vino: & medicamentum diabacanu ad obstructions quas crassi viscosiq; humores excitarunt salutariter sumitur: præterea iris & pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnibus iecoris affectibus ex vino dulci succurrit, itē antidotū Theodoretum efficacissimum est remedium iecori obstructo, scirrhus indurato diuque inflammato. Item colicis & ictericis. similiter etiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiendi facultatē habent, nēpe porra ex oxymelite, syluestris asparagus, & capparis, reliquaq; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; meatus reserat, incocta. Vinum tenue ac vetus vtile. vitanda sunt alimēta crassi succi, balnea crebra, eaq; potissimū à cibo. Si morbus in vetustatem incidit, etiā venæ sectio purgatioq; adhibenda, si nihil prohibet. Cū autem iecur inflammationem experitur. sanguis ex cubito dextro intrepidè mittendus est, & copiosus si vires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & fœnu græci, & semine lini cum palmulis, vel malis cotonis, melilori flore, absynthio, chamamelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est, vt astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata vero iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis confectum. deniq; quod coptu appellatur. Porro ad maximas inflammationes hoc valde experientia comprobatum est, absynthij comæ, nardi gallicæ, asari, croci, singulorū vncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, ammoniaci suffiminis quod thymiam appellat, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Ad hæc oxymel ipsis dandum est, simpliciaq; auxilia, nempe, asarum, nardus gallica, vel indica, iuncusq; odoratus rotundus, petroselinum. Alius irritanda est, vrticæ, vel mercurialis, coctorum esu. In declinatione morbi epithymum & polypodiū ex mulsâ porrigitur, aliusq; inaniri postulat per clysterē, initio quidē ex aqua mulsâ cū sale, vel

nitro, facta autē inclinatione, miscetur hyssopū vel origanū, vel cnicum, vel centaureum & cucurbita sylvestris. Summatim vero caua iecoris pars per aluū: gibba per vrinas expurgatur. Alimentum his dabitur, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit. At inflammationis quæ Erysipelatis naturam refert, curationē superius sumus executi. Abscessu autē facto, ruptura adiuuanda cataplasmate trispermio, cum resina, manna, pice, radicibus altheæ, colubæ fimo, caprillo stercore, præbabitur autem ius decoctorum ad tertias polij & fumarie quæ in ordeo nascitur, item decoctum thlaspis vel cichorij, & chamædryos radicis bibant: vomicaq; abscessus facta, mulla conuenit, & quæ in renibus exulceratis commemorata sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum Mnasei, reliquaq; emollientia. Item Icesidō, vel quod salicibus constat. Si vero iecur scirrho induratum fuerit, parum in medicina spes est, affectu in aquā subter cutem transeunte. Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum, bdelliū medullæ, adipēs, & quæ his similem potentiam obtinent. Portiones expediunt, quæ angustias visceris recludunt absterguntque. Huiusmodi sunt quæ vrinam citant, & calculos confringunt. Adhæc quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta nobis sunt: alimento nimirum decenter adhibito.

De malocorporis habitu, qui Cachexia dicitur. CAP. XLVII.

Pincipia hydropicorū affectuum vocare nostri malum corporis habitū, Græci *ναρξία* consuerunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractone, quæ particula tim ac per vices adhibita ad tertiū quartūve diem producit. Sed vacuandi sunt potissimum, qui hæmorrhoidibus, aut menstruis non respondentibus in morbum inciderunt, quemadmodum iis qui copia vitiosorum humorū laborāt, vacuatio sanguinis per venā vitāda est: purgādī autē sunt ex hiera, dia colocynthidos victus erit tenuis, & deficcās. Aquarū naturalīū vsus adhibebitur, primū aluminosarū, nitrosarūq; magis, mox sulfurosarū: pluribus diebus interpositis aliud balneū accomodabitur, variōq; exercitationis generi credētur ægrotātes, maximè autē ei quod per medicos aliptas, id est reunctores administratur. postea veratrū assumēt mirificè quoq; iuuat ipsos & absynthij potio, & cottabifini, & dropaces. Si affectus in hydropem deciderit, aquæ subter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

De

De aqua intercutem.

CAP. XLVIII.

Cum iecur vehementer perfrikerit, interim sane primario aut inflammatione, aut scirrho, aut alio implicitum vitio, interim lege consortij quod cum aliis partibus habet sanguinis elaboratio non succedit, ac vitiū aquæ intercutis quod hydrops græce dicitur, inde contrahitur, in quo nonnunquam spiritus copia cum humidi momento intra membranā, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomen percussum tympani modo crepitum elidat: quæ ratione etiam tympanias nuncupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, febribusque longis superuenit. nonnunquam vero ex duritie peritonæi, aut vuluæ in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdem regionibus collecta tanquam in vtre quodam conseruatur. unde malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima vero ex parte, ex duritia & scirrho lienis, & iocinoris longisq; intestinorum profluuiis, in quibus fit ut venter quidem intumescat, reliquum autem corpus quod alimentum non sentiat, consumatur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorq; sanguis cōtinetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis veluti in aquam resoluta emanat, adeo ut corpus albido, & pituitæ colore emortui instar appareat, vocaturq; hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, vel anasarca. Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu suppressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, vigiliæ sine ratione oborientes, causæq; his consimiles mouerunt. Curatio igitur communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medicamenta requirit, quæ aquam educant. Cui autē anasarca nomē est, sanguinis detractione succurrimus, maxime si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut mēstruis suppressis existit, nisi prius cū malo habitu premebātur sanguinem emisserint. Et hic igitur ut in iis qui malam corporis habitudinē sortiti sunt, per vices tēta est vacuatio. Deinde stercus bovis gregarij aridū exactē tritū, coctumq; in posca, vel oxymelite, sulfurisq; pars quarta superinspersa, toti vētris capacitati iniiciatur, vel stercora caprilla in pueri vrina ad fordidum spissitudinē macerata, applicato, per ventrē summē ipsos

ipsos purgat. Item cataplasmatibus utendum ex fermento, fi-
 cis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure viuo,
 ammoniaco, baccis lauri, vicia taminia, columbarum rura-
 lium fimo, vel omnibus, vel quibusdam ex his cum oxyme-
 lite. Post quæ epithema spongium appellatum ex caprillo
 stercore mirificè humiditatem vacuat, tum per larētes me-
 tus, tum per aluum. Insequentibus diebus emplastra per-
 cantia imponuntur, tum dia iteon, id est, quod ex salicibus
 est, tum quod icesium dicitur, vel quod Cureo ascribitur,
 vel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, vel po-
 lyarchium, vel epithema diaspermaton ex seminibus prepa-
 ratum. Atque hoc indubiè mirificos præstat effectus, quod
 sequitur. quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sul-
 furis viui, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ duode-
 cim, cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim.
 Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelliq; illita, toti
 ventri imponuntur. Ius radicis sambuci decoctæ in vino po-
 tui datur, vel cucumer sylvestris vino austero maceratus
 per triduum, cyatho vno propinatur. Accessio autē fit quo-
 tidie vsque ad cyathos tres. Hoc quod subiungitur, varia
 constat mistura: balsami, nardi, casia, cumini, dulcis radicu-
 læ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrrha pe-
 troselini, calami aromatici, piperis, seselis, spondilij pares
 portiones, faciūt autem bene etiam singula per se, & omnia
 quæ vrinæ ciendæ sunt similem facultatem obtinent. Cæ-
 terum scilla tosta, cum melle trita & linctus modo exhibi-
 ta, sine grauitate vrinam mouet: coqui autem possit etiam
 in aqua, iis qui bibere velint. Iam hoc quod sequitur præci-
 pue bonū est: interioris scillæ libræ duæ, in vini austeri sex-
 tariis tribus adusque tertias incocta porrigito ex vino quo-
 tidie, orsus à mystro vsq; ad vnciam. Istud vrinam optimè
 prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magni-
 tudinem: vbi aqua dissolueris, linteoq; percolaueris, ad tres
 dies propinato, vel vno interposito. Conuenit etiam his præ-
 cra ex oxymelite. Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis
 pastillus. Plura vero aquam educunt, sed hæc vsus com-
 probauit, gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, vel
 lathyrides viginti, aut triginta, vel euphorbij silique quin-
 que, aut septem, vel squamæ æris drachmæ duæ, aut tres
 cum micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, vel sam-
 buci

buci radicis corticis succus epotus cum condito, vel chameleæ foliorum, æris combusti, anisi singulorum par modus datur in aqua, per initia quidem drachma vna, diebus aliquot interpositis etiam duæ, & plures. Atque insequentia, mirifica sunt carapotia: aloës, euphorbij, cocci gnidij, singulorum vncia, rhei semuncia, excipiuntur succo brassicæ, singunturq; catapotia, dantur siliquæ septem, aut novem. Antidotum ex gariophilo, aquam mirabiliter elicit, iam vinum quod aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ vnciæ tres, seminis apij, capparis radicis corticis, piperis, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidij decorticati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, vini optimi hemina duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa cribatâq; vino perfunduntur, scilla simul leuigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, etiam theriaca vtendum est, & stercoris bubuli cochlear ex vino potum quotidie strenuè auxiliatur. item clysteres adhibendi acres, nisi venter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardomomi, cumini, nitri, aristolochiæ, fœnugræci, pulegij, sicuum interioris pares portiones fusino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus, vti continenter expedit: ad hæc in arena contexti desudent: aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si vero interim lauent etiam, vtentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus inspersis. Hæc sanè vel citra lauationem utilia sunt, aridaq; cum oleo ventri adfricata. At si id vitium est, cui anasarca nomen est, reliquas partes excerci, quatenus licet, oportet & siccas ad solem perfricari. Reliqua victus ratio siccior assumetur. Cibus itaque erit salsamentum, sinapi, & allia: ex auibz syluestres, & siccæ magis. Inter olea asparagus, bifacutum, porrum, sinapi, caucalis, reliquaq; syluestria. Obsoniis miscebitur sal theriacus, vel iamblichus: vinum vetus, tenue, ad vrinam mouendam efficax ebibetur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum: omnis portio liberalis vitanda est, aquæ in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusq; cibis & auxiliis abstinendum, mixtim vero his vtendū, ita vt ei quod magis vrget, occurramus: si vero id morbi

genus

genus est quo venter sonitum audit, Tympanias vocatur, purgantia, & quæ vniuersum corpus emaciant colliquantq; releganda sunt, item ex iis quæ vrinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & discutere spiritus possunt, tum intrinsecus, tum à foris vtendum est. aut cucurbitulæ leues crebro toti ventri suffiguntur. Sin id vitij male habet, in quo veluti in vtrem aqua contrahitur ascites vocatur, nisi prædictis cesserit remediis, ad perforationem veniendum est quæ παρακέντησις dicitur, quod nulli alij aquæ subter cutem generi conuenit.

De Liene.

CAP. XLIX.

CVM lien melancholicum humorem, qui veluti limus sanguinis existit, à iocinore trahere soleat, si quidē facultas attractrix infirma fuerit, meatūsve obstructus per quem prius trahebatur, niger icterus constituitur, sanguine impuro per totum corpus disperso. At si lienem grauitas, & distentio, vel etiam dolor exerceat, obstructio indicatur: si nihil horū euenerit, attrahendi potentie imbecillitas. Quinetiam si atræ bilis vomitus sine febre aliāve malignitate oboritur, retentricem lienis vim laborare indicium est. Expultricis imbecillitas cibum fastidium efferet, dum nō amplius melancholicum excrementū, ab liene ad ventriculi ostium defertur, appetentiamq; excitat sed in ipso liene obstruitur, primum sanè inflammatio huius, cuius notæ sunt, feruor, dolor, & distentio, excitatur. quæ paulopost in schirrum degenerat, sic vt feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem & duritia maneat, Hoc pressis vitio, os foetet, gingiuæ exduntur, vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iocinore, cutem subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaque intemperies ipsius eandem cum iocinore curationem postulat. si adest inflammatio, sanguis à cubito sinisteriore, vel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, veletiam propter naturalem quandam cognationem: deinde cataplasma inducendum ex quæ citra euidentem calorem extenuant, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: videtur autem hanc facultatem habere suapte natura, qui vocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, fœnugræci triens, farinæ hordeaciæ, nasturcij, singulorum yncia, ficum pinguium libra, verbenacæ herbæ

herbæ aridæ vncia, ficus, aceto quam acerrimo maceratur. Deinde cum aliis prius contusis incoquuntur, postea iterum coquuntur. Vel stercus caprillum cū cruda ordei farina coctum ex posca inducitur: adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo autem prius cyprino cum aceri momento, malagmatis utitor, primum simplicioribus, quale est hoc. Cere sequilibra, centaurij libra, nitri triens, terebinthinæ, seminis viticis, capparis radice corticis, singulorū quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida insparguntur. iam quod ad Nileū autorem refertur præstantissimū est. Verum ubi inflammatio in scirrū degenerat, valentioribus uti conuenit, ut etiam cutis summa exulceretur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, & ex salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum, auri pigmenti vnciæ duæ, sandarachæ vnciæ duæ, ceræ libra, terebinthinæ libra, picis aridæ tantundem, galbanī vncia, opopanacis vncia, capparis radice corticis, glandis vnguentariæ, singulorum vnciæ quatuor, lachrymæ ammoniaci scrupula sex, nardini, vel cypri vnciæ quinque. Ammoniacum etiam cum aceto applicatum, leni sæpe profuit, item potum scrupulis tribus quater nise cum vno castorei, si priusquam in lauacrum descendant, sicum siccatam comederint, sputoq; eam reddiderint, vel ammoniaci pars vna, castorij tantundem: datur drachma. hæc etiam ad induratos scirrhus, proficiunt, quemadmodum capparis quoq; cortex ex aceto cōtritū, applicatusq;. Idem bibitus aceto, vel oxymelite, crassos, glutinososq; humores vacuat, interim sanguinem. Iam salicis cortex, consimiliter inungitur, & cinis ex officina fabrilis cum cruda ordei farina ex oxymelite inductus. itē centaurei succus à foris impositus, epotusq;, & lupinorum amarorū decoctū cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ipsorū obducta, & aqua in qua candēs ferrum subinde extinctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febri carentibus autem cum vino & aceti cyatho vno, vel rumicis sylvestris radice cū scilla tres oboli, vel chamædryos, vel serpilli acetabulum totū cum oxymelite, vel anagallidis, quæ cœruleum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, vel acetum scillites, vel oxymel. Composita autem hæc, panacis radice, guttæ ammoniaci, capparis radice corticis, herbæ lanariæ, scillæ

scillæ tostæ medullæ æquales portiones, exhibentur drachmæ vnus pondere. benefaciat etiam suspiriosis, & hydropicis. *ALIUD.* Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ duæ, suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar drachmæ vnus dantur ex oxymelite.

Ad lienem scirrho induratum.

CYCLAMINI drachmæ viginti, brioniæ drachmæ tres, dictamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, herbæ lanariæ drachmæ sex, capparis radicis drachmæ sex. pastillus triobolaris ex oxymelite porrigitur: & qui ex æruca præparatur, non inidoneus est: cibus competit tenuis, acris, ficcus: potio paucissima adhibendæ exercitationes frictionesq; , & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu defigendæ.

De morbo regio, qui icterus Græce dicitur.

CAP. I.

REgius morbus, quem Græci icteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis à me dictum est, modo flauæ. Differentiis constat numerosis: quarum causæ & notæ hæ sunt. Si enim febricitante agro repente superueniens febrem finierit, crîsim restatur, materia ex alto foras prorumpente, contractum. Medicina non indiget, vt quod balneis & moderata frictione subito discutiatur. Si autem cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte grauitas adsit, feruens iocinoris inflammatio significatur: cuius vi sanguis in bilem mutatus, per vniuersum corpus defertur. Sin autem feruor citra grauitatem in ipso subslet, ex sola iecoris calida intemperie, vitium gignitur. Si absque febre alba deiiciantur, vesicæ fellis malum ostenditur, vel ipsius meatuum: si grauitas quidem præcordiorum dextram partem premat, obstructorum, sin autem citra illam, facultate imbecillum, vel attractrice, eius qui humorem ex iocinore eliciat, vel expultrice, illius qui ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim vero his etiam vrinæ biliosissimæ affatim excernuntur. Cæterum fit etiam arquatus, ex intemperie calida solidarum partium, dum id quod ratione alimenti, ipsis offertur, in bilem transmutant, quemadmodum in aquæ subter eutem genere,

genere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quod non subito, ac vna vice, sed paulatim procreetur, sic vt nulum ex commemoratis adsit. Iam verò noxiij medicamenti potus, & virus extrinsecus à venenato animali illatum, regiū morbum parit. Itaq; calidæ iecoris intemperiei, & inflammationis viriūmq; imbecillitatis, curationem suprà sumus persecuti, vbi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet, ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis vtriq; sint obstructi, vel alter dūtaxat, venam in cubito dextro ipsis diuidi consiliū est. Nonnulli vero, tum his, tum illis qui ex iecore inflāmato, arquatum contraxerunt, venam propter minimum dextræ manus digitum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent vtendum est, & purgatione ex hiera, nec non clysteres idonei sunt, potui rectè datur arquaticis, ius apij, vel adianthi, vel rumicis, vel serpilli decoctorū ad tertias, vel absynthium potioni inspergitur. Præclare faciunt raphani succi cyathi duo, cum vini cyatho vno poti. Et cichorei succi cyathi bini, vel terni per se aut cum vino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum ferunt acceptum, mulsum bibent, vel decoctum tenuis aristolochiæ, vel hyperici, vel adianthi, vel herbæ lanarię, vel erythrodani similiter, vel cornus ceruini scobis drachma, cum vino, vel pastinaci syluestris decoctum in vino, vt tertia pars supersit, vel sulphuris viui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam propter obstructionē arquato laborantibus valde auxiliantur, seminis autem atriplicis scrupuli octo, cū chrysattico, aut alio passo in solij ingressu poti, vacuationem magnam præstant. Rectè etiā picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quantū tribus digitis cōprehendi potest, in mulsi cyatho vno, vel aqua temperata, vel myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinq; tantundemq; cinamomi. Qui verò ex calida solidarū partium intemperie in arquatum inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis, vnctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter refrigerate, cremore prisana, intybo, feri, cichoreo, piscibúsque, vino tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex virulentorū animalium moribus in hunc affectū sunt prolapsi, de iis quinto volumine

tractabitur. Porro si bilis in oculos faciémque se receperit, elaterij instar erui cum lacte muliebri naribus in balneo instillato, & statim in solium descendant, cauentes ne caput immergatur. Post balneum victu, recreatis, rursus medicamentum errhinon in sole, naribus infundito. Bene facit etiã cyclamini succus, porri, & nigellæ. Acetum vero accerimũ naribus attrahat in solio desidens, contineatq; etiam pressis naribus paulisper, & mirifice vacuabitur.

De vmbilico prominente.

CAP. LI.

CAusam vmbilici prominentis, & quomodo id vitij manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam verò nonnulli etiam medicamentis in naturalem statum redierunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmæ quinque, flocium vini drachmæ octo, rosacei decem, gallæ immaturæ drachmæ duæ. Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur.

ALIUD. Fabæ fresæ, corticum gallæ, balaustij pares portiones, coquuntur in aqua: vbi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter, spōgia, vt prædictũ est, imponuntur. **ALIUD.** Plumbi scobis drachmæ sedecim, cicutæ, mannæ, cerussæ, hypocistidis succi, singulorum drachma, vino dissolutis in modũ prædictum vtitor.

Quomodo impuberes imberbesq; diu maneant, & particula naturales testesq; conseruentur, ibidem etiam psilothra numentur.

CAP.

LII.

Cimoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiuntur vt sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac vtitor.

ALIUD. Cicutæ succum, solani, alterci, lupini foliorum tenerrimorum, psillij æqualem modum, vbi contriueris, vtitor, sed locum prius abstergito abluitoq;. Oportet autẽ pridie quàm vsurpare velis, aquam bibere. Medicamentum pidis abolendis dicarum, psilothrum appellatũ. Afellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissimæ similem. græci *luxtonisiss dvionas* vocant, drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, calcis drachmæ octo, aceti veteris cyathus. Lixiuia e ficu tantundem: coquito in fictili, ac in balneo vtitor. **ALIUD.** Calcis viuæ partibus duabus, auripigmenti totidem, terræ cimoliæ parte vna, in

in aqua coctis quemadmodum explicatum est vti-
tor.

A L I V D. Simplex odorisque expers: calcis viux vtriúsque
sextarium, sandarachæ vnciam. Coquito vt dictū est, & vti-
tor. Porro quæ pilos adimant, in oculariis exposita sunt.

De ramicum generibus.

C A P. L I I I.

C Vm intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa
nimum est curatio. cum verò ob raritatem illius descē-
dunt, facilior sanandi ratio est: Ac huic malo pueri potius,
vtpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq̃ adeo
citra manus operam medicaminibus impositis, & conueniē-
ti deligatura persanati sunt. Utendum verò est remediis in-
fra comprehensis, vbi hoc solum addiderimus, affectus solo
loco differre. Quando nanq; intestinum etiam num suprà
in inguinibus iacet, nostri inguinis ramicem græci, βελονική-
λην vocant. Cum in scrotum iam infrà delapsum est intesti-
norū ramex, græce ἐντρονήλην dicitur. Malicorij igitur drach-
mæ, decem, gallæ immaturæ drachmæ quinq; in vini auste-
ri cyathis tribus incoctæ, & leuigatæ imponantur, intestino
prius confricato, & aqua frigida superfusa: decimo die so-
luuntur, sed ita, vt eger in lecto maneat diebus triginta, bi-
bâtq; cupressi decoctum cum vino, vel eius globulorum
tres obolos, ex diluta vini portione. hoc medicamentum au-
xiliatur pueris.

Aliud glutinatorium.

S Y M P H Y T I radicis, marrubij succi, amygdalarum ama-
rarum, gummi, pares portiones. A L I V D. Terebinthinæ ses-
cuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearū cum
suis testis, singulorum vncia, ichthyocolla in aceto diebus
tribus ante maceratur. A L I V D. Cupressi, galbulorum vn-
cia, gallæ tantundem, malicorij semuncia, taurocollæ vncie
tres, manne thuris, semuncia, symphyti tantundem, cochlea-
rum cum testis vncia. Galbuli & malicorium vino astrin-
genti diu incoquantur. Et cum reliquis leuigatis excepta,
in vsum accommodato. A L I V D. Aloës, malicorij, thuris,
hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulo-
rum sescuncia, vini dulcis quod sufficit. A L I V D magis va-
riū, facit etiā adultis cum morbus vetustatem nondū sen-
serit: chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocollæ, lapi-
dis Gagatis, lapidis hematitidis rhus, syriaci, & coriarij, acacie

singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem nō experti, magnetis cœrulei coloris, aluminis scissi, mannæ thuris, singulorum vncia, picis brutiæ vncia quinque, cochlearum cum testis vncia, argenti recrementi quod helcysma dicitur, vnciæ quatuor, gallæ, squamæ stomomatis, æris singulorū vncia, bituminis vnciæ sex, Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medicamento tam spisso vt digitos non coinquinet, vtitor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis infantibus abstinendum, vino copiosiore, crebris balneis, valido motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

Ad aquosum ramicem qui hydrocele dicitur, vt humor collectus euacuetur.

PIPERIS grana centum, lauri bacca octoginta, nitri drachmæ viginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei hemina dimidio exceptis vtitor. ALIVD præstantissimum. Lapidis asij floris drachmæ sex, vniæ passæ acinis vacuæ drachmæ duæ. cumini æthiopici drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imposito, fouens vespere & mane: quidam verò adiciunt etiā sulfuris drachmas octo. ALIVD. Calcem viuā balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululū nitri calci miscebis. ALIVD. Radicis brassicæ crematæ cinis adipe suillo veteri liquefacto exceptus inducitur: per tri duum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat colluies, hoc vtere malagmate, Ceræ libris duabus & semisse, picis triente, guttæ ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficit etiam medicamentum diægiron hoc est ex populo nigra & reliqua extrahentia.

† Antiquus codex, πρὸς τὸ μὴ πάλιν συλλογῆναι ὕγρῃ γινώσκειν, Ne autem rursus humor colligatur.

De inflammatione testiculi scrotique & alijs ipsorum affectibus.

CAP. LIIII.

SCroti inflammatio hisce agnosceatur notis. locus primo contactu indolescit, feruor, duritiesq; intensa apparent. Testiculo autem inflammationem sentiente non ex leui tactu dolent affecti, sed innixis validius digitis rubor & durities ipsius per summa minor extare videtur: impressis autē digitis durities in alto occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque testiculorum inflammationibus propriè conuenit

nit sanguis ex talo dimissus: communiter autem omnibus cataplasmata & cerata. Imponi igitur debent ex lomento diluta vini mixtione cocto cum vis pāsis pinguibus acinorum expertibus cumini, vel hastulæ regiæ radix incocta, contritaq; miscetur tenuissimæ parti polentæ æquali: vice cataplasmatidis adhibetur vel lini semen ex diluto vino, vel fœnugræcum ex mullā, vel liliij radix ex mullā aut recentibus vini flocibus cum polentæ polline. Vel senecion, & coriandrum viride cum vis pāsis quibus acini sunt exempti. Sin multus infestāt ardor, foliis alterci cum triticea farina, aut cicerum obducuntur. vel arundinis foliis, vel cucurbita cruda. Si vetustior est morbus cum duritie, cucumeris sylue stris radix in mullā cocta, leuigataq; cum lolij farina admo uetur. Item hoc efficax est auxilium, vuarum passerarum quibus acini sint exempti, vnciæ quinq; cicerum subferuefactorum fescuncia, cumini vncia, sulfuris vnciæ nouem, nitri vncia, resinæ vnciæ tres & semissis. contrita omnia cum melle in cataplasmatidis formam digerens, vtitor. cerata autem hæc sunt, olei cyathus, colophonix vnciæ sex plumbaginis, cumini, vuarum passerarum, lomenti singulorum triens, ceræ sextans. Plumbago cum oleo adusque aliquantulam spissitudinem incoquitur. deinde cera resinæque inditur. Sublata ab igne semifrigida, vis pāsis cōtritis, farinisq; superfundito. A L I V D. Olei anethini & rosacei, ceræ, resinæ picæ, singulorum quincunx, cumini vnciæ duæ & semissis, stercore asinini fescuncia. cuminum teritur cum stercore asinino, ceratumq; refrigeratum miscetur vnaq; leuigatur, deinde in panniculum illitum admo uetur, lana superaccommodata. olei omphacini, vel butyri, vel resinæ æquali modo vtitor. Quod si à sudoribus vlcera in scroto excitentur, gallani detritam, vel alumen inspargito, pingui aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphtæ vlcere pressos terram cimoliam cum aqua prius illitam, sinito siccescere, calidaque aqua abstergito, myrtum siccam, & smyrnij paulum in puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit, cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritu scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphidagriam appellant, alumen liquidum, aceto contritum, rosaceoq; illinitur in balneo. Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.

De seminis profluvio & veneris insomniis. CAP. LV.

Seminis profluvium quod græcè γονόρροια appellatur, est sinuita ac præter voluntatem excretio, quæ continuè naturalibus non intentis, ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate provenit: in qua ex usu est cōquiescere, lumbos pubemque hapso ex vino & melino vel œnanthino cōtegēs: mox cataplasmatibus obducere ex palmulis, malis cotoneis, œnate, acacia, hypocistide, rhu, & similibus. Insidere oportet lentis, rubi, & id genus aliorum in vino decoctionibus, vel etiā, aquis cibisq; vti siccantibus: post prima morbi tēpora ad exercitatoriam rationem deducere, qua totum corpus, partēsque affectæ confirmantur. Cæterum quomodo seminis paretur fecunditas, libro primo, ubi de sanitate tuenda agitur, abundè tractauimus. Vbi etiam illorum qui venere exercere nequeunt, scripta est curatio, itē quæ ad veneris insomnia proficiat. porro iuuabit genituræ profluvio laborantes, & lectus frigidior, & dextri lateris, vel sinistri incubitus, itē medicamenta frigida lumbis substrata, qualia sunt coriadrū, cicuta, cerussa, portulaca: omnia vero ex aceto.

De satyriasi.

CAP. LVI.

Satyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidā seminis vasculorum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariorum vasculorum resolutionem, aut conuulsionem delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. obeuntes autem ventre inflantur, & frigidum sudorem emittunt ac mulieribus quoq; sed raro hoc mali accidit. sanguinem igitur proterius dimittere conuenit, victu vti tenui, & abstemio, eumq; assumere quotidie, valenter nunquā, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua & mercurialis momentum, & ius esculentum cochlearū: nil mali fuerit etiam ex simplicib. clysterem ab inferiore parte iniicere. Quæ vero vrinam mouent, medicinæ cauendæ sunt, lumbis refrigerantia quoque admouere oportet, vt solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse vero est, colem, & inter anum, scrotūque locum refrigerantium, quibus leniendi vis inest, aliquo demulcere, nempe argenti spuma cimolia creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut vino dulci, aut sapa. supino cubitu cōquiescere nocuum est. Rursus confert bibere nimphææ radicem, iridē, & adiantum. Ru

ta ve

te vero succi potus profuerit, & seminis profluuiū laborāti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumētaceus modicus, sitis indicitur. At si prorogatur vitiū, cucurbitulę cute ferro incisa defigendę sunt. Si plenitudo adsit etiā hirudinib. vacuare, & vētrę cruda ordeī farina oblinere, alienū nō est.

De priapismo.

CAP. LVII.

Priapismus est firmum genitalis incrementum, quod in longum latūmq; intumescit, citra veneris appetentiam. flatulentus nimirum est spiritus qui particulam in tumorem attollit, ex humoribus crassis, & viscosis modici caloris opera procreatus. Notum vero est cuilibet, particulas non esse calfaciendas, sed leniter refrigerandas cerato rosaceo, cum aqua contuso, itē chamamelino cerato in genitali & lumbis imposito, victus & medicamenta exhibentur, quę extenuare citra manifestum calorem possunt. Applicabuntur etiā quę naturali modo operātur, experimentis ac vñ probata. Nymphaea igitur potui dabitur, viticis semen: rutęq; viridis obsonis mixtū. Sed per initia id non assumi debet, vt quod vehementer calefaciat: verum post aliorum extenuantium vñ. Si vacuatione vñ libeat per vomitum id facies. Nam per aluum factę, vicinas particulas sępe fluxioni oportunas efficiunt. Exercitium fricatioq; flatibus discutiēdis rectē adhihentur. Nulli prędictorum venus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare conicimus.

De particulis inefficacibus.

CAP. LVIII.

Qui hoc vitio laborant, nō ruunt in venerem cōq; pusillanimes fiunt. Causa horum est, particularum resolutio, vel seminis inopia. Cum igitur ea quę semini generādo sunt, libro primo inter pręcepta salubria exposuerim, tum quę simplici virtute ad venerem incitant, nunc valentiora adicere oportet. Communiter igitur medicamentis quę a lassitudinibus reficiendis, acopa dicuntur, ad resolutionē inscriptis, hic quoq; vtendum est. Priuatim stellio concrematus, in puluerēmq; redactus cum oleo magno dextri pedis digito, illinitur, & venus exercetur: vbi cessare voles, digitus abluatur. Iam medicamentum ex stellionibus varia constans mistura efficax est. Potui vero dantur quę incitant, quale hoc primum est, piperis, baccarum pini, petroselini, ceruini genitalis ramenti, terebinthinę pares portiones. melle excipiuntur. A L I V D. Cicerum crudorum, bacca-

rum pini, singulorum vnciae duae, seminis erucæ, piperis, singulorum vncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cum vino. Item satyriace dicta ex multis cōposita cōgruet, atq; id genus alia. Inspicere pręterea oportet reliquas morbi causas, & cōuenientē ipsis correctionē accōmodare:

Pudendorum & ani remedia.

CAP. LIX.

Naturalium aniq; vlcera citra inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ vehementer resiccant: cuiusmodi sunt ex charta combusta, anethū vstum aridum, cucurbita concremata. At siccis recentibusque vlceribus, etiam aloë præsens est remediū, si arida in puluerem redacta applicetur. Porro omnium lenissimum est, & nihilominus efficax pompholyx. At si humidiora euenerint vlcera, piceæ cortex per se lapis hæmatites. sin etiam altè descenderint, manna prædictis miscebitur. Si pascendo serpent, lēticula cum malicoriis inducetur, vtendūmq; est Coraco ex oxymelite appellato, & bithyno, adhæc, eo quod ex charta vsta cōponitur. Rimas autē naturalium sedisq; Græci vocant rhagadas, inuat resina fricta, cum rosaceo cōtrita, vt sordidū fiat spissitudo, adiecto etiā luteo oni, opioq;: vel hederæ foliorū cōbustorum cinis cum rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Iā pastillus ex ænelæo, & lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tum sordida circa ani orbē vlcera, præsertim quæ elidi nequeūt. **ALIUD** simplex quod etiam acrimoniam obtundit. Cadmiæ combustæ, elotæq; vnciae duae, rosarū vngue ex foliis defecto, vncia sex. puluis inspergitur parti vino prius absterisæ. Ad condylomata vero faciunt chalcitidis, æsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorum æquales portiones cum cerato, idē præstant pastilli ex ænelæo. Quod si in cole intra genitalis foramē vlcus delituerit, pus, vel sanguis citra urinā redditus fatebitur. Curatur primum aquosa mulsa collutum, mox lacte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Leuco, aut is qui vocatur dialotarion in plumbea pila subactus demittitur, vel etiam penna tincta perlinitur. inde tenue linamentum tortile vnctum imponitur. Præstantissimum vero est etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli, & aloës pares modos, rosaceo, & plantaginis succo leuigatos.

Ad naturalium dolores.

BYTYRI, resinæ, paribus portionibus pulchrē liquatis obdu

obducito, *velex* seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigatum imposito.

Ad intumescencia pudenda.

Vitis foliorum tenerorū triginta numero, cerussæ drachmæ quatuor trita applicantur. Cæterum foru ex aqua marina frigida coles vtitor & quiete, penemq; deligato. Carnosas naturalium excrescentias, quas Græci thymos vocant, compescit, nec sinit rursus augescere cinis palmittum cum aceto cataplasmatismodo illitus, item salicis corticis combusti cinis. In vniuersum & thymus, & myrmecia, & verruca pensilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta valenter exulcerantia eliduntur: iis autem quæ exedunt, emoriuntur. Proprie contra hæc vitia proficit, elaterium cum sale impositum, grossi cum aceto, nitro & farina. Liquor fici illitus, smaridis caput salsum crematum in cinerem, ærugo cum sulfure viuo combusta, tithymalli liquor illitus, ocymi folia cum atramento sutorio, vel heliotropij maioris semen cum vino cataplasmatismodo applicatum.

Ad ani inflammationem.

CERVSÆ vnciæ quatuor, pompholygis vncia, vel cadmiæ teneræ, thuris singulorum vncia: sereos succi hemina diluuntur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex vnciis duabus ceræ, & rosacei libra confectum: vbi deraferis miscetur, validèq; emollitur. Demittitur autem instrumēto quod à pure trahendo *πυλ-λ-α-κ-η* Græci nominant, & superdeligatur, facit autem & ad ani fistula cum inflammationem sentiunt, item aduersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rosione infestantes.

Ad sedis erysipelata.

MEDICAMENTI, quod ab herbarū succis diachylon appellatur, libra, rosacei quantum satis est, panis puri libra, croci vncia, opij vncia. crocus & opium passio macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum admiscetur, emolliturque. Vtile est etiam ad podagras calidissimas. **ALIVD.** Arcet etiam ani inflammationem cerussa cum vino rosacéoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq; vel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuigata, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.

Hedricum ad ani dolores.

ALTERCI folia tenera, portulacę folia tenera, micas panis in vino tinctas, ouorum tostorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est. vbi locum rosarum & meliloti decocto foueris, cataplasma imposito.

Hedricum optimum ad ani inflammationes, eiusdemq; excrescentias.

CERVSSAE, spuma argenti, suffiminis ammoniaci, bdellij, singulorū scrupula sex, terebinthinę vncia, cerę semuncia. Arida succo solani, alterci, vel portulacę cōterūtur. Quę liquātur, vbi illis adiūta fuerint, excipito. Et emolitis rosaceo, vtitor. Iam medicamē phicotyche. & dia molibdenes ad hęc dialotariō. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodō ad ani inflammationes genitaliumq; laudata sunt remedia.

Ad excrescentias ani.

EXCRESCENTIIIS si inflammatio adest, vtendū generatim iam commemoratas, & propriē hoc pastillo, cerussę quadrās, pompholygis vncia, argenti spumę sextans, mastichę scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, vino prius absteriso inspargitur, vel cucurbitę aridę corticis combusti, vel palmularum nucleorum cinis similiter, vel testarū ouorum, & fœniculi cinis, vel succi mali punici foliorū, æqualis modus. Vino albo deterisa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auri-pigmēto cum aceto acri trito rectē etiam in sole perungis.

De hæmorrhoidibus.

ORI s venarum, quę quod sanguinem fundere solita sint gręcis *αιμορροΐδες* appellātur, iusto largius inanitis, habitū in aquā subter cutē resolui cōtingit, & affectos, infelicitè cōtabescere: periculum vero est, etiam ne largum sanguinis profluuium accidat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: vnde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, vnā purgationis gratia relinquere oportet. Quædam vero superius existunt, non apparentes, eoq; difficilem curationem recipiunt. Cæce autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem. hæ itaque succo cyclamini illito adaperiuntur. Contra eas vero quę immodicē fundunt sanguinem, spinę ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisiæ, singulorum vnciæ quinque, sideritidis vnciæ quatuor, coquuntur in aquæ heminis octo ad dimidias, inde

her

herbæ proiiciuntur. aqua vero miscetur pulvis hic cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. vbi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. insecuto die pari modo aliam confectionem mensura æqualem superfundito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acu compūges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit. pulueris vero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, vt exactè adurantur. panis ob inflammationē instar cataplasmatidis inducetur. A L I V D. Panis pūrus in garū primæ notæ tinctus, vstusq; in nouo fictili, & pertritit applicatur, ano prius vino abluta. Facit etiam ad excrescētias. A L I V D. Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundē, atramenti sutorij quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ sutoriæ drachma. sicco vtitor. Cibi erunt iis qui supramodum inaniuntur, pauci sanguinis efficaces, & minimè recrementitij, quiq; siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, cichoreum, portulaca: inter vina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obcæcatis, his cōtrarius victus proderit: potissimum vero loliginum, sepiarum, multipedarum, torpedinis, selachiorumq; esus probè conueniet. hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

Ad prociudentem anum.

ERYCÆ fructus, gallarum, cerussæ, acacie, hypocistidis succi, piceæ corticis, thuris, myrrhæ minæ, paria pondera. Sicca admovento, ano vino prius austero deterfâ. A L I V D. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarū floris drachmæ quatuor, myrrhæ minæ drachmæ duæ. Vtitor sicut priore. A L I V D. Piceæ corticis, manæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, vtitor quemadmodum præceptū est. item vrina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

De veteri affectibus & primum de mensium purgatione. C A P. LX.

Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis vero ante tertiumdecimū, aut duodecimum,

decimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpūt. Tempus cuiq; purgationi præfinitum non est, ordinatumq; multis ad duos trēsve dies, haud paucis vsque ad quintum profluit, aliis etiam adusque septimum: raro ad duodecimū purgatae sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem vsque ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta quinque annis, præsertim obesīs, menses cessare incipiunt morata igitur purgatione, lauandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamum, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autē ex passō cretico erit, cuius heminae mensura pota ambulationibus mēstrua dimoueantur. Cibus sit, lolligines, sepiæ, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem propriē continuoent.

De mensium suppressione.

SUPPRIMITVR menstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam vero locis peculiari vitio conflantibus ex frigidityte insita, aut ictu, aut intemperie ab origine, seu acquisita malignitate magna vero parte ex abortu: vel principaliore quadam parte primario affecta, nempe iocinore, aut ventriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo vitiata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circumciditur, aut moratur, ex usu maximè fuerit, id quod primario afficitur curare, inde vteri habere rationem. Notæ vero quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum vero nihil illorum adfuerit, constat palam primario affectu vterum occupari. Itaque si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, venam oportet incidere, idque non ante statum mensium tempus: sed vbi iam præterierit, decem dies superadiiciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & dimidia, neque minus vna, si quidem venam diuiserimus. Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris ad sit, hiera quidem vti non expedit, verum sanguinem mittere in primis febriculæ diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus pauculis: in sequentibus autem, exercendæ obambulationibus, inferiorum frictionibus, & balneo. Cibi cōgruunt distrib

distribui faciles, & liquidi, olera, dulcia omnia, pisces saxati-
 les, ex auibz teneriores, lactis potio, ex melle confectiones,
μικτῶματα vocant, vinum tenue, album, non adeo vetu-
 stum. carnes inidoneæ his sunt, & legumina, præter ptisanā.
 Vbi statum mensium tempus propinquum est, dantur ex
 marinis selachia, & malachia, vt dictum est, item ostracoder-
 ma, hoc est testaceam cutem sortita, capitata porra, cum ru-
 ta & pipere cocta, eorumq; ius potui datur: infernæ partes
 vinculis, tribus quatuorve diebus constringuntur. Cum in-
 stat tempus purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obo-
 lus bibitur, aut fabæ instar, vel castorium ex passo, aut mul-
 sa, vel decoctum artemisiæ, aut saluæ post balneum ex pas-
 so, & absynthij. Absynthites autem vinum per totius cura-
 tionis decursum potatur. Vbi accesserit iam menstruale tem-
 pus, si nihil, aut nulla mentione dignum fuerit excretum, ex
 talo sanguis detrahendus est. Post septimum, aut octauum
 diem, purgatione ex hiera vtendum est, secundum quartum
 diem, dropax inferiori ventris regioni, lumbis & feminibus
 applicetur, atque aquæ potu triduum ysa, sinapi cum æqua
 panis macerati portione adusque æquinoctium admoueat,
 deinde lauet, insecuto mense ficus siccata in vicem panis mi-
 sceantur decocto fœnugræci, maluæ, pulegij, rutæ, & artemi-
 siæ. In sinum vero demittetur, susinum, aut amaracinū,
 pessusq; inseratur emneapharmacus, aut libanius. Est autem
 pessus lana concepta, & in rotundam, digiti humani formā
 redacta qua medicamenta contineantur. Hæc igitur curatio
 plerisque ad purgationem abunde fuit. si autem vehemen-
 tioribus indiguerit medicamētis, hæc sunt, iris illyrica cum
 vino pota, iunci angulosi, ariq; radix, cassia, iunci rotundi
 flos, & nardus, helenij radicis decoctum, myrrhæ ad fabæ
 Græcæ magnitudinem cum passo ex dimidio mulsæ cyatho
 pota, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniacum,
 & sagapenum. Quæ minus stomachi vitiis sunt oppor-
 tunæ, etiam opopanacis paululum in globulos redactum
 percocto melli intinctum, assument. Iam verò consueta no-
 bis semina menses mouere possunt, sed minus: fœniculum,
 cuminum, apium, daucum creticum, sēseli, ami, sison, cicer,
 fructus cedri, ac omnia quæ vrinam prouocant. Commode
 etiam sinui muliebrium imponuntur myrrha, absynthij, aut
 lupinorum decocto trita, aut rutæ succo leuigata, bdell-
 liumq;

liumq; similiter, styrax, syluestris oleæ gummi, aut rutæ succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrij formam concinnata. Per similitur etiam magni centaurei radix, aut veratri, aut liquor scammoniae, & cucurbitæ syluestris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galbanum suffumigatum. Eadem vero & foetus solent educere.

De immoderata purgatione vteri & sanguinis profluvio.

C A P. L X I I.

Immodicæ purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus adactis confarctimq; ac concitatus erumpentibus, interim ob legitimum partum quæ plerunque etiam sponte sua cessant: Crebro autem abortus causa, vehementi laborant profluvio, ut subinde periculum accedat. Imprius igitur extremi artus ab alis & inguinibus, vinculis excipiuntur. Posca non frigida potui datur, muliebria ex eadem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ, ex vino, oleo, vel rosaceo, vel melino, vel myrteo expressæ. Cibus dabitur chōdrus lotus ex posca: vel oryza, vel alica: vino autem abstinebitur, & hydromalum austerū, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balaustrum in posca propinari, vel hypocistidis, vel acaciæ succus, vel lycium, vel samius aster, vel succus immaturæ vnae siccus, vel rheon, vel lenticulæ ex Italico fistili combustæ cinis: aut sesamum editur in posca maceratum, quoad molle delicatumq; euaserit: insinuati vero pessi per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hypocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contrita. Mirificè auxiliatur spongia in vino, aut liquida pice demersa, pessarij modo adhibita, vel combustæ ipsius cinis cum aceto, vel posca eodem modo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fistili concremati cinis. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cataplasmata ex palmulis, & cotoneis: quæ malicoria receperint, aut fageam glandem, aut rubi surculos, aut lentisci folia, balaustrum, acaciam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime vero hoc, taurocolla madescit posca, quousque soluatur. deinde in linteolum validum illinitur, lumbisq; agglutinatur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, veluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoque ad sanguinis profluvium uti oportet. Gallæ interius leuigatum, & thuris lachryma aqua diluta naturalibus

bus inferitur, vel cytini, vel mala punica dulcia similiter, vel polygonum tritum. Composito autem, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciae succi, mannae, singulorum vnciae quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur succo plantaginis, miscenturque. Cum vsus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuanturque naturalibus. Iam cucurbitulae leues magnae frequenter subter mamillas affixae abunde retrahunt. Inseffus autem profluuiis sanguinis laborantibus conuenit, ex marino iunco, Graeci vocant oxyſchœnum, capitibus myrti, roſis, rhamni foliis, rutae surculis, æquali pondere in aqua coctis insidere iubeto. ALIUD. Mali punici dulcis radicis corticis, myrti, cupressi corticis singulorum tres partes, gallae pars vna, aquae quod satis est. Infundito autem per vterinum clysterem succum plantaginis. aut fereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicii herbae, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acaciae, eaque lana aut digiro, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper pastillus Andronis per vterinum clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut vino astringente efficax est remedium.

De fluore muliebri.

CAP. LXIII.

Vluae fluor, totius corporis quod expurgatur est distillatio: Talem vero speciem id quod euacuatur, representat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrum, veluti sanguinis sanies, aliud candidum, puitae soboles est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud vero aquosum. at si sanguis purus, sicut in venarum sectione, efferatur, attendendum est accuratè, ne quaedam in vulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continue madent humoribus, colore variantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in obambulatione difficulter, spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflàmata, aut sordida, aut pura. Toti igitur corpori auxiliantur quae citra manifestum calorem exiccant, cum affectus sit humidus, frictio totius corporis, & vinctio ex melle abunde cocto, medicamina dantur vrinam ciētia, utpote aqua, cui asarum & apium sit incoctum: vacuatur etiam totum corpus per aluum: praeterea portulaca commanducata, succusque

cusq; ipsius potus praesidio est. Item balauustum, rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiacet, & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maxime sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut vino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum vino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut hœdi, aut ouis, aut vituli, aut cerui, vinacea trita, myrti, vua immatura sicca, piceæ cortex. & quæ ad vuluam sanguinis profluuium laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi vero cum labore fertur, per siphonem vteri, clysteremve alicui succum, aut ptisanam, aut tragi, aut oryza demittes cum aliquo medicamento quæ dolorem sopiunt, ἀνέλκω Græci vocant: & in accessionibus quidem lenire oportet: cum autem remittit, circuitum enim nonnunquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit variis gestationibus, obambulationibus, vociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas vinculorum iniectionibus, frictionibus, pilothris, smegmatis, sinapismis, vomitibus à radícula victus ratione viribus recolligendis dicta, balneis, vino, vario ciborum genere.

De inflammatione vteri, & declinatione. CAP. LXIII.

Inflammatiō vuluæ, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoq; ex abortu, & ob sinistram partus additionem. Comes inflammationis vuluæ est febris acuta, dolor capitis, tendinis basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita stomachi ex consortio dolor, oris vuluæ conuiuentia, pulsus exigui, crebrique. Et si languida fuerit inflammatio, haud valido ipsius vteri dolore torquetur. Sin vehemens, & ipse totus pulsatilem cruciatum percipit, vndiquaq; inflammatione obsessus. si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus longanone compresso, retinetur. si priora, dolor inferioriorem ab umbilico ventris regionem occupat, & stillicidium, aut vrinæ difficultas vesica pressa excitatur. lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur. & crura grauantur. Extrema ad fundum vteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum vero os vuluæ inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque

toq; immisso os occurrit durum rigidumq;. Itaque in curatione primum vsui venit fots ex vino & oleo, vel vino & oleo rosaceo super infernam ventris regionem & lumbos per hapsm ex lana puriore citra deligaturam adhibitus. Cibo abstinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est, si nihil prohibet. alendæ sunt chondro ex aqua mulsa, vel pane, vel ouo forbili, vno die interposito. Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline farinaceo, semine lini, fœnugræco, ex mulsa, in qua papauerū capita decocta, reiciantur, & oleo. at si inflammatio erysipelatis naturam sortita exandescat, meliloto in passo cocto tritoq; ouorum tostorū lutea adicito cum rosaceo, vel melino, vel crocino, & cataplasmatibus modo adhibeto: aut palmas vino temperato feruefactas, cum polentarum polline, & quodam ex enumeratis vnguentis leuigato, applicatoq; in morbi aut declinatione ceratum nardinum, aut cyprinum iniiciendum est. Per totum verò morbi decursum, etiam infusus vtilis sunt ex decocto fœnugræci vel seminis lini, maluæ, artemisiæ, & oleo. In iis autem quæ nō sustinent calorem, ex aqua calida rosaceo superfuso: pesos autē infusionesque adhibere conuenit ex æsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, vnguento susino, & cera thyrrenica. in quibus autem calorem ferunt, etiam pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis cōueniet, item enneapharmacus: rursus in quibus non tolerant, ex ouo, rosaceo, adipe anserino, vel gallinaceo adaptabitur. Porro ad inflammationes magis furibundas emplastro dia chylon quod est ex herbarum succis in vase fictili cū rosaceo liquefacto miscetur succus plantaginis, vel sereos, vel cichorij, vel intybi. Aut hoc vttere: adipis anserini, vel suilli recētis drac. quatuor cerati rosacei, vel susini sextante, ouorum tostorū luteorū vncia, croci drachma, myrrhæ tribus obolis, opij obolis duobus, vel loco opij, papauerū capitum decocto: si dolor multus excruciat, lachrymā papaueris instat lenticulæ cū lacte muliebri, & succo fœnugræci in pello subiiciendū exhibeto. At si inflammatio cū duritia infestat, tetrapharmacum rosaceo solutū, applicatur, vel infunditur. si à naturali sede vulua declinauerit, per accessiones similem inflammationibus curationem recipiet. vbi verò remittitur dolor, & declinat, leuioribus vtendum. Quod si malū inueterauerit, noxia ex

alto euocantibus vtendum, quæ metasyncriticâ dicunt. Extrinsecus autem duritie oborta, malagmatis pugnâdum, nempe dia melilotum, hoc est ex sertula campana confecto, item Mnasei, Icesii, melinæ Serapionis, aut pyrina, victus autem per initia tenuis adhibetur. Vbi paulum declinauerit malum, ægrotantes ad balneû ducentur: varioq; magis cibo & pleniore nutriendi.

De vuluæ abscessu.

CAP. LXV.

Inflammatione in abscessum transeunte, dictæ quidem uotæ intensiores erunt. Præterea verò inordinatæ febriû cum horrore accessiones obueniunt primis quidem temporibus intense, cum doloribus. ad vltimum, vbi suppura-uerit, aliquantulum remittunt. Postquam verò erumpit vomica, dolores acriores subinde visi sunt, ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ vehementius instant. Atq; vrina nonnunquâ retinetur, nonnunquâ stercus, impedimêto ab affecta vteri parte facto. Aliàs tumor in pube eminet, & veluti exudationis sensus cû abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiâ instrumêto ad perspicendû iniecto, aut digitorû tactu deprehenditur præterquam quòd dolores ob neruosam oris vuluæ membranam acriores vrgeant, sicut in fundo sinûque minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius adiuuanda est cataplasmatibus ex fœnugræco, semine lini, farina hordeacea, aut frumentacea, cui ficus coctæ adiciâtur, interim & stercus columbinû. Inseisibus etiam ad inflâtionem aptis, frequētius vtendû. Itē pessulis ex terebinthina, mirrha, æsypo, butyro conueniunt. Abscessu autem rupto, si ad vesicam pus euaserit, lactis & cucumeris seminis potu vtendum est: sin ad longanone ruptus sit, lenticulæ & malicori decoctum indetur aluo. At si in sinum pudendi eruperit, mundum quidem à pure, rosaceum infundetur, aut candidum oleum, aut tetrapharmacum regale, aut butyrum recēs. sin autem efferatur faries tenuis, fœtida, ceu ab vlceribus depascentibus, magis astringens erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si verò humoribus etiam excretis, inflammatio diuexet, persistere in cataplasmatibus, & inseisibus, ratio est. Cæterum si in vuluæ ostiolo, abscessus sit obortus, neq; rumpatur, partibus, quæ puri incumbût, extenuatis, ad puris excre

excretionem, quæ manu administratur, diuertere consilium est, ut in chirurgica pertractabimus.

De vteri exulceratione

CAP. LXVI.

EXulceratur subinde vulua ex infelici partu, aut foetus extractione, aut eius corruptela, vel ex medicamentis acribus, vel fluore, vel abscessibus diruptis. si igitur proptæ in conspectum venerit exulceratio, instrumento locis inspicundis idoneo deprehenditur. sin altè defecerit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur: ex inflammato quidem vlcere, paucus, cruentus, aut fœculentus cum magno dolore: ex sordido autem copiosior, & sanies cū minore cruciatu: depascente, fœtidus, niger cū doloribus vehementioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicamina, irritant, contraria leuant. Cum purū vlcus est, humor paucus, æqualis, odoris expers, crassus, cādīdus, cum sentiendi facilitate habetur. Si inflammationem experitur, vlcus, iis quæ ad illam scripta sunt, vtendum est. Sordidum, prisanæ cremore cū melle illuendum est, aut tetrapharmacum iniiciendum cum susino, vel mulsæ, in qua fœnugracū sit decoctum, aut malua, aut furfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quò magis expurgetur, etiā marrubium, aut eruum, vel melli adiuncta erui farina, vel iris, vel alumen rotundum, vel aliquid simile inspargatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus ex mulsæ macerata instar cataplasmatismis illinuntur. Peculiariter prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ lenigatur cū lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cū adipe anserino inūgitur linteolo. verū quod infra ponitur, isto quoq; efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passō temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquuntur, donec intabescant, postea teruntur vnā cum rosæ foliorum drachmis quinq; croci drachmis tribus, iute capitum papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamentum ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui medulla præparatū. Itē Aegyptia citra æruginē mirificè ad exulcerationes cōducit. † vbi aut pascēdo serpūt vlcera cū inflammatione quidē obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althea, fœnugracō, palmulis pinguibus. Iniicietur autem plantaginis succus, solani, polygōni, & sereos primū per se,

mox cum vino austero, aut aceto. At citra inflammationem, si urgeat depassio valentiora iniiciuntur, veluti decoctum malicorij, rosarum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisci, rhamni, rhus coriarij ex vino astringente. postea verò aluminis, acaciæ, lycij, hypocistidis. ex eisdem vero decoctis parabitur etiam infusus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cum posca primam demittere, deinde cum aceto, aut Antherâ, aut chalcitidem, aut atramentū futorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis cōgruunt: cibis dandus boni succi, modicus. Purgato vlcere, egrotans balneorum ciborumque varietate sollicitari, vinoq; refici debet, quo caro statim procreetur. Pesi loco subiicitur medicamentū diamoron, hoc est ex moris, remissum cadmia, vel ladano, vel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quemadmodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. νομῆς ὃ οὖος σὺν φλεγμονῇ μὲν καὶ πλάσσειν ἄρτω καθαρῷ πεφυγμένω δι' ὑδρομέλιτος, ubi autem est nomen cum inflammatione inducere cataplasma oportet ex pane puro subacto ex hydromelite.

De cancro.

CAP.

LXVII.

CAncrorum vuluæ alij cū exulceratione, alij citra vlcus inuadunt. vbi igitur exulceratio non est, tumor in vuluæ ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore feculentus, subruber, interim subliuidus, ac vehemens dolor exercet inguina, abdomē, imum ventrem, & lumbos ad manus cōtactum, variāmq; medicinam excandescunt. Exulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumorēmq;, ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, sordida, labris prætumidis, albicantia, turpem humorū colluiem concretam habentia. Quæ verò pura videntur, faculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparēt: sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauiter olens. Interdum verò & sanguis defertur, aliæq; notæ in vulua inflammata expositæ. Itaq; affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est in fessibus ex fœnugræco, malua, ac cataplasmatissimi

similibus. Insigniter autem leniunt, solanturq; in accessio-
nibus malua, aut altea in mulla intabescēs, & rosacei paulu-
lo lenigata, & applicata. Ad hæc cataplasma ex ficis siccatis
melilotis, ruta, thure, buniade herba diligenter cum oleo
contusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui ad-
iecta sint ouorum lutea, polentaq; , vel ex papauere cum co-
riandro, aut polygonio, aut seri. Hęc in doloribus vsui sunt,
Postea ceratum iniiciatur ex rosaceo, aut myrteo, aut cœnan-
thino, aut melino, cum palmulis in passo coctis. propriè ve-
ro cōuenit præparatū ex amurca in vase æneo collecta, quæ
torrefacta lenigatur, & rosaceo cerato, adusque emplastri
spissitudinem excipitur, hæc quidē extrinsecus conferunt,
intus autem oleum quoq; lenit, vbi fuerint exulcerati, item
lac muliebri infusum. Pari modo succus plantaginis tepi-
dus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico
dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex croco, muliebri lacte, la-
chryma papaueris, & cœlypo. Omnibus autem efficacius est
etiam ad sedis affectus medicamentum quod recipit: Argen-
ti spumæ Italicæ lotę selibram, thuris masculi, cœlypi, adipi,
suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ, singulorum
sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex sereos suc-
co trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facile in cor-
poris membra queat distribui, bonique succi, vinum pau-
cissimum, aquosum: acrium esus, & alimenti copia vitanda
est, vt quibus cibi promptè corrumpantur.

De scirro & duritie.

De scirro & duritie. L X V I I I.

Scirrum contrahit vulua, aliis repente, vt nulla causa cui-
dens præcesserit. plerunq; verò eundē inflammatio mouet,
quæ nec soluta, nec in abscessum mutata fuerit. At scirrorū
genere cōprehendetur etiam durities, quam σκληρώμα Græci
vocant, circa vuluæ ceruicem potissimum obueniens: tumō-
rem quidem pari modo repræsentans, sed minus tactui re-
nitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem hos
quoq; vteri in opposita declinatio & tumor qui ratione de-
pressionis vehementer renititur, cum grauitate, motuq; dif-
ficili, non crurū modò, sed totius etiā corporis, atq; obeun-
dis actionibus pigritia. sequitur non probè curatas, malus
corporis habitus, aquam inter curam repræsentans. Per ini-
tia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis,
assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, cœlypo, nitro,

absynthio: & cucurbitulas cute ferramento incisâ admoue-
re consilium est. Malagmata verò hæc, Polyarchion, & dia-
spermaton hoc est ex seminibus confectum, & quod bac-
cis lauri constat. Infessus ex caricarum decocto, artemisia,
pulegij, altheæ: pessulos ex terebinthina, galbano, myr-
rrha, iride, æsopo, dropace, aquas naturales sulfurosas, bitu-
minosasq; vsurpare commodum fuerit: si vires cōstant, etiâ
helleborismus conuenit.

† *Vetus liber, ὅγν' & πρὸς λόγον τ' πλῆθους ἰσχυρῶς ἀντίτυπ' &* id est,
tumor ratione plenitudinis vehementer resistens.

Pessulus emolliens.

CERÆ ponticæ, nardini vnguenti, singulorū quadrans,
irini, gleucini, cyprini singulorum vnciæ duæ, adipis vrsini
anseriniq; butyri, æsopi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ,
singulorum vncia. A L I V D. Polij drachmæ duæ, myrrhæ
drachmæ quatuor cum vino Mendefio tritum irinoq; im-
butum subiicitur. A L I V D. Ceræ thyrenicæ, adipis vituli-
ni, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei vete-
ris parēs modos. M E D I C A M E N T U M noxia euocans quod
Græci dicunt metasyncreticon, & ad inflationes, vix passæ
candidæ sine acinis, vnciæ tres, rutæ viridis foliorum vnciæ
duæ, aquæ marinæ fescūcia, cymini drachmæ quatuor, mel-
lis quod sufficit. Inunctum verò pessulum cyprino oleo im-
mergito, & subiicito. Præterea Chrysus ab auro sic dictus
pessulus Libaniúsq; & Enneapharmacus affectui sunt vti-
les. verum Titianus his magis accommodatur.

De mola.

C A P. L X I X.

*M*ola quoq; induratus est tumor, interim in vulgæ ostio
lo, interim etiam per totam ipsam prominet, tactu la-
pidis duriciem refert: ita ut ea & quæ superiacent deorsum
trahantur, corpus emacietur, color prauus appareat, cibi fa-
stidiū vrgeat, menses supprimantur. Mamillæ inturgescant,
ut in quibusdam per initia de fœtu cōcepto sit suspicio. In-
secuto autem tempore discernuntur: nonnullæ verò aquæ
inter cutem præbent opinionem, sed hoc intercedit discrimi-
nis, quod tumor durus sit, nec sonus fiat cum digiti iniiciū-
tur, quemadmodum in morbo hydropico. Cum autem
intenditur, in aquam subter cutem reuera degenerat.

Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus

redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modicè frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant elatiores quietosque. Nam motus quàmlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiæque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis vulvæ dicta sunt, planabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisque eruptionem, ut etiam fluorem muliebrem curabimus. Cæterum sunt qui molam carnem assèrant informem, ipsi vulvæ tunicis adhaerescen-tem, fortis modo in lucem adi. Atque hæc morbi species victus ratione laxante tractabitur, quò citius excutiat.

De inflatione vulvæ.

CAP.

LXX

INflatur vulva ex frigore, vel corruptione foetus, vel ex agro partu osiolo conhiuente, vel sanguine in grumum intus coacto. Aliàs spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, aliàs in raritatibus vulvæ corporis, quas tumor pubis & imi ventris comitatur cum duricie & dolore punctorio, qui ad septum transversum vsque & stomachum inguinæque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu timpani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaque ex oleo rutaceo adhibentur: infusus ex rutæ pulegij, artemisix, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apij, cumini, anisi, ameos, farina lolij. Adhæc cucurbitula, tum lenes, tum cute incisa affixæ. At si diutius vitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est: dropacæ, sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumben-tem si cõringat, auferet, leniter ipsum dissipâs, rursumque admovebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absynthio. At epithemata mollientia erunt, Polyarchion, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatum. Præterea pessi ex ruta, melle, & nitro. Maxime verò hic conducet, ficuum pinguium contusarum drachma, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma. at acrimoniæ causa, in lac prius immergantur. Iam emollientes pessuli sunt huic vicio accommodati.

scula, excitabitq; & ea admovebit, quæ per sternutamenta euocât, ex castorio, struthio, & pipere. vbi accessio cõquie- rit, vomitum cogere, cibum nullum aut paucum præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthi- dos dabitur, post triduum cucurbitulæ defigentur lum- bis & iliis. Mox castorei potione vtemur, nunc artemisiæ de- cocto, nunc ex mulsâ, in quibusdam enim hoc vel solum ad integram morbi curationem abundè fuit. Inseßus por- rò & pessus mollientes his adiungentur. Atque hæc ad ac- cefsiones proficiunt, verùm vt totum corpus reficias, à san- guinis dimissione auspicatus, ad purgationē ex hiera trans- gredieris. Inde picran ex aloë factam exhibes drachmæ pon- dere cum tribus aquæ mulsæ cyathis, diebus continuatis, vel interpositis mensura duarum drachmarum, cum senis aquæ mulsæ cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & si- napismos vtiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis vti, frictione & vocis exercitio prodest, de- nique & aquis naturalibus.

De vuluæ procidentia.

CAP. LXXII.

Vlva procidit rarò quidem, sed multis occasionibus, vel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, mēbra- nis, quæ interaneū id cõtinēt, ruptis, aut extractione secūda- rum simul ipsam extrahentium, vt quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili: vel indiligentius imperi- tiūq; extracto fœtu, vel ex vulnere, vel aliqua animi pertur- batione, scilicet nuntiato filiorum interitu, aut hostium in- sultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quadā cau- sa: Vt cū tota corporis mole soluta, vulua simul sit deuoluta vel ob resolutionem, imbecillitatēq; particularum, vt in- clinatibus ætate potissimū accidit. Procidit autē iuxta os ipsius. Quidā verò & totā vuluā prolabi memorię produnt, quod à vero longè abest. Qua enim ratiōe sursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur fœcibus clystere prius eua- cuatis, vrinaque excreta, quò vulua vndiquaque sit libera, laborantem figurare supinam, vt coxas habeat sublimio- res, poplitēsque flexos cruribus diuarcatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinui muliebri pro- portionalem, tenuiūq; linteo circūdare, & in succum acaciæ, vel hypocistidis vino dilatum demergere, tum vuluæ in- serere, & citrà violentiam totum quod procidit sursum age

re, quoad tota moles in sinu factus subsederit. Inferna ab umbelico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulae agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & utrisque illis: naribus odorata admovebuntur olfactanda. Tertio die lana sinui iniecta, mulier insideat in vino nigro austero modice tepido, vel in decocto myrti lentisci & malicorij. his probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inseritur. Cataplasmata à foris imo ventri superiniunguntur ex palmulis, polenta, vel lentici & malicorio cum oxymelle, ac tribus diebus interpositis rursus hæc fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu periculi. Etenim vulua vniuersim ablata, ubi computruerat, mulierem superuixisse commemorant.

De muliebrium locorum clausura, quam plurimum appellant.

CAP. LXXIII.

Oci muliebres circa ipsorum os clauduntur, vel ex procedente exulceratione, vel in scirrhum durata inflammatione. Curabuntur in seſibus qui emolliant, ex hydreleco & fenugraci decocto, consimilibusque; cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusque iis qui ex aromatibus consunt utendum erit. Iam vero soluit etiam hoc vitij cum nihil aliud sit quam vulua ostioli astrictio, pessulus ex æſſypo, nitro, resina, & terebintina.

Vt sterilis mulier concipiat.

CAP. LXXIIII.

Communiter itaque ambobus congruit, & viro & mulieri vniuersum corpus conseruare probe temperatum, laboris, cibi, balnei & reliquorum omnium mediocritate, & quod inter ea maximum est, curare ne habitum sint obesiore. Neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuo se contingere haud possint commodè, tum quod momentum seminis emittant. Neque tamen nimis extenuati, liberis operam dare feliciter queunt. Iuuabunt autem ipsos omnia calefacientia & leniter inflantia: vinum itaque calidum modice sumptum. Et ex oleribus, crucea, horminum, erisynum & consimilia: ruta verò & calamintha omnino vitanda sunt. At si humorum quodam vitio femina non

non concipiat, hos expurgare, aut proba victus ratione emē-
 dare expedit: Proprie verò mulieribus conueniet, curam lo-
 corum genitalium quàm fieri potest maximam habere, &
 menses sine vlllo impedimento emanare. Cum igitur pro-
 pinqua est purgatio, cibi potúsque quàm maximè licet, me-
 diocritatem, curæ habebunt. & ex iis quæ purgationi irri-
 tandæ sunt, aliquid assument, cuiusmodi sunt adorata ole-
 ra & acria, vtpote scandicem, erithmon, fœniculum, apium,
 smyrnium. Porro vuluæ intemperiem corrigere oportet:
 frigidiore itaque notat menstruorum retentio, victus fri-
 gidior, & crassi succi, stupidum quid in ventris parte infer-
 na lumbis, & cruribus oboriens. Quæ verò penitus refri-
 xerunt, ne venerem quidem appetūt. Quare conuenit cum
 aliis remediis, tum fomentis omnibus & iis quæ constat suf-
 fitibus, calorem reuocare. Nec abs re fuerit, castoreum bi-
 bere, & ex feminibus odoratis, cuminum, anisum, pulegij co-
 mam, iuniperi fructum, pipere singulis adiecto. at fomenta
 ipsarum vuluarū, partim vapores erunt qui inferius per sel-
 lam assumentur, partim aqua calida ad collutionem iniecta,
 in qua decocta sit saluia, artemisia, ruta, iuncus odoratus an-
 gulosus, pulegium, acorum, semināq; odorifera: hæc singu-
 latim etiam inferiori ventris regioni ab umbelico applican-
 tur. Præsidio est, & polyarchi epithema. Item inferioris ven-
 tris coxarūmq; fricationes nihilominus conducunt. Insuper
 in pennis subiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & castoreo,
 vbi prius aqua malsa, aut marina vuluam foueris. proficit
 etiam ad hæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fa-
 tetur corpus totū calidius, menses pauci & laboriosi, genita-
 liāq; mulieris exulcerātes, corriguntur modicè humectis &
 frigidis, cuiusmodi sunt olera quidem lactucæ, maluæ, bli-
 tum, cucurbita, cucumis, pepon, atriplex, portulaca, aliiq;
 cibi consimiles. vesicæ abdomini et lumbis frigida applicā-
 tur cataplasmata, succiq; illinuntur. At humiditatis vitio
 fecunditatem frustrari indicat in coitu, vulua humescens,
 tenuius & copiosum menstruū. His victus utilis est siccior,
 labores, superiorū perfricationes, vomitus, cibi sicci & me-
 diocres. Profuerit & vuluam acerbis medicaminibus con-
 tinere, quale est lentisci decoctum, myrtorū, rosarum, rhus,
 item mali granati floris, rubi ramusculorum teneriorum,
 & gallæ. Sicciorē verò vterum contrariis curare oportet,

PAULI AEGINETAE

balineis dico, inunctione, & alimento humido, olerosoque, mediocri vino & non nimis veteri. Quod si à crassioribus succis concipere impediuntur, siquidem rodens aliquis fuerit, mulierem probè purgare conuenit medicamento quod cuilibet humori proprium est. maximè autem picra ex aloë: mox sero lactis aluum ducere, & victum probiorem deligere. Pituitosos autem humores laboribus vacuare, sudoribus, & vomitu: vel per inferiora. Ceterum ex medicamentis epithimum quoque, euphorblum, piper, dauci semen, petroselinum semen, omnia contrita drachmarum duarum pondere potui rectè dantur. Hoc & ventrem probè ducit, ac vuluam calefacit, quemadmodum sæpe iam menses eruperunt etiam iis quæ purgationem non sunt expertæ: Postquam vero utrum emendatum esse constiterit, mensuris benè respondentibus, tunc venus est ineunda, purgatione desinente. Iam verò, quoniam spiritus similiter in vulua inclusi cōceptionem impediunt, notas ipsorum ex capite de vuluæ inflatione sumemus. Medemur autem parciore primum victu, mox cuminum, anethum, apij semen, rutæ, anisi & pleraque aromata præstamus, partim potanda, partim subiicienda. Conniuentes locos aperiemus iniectis clysteriis odoriferis, fomentisque ex malua, semine lini, fœnugræco, & oleo. Nōnunquam etiam melle, validioribusque, artemisia, cunila, calamintha, pulgio, & anthemide. Præter hæc conuenit uti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, calia, picis sero. Quibus autem os hiat, victus, fomenta, medicamina sicciora astringentiaque, grana mali punici, lentiscus, rubi radices, myrta, & quæ humidiori vuluæ congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, insertis. venus autem à tergo exercita, ad concipiendum videtur conducere.

De vuluæ scissuris, condilomatibus, & hemorrhoidibus.

CAP. LXXV.

IN vuluæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant, ex enixu violento fiunt. Primum sanè latent cum recentes adhuc ex partu sunt dolores, postea verò paulatim percipiuntur, aliàs manu tactu, aliàs in coitu. quando & propter affricationem cruorem reddunt. deprehenduntur autem sinu aperto. etenim diruptiones scissuræque in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaque medi

medicamina vitantes, simplicioribus in se sibus, pessulisque utemur. prodest etiam tetrapharmacum dilutum. At si calum contraxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius vim non tulerint, iridem illyricam terebinthina exceptam imposito. vlcibus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia pręparatum, aut aliquod ex iis quę sedi consecrata sunt: veluti quod dia lythargyru, hoc est argęti spuma inscribitur. Cũ verò scissuras veteres in condylomata degenerare contigerit, similibus excindi, adq; cicatricem duci debent. Cæterum hæmorrhoides vuluæ os, & ceruicem infestant, quę in partibus instrumento ad perspicendam vuluam accommodato exploratis, deprehendentur, inde quod ex crescentia in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At vbi remiserint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & fœculenta. In his igitur cum morbus remittit, ~~vulua~~ *ostella* modò fieri queat, pręhensas amputare oportet: sin minus, certè medicamentis ipsas desringere, partim attingentes sicco malicorio cum galla, aut huiusmodi aliquo, partim iis quę in vulua sanguinem fundente exposita sunt vtentes:† quę etiam profluuiis, & hæmorrhoidibus conducent, eo potissimum distinctis, quòd vulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo libr. hæc est scriptura, & *ὡς τὰς αἰ* ἀπὸ τῆς αἱμορροΐδος, id est, quę ob imbecillitatem sanguinem fundentibus. &c.

De partu difficili.

CAP. LXXVI.

Difficilis partus accidit, aut vitio pariētis, aut fœtus, aut secundarum, aut foris aduenientium. parturientis quidem, si crassa obesaq; sit, aut vulua tota exigua, aut dolorū imperita, aut timidiuſcula, aut inflammationem in locis genitalibus aliãve particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis vt fœtum nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At fœtus vitio, si vel inusitata magnitudinis existat, vel exiguus & modicę grauitatis, vel magni capitis, vel monstrosus, vt, biceps, vel mortuus, vel viuus quidem, sed imbecillis, vt foras non possit procedere, vel si plures fœtus sint. Nam Herophilus, quinque ædidisse mulierem, memorię prodidit. Vel si figuram naturę contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est fœtui: prima quidem, qua manus femoribus porrectę sunt,

&

& caput nusquam inclinans ad os vuluæ rectâ dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Aliæ omnes præter has à natura abhorrent. Ob secundas, quod velamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus est propter subtilitatem abrum-patur, humore siquidem euacuato, infans præ siccitate a grè deuoluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod vuluam densauerit, aut calore immodico, qui vires dissolue-rit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictio-ne, aut veluti fœtu adfirmata pariendi oriatur difficultas, la-xatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dul-ce, & calidum, cum decocto fœnugræci, aut maluæ, aut fe-minis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis cataplasma-te obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulsæ, aut hydrelæo, in fœtibusq; similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quædam occasio impe-dierit, mouereq; parientem sella in aëre calido mediocriter. Nonnulli etiam conuassationes validas, sternutamentisq; ciendis idonea adhibuerunt. Timidæ, mentis robur admo-uendum: imperita dolorum docebitur, vt validissimè spiri-tum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quæ deliquio abigendo sunt, natibus admotis recreabitur. Alleuiata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obe-sam mulierem in lectulo resupinam figurare oportet, vt ad femina genua succlinat, inflectatq; quò vulua ad abdomen tendens, è directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pingue tudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atq; si mor-bus aliquis particulas malè habeat, etiam huic prospicere. Ad hæc stercus detentum molli clystere emoliri, & secundas clausas diuidere, aut digitis, aut ferramento quod *παυλῖται* vocant, in ipsis occultato, sinistra manu præcedente. ac humo rem quendam oleosum in vuluæ spatium interius clystério indere. Verùm ubi fœtus præter naturâ figuratus fuerit, na-turalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim ad-ducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si quidem manum pedemve præmiserit, non attrahere mem-bro prehensum oportet. magis enim affirmatur, vel luxatur, vel etiam abrum-pitur: verùm digitis humero infantis, vel coxæ affixis rursus in conuenientem locum id quod præmis-sum

sum est, diducere. Porro si cum firma adhæſione, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab utero sublimen detrudere consilium est. deinde prehensum rursus ad os dirigere. Postremo si plures vno infantes deferantur, iterum à superiore, infernaq; parte referes. sic vt omnia sensim & citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tempus quo in sellam collocabitur parturiens est, cum vuluæ os dehiscens, digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verû si non procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extractionem quam Græci ἐμβρυοτομία appellant, veniendum est.

Decoxarum morbis.

CAP. LXXVII.

COxarum dolor ab articulari morbo nihil differt, nisi quod ipsius causa, nempe crassus pituitosusq; humor in sola coxarum compage, articuloq; concretus insideat. Dolor ipsis gibba in natibus regione inguinibusq; ad genua usque, in plurimis autem ad sumum usq; pedem pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere vacuatis, vena in cubito secanda, cum sanguinis detractione: si autem vetustas vitium occupauerit, ex talo partis affectæ immixtionem sanguinis moliemur. In accessionibus fotu hoc vtendum, Cyprini cyathis octo, aceti cyathis quatuor, nitri cyathis duobus, cachryos cyatho vno. Succidis lanis calida admoventur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum amarorum cum oxymelite, aut farina lolij, cum resina, cucumeris syluestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam calamintha sola vtiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admouetur. Emplastro verò hoc quod leniendi facultatem obtinet, vtendum est. Cera drachmæ centum, terebinthinæ drachmæ viginti quinque, æruginis drachmæ sex, myrrha, galbani, iridis, singulorum drachmæ sex, cedriæ drachmæ quinque. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum eruus implet, aut castorij drachma cum opopanax tribus obolis. Porro radicis capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus admixtus est remedio. Cum autem dolor multus excruciat, etiam medicamenta à dolore leniendo ἀνδύνα dicta locum habent, vtpote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autem enema inferetur, mellis cyathus vnus & semis, olei tantundem: aquæ cyathi duo, nitri drachmæ octo, terebinthinæ drach

drachmæ quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, ut longiori tempore ea retineantur: mucosa vacuat, nonnunquam, & sanguinem, quando etiam magis opitulatur. At si malum perseveret, quod rarum est, iterum frequentius eo utendum est, in vicem aquæ, centaurij decoctum admiscendo. Sanguinem vero trahit & thlaspis semen per inferiora inditum, succus elaterij, & medicamentum ex ipso factum, vel quod ipsius radicibus constat. Item oleum sicyonium, salforum piscium muria, & oliuarum colymbadum probe per anum ingeretur. Cucurbitulæ coxendici multa cum flamma, cute prius incisa defigendæ, interim quoque hirudines. Quod si his malum non finitur, ad purgationem eundem est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internæ probè contritæ drachma offeretur in aquæ mulsæ cyathis duobus, aut paulò amplius, aut minus, pro laborantis virtute, & alui facilitate dabitur. In aqua verò mulsæ ruta decoquatur. Puls etiam ex cucurbita sylvestri confecta recte hos expurgat. In quibusdam verò & vomitus à radiculis citatus per initia profuit. Cum morbus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaque ex euphorbio sunt utilia. præsertim quod à varietate vocatur præcilon, item balineæ naturales his accommodæ. Si desiderantur, in aliis lauabunt balneis, commemoratisq; utendum est acopis, & compositis nitris, medicamento Asclepio, & eo quod ex euphorbio, adarce, nigro veratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quam staphida agriam vocant, simili pondere confit. Secundum balineas inspergentur picis aridæ vnciæ tres, sulfuris ignem non experti vnciæ duæ, cuti adhuc calidæ: quæ charta etiam contegetur. At si ne hæc quidem profecerint, vel reliquiis morbi remanentibus, congruum erit & sinapi cum caricis, vel etiam per se illitum. In totum vero hos restituit sanitati, iberidis herbæ usus, quam lepidion quoque, alij agriocardamon hoc est, sylvestre nasturcium appellant. Quæ vero apud nos fruticosa nascitur similibus lauri foliis & multo amplioribus, respondere, multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diuturnis affectibus. per æstatem vero longè sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non produxerit, cortex ipsius radicis contunditur cum adipe suillo, ut emplastri speciem repræsentet, inde linteolo densiori illitum locis maxime dolentibus imponitur, nempe toti

pe toti in natibus gibbo & femoribus, sinésq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto liueat. Postea ipsum auferes, lotoq; ægrotanti ceratū impones, opopanax drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluntur, excipiunturq; cerato cyprino: Quod si talium adurentium vsus abominentur, emplastris vti refectoriis oportet, è quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityine singulorū drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum syluestrium sterçoris, sæculæ vini combustæ recentis, singulorum drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex reficientibus est quod leana appellatur. vtilia verò sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli iis vsi sunt potionibus quæ ad annū continuantur, in quorum grege habetur medicamentum diatesaron vocatum: chama dryos pondo, gentianæ deunx, aristolochiæ rotundæ deunx, rutæ feminis siccæ sextarius. hæc tusa cretaq; dantur quotidie cochlearij mensura ieiuno & probè cōcoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annum, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, id est ex septem confectū, & quod ad Proclum authorem refertur. Exercitia absoluntur, in ambulatione, continuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis conuenit. porro si malum nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cū vitium longius se prorogat, articulum tribus quatuorve locis vrere oportet, vt in chirurgica dicetur, ac complusculis diebus vlcera adaperita, sine cicatrice seruare.

De podagra & articularijs morbis. CAP. LXXVIII.

NON sola particularū corporis imbecillitas, podagricos articulariōsq; cruciatus excitat, quoniā accessiones, siue vlllo temporis interuallo vrgerent, quatenus infirmitas imbecilibus articulis semper incūbit. item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidē non solis vitiū articulis insidet: sed vtrunq;, & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas morbū adfert articulariū. quoties enimatrix particularū facultas, imbecillior, ciborum grauatur copia, ex qua cruditates enascūtur, humor superās, in quodcunq; articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert, & artubus sese insinuans, colligantes neruos disten-

dit, dolorem excitat: neq; enim neruos, per quos motus dispensatur arbitrarius, affectu primario, inflammatio infestat, quoniam oporteret etiam medios internodiorum locos, ipsam occupare, utpote tibias medias aut femora aut cubitos, aut brachia. attamen afficiuntur iidem nerui lege confortij, quod cum articulis ineunt. Quousq; igitur & solus humor pedum articula menta molestat, podagra vitium nuncupatur. Vbi vero causa in omnes corporis articulos compulsafuerit, ἀρρίτις Græci, nos articulares morbos appellare consueuimus. Quo vitij nomine, vertebrae, humeros & maxillas comprehendimus, omnemq; articulum, quicumq; morbo implicatur. Nonnulli vero aures, dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemq; articulariis doloribus confictari pronuntiant. A quibus nisi de subito vitium in artus sese recipiat eructetq; periculum breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus est, nunc sanguineus, aliàs atra bile vitiosus, plerunque etià pituitosus, crudusq; copia alimentij, aut cruditate, aut otio congestus, verum verustate in articulis crassescit, & glutinosior euadit: sic ut in duritiem corumacissimam, quam Latini tophum, Græci poron appellant, occallescat. Interim vero diuersa humorum colluue, vitium contrahitur, ob quod ægre dignosci, & difficulter medicamentis elidi potest, vel etiam penè nullo remedio sanescit. Caterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, vehemens ambulatio, equitatus creber, vsus veneris intempestiuus, insueta frigida potio, frigidorumq; vel multorum noxiorumve ciborum esus, multus vini vsus. Iam aliqui prolapsu, vel deturbatione, vel propulsu, vel distorsione, vel id genus aliis, prima morbi fundamenta iecerunt, † materia quidem præcedente in corpore, quæ antea conquiescebat, nunc autem à causa primaria est commota. Mœrores autem, curæ, peruigilia, & reliqui animi affectus, non modò mouent, sed ipsi quoq; noxios succos, siue primario, siue ex accidenti procreant. Variæ igitur, ut à me dictum est, affectus causæ habentur. Sed deprehendi tamè faciliè humorum noxam inferentium discrimina possunt, tum suis coloribus, tum iis quæ superueniunt denotata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum & rubidum, caloris sensum doloremq; acriorem efficit & protinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitq;

scitq; calidis impositis, sicut è contrario iis que refrigerant remittitur. Hoc sanè cū aliis omnibus magna ex parte, tum maximè iis qui à bilioso humore originem habent cūenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & sitis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddetur in pituitosis, exalbidus & aquæ subter cutē similis apparebit, vbi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verūm vt singula exactius dinoscas, superior victus ratio reliquaq; consulenda tibi veniunt.

† Rectior est hæc scriptura veteris codicis, *πρὸς αὐτὴν γὰρ μὴ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἡρεμύῳ τῶν ὕλων*, id est, materia antè coacervata in corpore etc.

Curatio biliosæ defluxionis articulis concepta.

IN ITIVM curationis si flava bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, vacuatione noxij humoris tentabitur per medicamēta purgantia. quale est maximè quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis cotoniis cōstat, item antidotū ex hiera picra, & aloë catapotia. Per accessiōes verò à foris vtendū rosaceo cū oui luteo, & vini momēto, particulam sensim infricando, herbæ autem admouentur quæ refrigerant, vt solanum, portulaca, altercum, semperuiū, palustris lenticula, seris, papauer, polygonium, rosarū folia, & consimilia: Et nunc per se illinuntur, nunc cū micis panis posca imbutis adhibentur, vel hordeacea farina cū rosaceo instar cataplasmatidis superaccommodatur. At in Erysipelacea inflāmatione articulorū manifestò lenietur cucurbitę recētis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & cū pane. itē per dicij foliis & hederę cū pane vel tenuiore parte polentę. Ad hæc psylliū farinæ hordeaceæ incoctū, ardētes inflāmationes mirādū in modū solatur. simili modo & rosaceū ceratū cū quibusdā refrigerantibus succis illitū, & quod ex fabarū lomento cōponitur. habet autem hoc pacto: ceræ vnciæ quinq;, chamemælini, rosacei, singulorum vnciæ duæ &. S. fabacei lomenti semuncia, ouorum lutea quinq;. ALIVD cataplasma. virentes maluę coctę teruntur, psylliū priuatim in viscū redactū, admiscet: † deinde ouorū luteis admixtis, oleoq; chamemæolino applicantur. Si verò tātus vigeat dolor, vt laborās par esse ferēdo nequeat, medicamēto

ex croco, glaucio & opio vti cōueniet, quæ in posca trita ve
sublinentur, vel cū micis forma cataplasmatibus obducuntur.
Galenus autem, huius meminit, lachrymæ papaueris drach-
mas quatuor, croci drachmam cum bubulo lacte, vel capril-
lo trita, vel panis micam iniicito, & emolliens rosaceo exci-
pito, ac vti tot cataplasmate, aut opium crocūque pariter
trita in lacte, cerato rosaceo excipito. Contulerit etiam ea-
dem parte in accessionibus ceratum ex turpena pisce confe-
ctum, item oleum ex eodem expressum. Persimilis est hoc
efficaciæ, micarum panis aqua, vel posca maceratarum &
semperuiui, vel portulacæ, vel solani vel palmularum carnis
& papaueris capitum seminis, pari portione, ouorum tosto-
rum luteorum & rosacei quod sufficit, accommodato in ca-
taplasmate. Verū his quæ membris torporem inducunt,
narcotica Græci vocant, diutius non erit insisterdum, quā
vt doloris vehementiam solum lenierint. siquidem largior
ipsorum vsus, sic insertum constringit humorem, vt in to-
phaceam duritiem quos græci πώγους appellant occallescat,
ac diurnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur
vsu quæ dolorem arcent vel medicamento è succis her-
barum facto, diachylon vocant, ex chamemæliino resolutio
vtendum erit, vel eo quod dialtheas appellant, vel huius ge-
neris alio. Posteaquā verò partem affectam quæ refri-
xerit recalfeceris, roboranda erit palmulato medicamine
quod diaphanici dicunt, cum oxyrhodino, vel vino &
rosaceo soluto. At si emplastra detrectent grauenturq;, aca-
ciæ succum ex posca, vel lycium adiecto croco & glaucio, &
succo perditij ex posca, delinere conuenit. Viſtus autem ra-
tio refrigerans humidāq; erit, vt hordei cremor, ex chōdro
forbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium co-
hortalium maximè pulli, piscium saxatiles, erinacius pecti-
nes, & eius notæ reliqui. Vitanda omnia calfacientia, & quæ
pallidam, aut flauam bilem generant, vinum vetus, fuluum,
& nigellum, & cibi repletio. balineis vtendum aqua potu-
lenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ
infestant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Tem-
perandum ab iracundia, inedia, acrimonia esu, temulentia, im-
modico labore, & veneris vsu.

† Vetus codex, ἔτι τὰ πρὸς αὐτῷ τὰ λευκὰ, id est, deinde albo ouo-
rum admixto, quæ lectio huic loco magis conuenit.

Cur

Curatio si sanguis antus infestet.

IN quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti debet: ac nō in his solum, sed etiam in pituitosioribus; aut melancholicis: Siquidem in his quoq; succus venis plurima parte continetur, qui copia sua potius quā qualitāte offendit. statim igitur cum quis morbum experiri primū cōperit, sanguinis missio erit tentāda: nam quos iam fluxio frequenter infestavit, ij plus inde noxæ, quā auxiliij sentiunt. præsertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiā imbecillius. Post sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, momento temporis interposito, etiam purgationē ex hiera antidoto moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe hæc magna commoditate purgant: qui verò ab huiusmodi medicamentis vacuantibus abhorrent, catapōtia quæ sequuntur deuorabunt: aloës, colocynthidis, id est cucurbitæ sylvestris, veratri nigri, scammoniæ, singulorum vnciam, euphorbij, nitri, singulorum semunciam, succi brassicæ, quod ad ea capiēda satis sit. Dantur singulis pro viriū ratione: melius proficiet, si cotoniorum succo excipiantur. Aliud catapotiū quod & in accessionibus, & remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunque etiam humor articulos affligat. Recipiē aloës selibram, agarici, croci, singulorum semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi, floris, opobalsami, casia singulorum vnciam, scammonia sextantem, epithymi quadrantem cum semisse. Modus mediocris instar duorum scrupulorum, summus quaterni scrupuli. Iam verò ex armeniacō lapide catapōtia, mirificè purgāt, ac proprie articulariis doloribus congruunt, tum inter fluxionum principia, tum in decremento, tum in remissionibus, sed quoniam nonnulli scammonia ceu stomacho noxiam fugiunt, dabuntur ipsis præsertim cum pituitosa subluuies torquet, hæc catapōtia, colocynthidis medullæ, veratri nigri, bdellij, gummi, aloës, singulorum vncia, nitri alexandrini, euphorbij, singulorum semuncia, dantur quaternis scrupulis. Ego in vicem gummi epithymum adiciebam. Sunt qui in omnibus articulatorum viciorum accessionibus, purgatione ex hermodactylis ipsis aluum sollicitauerint, sed attendendum est, quoniam hermodactylus stomacho facessit negotium: anxietatem & cibi fastidium mouet. Quapropter in his vti consilium est, qui obeundarum actionum necessitatem habent. etenim

breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiunt, sic ut consuetis muniis obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neque aliquod ex ea compositum medicamentum, sed herbe ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, utpote aniso, vel apio decoquens ipsum, potui exhibuerit. ac mirum est quam resoluta sepe alio defluxionem sedaret: verum quia, ut nuper retuli, stomacho inimicum est, iis postea quae stomachum confirmant viresque eius recolligunt, mediocri calfactione os ventriculi corrigere oportet, iis autem quae ex hermodactylis fiunt, multo laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur, quod & eandem vacuationem praestet, & dolores sopiat praeterquam quod stomacho noxam non inferat. Ceterum loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocris dolor afficiat, viridis brassica, apium, cunyla, verbenaca recta, sin acris dolor affligat, farinae fœnugraci partibus treis, pollinis loliacei, farinae cicerum, singulorum partem unam. ex aqua mulsa, aut vino tenui cum modico cypri no, vel nardino conuenit applicare, maxime per hyemem, item cinis crematae radices brassicae, eiusque cauliculorum cum axungia inductus, multis fuit praesidio. Sed sopiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori vetus salsa auxiliatur: bubulum etiam stercus cum hordeacea farina in aqua mulsa coctum prodest: vel per se recens & liquidum, vel cum foliis brassicae. Similiter caprillus finis per se, vel cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniam verò nonnulli ex iis quae contraria esse videntur remedium senserunt (etenim diuersorum humorum mixtura dignotionem postulat) commemoranda iam harum materia est promiscua. Itaque iuuat sylvestris atriplex & satiua cum pane applicata, aut verbasci folia cum bulbis & pane trita, vel cum polenta, vel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus obscura morbi est origo, haec semel experiri abunde fuerit, modò ad consimilia transgrediendum est: modò contrariis pugnandum. Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis solatium perceperint. Haec quotidie in artibus operibus fieri videmus, ut idem medicamentum vni articulo profuerit, alteri in eodem aegrotante similiter inflammato

inato non modò non opituletur eodem tempore, sed aliquando (quod maximè est mirum) offenderit. Quippe vnus idemque sæpe articulus, ex eodem remedio nunc iuuabitur, paulopost eiusdem appositu, inflammationem concipiet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusq; humor superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verùm cū acris aut feruida humoris qualitas præcellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis paratur. Nec miraculum est si materies natura frigidior inflammationis tēpore, & feruore æstuet & incandescat, vt bilis, si ita contingat, admissionem omittam. Porro tophos in artubus impedit coalescere lupinorum farina cum oxymelite, vel posca, vel laserpitio, aut brionix radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra noxam mitigat, & mediocriter discutit, lycij, ammoniaci, thymiamatis, singulæ vnciæ cum vino veterrimo & oleo omphacino, trite coquuntur, & è lomēto fabarū, quod sufficit, adicitur, coctæ mediocriter modo cataplasmatibus applicantur. Post inflammationis statum, tumore relicto applicandi bulbi per se, vel cum polline polentæ, ad ruborem vsque. hoc enim modo efficacem vsum exhibent. Quod si nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, fotibus & superfusionibus erit certandum, maximè si tumor extrema occupet, chamemæli & melilori, aut centaurei decoctis. Nonnullis etiam cappari decoctū abunde fuit auxiliij, hoc tamen quod infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origanum, satireia, & calamintha, in aceto quāmacerrimo coctas eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum, sed frequenter in die fouentur cum fiducia. Hoc præsidio permulti pristinam valetudinem recuperant, quibus non pituita solū, sed flaua etiā bilis fuit infesta. Nō desunt qui & subsequens medicamentum salutare sint experti, illicis glandes in farinam redigunt ac diu coquunt, hoc decocto extremos artus per fluxionum initia longo tempore aspergūt. At quæ interiorius partes habentur, spongiis fouent & per hæc materiæ impetum repellunt. Idem & bile vitiosis artubus conuenit, quemadmodum ex calida aqua sine aliquo decocto superfusio. Porro doloribus qui intenso frigore, aut humoribus inter articulorum ossa impactis contrahuntur, valens hoc est remedium. Olei veteris sesquilibra, nitri alexandrinī, resinæ terebinthinæ singulorum libra, euphorbi;

uncia, iris sextans, fœnugræci farinæ sextarius vñus & dimidius. his autem ea quoq; quæ aduersus coxendicum cruciatus scripta sunt, pulchrè nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus huiusmodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum siccatis ficis vsi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborem excitant. Alij verò medicamentum ex cantharidibus admouent, verum hæc in posterum officiūt, nisi aliquo etiam moliente vtantur, vt, diastrutheon & pyxide, & basilio, aut diaclates, aut dia xgiru, aut bromio, aut lysiponio, aut valentioribus acopis. in quibus etiā nerui cōsensus, potissimum & infarctus humorum eueniunt. At ex mulæ lotio, in morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commodum est. Pariter conuenit etiā ex utroque veratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spōgias artus persudillè vincit. item emplastra ex sale præparata, vel ex lixiuia, & nitro, hisque consimilia cataplasmata, post vigorem morbi auxilio sunt, victus ratio siccior minimèq; excrementitia competit, item inedia, vel parciore cibis: frequētibus balneis abstinendum. At si lauent, nitro aliisque pulueribus vtentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit, exercitiis se credent: & frictionibus maxime articulorum, in naturales balineas descendant, aut etiam arena contesti incalescēt. Vomitus à radícula cibisq; assumpris mouebitur. Qui ad hoc se commodè habent, etiam veratro nigro vacuentur per vomitum, vel etiam per aluum inferiorem purgentur.

Quomodo sanguine infestati artus curentur.

Quia ex sanguine dolorem articulariū conceperunt, post sanguinis initio morbi detractionem, remedia commemorata loco dolenti sunt inducēda, si biliosior quidem acriorque sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certandum, si frigidior, pituirosiorq; aut melancholicus humor coaluerit, & iis quæ post illa subdidimus præter nimis æria, curationem tentabimus: at si vitium in vetustatem incidit, his quoque locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & rhus cum polenta ex vino detrita obducuntur. ALIUD. Brassicæ folia cocta accuratè conteruntur, aceti flocces cum duobus coctorum ouorum luteis, & rosacei momēto, adiiciuntur, leuigatq; simul loco iniiciuntur.

tur

tur. subinde ea mutando. Cibi assumentur qui extenuant & parum nutriunt: carne igitur & leguminibus & vino copiosiore nigro abstinendum. si autem fieri possit, etiam ex toto vinum circuncidendum. Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemij omnes sanitatem consecuti sint. Alij siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alij in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi contrarium hinc accidat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò vitam agent abstemiam.[†] At qui per imbecillitatem, aut perfriktionem aliquid subsecuturū opinentur, ad biennium vsque abstemij, inde ad pristinam consuetudinem reuersi, modicum dilutūque continenter bibent. Oportet autem abstemios in vicem vini decocto anisi, aut alicuius consimilis seminis vti: fructibus pomaceis reliquisque refrigeratoriis abstinere, tum veneris vsu. Qui verò per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere voluerūt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. verū qui calidioribus siccioribúsq; constarēt naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quòd materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonē, aut principē quādam partem se contulerit. Satiùs itaq; est biliosiore prædictis habitu, aut copioso sanguine refertis, vini vsu interdiceret: quod nullus ex eius abstinentia, in cōmemorata vitæ pericula inciderit: frigidiores autem & recrementis pleni, ex viperis theriaca vti debent, hyeme frequentius, cōcoctione bene obita, per æstatem rarius. vel enim morbo liberabit, vel certè leuiorē reddet, nulli ex prædictis particulis officiens: quoniā verò nonnulli nos etiā cōmemoratis vti antidotis cogunt, nō te lateat id quod ex damasonio constat & quod ad Agapetum, refertur, item quod atacton & octoidon dicitur, & quod Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi solitū est, alia pleraq; non mediocriter proficere, omnium verò securissimum est longóque vsu probatissimum, diacorallij. siquidem cōcretas iam in tophum duritias discutit. horum omnium vires & modū vsus, & quid in his caueri debeat volumine, quod compositis medicaminibus dicatum est, reperiēs similiter aduersus articulares dolores, medicaminum quæ psilothra vocant, misturam vsuq; in eodem habitu, nempe pituitosiore. Alij verò

qui à toto se morbo vindicare volunt, integras vulpes oleo incoquunt, quo articulariis morbis medentur. Non desunt qui viuas lebetibus magnis iniiciunt. alij tantum emortuas. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleum hinc cōficiētes, quod discutiendi vim habeat. deinde eo balnei solia complent: in quæ postquam descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt, vnde sæpe factum, vt non modò artuum tumores, sed etiam vniuersum corpus euacuaretur.

† Vetus liber, τοῖς ἐν' ἐνείων, id est ijs quæ in illis dicta sunt.

† Veteres libri habent hoc loco ὁμοίᾳ δὲ ἀδύναμιν κατὰ φύσιν ὁππότε ἡ ἀνάγκη τὴν ἀδύναμιν, ac qui per imbecillitatem aut per frictionem expuere aliquid videntur.

De tophis, quos graeci poros vocant.

QVONIAM & tophi subinde in articulis creantur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassiciem, terrestremque duritiam, modo propter immoderatos discutientium resiccantiūmq; medicinarum vsus, sine earum mistura quæ emolliendi virtute pollent, sciendum venit ea esse conuenientiora, quæ mollientem simul & discutientē naturā fortiuntur. itaq; emolliunt adipēs vetustī, medullæ, ammoniacum, bdellium, oleum bene vetustum & styrax. Discutiunt autem & resiccant, nitrum, sal, lixiuiū, adarce, euphorbium & consimilia. verūm ad concretos in articulis tophos propriè facit vetustissimus acerrimūsq; caseus cum fuillæ carnis præpinguis ac veteris decocto contritus & superimpositus. siquidem sua sponte topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valet etiam medicamentum diapernes, vsu probatum, quod duplici modo præparatur. item quæ dia stactes dicuntur. iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, lixiuij quod calcem adiectam habet, propolis, singulorum triens, ceræ bes, colophonix libra, olei fescuncia: mixtis vtitor, tū in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, aliāque complura: sed ægrè paratur. Quod verò dia leptocaryon dicitur, præterquam quod probatum, etiam facilè conquiritur, non solum valentioribus, sed teneris quoque corporibus accommodatum, si assumat medicamenti ex melle, vel ex anemone

mone confecti partes duas ad illius partem vnam: quæ si desiderentur, etiam eius quod cerusa constat, subinde equalis modus ipsi miscetur. *ALIUD.* Ad tophos, sandaracham contritam quærneo visco excipito, & vtitor. *ALIUD.* Proficit etiam ad fistulas, & argilopas, olei sextarius, spumæ argenti vnciæ octo & semis, auripigmenti vncia. Argenti spuma, oleumque tantisper incoquitur dum manus non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam vstionem senserit medicamentum ab igne tollito, & vtitor. Ex asij lapidis flore confecta, vbi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli veterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis flore præparatum medicamen si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

Quomodo quis à podagra se tueatur asseratq;.

PODAGRAM quæ iam constiterit, articulariūmve dolorem, sine prædicta medendi ratione aboleri longè difficillimum est. At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis demat, & eis vtatur quæ promptè in membra digeruntur, excrementisq; vacant. item vino moderatiore & exercitationibus satis se cōmittant. Quod ad præfidiij partem attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affricus, omnes qui se ab hoc vitio vindicare volunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illitu, & mane, & vesperi por totum vitæ curriculum, & vbi inflammationes inclinauerint, vtendum est.

Ad perniones qui tum pedum plantis tum calces infestant.

C A P. L X X I X.

Perniones vlcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; cōtrahuntur, Græci chimethla nuncupant. Itaque tepidam aquam marinam superfundere oportet, vel betæ decoctum, vel lenticulæ, vel erui, vel hastulæ regiæ radices. A' superfusione, lenticulæ coctæ vinoque detritæ admouentur, vel ficus ex oleo leuigata imponitur, vel alumen & farina pari modo, in vino pertrita applicatur, aut floces vini subaridæ, aut bulbus recens vino tritus adglutinatur, aut allia in oleo fricta, proiectaque, & cera oleo mediocri liquefacta imponitur, aut malicorium incoctum vino, & in tenuem redactum puluerem, cerato rosaceo exceptum

ceptum inducito, prius locum decocto lupinorum irrorans, aut mannam, sulphurq; ignem nō expertum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus vindicat.

Marcellium ad perniones.

RAPAE sativæ radice excavata, coniicitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in duplici vase ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidem superfundito, ceratum vero in rapa liquefactum frigidū imposito. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minij, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones male habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ uncias sex, colophonix, uncias quatuor, mellis uncias sex.

Ad digitorum rimas totorumq; pedum quæ rhagades dicuntur.

PICE liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut marino super carbones cremato, testa abraditur, & cum oleo trita ut mellis spissitudo sit, abstergis prius scissuris instillatur. Proficit etiam scillæ medulla oleo feruefacta, item cum terebinthina leuigata, necnon cornu caprillum vsum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamentis uti.

Ad scissuras calcaneorum & plani pedum, anthera.

CALCIS viuidæ drachmæ decem, cerusæ drachmæ viginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis uncia septem, colophonix uncia nouem, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: teneram plantam efficit ut aliud nullum. A L I V D. Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura vtitur. A L I V D. Malicorium aceto incoctum diebus quinque applicatur, deinde loco vndiquaque putgato calx viua cum oleo, aut sordibus imponitur. A L I V D. Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta proicitur, oleo verò in quo tamen terebinthina liquefacta sit vtitur.

Ad attritus calcanei ex longo decubitu.

CERAE, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt

ciunt in omni exulceratione, plantæ pedum, calcanei, super-
næ partis, & internæ digitorum, magisq; si vlcus vngui sit
propinquum.

*Ad sordida plantæ vlcera emmoton, facit etiam genitali
exulcerato.*

AMURCÆ cyathus, aceti cyathus, cocta vase æreo do-
nec melleam spissitudinem habeant, & trita separatim, pro-
sunt. Item squamæ æris drachmas duas, mannæ tantundem,
lanarum succidarum mollium, quantum manu comprehen-
di potest, inuolutarum tedæ, vstarumq; cinerem totum ex-
cipito, & vtor, in vulneribus quidem vino diluens. in natu-
ralibus autem & pedum plantis passo. ALIVD. Amurcæ,
mellis despumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

Ad intertrigines, ex calceamentis.

PVLMO agnus, suillus & caprillus benefacit, verum
coria ex veteribus calceamentis combusta, si inflammatio
irget, nihil quidem adferunt præsidij, sed illa finita, multū:
vel cepa cum gallinæ adipe copiosior adiicitur, vel galla cō-
busta in spergitur, vel acacia aceto diluta illinitur.

Ad clauos callosq;.

CAP. LXXX.

CLauis prius vndiquaque purgatis, inducitur medica-
mentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci vo-
cant, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacus pul-
uis, aut collyrium syringiacum loco gummi, ammoniaci
exceptum. Est autem clauus teres figura callus, candidus,
clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus,
sed pedum plantis, digitisq; præcipuè nascitur. Tollitur au-
tem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauum par-
tem continuè abradat scalpello, aut pumice affricet, simili-
ter etiam callos. Proficit lupinorum crudorum concrema-
torū cinis cum melle, aut misy, liquida pice exceptum, me-
lanthion cum vrina pueri venerem non experti, vel oui lu-
teum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc sub-
inde expertum est, cantharidum, atramenti sutorij, casto-
rei, par modus singulorum, excipitur terebinthina, vt em-
plasti fiat spissitudo, clauoq; prius circumciso, imponitur.
ALIVD. Feculæ, calcis viuæ, visci, singulorum pares por-
tiones, cum stillaticia lixiua, vel vrina pueri venerem non
expertum.

Ad

Ad vnguium vitia, & primum de reduuijs. CAP. LXXXI.

R Eduuia, Græci paronychiam appellant, abscessus est qui ad radices vnguium coit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimat, & confirmari prohibet, vel Musæ pastillus, vel Heræ, ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturq; , valet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium. suppuratas autem reduuias, acu adacta humorē emitte, spongiamq; aqua imbutam imponere oportet, vel lenticulam applicare ex aqua tritam, aut palmulatum cum vino, vel rosas virides, vel siccas, aqua niaceratas tritasq; , vel polentam cum aqua: efficax est reduuiis etiam lupinorum farina melle, vel mulso macerata. Exulceratis reduuiis opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex vino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem vndiquaque ab vngue diducere.

De pterygijs.

PTERYGION carnis incrementum est, aliquam vnguis partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, aduersus quam auripigmentum & manna paripondere inspargitur, super autem, linamentum ex vino et spongia imponitur. **ALIUD.** Chalcitidis squamæ, malicorij æquales partes. Excipiuntur fico tosta & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod autem siccum est in vngue circuncidito.

Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum vlcera.

LACHRYMAE thuris drachma, squamæ drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subflauescant. Et loco vino prius irrorato per splenium inducuntur.

Medicamentum quod subito pterygia desiccant per sanantq;.

SOROS combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æruginis rasæ drachma, cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum vlcera, nigritias & putredines. **ALIUD.** Squama æris, palmularum carne excepta, aut ficorum vititor. **ALIUD.** Columbæ stercus cum polætæ polline ex passo coctum pertritumq; calens imponitur, item squama per se inspersa, pterygia

rygia desiccet. Oportet autē crebro, angulum vnguis pterygion pungentem, ne incre scat, scalpello superimmissio, adinere.

Ad vngues contusos.

MYRTI, & mali punici foliis teneris vngues obducito.

Ad cruentos vngues.

FARINA pice mista imponitur.

Vt vngues qui laborauerint abscedant.

SULFVR tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

Vt scabri vngues abscedant.

VISCI quercini, sandarachæ, fœnugraci singulorum pondo sextans, cantharidum, thapsiæ singulorum vncia, acetum quod satis est. ALIVD. Propolis atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo nō inquinat, in vsu calefactum vnguibus applicatur. ALIVD. Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris viui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. ALIVD. quod separat scabros vngues sine exulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulfuris viui singulorum drachmas quatuor, resina excipito & vritor, dissoluens per dies septenos. ALIVD. Eruī farina, felle ouillo, vel vrina ouilla imbuta vritor, vel calce viua cum oleo, vel chia cum opobalsamo, vel visco, atramentum sutorium, sulfurq; viuum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, vel herba pedicularia, cū aceto trita vritor, vel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici vnguis imponitur, diligentiq; fascia illigatur. Cum autem vnguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.

FINIS III. LIBRI PAVLI AEGINE-

TAE, IOANNE GVINTERIO AN-

DERNACO MEDICO

INTERPRE-

TE,

PAVL

PAULI AEGI-
NETAE LIBER IIII.
IOANNE GVINTERIO
ANDERNACO IN-
TERPRETE.

*

De elephantia.

CAP. I.



ECTE^a mea sententia† Cappadox Aëtius
memoriae prodidit, auxiliorum vim mor-
bis fortiolem esse oportere, eoq; elephan-
tiam nunquam curari, vt qua nulla poten-
tior medicina reperiatur. Si enim cancer
veluti elephantiasis quadam vni obortus
particulæ inter morbos insanabiles vel ab ipso Hippocrate
relatus est, quanto magis elephantia, seu totius corporis
cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio? Cùm enim atra
bilis, ex qua huic affectui origo est, duplici modo genere-
tur, (vel enim ex melancholico sanguine, faculentiorq;
& veluti eius limo: vel bile flaua, vtrisque nimium vstis, na-
scitur) subrubicundam quidem elephantiasim mitiorem
quodammodo, vt autem verius dixeris, minus malignam,
prima ipsius differentia procreat, reliquam verò, & mali-
gniores in qua totum corpus scdatur vlceribus, & extre-
ma decidunt, altera flauæ bilis supra naturæ modum adustæ
soboles, producit. Quapropter morbo iam vstis manus ad-
mouenda non est. At si recens adhuc malum est, vt nihil ex
summis deciderit, nulla autem infestaret exulceratio, neque
tamen eminentiæ tuberosæ plurimum exurgant, sola au-
tem facies aspectu ingratiór, deformiórq; sit quodammodo,
eaq; non admodum indecora appareat, curationem expe-
riemur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis adustio-
ne multos qui hoc inceperant vitio corripi, ne vincerentur,
inhibuerunt. Protinus ergo interinitia sanguis mitti debet,
& magis vere, in quo potissimum hæc lues, & nascitur, & in-
tendi

tenditur. paucis diebus interpositis, nouem decemve, pulte diacolocynthidos ipsos purgabimus, non semel, verum subinde, ex ratione virium quantitatem medicaminis adaueri. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis fssilis serum dabitur, neq; minus tribus heminis, neq; amplius quinq;. Insequenti tempore non fssio, aut recens multo lacte nutriuntur. Ob quæ si morbus remittat, eodem vti cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt: acribus autem assumptis vomitus cietur, à radícula, aut cibis. Proficit & ex albo veratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri potest, vere, semel per autumnum adhibita. Malo victis neq; sanguis mitti, neq; veratrum exhiberi debet, cum materia neq; ex cute in altum deriuari, neque hinc etiamnum minui possit. sed ea quidem ad ventrem, & intestina deducēda est. Medicamentis autem noxia euocantibus vtendum, metasyncritica dicunt, & summam cutem desiccare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitulæ ventriculi ori & præcordiis agglutinabuntur, eadem membra etiam dropace delinentur. Modico temporis processu rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione quæ præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractiōe, vt quæ plus noxæ, quàm præsidij esset allatura. Atque hoc circuitu ad ternas vices quaternasve per annum vti expedit, vere potissimum & autumnō. potare his prodest aceti cyathū, cum cedrimi liquoris cyatho, & brassicę crudæ succi cyathis duobus. mista dantur manē & vespere. Vel syderitidis herbe folia torrida denarij pōdere in vini cyatho, vel cornu ceruini drachma, & scillitici aceti quantū cyathus implet, quotidie post matutinā obambulationem potui exhibetur. reliqua verò pro ratione temporis his offeruntur, vel scillæ lotæ drachmæ quinque in mulla, vel melle. eclegmatis modo: vel liquoris cyrenaici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, vel eboris ramenti drachma semissis cum vini cyathis duobus, vel cumini æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His amplius iuuat theriacorum pastillorum drachma in vini primæ notę cyatho leuigata epotāq;. Similiter etiam scilliticorum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ succum ceu efficacissimum potu auxilium commendant. incipiendum dicunt à cyathis ternis adusq; senos. Cæterum omnibus his efficacior est theriace

ex viperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cum autē viperarum copia datur, nihil æque proficit, ac viperarū carnes comeste, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, vsq; dum spine dissoluantur, sed capitibus ipsorum caudisq; digitos quatuor prius amputatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadē per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorū vsu accidit, nonnunquam squamas, †vel ceu vulpis pellem quandam ex cute elephanticorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καπαδοκίω ἀρεταῖον. Cappadocem Arctæum. quæ lectio rectior mihi videtur.

† Vetus codex, συμβαίνει ποτὶ λεπίδας ἢ δῖον τινα λεπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ δῖον τινα λεπὴν. est autem λεπὸς τῆς κρομμύς λεπίδος, id est, cepæ tunica, ut sit sensus, veluti cepæ tunicam & tenuem illam pellem.

Vitæ ratio talis erit.

A SOMNO manu molliter permulceatur, aluoque deiecta gestetur, vocem exerceat: deinde perfricetur & vario exercitationum genere utatur, nunc saltu, nūc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quem illinc contraxit, absterfo delinetur adipe vrsina, aut vulpina, aut hircina, aut auis alicuius, aut butyro recenti. paxillo tēporis interposito in laua-cro perūgetur succo fœnugræci, aut prisanæ cremore, aut ammoniaci momento, quod aceto subegeris. A balneo deterfus perungetur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrteo. Vinoque modico cum alumine, vel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo. Rursus teneris panniculis abterfus dimidia hora conquiescat. Inde potu aquæ ad vomitum sollicitetur, digitis in os, aut pinnis demissis. post vomitum detur potui vinū absinthites, aut organites. Cibus erit panis hordeaceus, vel maza ex polentis. Inter olera, beta, lactuca, raphanus, porra, brassica aquis binis edulcata, & capparibus. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacci, pectines, tellinæ simul cum betis incoctæ: salsamentum vetus ceu in medicamenti vicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & venere similiter abstinentum. At cum vires ex purgationibus lacescitæ recreantur, paxillum duntaxat vini tenuis & aquosi assumitur. quando & acria circuncidi deb

debent, exceptis condimentis. Recteque ipsis datur ptisana, oua, chondrus clotus, lac, mel cum pane, malua, rumex & sisarum: piscis molli præditus carne: Ex iis quæ volatu fidunt, probis donata succis: Inter fructus, ficus, vua, & vuæ passæ: ex dulciariis mellitis conferunt, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis, & cnico, constant, iis qui his quotidie cibum capere solent: graue autem his est molestumque, semel duntaxat eum assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo vtendum ex decocto betæ, aut fœnugræci cum aphronitra, aut sapone, aut myrobalano: interim & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum acero detrita, tenue semperuium, rumicis radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus ex vino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad vtiginis speciem quæ alphos dicitur, accommodatum, ex alcyonio, nitro, myrto, sulfure, fici agrestis foliis siccis, cum aceto tritum, illitumque: idem præstat quod ex sepia testa concremata sit, pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pondere siccū inspersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effectus: rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, nitri drachmæ quadraginta, thuris viginti quinque, sulfuris tantundem, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas octo, co si drachmas duodecim, calcis viuæ drachmas quatuor, ceræ totidem, baccharum lauri aridarum drachmas duodecim. Hæc macerantur populi albæ foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur. **ALIVD.** Radicum rumicis fasciculi duo, aceto incoquuntur, & in pilam coniecti coteruntur læuiganturque. Deinde alcyonij libra, aphronitri vnciæ octo, sulfuris ignem non experti libra, cochleæ testarum combustarum triens, † chamaeleontis cum radice triens. Omnia simul læuigantur, donec sordium fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole frequenter, hyeme in balneo usque ad desudationem. Item Aesculapij aridum smegma pulchre his conueniet, ac omnia quæ communiter dicuntur smegmata, imo etiam ea quæ alphis dicata sunt propriè huc pertinent. quemadmodum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas eminentias si inflammatione retentur, aut exulcerata sint, delinètur lycio indico, vel glaucio,

vel aloë, vel Andronij pastillo, aut polyidæ sphragide. Cataplasma ipsis aprabitur ex chondro cum succo polygonij, vel plantaginis, vel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ viridis folia cum axungia tunsa, applicataq; mirabiliter proficiunt. Etenim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pane applicato, aut cerato ex amygdalino atq; color naturalis redit. Exulceratis rectè accommodantur emplastra, tum ex diphryge præparatum, tum ex vino melinū. Adde Coracion, quodq; constat ex oxymelite, & pastillum Andronij, pompholigem, & cadmiam. iudicium verò est totum morbum mitescere. si prima vlcera cicatricem recipiant. Ad spirandi verò difficultatem eorum qui elephantia laborant, aselli sub aquariis degentes, quinque, aut sex, ex aqua mulsæ cyathis tribus potantur. Iam verò quædam ex iis quæ ad ægrè spirantes inscribuntur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum naturalium vsus adhiberi debet, ceu maximè necessarius, præsertim aluminosarum, ferrumque resipientiū. & si fieri potest, frigidarum. Conferūt ipsis si etiā bibantur, nec non marinæ arenæ vsus. Eandem habent efficaciam omnia quæ desudationes mouent. Quoniam verò affectus hic, non minus ac pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab vrbibus remoti ægri, in locis mediterraneis, frigidis & vbi sit hominum si fieri possit, infrequentia habitabunt, inde verò ad confinia migrabunt, † tum ipsorum causa, tum illorum potius, qui, vt verò simile est, ipsis incident. Quippe & aëre fruentur commodiore, & alios hac lue non inficient.

† Vetus liber habet, χαμαιλέοντες & μέλαν & ῥίγας, id est, chamaeleontis nigri radices vicia tres.

† Hic locus sic legitur in veteribus libris. διὰ τε αὐτὸς καὶ τὸς ὅς εἰνός ἐν τοῖς μένους συχνότερον, id est, tum ipsorum causa, tum illorum potius qui (vt vero simile est) frequentius incident.

De lepra, & scabie, quæ psora dicitur.

C A P. I I.

VTerq; affectus, cutis aspritudo est cum pruritu, in qua corpus absumitur colliquatúrq; originē ex melancholico humore trahens: sed lepra altam cutem orbiculatim depascitur & piscium modo squamulas ex se remittit. Scabies verò summa infestat potius variè figurata, furfuraceaque remittit: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si corpus

pus magis plethoricum videatur. sin minus, purgatio certè ex iis quæ atræ bili vacuandæ sunt. Extrinsecus autem vtre communiter vtroq; veratro, calcémq; habet elotam & siccam: in ipso autem vsu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito. A L I V D. Saluæ, oleæ æthiopice lachrymæ, singulorum drachmæ octo, capparis radicis corticis, gummi, singulorum drachmæ quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, propriè verò lepras disiciunt anemone applicatæ, itè vitis albæ radix. Composita verò hæc, lolij farinæ chœnix, cardamomi albi drachmæ quatuor, nitri spumæ drachma, atramenti sutorij drachmæ octo, hastulæ regiæ radicis medix drachmæ quatuor. Aceto pertrita, & in cerati spissitudinem coacta illinuntur, parti prius nitro deteras: vbi solueris (solues autem tertia die) & frigida aqua elueris, rursus inungentur. A L I V D. Hastulæ regiæ radicis succi vnciæ sex, sulfuris ignem non experti, mannæ, singulorum drachmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad scabiem peculiariter facit, ex simplicibus herba pedicularia, staphis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto, lilij radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillum stercus. Inter cōposita, misy & chalcitis pari modo ex vino humidiores scabies delinuntur. A L I V D. Rhododaphnæ tenera folia in olei sextario simul incoquito, donec arescant. Ac vbi proieceris, oleo adiunge ceræ dealbatæ vncias tres, postquàm soluta refrigerataq; fuerint, sulfuris viui vnciam inspergito, ad solem, vel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaphne etiam scillam coquunt. A L I V D. Medicamenti *Αιχναλων*, hoc est ex succis herbarum confecti vnciæ duæ, ceræ tantundem rosacei vncia argenti spumæ vnciæ tres, cerusæ totidem, liquidæ picis vnciæ sex, stercoris argenti vnciæ duæ, sirici tantundem, aceri quod siccis læuigadis sufficit. A L I V D. Cerusæ semuncia, amyli tantundem, plumbi vncia, lotariorum rubrorum vel anchusæ, vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex, rosacei vnciæ nouem. Anchusa probè cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiiciuntur. A L I V D. Oua decem, vel quot ad vsu opus est, aceto quæ acerrimo macerantur, quousque putamen ipsorum tenerascat, lutea in eodem aceto coquuntur, læuiganturque rosaceo, & reliquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spissitudinem coactum illinitur. A L I V D. Quotū quæ

in aceto commaduerint, lutea tria, rosacei vnciae sex, sulfuris viui vnciae tres, laeuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratum adiicito. Argenti spuma verò oxyrodino detrita, vt emplastri crassitudo fiat, acriores scabies exterit. Iam verò ex lapatho smegmata, & ex iis quae elephantice faciunt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

De Impetiginibus.

CAP. III.

Impetigines ex serosis tenuibus, acribusque humoribus, crassioribus aliis mistis contrahuntur, celerrime in scabiem, & lepram transeuntes, quapropter remedia validè siccantia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis conferent, cicer, veratrum, erinaeceus saxatilis, pix cerato, resinaque mista, crocodili terrestres stercus, atque sturnorum, cum oryzam solam ederint. Plerique hoc solo impetigines mentum infestantes, aliamve particulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudique ignitae cuiuspiam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calēs adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis salua continuè defricantur. His opitulatur pruni gummi illitum. In vetustatem incidentibus viticis folia cum aceto detrita applicantur, vel capparis folia similiter. Composita verò haec, sulfur cum thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

Pastillus ad impetigines.

CLV TINIS fabrilis drachmae quatuor, thuris drachmae tres, aceti cyathi dimidium. aceto soluta illinuntur. **A**LIVP. Chalcitidis, gummi, singulorum drachmae octo, sulfuris igne non experti, misyos, singulorum drachmae sex, squamae aris, acaciae, singulorum drachmae duae, aceto delinuntur. **A**LIVD. Sulfuris viui, nitri spuma, singulorum drachmae quatuor, cachryos grana sexaginta, leuigantur ex aceto. Sola verò pars vitiata inungitur, sed ita, vt quae integra est, non coinquinetur: exarefacta, aqua frigida eluitur. **A**LIVD. Veratri albi drachmae octo, farinae lupini, buccinorum combustorum, nitri, singulorum chœnix. Arido medicamine defricantur. Porro impetigines, quas *αγφίς*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remediis non discutiuntur, acrioribus autē irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abundè quidem efficacia, sed quae non valenter erodunt, quale est
istud,

istud, Glaucij, thuris, alcyonij, bituminis, sulfuris, gūmi, singulorum vncia, aceto inungitur. A L I V D. Picē aphricanam cum aceto coctam liquatāmq; illinito. A L I V D. ad impetiginēs & pruritus. Atramenti sutorij, sulfuris viui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, vino vititor. A L I V D. Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum. Guttæ ammoniaci, crui farina, lupini farinae æquales portiones aceto illinuntur

De Pruritu.

CAP. IIII.

P Ruritus qui senibus accidit, ex toto nunquā cōsanescit, verū lenitur infra positis remediis. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris vel etiam falsus est, per ipsius vacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamento, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in venis simul cum sanguine redundare videatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis vacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandū: quippe vitium vix inhumescit, detergitur autem scœnugræci decocto, aut betarum, aut fursurum, aut malæ agrestis & satiuæ, aut prisanæ. Præter hæc, farinae etiā fabaceæ, vel lupini, vel myrobalani, vel smegmatis ex pepone præparati, quod *πικράτωρ* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidē cōuenit: foris autē ex saluæ decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegij, baccarū lauri, cucumis syluestris radicis, capparidis, lixiui, & oxalme. Deinde resperguntur arido nitro, vel cū scœcula aceri, vel quod recipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulfuris viui singulorū librā, cimoliæ librā semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris viui, alcyonij combusti, pari modo. siccis vititor, vel cū quodam ex suprà dictis decocto. Si autem placet, etiam veratrū siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelœo herba pedicularia cōtrita, vel sulfur, vel sandaracha, vel omnia, vel sinapi cum myrobalani expressio, & oxelœo, vel vtere cochleis combustis leuigatisq; melle, vel runcis radicibus, vel smegmatis inde confectis, vt in capite de elephantia comprehensum est, aut quibusdam ad scabiem efficacibus. Si autē exulceratio partes exercuerit, parygro, vel

diapompholygos appellato medicamine vtendum, vel ceræ vncia liquefacta in cyprini cyatho, cui sulfuris adiecta sit vncia. A L I V D ad pruritus. Nucum agnarum rancidarum vncia, sulfuris tantundem, apij succo leuigatis vtitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu detentis, abundè fuit. Item apium per se viride tusum infricatumq; in balneo vehementer auxiliatur. Similis effectus est perdicion, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitq;. A L I V D. Oryzæ puræ & nimis candidæ, vnciæ tres, tuse cretæque aceto quàm acerrimo læuigantur, donec sordium fiat spissitudo, adiiciaturque priuatim sulfuris viui detriti vncia. mixtis perbellè in balneo vtitor, diutius defricans. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstantius remedium reddetur.

De Leuca.

C A P. V.

LEuce, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ viscosa, glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam verò non quælibet leuce curationē recipit, notas ipsius tales habeto. Acu per summa leucæ pūgito, sed cute non penitus: & siquidē sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non confanescit. Et quæ plura corporis loca obsidet, leuce, difficilior tollitur, quàm quæ pauca deturparit, item vetustior, quàm recens minus in medicina spei habere censenda est. Nonnulli igitur adustionem quæ feramento candente administratur, in leuca probarunt, sed ita, vt hæc vel sola valetudini sufficeret. Alij vero dolorem inde cicatricemque secuturam veriti, vt quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, vti sunt. Alij, & horum inefficiam repudiantes, tincturis vti maluerunt, imposturæ potius quàm auxilij rationem habentes, quæ sanè omnium maximè vitari debent, quòd affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis vti medicinis cōsiliū est. ad arcæ seminis roris marini, sulfuris viui, singulorum paria pondera, tusa & in cerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus detrita, in sole illiuntur, non cumulatè, ne cutis exulceretur. Procedente autem

tem tempore†veratri & gallæ similiter momentum adiicitur. A L I V D. Fici nigræ furculis, aceto maceratis, contritisque misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myricæ fructus, parem singulorum modum, vbi nitro cutem defricaueris, perungito: solique exponito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis viua eo quod satis est, mixto, similiter vsus est, vel infricatas (inquit) leucas, albo veratro, donec sudore diffluentes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, vel mediade, vel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, vel prius absterfis, vt est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato.

†In veteri libro hæc est scriptura, λευκὰ ἡλεβόρα, veratri albi.

De Alphi albo, & nigro.

C A P. VI.

ALphi cognato leucis modo generatur, sed illæ quidem altius cutē mutāt vt pilos quoq; sibi similes procreent. Alphi autem summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum vetustatem sentiunt, penitius recedunt: vt etiam albos pilos producant, idque humoris qui subest ratione. Et enim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, vtrisque; igitur commune prodest auxiliū, elota calx aqua soluta, aut dracūculi radix, cū aceto applicata, simili modo vtrunq; veratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumque farina, ex aceto, vel oxymelite inducta, iam capparis radice cortex cum aceto, liliq; radix cum melle, capæ ex aceto in sole illita, crocodili terrestres simus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementum, cum oryzam duntaxat ederit, sepiæq; testa cōcremata. Compositū verò hoc præstans est, Alcyonij, nitri, singulorum sextans, veratri albi, sulfuris viui, singulorum vncia. Nonnulli vero & flocces vini combustas adiciunt. A L I V D. Sulfuris ignem non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis roris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum verò alphi perungito, sed ita vt integram partem non attingas. siccatum medicamen aqua frigida eluitur. A L I V D. Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum chœnix, veratri albi, drachmæ octo. Arido pars defricatur. A L I V D. Erui farinæ libræ duæ, erucæ seminis, amygdalarum amararum, cucumis

syluestris radicis, singulorum libra: mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, varos, & cutis sordes.

Ad Alphas albos experta.

SULFVRIS signem nō experti, sextarij duo, calcis viuæ candidæ, vnciæ quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentum. sulfur primum in puluerem cogitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, rursusq; leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterū teritur, calcem vero priuatim lotam semel, bis, tēve, sulfuri adiicimus, vnā cum ouorum aquato, & denuō cōterimus. collectus humor effunditur. pauxillum verò relinquentes, vt vnguentū queat illini, in hunc modum vtimur. A L I V D probatum. Sulfure viuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto vtitor. A L I V D Archigenis. Fici foliorum quæ in vmbra exaruerint, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio cum aceto inungitur, aut foliorum fici, drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, alcyonij cōbusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perūgitur. albos verò tollit atramēti sutorij, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infricatur, illiniturq; vel cachryos, sulfuris viui adarcæ æquæ portiones, ex aceto pertritæ infricantur, illinunturq; cū inaruerint abluito, locū perfricans. Idem facit & leucis.

Ad Stigmata, ex commentarijs Archigenis.

C A P. V I I.

STigmata curabis, si quod matulæ adhærescit, cum aceto quā acerrimo illinas, vel calcis viuæ partem vnā, nitri ossi fului dimidiā, cum aqua in sole illinit. At vbi exulcerationem, fuerint experta, cicatricem tanquam vlceri inducito. Crito verò iubet confricatæ nitro prius cuti terebinthinā illini resinā, linamentisq; ligatam sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinē qui fluere spongia derergi, interiectoq; breui tēporis spatio, tenui sale confricare locum. Tum imponi, ad dies quinque; medicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis viuæ, ceræ singulorū drachmas quatuor, mellis octo. Quum enim à parte medicamentum deposueris, nigrum in eo offendes. A L I V D vnguentum. Piperis drachmæ duæ, rutæ drachmæ, quatuor, sandarachæ drachmæ quatuor, auripigmenti drachma mel-

lis

lis quod satis est, cuti prius nitro infricatæ illinitur, item aliis priori consimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigritie absterfa, rursus inungitur. Exerit enim (inquit) diebus viginti, tam integre, vt nec exulcerationem, nec cicatricem relinquat. ALIVD quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, atramenti sutorij drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ totidem, auripigmēti drachma vna & semis, sandarachæ drachmæ tres, mellis quod sufficit, vtere quemadmodum superiore Oribasius tradit ranunculum applicatum, vel capparis folia stigmata exterere. At si altius fixa non discutiantur, modicam vero cutem attingāt, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

De Exanthematis.

CAP. VIII.

EXanthemata generantur, ex crasis in cute impactis humoribus, magisq; adhuc in superiore pellicula cum densa est. In quibus igitur, si etiam in alto humorum copia subriterit, primum purgatio tentanda est. Nam si hoc neglecto, prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius quam per cutem euacuabis. Sin autem nullæ in alto deliteant humorū colluies, per cutem vacuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut vomitu vacuationem moliri velis. sed humorum qui cuti impacti sunt, curationem medicamentis experire, quæ exurunt, calfaciuntq; maximè quum lata sunt exanthemata, siquidem ex frigido admodum, crassoq; humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorum foliorum, rutæ & manna, æqualem singulorum portionem detritam, & lachrymam thuris oleo subactam delinito, vel betam teneram incoctam, tritamq; inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinem coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, omnia simul incoquito, factoq; emplastro vtor. Sed coctioni sedulo assistendum est, vehementer bonum remedium existit.

Ad epinyctidas.

CAP. IX.

EPinyctides vlcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quibus disruptis, cruenta fannes defluit, per diemque non magnopere excruciant: per noctem vero, graui magis quam pro ratione vlceris, dolore torquent. Itaque liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rofionem desiccat, aut cicuta in læuorem detrita inducitur

citur, aut brassa cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia, cum melle pertrita admoventur, aut solanum per se, & cum coriandro viridi, aut oliue foliis vitior cum aqua coctis: aut vuas acinis exemptis, leues, splenio illitas imposito, vel adianthum ex melle tritum. Vitari debet acrium, acidorum, & salforum esus, fomenta, balneum & insolatus.

Depustulis, quæ Græcè phlyctenæ dicuntur.

C A P. X.

Pustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, vt humoris colluies habeat emissarium. Deinde humore leuiter expresso cutis præposita finitur, donec impleatur. At si vulnus connueat, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis astricta, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratū est, ad cicatricem peruenerit. Priusquam igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, vel mali granati virgulta, cinere calido tepesfacta imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & vlcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in linteumque illitus admouetur, vel lilij radix in aqua cocta tritaque cum cerato imponitur.

Adepinyctidis, & phlyctenas.

ARGENTI spuma & sulfur ignem non expertum pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in laeuorem redacta, sordium illitione cum oleo & vino, benefacit, tum his, tum calidis eruptionibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis vlceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdena, & quod ouis præparatur.

Ad Ambustæ.

C A P. XI.

Ambusta medicamentis indigent quæ modicè abstergant, non euidenter calefaciant, aut refrigerent: Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisque leuis terra illita cum aceto non admodū acri, vel aqua, præclare facit, prohibetque pustulas excitari. item oui albumen crudū statim impositū, lana molli exceptum. etenim refrigerat leuiter & citra rofionem desiccatur. idē efficit atramentū scriptorium illitum, vel lachryma thuris aqua diluta, vel lenticula cocta tritaque vel eruus applicatur. At ex aqua calente vstiones priusquam pustulæ oriantur, oliuarū falsarum aqua continuè superfundun

duntur, ipsæq; oliuæ salsæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertritum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fouetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinem coacti delinuntur. Marcellus autem hoc compositum tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina inuoluti, combusti; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut calcem viuam cerato mixtam, illitamq; linteolo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis vtile est, partes exulceratæ porris contritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti cōbusti; , & oleo diluti cinere vtitur. Mirificè proficit pini aut piceæ cortex, aut adianthum aridum, læuigatumq; : aut myrti folia combusta, pertritaq; insparguntur. efficax autem vnumquodq; horum est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis siccæ, & in lauorem contusæ trientem recipit, ceræ albæ dodrantē, rosacei vncias duodeuiginti, iam quod cerusa constat cum modica cerui medulla, laudatum est remedium.

Ad eos qui flagris cæsi sunt.

CAP. XII.

Cerusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum susino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim susino solo vtitur, vel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine putamine, unita cæsis imponuntur, item pellis ouis recens excoriatæ calens adhuc circumdata, quolibet efficacius die vno, & nocte persanat.

Quo modo pili adustis renascantur.

CAP. XIII.

Pili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili rosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, sampfuci drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, vtitur, vel detrimenti lapidis drachmas centum, æris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in vsu partem vnam cerati partibus octo diluito.

Ad abraſa, quæ apofſymata Græci dicunt.

CAP. XIII.

Abra

Abrasa & superficiem infestantia vlcera, primum aut vino, aut aceto, aut muria aceto mixta quæ oxalmæ dicitur, astringes. Deinde medicamentis, ad cicatricem ducendam vtère, tum liparis, tum ex albis emplastris trypheris. Summè autem facit quod cerusæ partem vnā recipit, ammoniaci dimidiā, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorē trito cerusa miscetur, myrteumq; superfunditur: vtitor lipara. Vel lapidis detrimento, squamā aris admisceto, & myrteo in læuorem coactis vtitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex vino, recininoq; & myrteo tritis vtitor.

*Ad abraſa, intertrigines, inueterata vlcera, ſenilem tene-
ramq; cutem.*

ARGENTI spumæ chryſitidis drachmæ quinquaginta, ceræ drachmæ viginti, resinæ ſiccæ ex picea drachmæ duodecim, olei ſeſquicyathus. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adiciuntur: rudicula agitatis, vel etiam in pila emollitis vtitor, ſed cutem abraſam ab vlceribus non oportet amputare, ſed medicamentum ei inducere: ſic enim glutinabitur, vel nigreſcens. At vlceri, quod eroditur, ſordidumque eſt, ſi carne nudum hiat, vix cicatrix obducitur. Cæterum abraſa tuetur ab inflammatione, rhu rubrum, ſi illinatur læuigatum, cum melle, aut lentifci coma cremata, & cum melle impoſita.

*Ad abraſa, ſlagris caſa, & articulorum contuſiones medicamen-
tum, quod dolorem leuet anodynon appellatum.*

ARGENTI spumæ, cerusæ, ſingulorum vnciæ decem, ceræ vnciæ ſex, olei puri, aut roſacei ſeſquilibra, amyli vnciæ duæ. Ad eadem valet Pelarion quoque ex helcyſmate, id eſt, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ouis conſtet.

De formica & verruca.

CAP. XV.

VTrunque vitium, cutis excreſcentia eſt exigua, calloſa, & plerunque figura teres: ſed formica, quæ Græcè myrmecion dicitur, latiore baſi, † ſimilem ſi quis non trectet mordentis formicæ ſenſum inducit. Verruca autem, quæ Græcis vocatur acrochordon, anguſtiore, vt chordæ ſummo aſſimilata, pendere videatur. Hos igitur tumores, elaterium cum ſale inſtrictum tollit, thuris lachryma cum aceto, groſſi cum aceto, farina, & nitro, liquor ſici illitus ſimiliter facit: rithymalli, ſmaridis caput ſalſum concrematum, arug

æруго cum sulfure ignem non experto combusta, ocymi folia cum atramento futorio, sarmentorum adhuc viridium vstorum quod distillat, fimus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, heliotropij magni semen, cum vino applicatum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum vrina pueri venerem non experti, stercus bouis gregarij in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, una in vulgatis codicibus, *ἡ δὲ πρὸς τὰς ἀποψήγεις ὁμ. ἵαυ αἰθροῖω*, id est, si quis deradat sensum mordentis formice similem inducit: altera est, *πρὸς τὰς ἀποψήγεις*, id est, si quis constringat.

De Ganglio.

CAP. XVI.

Ganglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipuè verò motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in vitio Archigenes calcem viuam vnà cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet. Doles vero medicamento, quod lapidem achatem recipit, vtitur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerussæ, resinæ, è pinu, olei veteris, singulorum vncia, ammoniaci suffuminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ vnciæ quatuor, aut pilam plumbeam (inquit) crassiore vertebræ modo, ganglio ampliorem imponito, deligatoq; pondere siquidem longiori temporis spatium ipsum dissoluit, atque hoc nos vtimur.

De inflammatione.

CAP. XVII.

Omnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruorque adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueuerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque euariant. Cum enim sanguis probus, & crassitie mediocris, in particulam aliquam subito confluerit, ac propter copiam impactus inhæserit, inflammatio propriè appellata nascitur. Cum vero flaua bilis in parte aliqua substiterit, herpetem: vbi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impensè, & crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus, tangenti renitens, & calidus ex sanguine, vt à dictum est, probò originem trahit: quî, sanguinem dico, nunc ex toto fertur corpore, nunc in aliquam particulam copiosus incumbit,

cumbit, sic ut à vasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Saepè verò vitium hoc vulneribus, fracturis, vlceribus, aliisque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obsederit, totum vero corpus, parti contagium transmittat, vniuersum quidem id, sanguinis dimissione, vacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper uiuo, mali punici corticibus, vino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus cum dolor vehemens non vrget vtendum est. Vbi vero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleumve adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionum vitiis omnia sint inimica, doloris tamen vehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceraque modica, & lanis sordidis quæ æsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme tepida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque affectis partibus loci, spongia vino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus vtiliter etiam herbae. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita, calidis illite, benefaciunt & tribuli utriusque inflammationibus ex influxu concitatis. brassica vero dure-scentibus valet. At ubi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicto, lanam verò puram vino austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si vsus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægrotanti accerses.

D.

De exterioribus corporis abscessibus.

CAP. XVIII.

Quòd si fieri non posse tibi videatur, vt suppurationem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam cōsimili præparatam modo. particulam iure radice althææ incoctę fouebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut agrè discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis vttere: oportet autem ficus dulces pinguésq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarum in tenuis mellis speciem cogi, farinámq; hordeaceam adiici, & si quidem tumor discutitur minus autem ac conuenit, cum ficis siccatis incoques hyssopum, oryganúmve: si voles magis intēdere, salem decocto iniicies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars in scirrhum occalescat. Tale si quādo videris, cucumis syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques. valentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumq; medicamētum, quod dracunculo constat, validè huiusmodi vitia disiccit. Nonnunquam igitur solum hunc decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinámque simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, incoctósque tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros ac crudos tumores vniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisque liquida. **MEDICAMENTVM** compositum, † quod abscessus iam coctos expellit. vt subinde pus in splenio reperiatur. nōdum verò coctos in totum discutit. Lapidis pyritis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice, liquida, pellicque illitum imponitur. Splenium verò non prius aufertur quàm sua sponte deciderit. sed medicamentum non multo antè præparari debet, vt quod confestim siccescat. In his autem si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum vacuabitur; cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua admoueatur, verùm si vulnus abluere interim oporteat, aqua mulsa, posca, vino & mulso vtendum est. Si verò inflammatione conflictetur, ex lenticula cataplasma inducitur. vbi inflammatio abest, alio quodā emplastro medicamento in huiusmodi sectionibus vtetur. quinetiam eo quòd constat chalciride. Cæterum super ipsis iniicitur spongia lanæve vino austero imbuta, vulnere autem nullum pingue medicamentum ac-

t

commodatur, quale est tetrapharmacum. nam vehementer postulat siccescere.

† Hic locus est expressus in veteribus lib. τὰ μὲν ἵδνα περιμμένα τῶν ἀποστημάτων ἀπένως ἐξιδῶν δύνατον, id est, quod abscessus iam coctos nullo negotio expellit.

Quæ abscessus rumpant.

QVONIAM nonnulli abscessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcissi radix in pollinem detrita, ex mulsa cum irino cocta applicatur, vel tenera arundinis radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mulsa prius incoquetur: vel aristolochiam cum melle applicato, rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par modus, cicatricemque inducit.

Dionysia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latentes meatus discutit.

O L E I veteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim mox, aphronitri vnciæ sex adiciuntur, mysos vncia vna vel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum vnciæ sex.

Ad nervicos abscessus.

C E R A E, colophonix, butyri singulorum libra, picis aridæ, mellis, singulorum libræ duæ, vnciæ sex, æruginis vnciæ tres, visci quod satis est. A L I V D epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris viui quadrans: nitri quadrans. Smilion autem medicamen appellatum, & quod porris constat, validè tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, per commodè discutit, mutat, rumpitque. At mitioribus abscessibus medicamenta congruent etiam ad parotidas inscripta. Atque hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autem memoriæ tradidit abscessum nulla præcedente inflammatione constitui, quæ ex probo sanguine habet originem. Statim siquidē ab initio (inquit) humor aliquis aliàs specie alius, in parte quadam collectus, vicina illi corpora excoriat tempore, & à subiectis dirimit. Sanè inveniuntur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorum, tum solidorum quorundam corporum spec

species. Etenim stercore, vrine, grumo, humori mel referenti, mucosoque: ad hæc ossibus, vnguibus & pilis, consimilia corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omnibus propè quæ ex putredine subnascuntur simillima, Præterea in abscessibus potissimum inueteratis, qui humorum ex loco in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sordes, amurcam & fæcem repræsentent. Quare absolutior exteriorum maximè corporis abscessuum significatio compèdiosè tradenda est, tum eorum qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaq; est carniū seu partium carnosarum, nempe musculorum, venarum, arteriarum corruptio, mutatioque. In genere abscessuum nonnulli tunica comprehenduntur, vt atheromata, steatomata, melicerides. Alij sine tunica constituuntur, quæ generis vocabulum vsurpant, vnde sermo hic noster procedit. Porro abscessuum generationem plurima parte inflammatio præcedit, de qua disceptatū est. Interim protinus ab initio, quemadmodū nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuum sunt, igneus loci feruor, tumor eminens, ruberq; magis ac antea, durusq; cum dolore punctorio, pulsu & grauitate, vt aliquid ex particula suspensum esse videatur. Quod si verò locus insignis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissimum dolor fatigat, & febricula. Est cum inguinis inflammatio, proximis in glandulis exciteretur. Vbi verò abscessus in totū fuerit absolutus, magna parte decrescit, punctus obueniunt pruriginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucronem acutū magis fastigiatur, tactu lenis, cedensq; superficies in vertice auellitur. Dico autem hæc de his qui foras rumpuntur. Si igitur vel medicamētis, vel sua sponte rupti fuerint ammoto medicamine, curationem tentabis, parte iam purè vacuata: si aliter accidat, aperire ipsum in eum modum oportet, quem in chirurgica explicabimus.

De Gangræna, & Sphacello.

CAP. XIX.

CVM inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur, sæpè in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dicitur sphacellos, incidit, de quibus iam sermonē instituimus. Gangrænas, enim appellant, cum membrū aliquod ob inflammationis, qua conflatur, magnitudinem emoritur: neque iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiamnū fiunt. Eius mali

vis est, vt nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars, quatenus vicina cōprehendit, mortis habitum repræsentet, & hominem iugulet. Vbi verò membra sic vitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænā, sed iam sphacelum nuncupant. Quin & ossibus hoc mali accidit, cum caro ipsis circundata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum itaq; membrum ex toto, vita, sensu motuq; priuatū est, confestim præcidi oportet quàm proximè sanæ parti. Gangrænā verò curamus, sanguine ex parte vitiata affatim emissō, vel enim vena incisa sanguis corruptus, cum vena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, vel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis. vbi verò sanguinem emanare permiserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolij, aut lomentum, ex oxymelite. Quòd si valentius imponere cogites, salem adiccito, aut pastillum Andronis, aut eius generis aliquem. Faciunt ad gangrænas, & vetustæ nuces: cortex autem ipsas expurgat: item liquor tithymalli tempestiuè & mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorum amarorum decocti ius superfusum. Nonnulli verò vbi putridam partem præciderint, quò securius mali radicem euellant, candens ferramentum adigunt, in quibus sale cum porro vtendum est. Vt autem crustæ citius decident, cataplasma deinde accommodatur ex pane, vel hordeacea farina, vel triticea ex hydrelæo incocta. Item medicamenti cephalici puluis ex melle, tetrapharmacum, & Macedonicum vt appellant, vtiliter imponitur. Iam panis cum apio tritus, aut ocymo, sic iris vel panax, vel aristolochia, vel acorum cum melle, vel thus, crustas probè separat. Idem præstat Macherionis medicamentum, & Isis linamento illita ex melle. In teneris autem corporibus abundè est etiam erui farina ex melle.

Ex Oribasij commentarijs ad Gangrænas.

AERVGINIS rasā, minij, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello vndiq; exasperatis. Item lolij farina cum raphano & sale, nunquam etiam aceto. vua passa acinis vacuata, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandium medulla, myrti folia vino incocta, tritaq; ex melle: raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa vsq; rumpit.

De

De Herpete.

CAP. XX.

Cum bilis flaua nullo mista humori excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acriorque, tota cutem adusque carnem subiectam exulcerat, vocaturque herpes exedens. Si vero tenuior & minus acris calidaque, pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinem, herpes miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cum flaua bile mista, miliarē herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducēde bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaque inducuntur, principio capreoli vitis, rubi, & plantaginis applicatur. postea vero lēricula his miscetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptū est exēpto semper uiuo. Verum exulcerata pastillis inunguntur, passo, aut uino tenui & austero nō veteri, aut posca aquosa solutis. inducitur & glauciū, ei que consimilia ex aqua. Cum autem nihil proficit acetum admiscetur. succo autē plantaginis, aut solani, aut uino diluta magnifice auxiliantur: aut lini semen torridum oleo uinoque incoctū, inque laeuorem redactū imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argenti spumæ vnciæ quatuor, porri succi cyathi dimidiū, betę succi tantundē, laeuigata illinuntur: at inueteratis iā huiusmodi vlceribus, Musæ pastillus & Andronius efficax est. **ALIVD** ad herpetem pustulosum. Recrementum plumbi ex uino austero laeuigatum illinitur, superiniiciuntur betę folia uino incocta, uel cerę triens, myrtei vnciæ sex, stercoris plumbi triens, uino diluta illinuntur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremento utitur, aut lente cocta cum melle partem obducito. Ad herpetem uero qui sub cute affligit, retrimentum plumbi, rutę laeuigatę succo excipitur, aut ceratū myrteum in uicē rutę. **ALIVD.** Lanæ ueteris illotę, circa tedam combustę drachmę duodecim & semisis, cerę drachmę vigintiquinq; recrementi plumbi vncia una. S. seui caprilli curati lotique, ex aqua drachmę vigintiquinq;, myrtei vnciæ quinq;. **ALIVD** ad herpetas acutē depascentes, corij mali punici dulcis drachmę sex, argenti spumę tantundem, lanæ illotę circa tedam combustę drachmę tres, cerę drachmę duodecim, cerusę drachmę octo, thuris, aluminis scissi, singulorū drachma, uino aut myrteo excipiuntur.

† Hic locus sic legitur in veterib. καὶ χυλῶν ἢ ἀρογλώσων ἢ σπύρον
 Δις, ἢ ἰψήσας δίνω μεγάλως ὀνήσεις, id est, & succo plantagini aut so-
 lani, & ubi ex vino coxeris multum iuuabis.

De Erysipellate.

CAP. XXI.

Galenus tumorem ex feruente & tenui sanguine conflatum priuatim quidem & propriè erysipelas, appellauit: cum verò ex ambobus, sanguine & bile constat, vtique ab eo quod in mistura superat nomen vitio indidit. Etenim ubi sanguis excellebat, inflammationem erysipelaceam, ubi bilis flaua præpollet, erysipelas inflammatorium dixit. Verùm communius tumorem ex sanguine & bile calidioribus factis conflatum, Erysipelas appellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeò ad præsidiorum vsum interest. id verò scire oportet erysipelata quæ capiti potissimum oboriuntur, plus facessere negotij, adeoque esse periculosa, vt nisi efficax consequantur auxilium, interim quoque affectos strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab initio vena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin autem hæc non appareat, eam quæ se conspectui obii- cit. At si quid sanguinis dimissionem impediat, purgatione vtendum ex medicamento quod bili ducendæ est. Hac sanè & in aliarum partium erysipelatis vti, vel clysteriis efficacioribus oportet, cum ipsis illinere quæ influentem materiam refrigerantium virtute repellunt, collectam verò, calefacientium mediocriter & humectantium discutiant priusquam particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura vt perliquida inungantur, ita vt frequentius immutentur, primis per spongas molles ablotis, siquidem multæ particulæ feruor celeriter in vaporem erumpens, hæc deliccat. Cæterum requirunt erysipelata per initia, vt dixi, quæ refrigerent cum humiditate, non astringant: quale est semperuiuum, portulaca, psyllion, lenticula palustris, seris, cucurbita, solanum, altercum, lactuca, glaucium, item apiū, & rhamni folia per se vel cum pane inducta, item ceratum ex aqua admodum frigida. His miscetur etiam opij aliquid, lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōposita medicamenta inducuntur, fiētque ceratum, cera dealbata rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto: his in pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur,

ditur, quantum potest recipi. Si verò aceti tenuis & pel-
lucidi momentum temperes, præstantius medicamentum
habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidio-
re ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrige-
rat. Idem efficiunt palmulæ pingues cum horum aliquo
mixtæ. Ad hæc pars etiam delinetur cerusa, vel terra ci-
molia, aut figulari cum solano, aut argenti spuma cum
rosaceo, aut chalcitide cum oleo passoque, aut cerusa cum
aceto & lycio, vel acacia cum aceto. Cum feruor remit-
tit vtendum simplicibus quidem, sulfure viuo & menta
cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, aceto & oleo;
aut argenti spuma cum porri & betæ succo, compositis au-
tem, priuatim in capite hoc pastillo. Argenti spuma, ceru-
sa, croco, sulfure ignem non experto, opioque cum passo.
Communiter autem omnibus, minio sinopico, chalcitide,
misysto, erugine rasa, atramento sutorio, alumine scis-
sili pari pondere ex aceto vtitur. A L I V D. Sulfuris viui, ce-
rusæ, opij, acaciæ paribus singulorum portionibus ex ace-
to. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, paroti-
das & ambusta. Althææ nouellæ foliorum tenerorum libra:
cocta in hydrelæo perbellè teruntur, adiectoq; rosacei triē-
te, argenti spumæ, cerusæ singulorum vncis duabus &
semisse, iterum læuigantur cum succo coriandri, aut sem-
peruiui, aut solani: deinde micis panis adiunctis vt empla-
stri formam induat, illinitur. Hoc autem emplastro vti-
tor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, vnguen-
ti quincuncem, argenti spumæ trientem, æruginis rasæ
sextantem. Aerugo & argenti spuma aceto læuigantur.
Ceratū ad erysipelata & ambusta. Cera alba triens;
rosacei quadrans, oua sex, perdicij herbæ triens. Vbi ve-
ro inflammatio membri conquieuerit, aut vetustatem ex-
periatur, cataplasma illi, priusquam liueat, ex cruda farina
ordei est imponendum. Quod si liuor iam occuparit, cu-
te scarificatu incisa, cataplasma induci, locusque perfundē
ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim
conducet, quinetiam ipsi cataplasmati talis aqua, vel ace-
tum, vel muria cum aceto misceatur. Deinde commemo-
ratis medicamentis compositis cura adhibita vti licet. Nam
si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem con-
uertitur:

De phymate, bubone & phygethlo.

CAP. XXXI.

Autore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, & phyma autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum vero quorundam sententia communiter omnes, qui à natura abhorrent, ceu abscessorij tumores quaecunque corporis partem obsideant, phymata appellantur. Si quidem Hippocrates in hunc modum scribit. Quibus phymata vrinarium meatum exercent, hi abscessu in vomicam erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis vlceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo vacant: febribus autem superuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Verum priores initio, quæ admodum inflammatio, qualibet, auxiliis repelluntur, quæ refrigerant astringuntque, vel spongiis ex posca impositis, vel lanis oleo crudo vinoque imbutis, vel rosaceo, vel melino, vel lentiscino, vel myrtheo, deinde iis quæ digerunt vtendum. At si corpus vniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum vacuari conuenit. vbi iam inanitum est, vlceris in quo id pronenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de vlceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tætetur, lanis oleo quodam laxante, irriguis, rectè lenitur, totumque ipsius membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non promptè diuidere, sed medicamentis quæ cerati speciem referunt, discutere nitimur, cuiusmodi potissimum est ex perano confectum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per hæc non discutitur rumpere adgrediemur, aliorum abscessuum modo, similiterque illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam procreantur, cauere debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quæ discutiunt, statim curationem incipere consilium est. Si autem nihil prohibet, nempe aut ætas aut virtus, sanguis prius è cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maxime ex iis quæ tertio volumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quæ nuper contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. Aster atticus herba quam
& bu

& bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa vocant, non solum illitus, sed etiam contactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autē priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, althææ radix vino incocta, ammoniacū cū melle emollitū inductumq; , viscus cum resina, ceratoq; . Rumpit autē abscessum propolis, lupini amari ex aceto illiti, cucumis sylvestris radix, terebinthina excepta, capparidis radix similiter, nitrū cum fermento aut ficis.

† In antiq. codicibus quedam leguntur quæ in vulgatis exemplaribus desunt. Phygethlon enim ita describitur, φύγεθλον δὲ τὸ φλεγμονώδες ἰσχυρίπιδας, ἢ ἰσχυρίπιδας φλεγμονὴ τοῦ ἀδίνου. id est Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, vel erysipelatodes phlegmone glandula.

De furunculo, qui dothien appellatur.

CAP. XXIII.

Furunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex crassius humoribus in carnosius plerunq; partibus concipitur, mitis quidem, cum in sola cute coit: peruicax autem, malignusq; vbi subter actis radicibus in superficiem erumpit. Dissipat autem furunculum, triticum mansum & impositum: mastichæ ægyptia, vix passæ quibus acini sunt exempti cum sale tritæ, ac admotæ hunc aut dissolunt aut rumpunt, vel siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, vel resina ficis mista inducitur, vel ipsæ ficus siccæ cum fuerint pingues dissectæ, vel fermentum cum nitro, vel lini semen cum melle, vel alterci folia, trita cum butyro. Composita vero hæc proficiunt, quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod priuatim à furunculo græcè dicitur dothienicon, fomenta autem adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aquæ intinctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

De terebintho.

CAP. XXIII.

Oribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse affirmat, in cuius extrema parte pustula nigra incumbit: hac rupta id quod subiacet abrafo simile apparet. vbi scalpello diuiseris, pus inuenitur. Dioscorides autem Alexandrus literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias, rotundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atq; has aliis phymatum tumoribus similiter curari censeret: auxilia ex suprâ comprehensis huc transferenda.

De carbunculo.

CAP. XXV.

c 5

Cum sanguis magis melancholicus effectus inferuescē-
 que aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet,
 quod vlcus est crustaceum plerunq; à pustula ambustis con-
 simili, interim verò & sine hac incipiens. Cæterum inter ini-
 tia, quibus hoc malum instat, in particula omnino pruritus
 sentiunt, deinde pustula, nunc vna, nunc plures tenues exo-
 riuntur, miliorum quorundam instar: quibus perruptis, si-
 militer crustaceum vlcus prouenit, quale ferramenta cāden-
 tia excitant, modò crusta ipsa cinereum colorem, modò ni-
 grum præferente, sic vt inferiori carni continua adhære-
 scat, & quodam modo affixa sit depascaturq;. Reliqua au-
 tem caro circumposita, feruidam refert inflammationem,
 quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splen-
 detq; bituminis & picis modo. talis autē est bilis exacte atra.
 Verum carbunculi, qui carnem inuaserint, cōfessim circum-
 scibuntur: qui membranas, nervosq; occupant, diutius re-
 manent, lumenq; subiectis corporibus impartiunt, vt etiam
 inflammationes quæ erysipelatis naturam respiciant, in ipsis
 excitentur. plerisq; itidem in suppurationem conuersi sunt.
 multis febres simul accedunt. Iam verò carbunculi ex cau-
 sis populatim grassantibus excitantur. Curatio ipsorum, nisi
 admodum fuerint exigui, à vacuatione sanguinis è vena ad
 animæ defectionem vsq; dimissi, tentanda est: mox scarifi-
 catus recte accommodatur, plagis ob succi crassitiem altio-
 ribus: particula laboranti inducuntur, quæ modicè reprimunt
 dissipantq;. tale est caraplasma, quod ex plantagine &
 cocta lente constat, quod recipit panis furnacei micam. Est
 autem panis, nec omnino à furfure purus, nec nimium eius
 habens, super ipsum verò vlcus valens aliquod medicamen-
 tum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Poly-
 dæ, diluūq; id vino aliquo dulci, ad sordium spissitudinē de-
 bebuit. Item massalioticum aridum, vel & ipsum similiter di-
 lutum. Item radix dracunculi, vel aristolochiæ, vel liquor sil-
 phij, vel cirenaici, singula ex aceto probè delinentur. At quæ
 erysipelatis naturam referunt, supra comprehensis ad id
 vitij remediis perungentur. Quæ verò partes consortij le-
 ge affici putantur, succidis lanis ex œnelæo madefaciendæ
 sunt. Vbi iam ardor acquieuerit, carbunculus iniiciuntur ce-
 rata cephalica, diluta, illitaq; in linteolis. generosissimum
 est quod herbis, tum illud quod nitro cōstat, item arida vl-
 cere

ceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo. Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, operam adhibentes, ut quàm celerrimè carbūculi suppurent. Quod quidem fiet, si die bis noctu semel tum cataplasmata tum medicamenta mutes. At quò radicitus carbunculos diuellas, dirimāsq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidum, minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in lauorem deteres, linteóq; illitum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis auellanae veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc praestant & cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum polenta, vua acinis vacua, ficus siccatae vino incocta, papaueris ceratidis flores, liquor silphij, cum ruta & mellis mometo, pix liquida cum uuis passis, & suillo adipe.

Ad carbunculos vehementer efficax.

ARGENTI spumae libra, olei veteris libra & semissis, auripigmenti uncia. Oleo cum argenti spuma dum manus non inquinat incocto, sublatoq; ab igne, auripigmentum adiicitur, rursusq; medicamentum coquitur donec nigrescat, tritis in pila utitur in linamenta filatim carpta illitis.

Ad gangrenas, vlceras vetera, chironia, strumas, podagram: priuatim verò ad carbunculos, praesertim eos qui palpebras infestant.

OPII, acaciae, misyos tosti, squammæ æris, singulorum drachmæ duæ, atramenti sutorij drachma, alterci seminis drachma, tritis ex aqua utitur, probè facit & tetrapharmacum quod quintam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbunculos, chalcitidis, atramenti sutorij, singulorum drachmis octo, aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis utitur. Valet stercus quoq; ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade quæ orchis & triorchis dicitur viridi, cum micis panis, cataplasmatibus modo utuntur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi verò crusta exciderit, communis vlceris modo curabis.

De cancro.

CAP. XXVI.

CANCER in qualibet corporis parte oriri consuevit, siquidem in oculis, & vulua, quemadmodum in ipsorum capitibus expositum est, aliisq; pluribus particulis, sed præcipuè in foeminarum mammis accidit, quoniam natura fungosa & inanes, crassissimam atræ bilis, vnde hoc vitium contrahitur,

hitur, materiã promptè possunt excipere. ex eo enim humore cū referbuit, cancri proueniūt. atq; si acrior illa fuerit, cū exulceratione. Quapropter colore magis quàm inflāmatione nigricant, sed ita vt tantā caliditatem non experiantur. Venæ autem quæ circa sunt intumescunt, intendunturque, cancri animantis pedum modo, vnde & appellationē hanc vitium est sortitum. Nonnulli verò inde sic nuncuparunt, quòd difficillimè ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animans. Hoc malum planè propter succi crassitiem non confanescit, vtpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, vel quod etiam mitiora negligat remedia, vehementioribus autem irritetur, exandescatq;. Prima sanè cancri initia prohibere, ne augeant, licet si melancholicus humor prius vacuetur, quàm in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit. vacuatio quidem primum tentanda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidem ex simplicioribus petita, quale est epithymō, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulsa exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum veratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccescant succo, continentius superfuso. Iam vti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pompholyge constat. Nec inepta sunt, quæ tertio volumine de vuluæ cancris prodidimus.

Ad carcinode, malignaq;, tum ad sedis tuberosa vlcera, item ad naturalium vel testiculorum, vel mammarum inflammationes.

IN plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem ex posca, & mulsa, vel lacte conterito, vt nigrescat: vel rosaceo, vel immaturo oleo, succove semperuiui, vel cotyledonis, vel lactucæ, vel psyllij, vel vux acerbæ tritam similiter inungito. Crebrior victus ægro dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex, bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquā palustres.

Archigenis ad carcinode, & maligna vlcera.

CANCRO RVM fluuatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis

cinis vnà cum cerato inducitur, item erysini semen detritum cum melle accommodatur.

De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis dicitur.

CAP. XXXVII.

CVm de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputatum sit, iterum de contrariis agemus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exorſi. Quemadmodum enim ex biliosa fluxione, eryſipelas, ita ex pituitosa, œdema latus quidam atque indolens tumor excitatur. Equidem ſcimus aliter quoque œdemata prouenire, nempe in pedibus, in aqua ſubter cutem affectibus, habitu corporis contabefcente, qui phthoë Græcè dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis quidem tumor hic affectus qui hominem premit accidens eſt, nullam ſeorſum, curationem propriam poſtulans. Satis enim eſt, ſi quidem curatione egebit ipſa tum crura perfricare oleo cum ſale, aut etiam oxyrodino ſal habente. At ſi ex pituitoso humore in particulam influente œdema conſtitit, abundè quandoq; eſt ſpongia poſca imbuta, cum ligamento leuiter ſtringēte impoſita, quæ ab inferiori parte incipiens, ſuprà finiatur. Eſto autem ſpongia, modò conductura ſit, recens, ſi huius copia non eſt, eam, cuius erit facultas, detergebis, expurgabiſq; nitro, magiſq; aphronitro, & lixiuio. Quòd ſi per hæc tumor non ſubſideat, paululum aluminis iniicies, commodum autem eſt tenerrimum ellychnion, poſca madens impoſitum: bonum eſt, & glaucium. Quòd ſi in vetuſtatē œdema inciderit, parti oleo prius inuncta ſpongia ex lixiuio impoſitur, eiufq; violentiore conſtrictione curatur. diſcutit autem, ac comprimit tumores laxos cedentesq; quælibet terra illita, magiſq; Aegyptia, tum iſatis domeſtica.

De inflatione.

CAP. XXXVIII.

INſtatio ex flatuoso ſpiritu nunc ſub cute, nunc ſub membranis, quæ oſsibus circundantur, & muſculis, collecto, enaſcitur. Porro iſ colligitur aliquando in ventre & inteſtinis, itemq; in medio horum ſpatio & membrana, quæ peritonæos dicitur, vt in aqua ſubter cutem genere, cui nomen eſt tympanias. Diſfert quoque hæc ab œdemate, quòd preſſa digitis, foſſulam non repræſentet, & ſonitum tympani modo ædat. Membrorum autem denſitas, tum ſpiritus ſimul craſſities efficit, vt idem ſpiritus non diſſipetur. Vnde

curan

curandī ratio huc dirigenda est, vt membra rarefacias, crassioresq; spiritum extenuas, quod medicamenta tenuissīma & potestate calida praeſtant : atque in ventre quidem & visceribus oleum tenuius quod rutam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apij. Interim vero & cucurbita iustae magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis, tēve defixa, in flationē discussit. Musculis autem ex contusione, quemadmodum propulsu inflatis particulas calidis nimium, & acris excandescere contingit. Quare per initia medicamenta quae magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quae discutiant. Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, vel etiam ceratum ex aēsypo admiscetur, cura adhibita vt caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam aeger lenitus, sopitusq; est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixiuium. Postremo emplastris utendum quae discutiendi vim habent, quod inflatio subsidat, quale est quod sequitur, Sordes balnearū subferuefactae percolantur primum, vt purae euadāt, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaq; calx restincta farinae modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utitor. Hoc efficacius est medicamentum ex sycomoro compositum.

De intortis & contusis.

C A P. X X I X.

Articulis intortis, contusisq; faciunt lanae succidae, aut spongia oxelaeo imbuta impositaq; , item bulborum elixorum pars tenerior cum melle, viticisq; folia, sal, nitrum tostum, laeuigata cum cerato inducuntur. Iam superfusio aquae dulcis, aut marinae calentis vtiliter adhibetur. Vbi vero inflammatio, & dolores conquerint, intortae partes etiam recte perfricantur.

De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu quod Graeci ecchymoma dicitur.

C A P. X X X.

Carne a graui quodam corpore, quod extrinsecus superinciderit contusa, venisq; exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Graeci *νατὰ διαπύδνω* appellant, vnde sub cute collectus, ecchymoma dictum efficit. Cute inquam, non diuisa, tanquam tumore tactu mollis & cedens, comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eò igitur animum tendimus vt sanguinem qui continetur dissipemus, idq; confestim priusquam nigruerit.

rit. Per initia sanè nonnihil ex astringentibus, iis quæ discutunt, admiscere oportet, eò quòd tunicæ venularum contusa densationem requirant: inde etiam solis discutientibus sine astrictione utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequenter curationem accommodabimus. Ad inueterata autem ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit ea ubi erodere inceperit, aut raphani succus, cum micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. Item sanguinis inter vngues concursus ex percussu proueniens, de quibus priuatim tertio volumine dictum est. Verum de vnguium vitiis, in partē chirurgica differemus.

De ruptis & anulsis.

CAP. XXXI.

Ruptio cum ecchymomate prorsus accidit: curatur autem medicamentis mediocriter calefacientibus, quale est ex nigris populis acopon, aliaq; huic consimilia. At altioribus rupturis magis acria, magisq; incidentia accommodantur. Talibus sanè & cucurbitulæ vsus proficit. Ergo si euocatum celeriter per halitum ecchymoma totum est, facilè deliscens ipsa caro coalescet. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire non potest, sed tantum propè ipsius labra admouentur. quo fit vt leui momento ea facilè separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quàm assidue novum quodammodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quòd citius quàm illud dissipetur, vtpote ex tenui magis sanie nunc constans, cum per initia è sanguine ecchymoma esset. Conuulsum autem fibris quibusdam laceffit distrahitisq; leniri tantum desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe conglutinari nequeunt. Itaque Aristolochia rotunda ruptis conuulsisq;, si quid aliud, idonea est: similiter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, costus, bdelliū cum oxymelite pota.

De scirrhis.

CAP. XXXII.

Exactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sensus expers, & durus: non exactus autem vix sensibilis est. ac qui sensu vacat sanari non potest: qui agrè sentitur, vix sanescit, si quidem humor vnde huiusmodi vitium contrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis quæ scirrho obducuntur impactus solui contumaciter repugnat. Est cum
statim

statim ab initio constituitur, augeturq; , plerunque vero à medicis qui erysipelata & inflammationes vehementer refrigerauerint, astringerintq; , originem sortitur. Quòd si quis ea quæ valenter discutiunt medicamenta, partibus scirrhus obductis admoueat, huic paucis primis diebus, manifestò scirrhus decreuisse videbitur. Caterum quod de affectu restat, id reddit insanabile. siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter conuenit diffusorium aliquod medicamentum, & emolliens habere, quod non validè calefaciat atque desiccet. Huius autem generis sunt medullæ omnes, magisq; ceruina, & vitulina. Ex adipibus commendatur, leonina, pardalis, vrsina, deinde taurina. Inter aues anserina, & gallinacea & phasianica, sicciorque caprilla, & hircina. Ad hæc ammoniacum suffimen, bdellium maximè scythicum, styrax qui humentior est & pinguis: ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sanè particulis scirrhum expertis his seorsum vtendum est, tum iis quæ inde componuntur. verum in tendonibus & ligamentis, lapis igni candens, aceto acerrimo extinguitur, & siquidem haberi potest, pyrites: sine eius copia non est, molaris, in quo pars affecta commoueri debet, vt vaporem ascendētem recipiat, atque inde rursus medicamen quod emolliat imponitur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur: interim oleo in quo althææ radix ac syluestris cucumeris sit incocta. A balneo autem in totum ægri abstinebunt, vel certe frequēti, sed posteaquam scirrhus emollitus fuerit, ammoniacum pinguisimum aceto quàm acerrimo maceratū particulæ: sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine vtendum, quod receperit galbanum, & opopanax, eaq; pinguisima. eiusmodi vero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumis dicata medicamenta.

De strumis.

CAP. XXXIII.

Strumæ glandulæ sunt scirrhus indurata, quæ in ceruice, Salis & inguinibus maximè nascuntur. Curatio earum, cum illa quam in scirrhis tradidimus cōmunis est. Priuatim vero lupinorū amarorū farina ex oxymelite cocta applicatur, ea quoq; phymatis proficit: vel bouillum stercus aceto incoct

incoctum inducito, id etiam tumores scirrosos omnes dissipat. probè autem discutit strumax calx viua melle, vel gymnasiarum sordibus excepta, vel oleo, vel adipe suillo: aut calcis nitriq; par modus, nasturtij, & fœnugræci quadruplum cum melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus conuersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini vino incocta, grossi syluestres, & satiui, aut nasturtium album detritum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris syluestris radicis siccæ, lauri foliorum siccorum concrematorum cinis cū terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pōdus, erucæ duplum cum resina iniicitur, aut sterco caprillum bouillūve aceto incoctum, aut erui farina in vrina pueri viderem non experti macerata exceptaq; pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsoque oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali fœnugræci pondere misceto, melle excepto vtitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ virtutis est, tum quod ex struthio cōficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit: strumas ad supurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decem, ammoniaci thymiamatis drachmæ septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila cōtunduntur. Ad strumas mammarum duritiisque proficit subscriptum medicamentum, visci elaborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

Ad strumas exulceratas, & sine vlcere.

CERÆ, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubij, eruginis rasæ, singulorum selibra.

Medicamentum ad strumas, quod dicitur cheradicum.

OLEI veteris pondo dua, ceræ pondo, colophonix triens, nitri, tantundem, alia duodecim membranis detractis in oleo per triduum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerint, proiciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiā abscessus. ALIVD. Cineris è ficu vnciæ dua, aluminis scissi vncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ vnciæ septem.

Exedens cheradicum.

ALUMINI scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ

quatuor, squamæ aris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si cancri naturam induerint, rosaceo maceratis bis die vtor.

De *steatmate*, *atheromate*, & *meliceride*. CAP. XXXIII.

Cum hæc quoque inter abscessus, quemadmodum in illis dicebamus, habeantur, singula propriam appellationem à similitudine rerum quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alij siquidem ipso veluti pingue quiddam seu adeps subest, alij melli simile quippiam, alij quasi tenuis pulticula. Consilium igitur curationis est commune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamentis totum exedatur, aut sectione auferatur. Quidam enim ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirum qui liquidiores humorem continent, qualis est meliceris; aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medicamentis exeditur, steatoma verò nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem unumquodque horum agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminum, quæ dissipandi vim habent, materiam, ubi actum est de strumis, reperiēs. Priuatim verò meliceridas hoc dissipat, vix passæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. **ALIVD.** Ladani, bdellij, galbani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contunditur: facit etiā strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. At Archigenes contra meliceridas commendat aphronitrum & veratri partem duplam, cum cerato duriore impositam, exedentibus autem in cute circumdata, vti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, vel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorum est quod recipit calcem viuam, saponem & lixiuium. Variū autem magis, quodque reconditum seruari potest, capit calcis viuæ drachmas quatuor, fæculæ quæ est fex vini combusta, nitri liquidi tosti singulorum drachmas duas, minij drachma, lixiuium tertur: ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter feruefacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pixide plumbea reposito, lixiuiam super distillans ne subito exarescat. valet quoque ad verrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, fæcula bimestri non vetustiore cutem delinito: ubi arescere inceperit, sponsia elotam rursum perun

perungito: vbi nigruerit denuò ablues medicamentis crustam inducentibus: postquam autem crusta deciderit, exedentia adhibentur. Medicamentū exedens validè citra ro-
sionem, squamæ aris drachmæ quatuor, sandarachæ drach-
mæ duæ, veratri nigri tantundem, cum rosaceo vtitur.

ALIUD. Squamæ, sandarachæ, vrticæ seminis torrefacti
pari mensura cum rosaceo vtitur. **ALIUD.** Erynaceorum
combustorum, sepix testæ, auripigmenti æquale pondus ex
rosaceo: quæ ambiunt partes orbiculatim omnes prius de-
linito cerusa cum oleo. Item efficax est compositio ex cal-
cis viuæ partibus duabus, chalcitis parte vna, auripigmenti
parte vna.

De fauis.

CAP. XXXV.

FAuis qui Græcis cerion dicitur, tumor est qui in cute
foramina habet, per quæ humor crassitudinē mellis re-
ferens excernitur: rectè igitur ipsi imponuntur vix passæ cū
ruta, aut fici folia mollissima cum melle, aut nasturtiū cum
lini semine ex melle, aut cucumis domestici radix cū melle,
aut sulfur viuum cum cerato, vel terebinthina. Caterū va-
riam magis fauorum curationem molire, si quæ tertio vo-
lumine de manantibus capitis vlceribus dicta sunt, in hunc
locum transferas.

De simplici vlcere.

CAP. XXXVI.

QVoniam simplex vlcus continui solū est diuissio, si quis
partes diductas fascia orbiculatim circumdata com-
mittat, vtique citra aliquam aliam molitionem coalescent.
Cum verò alterum vlcis os in obliquum spectauerit, inde
deligaturā tentare & in contrariū ducere oportet: cū vtraq;
illius labra eò vergant, à duobus principiis incipiendum est,
& ora sic adducenda. Nam cū nihil intra oras inciderit,
nempe pilus aut arena, aut oleum, aut sordes, aut id genus
aliud, omnino vlcus concreset. quod si magnum sit, adeò vt
diductæ partes in totum prædicta deligatura committi ne-
queant, futuris ipsæ prius adducentur, deinde sic deligatæ,
glutinatoriis, vt vocant, præstidiis vtemur, quæ collectā hu-
morum subluuiem desiccare & consumere queant: aliam,
ne influat, prohibere.

Quæ vlcera glutinare possint.

CAP. XXXVII.

QVERCUS folia applicata vlceribus glutinandis sunt. Itē
salicis, brassicæ, oleaginis fruticis quæ chamæla di-

citur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantaginis, papyrus, posca aut vino imbuta & in orbem circumdata. Recentia vlcera glutinant pini & piceae folia, cortexq; recens ligamēti modo circumdatus cum aqua aut posca, aut vino caseus recens laeuigatus: extrinsecus imponuntur, folia rumicis aut vitis, aut betae, aut lactucae. At ex acido lacte caseus qui oxygalactinus dicitur, vulnera quoq; ampliora committit: pira syluestria quae achrades dicuntur, fluxionem reprimunt. equisetū si applicetur, etiam si nerui fuerint praecisi, isatis satiuā in duris corporibus vlcera etiam si musculorum capita affligant, idem praestat, cupressi folia, germinaque & nouelli galbuli mollisque etiam duris corporibus proficiunt, sed miscendus est pollen farinae, qui à pariete propinquo mola assumitur, myrrha cum aqua illita, vel lachryma thuris, terraeq; lumbrici etiam neruorum praecisiones glutinant, pentaphylli folia cum melle, allia combusta applicata. Inueteratis vlceribus anagallis prodest cum cerato. hordeum combustum, & cerusa cum myrtei cerati triplicato pondere. Ad capitis vlcera valet, myrrham aridam inspergere non madefactam, quippe celeriter contrahit, vel aloē aridam, vel aristolochiam tritam & melli ex vino incoctam dum mediocris fuerit spissitudo, in linteam illinens applicato. Composita autem ad glutinandum sunt Barbara, Chryse, Nicolai. item dia iteon quod salicibus, diadictamni quod dictamno constat, atque alia his consimilia quae magnis potissimum vulneribus glutinandis sunt.

Si dolor & inflammatio vlcera exerceat.

C A P. X X X V I I I.

SI dolor & inflammatio vulnera obsideat, vsus est medicamentorum quae desiccant, atq; inflammationem arcent. Ex liquidis igitur laudatissimum est vinum, deinde posca. Si verò etiam cum sordibus inflammatio infestet, mulsa aquosa conuenit. Ex iis autem medicamentis quae siccandi potestate praedita sunt, communiter quidem conferent, inflammationibus dicata, si oleosa acriaq; excipias: priuatim hoc proficit, malum punicum dulce vino incoctum tritumque applicatur, mirabile nimirum & multiplici vsu commendatum est remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum ea quae toto corpore excruciant, oculorumq; inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accessit

accefferit, iis vtendum præfidiis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

Si maturari, & ad suppurationem perducere nequeant.

C A P. XXXIX.

Recentia quidem vlcera, & quòd inflammatione adhuc occupentur, non suppurantia, concoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, vel chondrus, vel panis, vel glutinum librarium, cum terebinthina obducta, item cera, crocus, lachryma thuris, pix, rosaceum, adeps suillus, virulinusq;. Inter composita verò tetrapharmacum quod linteolis illinitur, rosaceo subactū. Vetera autem & callosa maturant, simplicia quidem vna passa domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche, ægyptiaca, & œsypum. Composita verò ex resinino, dictum acceron, id est, absq; cera, quod ad Galenū auctorem refertur, si linteolis illinitur, oleo veteri aut resinino solutum, item quod à duplici colore dichromō dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

De cauīs vlcibus.

C A P. XL.

Cauum vlcus carnem quæ periit restitui postulat. cuius generandæ materies sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur mediocritatem ex alimento sufficienti conciliabimus, temperiem verò probam ex bonis ciborum succis, & proba particule in quo vlcus est temperatura. At in recremento quod euacuatur, tenuē quidem, humidum vlcus reddit: crassum verò, sordes, circum ipsum coalescentes, eoq; medicamentis eget quæ modicè siccāt purgantq;. Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruorumq;, fabarū lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quòd si nihil medicamentū ad creandā carnē inductū proficit, ad aliud sic digrediendū est. At si plusculū sordis sit, humidiusq; vlcus, sciendū venit medicamentum intra modū desiccasse, intendendūq; esse ipsum mellis mixtura: sin purū & absque humore cernitur, vltra, ac conuenit desiccavit, ac oleo pleniore dilutum ceratū inducere oportet. Accidit nō nunquā carnem à medicamēto valentiore colliquari, vt fordidū humidūq; vlcus appareat, quemadmodū ab iis quæ minus ac par est, desiccant. Verū hoc vlcus dum cōsumitur, cauū magis euadet, labris prætumidū, rubens præterea & inflammationis particeps. sæpe verò ager manifestā erosionē

percipit. Alterum illud quod à parum siccantibus remediis humescit, nihil horum succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum, & potissimum eorum quæ moderata astringēdi abstergēdīq; virtute donata sunt, quēadmodum & vlmus, purgant vlcera, puraq; iam facta, carne replent, vel anemona appositæ. item piceæ cortex deraſus, tritusq; cum cerato & linteolis illitus cauis vlceribus auxiliatur, & præsertim recentibus, vt quæ carne destituta reficiat, repleatq;ue. Composita verò, vbi pura quidem sunt vlcera, accommodantur, quod ostreis cōstat, quod Manathoni adscribitur ex vini fæcula, & quod ex aloë conficitur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannae, thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. similiter quod è thure confit, & aphroditariū. Sin autem sordibus magis scateant, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinuntur, vt Trophos dictum, Isis Athene, ex atraſtilide præparatum, Italicumq; & quæ experientia comprobauit.

Quæ sordida vlcera purgent.

CAP. XLII.

Sordida vlcera siue caua, siue plana fuerint, probe purgat aristolochia cum melle, terebinthina cum pari rosaceo & melle, vel loco rosacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ colymbades applicatæ. Ad ea verò quæ neruosis obueniūt, terebinthina cum butyro liquefacta: sordidis nimium & depascentibus benefacit marrubium cum melle. hoc etiā crustas deiicit. Composita autē remedia hæc sunt, amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis phorimi, hoc est liquidi, paria pondera. **ALIVD.** Serapiadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, sicca, iridis illyricæ, marrubij sicci, aristolochiæ, singulorum drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decem, arido vititor & cum melle. Insuper ad sordida vlcera facit tum Aegyptia, tum ex sale cerata liquefacta, tum Indice, tum Athene, tum viridia diluta. Ad hæc, quod pumice constat, & ex eruo, sicca, pastillusq; melanchlorus, hoc est, nigroviridis, similiter etiam Criogenes appellatus.

Ad vlcerum vermes.

CAP. XLIII.

Ad vermes qui in vlceribus procreantur arcendos, primum quidem est, vt humiditatē putredinemq; eorum opificem tollas. Cæterum necant vermes communiter quidem omnia quæ ad aurium vermes inscripta sunt. Ad eos autem qui vlcera infestant, Archigenes commendat cerusam,

po

poliumque, pari modo cum pice liquida illitum.

Quomodo caro vlceribus supercrescens exedatur. CAP. XLIII.

Supercrescens vlceribus caro medicamentis quæ valenter exiccant tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum squama aris, omniaque testacea combusta, & erinacei concremati utrique cum toto corpore. Verum hæc modicè purgant, & supercrescentia continent. Asiæ vero petrae flos, validior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy: combusta minus rodunt: item aris flos: similiter et rugo omnibus est valentior, sales autem concremati, humentes & flaccidas carnes consumunt, sic etiam linamenta carpta è panniculo, muria acriori imbuta & resicata, quæ si imponantur, mediocres carnum supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ validè excresecntia supprimunt. Composita Rhodia (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morfu retinent. At maximas carnum excresecntias, adusque penitiora crustis obducunt, pastilli Faustiani, triti inspersiq; & medicamentum, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridum. Adde his quod recipit calcis viue, squamæ aris, & mannæ thuris, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisque respondent, cum melle, purgat: cum terato, carne replet.

Arida compositio ad carnem compescendam.

AR G E N T I spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. **A** L I V D vehementer reprimens citra rosionem, valet quoque ad pascentia vlcera, & præsertim gingivarum vitia, quas epulidas vocant, necnon ad dentium candorem. Calcis viue pondus, auripigmenti selibra, hoc auripigmentum siccum, inquam, ex aqua detritum calcis viue, cadmiæ modo lotæ adicitur: in puluerem radaetis siccis utitor, ex pastillis autem, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypum inscripti sunt, pulchrè coercet, sic emplastrum viridia & præcipue id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & iis summè carnem supercrescentem in vlceribus continet.

De vlceribus serpētibus, & putridis, et phagedæna. CAP. XLIIII.

Supperfusiones utiles sunt vlceribus depastis, putridisq; ex saceto, posca, aut vino astringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lenticulæ, malicotij, balauitij, lētisci, myrti,

spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex iis quæ astringunt & siccant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine liquido, panis filiginei mica, gobio veteri, aut alio salsamento veteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritum, vel aristolochia, vel reciniorum foliorum succus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua vt mellis sit spissitudo illinitur: si crusta nō deciderit, elaterij parem modum ærugini admisceto. putridis efficax est fori si tritum inspergatur. Et super linamenta carpta arida, vel aristolochia rotunda, vel gallæ, æquo pondere cum oleo illinuntur, vel cucumis sylvestris radix, vel brasiçæ, vel betæ, vel cucumeris folia, illigata calidis cineribus recoduntur. Vbi verò emollita fuerint, cum sale trita imponuntur, valentérq; repurgant: vel oleæ summitates in vino decoctæ cum melle inducuntur: vel chalcitis applicatur, vel apij semen cōtritum, vel lini semen læuigatum, cum atramento sutorio inducitur, vel thymum, vua passa, & ficus incoctæ applicantur, aut fici folia in læuorem trita cum melle, aut nitrum, cuminū & farina ex melle, aut cucumeris sylvestris radix, aut scilla cocta ex melle, aut foreos drachmæ duodecim, chalcitidis drachmæ decem, misyos drachmæ quatuor, cum dimidia aceti acerrimi hemina, læuigantur donec arefcant: exceptis vteris, specillū intingens, ac vlceri circumadigens, superq; duplex linteculum ex œnelæo imponis: si inflammatione sint occupata, altercum cum polenta, aut brasicam cum melle obducito.

Ad putredines quamlibet partem occupantes, & vlcera quæ depascunt.

CALCIS viuæ, chalcitidis, singulorum drachmæ duæ, auripigmenti drachma: hoc quoque ad digitorum pterygia & phagedænas efficax est. Item naturalium carbunculis cum melle vtiliter adhibetur. In reliquis vitiis arido vtitur, super splenium ex resina inducito.

Ad omnia quæ depascunt vlcera, quæq; os infestant, item ad sanguinis profusum, & carnem excrecentem, aridum, compescens, longè vtilissimum.

CHALCITIDIS, misyos, vtriusque crudi, drachmæ viginti, squamæ ferri drachmæ sex, gallæ omphacitidis drachmæ octo.

Ad serpentia vlcera & putredines.

SALIS drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squammæ, pumicis combusti, singulorum par

ar modus: valet & ærugo rasa cum misyi combusto, pice liquida excepta, squamâq; ferri cum oleo.

Ad vlcera pudendorum depascentia.

HÆC & meleterion dictum nomis proficient. Item diaoxymyrsmes, hoc est ex acuta myrto, itē ex charta medicamen aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc coration ex oxymelite, pastillus Andronis, & qui huic respōdēt. Eadem vero hæc medicamēta phagedenis quoq; cōgruunt, nam & ipsa vlcera sunt quæ depascunt, exeduntq;ue.

Ad staccida humiditate vlcera fœtidâque.

LEMNIA sphragis ex aceto, vel oxymelite, vel posca, vel vino subacta, ad luti spissitudinē illita benefacit, aut cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concremata cinis, aut platani corticis cōbusti, aut anethi cremati similiter, aut lanarum sordidarū vstarū, aut plantago, aut isatis per se, vel cum polenta, vel peucedani radix arida.

Quomodo cicatrix vlceri inducenda sit.

CAP. XLV.

SI carnem vlcerum quæ cicatrice indigēt, siccemus, astringamusq; adeo, vt non modo id quod præter naturæ modum superfluum est, discutiamus, sed etiam illud quod naturale est, attingamus, superficiem vlceris cuti similem reddemus. Ad hoc autē sunt idonea, galla acerba, & mali punici cortices modicè siccantes. Quæ vero præter astringentem sine morsu exicant, ea quoq; cicatricē inducunt, veluti myrrha, argenti spuma, ostreâq; concremata. Nam hæc quoq; si inspergantur, arida, sæpe cicatricem inducunt: pini cortex cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato, lilij radix cum rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari portione, siccis vti tor, idem etiam reprimat: vel pumici trito, manne thuris & diphrygis singulorū miscens paululū, vti tor, vel argenti spumæ partē vnā, diphrygis dimidiam cum cerato instar splenij impones. Vetera autem ad cicatricem ducit viscus, cum lachryma thuris, ærugo cum diphryge æquali, ceratoq; myrteo: vel cētaureum minus recens applicatum. At humidiora cyperi radice obducito: sedis autem naturaliumq; vlcera, præsertim si inflammationem experiantur, aloë persanat læuigata, arida, vel ex aqua aut squama æris, aut chrysocolle in sole cū cera emollita inducitur.

Aridum ad cicatricem inducendam.

OSTREORVM drachmę duodecim, pollinis thuris drach

v 5

mae sex, cadmia drachmę quatuor: facit & Nomis. A L I V D. Aristolochia, drachmae sex, pini corticis drachmae sex, pollinis thuris tantundem, pumicis, colophoniae, iridis, singulorum drachmae quatuor. A L I V D. Cornu ceruini combusti drachmę quatuor, pini corticis vnciae sex, cerusae vncie quatuor, æruginis rasae vnciae nouem, cadmia drachmae octo, decim. A L I V D. Cytinorum, atramenti sutorij, singulorum drachmę sedecim, squammę eris, aluminis scissilis singulorum drachmae octo, gallae drachma. A L I V D. Cerusę, argenti spumę, singulorum drachmae octo, recrementi plumbi, gallae, myrrhae aridae singulorum, drachmae quatuor.

Ad cicatricem inducendam.

A L V M I N I S scissilis vncia, trita in aquae sextario maccatur: vbi solueris, aqua linamenta imbuīs, & sicatis vteris.

Emplastrum ad cicatricem inducendam ex simplicioribus.

C E R A E drachmae quadraginta, argenti spumę drachmae triginta quinque, diphrygis drach. octo, myrtei heminae dimidium: efficax est his quoq; Palmulatu, quod phœnicine dicitur, item ex cadmia, tum myrsinatum, & consimilia. Ad ea vero quae cicatricem vix recipiunt, cerę myrtei singulorum drachmae sex, cadmia drachmae sex, plumbi, thuris, singulorum drachmae duę, aluminis scissilis, æris combusti singulorum drachma, æruginis rasae drachmae duę: die interposito soluitur.

Diu inueteratis & agrę ad cicatricem venientibus.

C A D M I A E, chrysocollae, aluminis scissilis, singulorum drachmę octo, æruginis, squammę æris, singulorum drachma, resinae pityinae drachmae quadraginta, cerę drachmae centum, myrtei quod satis est. A L I V D. Cerę resinae pityinae, singulorum vnciae sex, cadmia tantundē, chalcitidis crudae vnciae tres, myrtei quantum satis est: vino læuigatur cadmia cum chalcitide, quando caniculę sidus oritur: latiore vterre splenio, quod platysma dicitur: super id linamentum carptum & spongiam ex vino inducto. A L I V D. Aeris combusti, aluminis scissilis, singulorum vnciae duę, salis ammoniaci drachmae duę, cerę vnciae sex, colophoniae tantundem, myrtei vnciae duę, arida in sole diebus viginti ex aceto læuigantur, vbi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataque emolliendo miscetur. Valet etiam ad hæc medicamentum ex punice, item Isis, & id genus alia.

De

De maleficis vlceribus dolosisq; cacoëthe Græci vocant, aliàs chironia & telephia.

C A P. XLVI.

I Nueterata & quæ vix cicatricem recipiunt vlcera, alij chironia appellantur, ceu Chironæ medicinæ peritissimo indigentia: alij telephia, quod in tali vlcere Telephus conuenit. Inspiciendum igitur venit, num & totum corpus vitioso redundans succo huiusmodi fluorem vlceri transmittat, ac qui superat humor, conuenientibus vacuari debet remediis. Si verò varix cruribus vlcere infestatis illum imperiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut venæ sectione ipsos vacuabimus, abundè sanguinis detrahentes. deinde loco inducemus auxilia quæ sine morfu reficiendi vim habent. simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce mediocriter lota: alumen scissile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, vix passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ aris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

Composita hæc sunt, emplastrum ad chironia.

CERVSÆ vnciæ octo, aluminis scissilis vnciæ duæ, squamæ aris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorij, singulorum vnciæ duæ, calcis viuæ vncia, ceræ libra, myrtei libra vna & semis, arida vino teruntur. hoc medicamento protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in vsu emollitum myrteo, cicatricem inducit. **ALIUD.** Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radicis aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum vncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum vnciæ duæ, præparato radicibus viridium arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica vlcera quæ tibias mammaeq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores vtuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis vnitisq; vtor. **ALIUD.** Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, vel eius lachrymæ, diphrygis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cum aceto læuigas, vbi mellis spissitudo facta, cerato mices, & vteris diluto quod linteolis possit illiri. **ALIUD ad mulie**

mulierum dolosa vlcera, & aliorum qui tenera carne praediti sunt, Cerae tyrrhenicae drachma octo, adipis taurini, terbinthinæ, plumbi combusti, lotiq; singulorum drachma vititor per linamenta ex rosaceo vel myrteo diluens.

Ad cicatrices nigricantes.

CAP. XLVII.

Cicatrices nigras tollit oleum in quo bryoniae radix candida & nigra incocta sit, dum succum reddat, impostum: calamintha ex vino cocta, argenti spuma cum rosaceo albo lota: ex impetiginibus cicatrices, tum alias, & concoloris efficit asini adeps illitus: ærucæ semen ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctum cum argenti spuma, ouillus talus combustus, ex vino austero tritus, gutta ammoniaci cum suillo felle illita. Composita vero, argenti spuma, mentha, lachryma thuris, pares portiones cum melle. ALIVD. Nitri, suffiminis ammoniaci, sulfuris viui, myrrhae, paria pondera, ex aceto albo, aut vino, aut aqua, minutim detrita modicè illinuntur, ne exulcerationem excitent. ALIVD. Cimolix cretae, columbarum fimi, saponis, thuris, æquales modi ex aceto. *MEGMA* ad cicatrices nigras. Cimolix cretae drachma octo, aphronitri drachma quinque, veratri albi drachma quinque, glandis vnguentariae expressi drachma quatuor: in balneo cicatrices abstergito.

De sinibus.

CAP. XLVIII.

Cum adiacens vlceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit glutinaturq; , nostri sinum, Græci colpon nominant. Si igitur ad superiorē partem porrectus sit, facilè sanies per os emanat, atque ideo promptè conglutinatur. Si inferius ipse spectet, sanies vicinam aliquam partem intus erodit, ac nisi emissarium quoddam collectionis scalpello prius feceris, nihil promouebis, neq; carne ipsum replendo, neque conglutinando. Quod si artus aliquos nempe cubitum, aut femur sinus occupet, poterit utique decliuis figuratus citra diuisionem ex aduerso factam coalescere. Etenim in cubito cum orae flexurae ipsius vicinae sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxum conuertis. At in femore si propter genu sinus desinat, decliui figura posito, iuxta poplitem mollem puluinum subiicis, quò inguina genu humiliora sint. Si igitur sinus carne impleri non desideret, statim fistula quadam recto peruia foramine cui vesica illigata sit, ad saniem quidem quæ sinui inhar

hæret abstergendam aquosa mulsa potabili, elui debet: erum vt coalescat, vino aut mulso: deinde ad glutinās medicamentum transeundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primū, medicamenti, q̄ charta cōstat, aridi paululū cum multo rosaceo inseri conuenit. deinde carpto linamento obturari. Inde emplastrum Iſis aut Macharionis, aut ſimile quoddam vnā cum rosaceo cerato liquidiore solutum indicitur. Vbi vero carne mediocriter sinus fuerit repletus, conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum & recens cruentum vulnus curabas. Huius autem generis sunt, Barbara, Dichroma, & scirrha, id est, fulua appellata. Maximè verò omnium quod ex resinino, & metallicis sine cera præparatur fulvum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, spongia recens ex mulso, aut vino circumponitur, & quā fieri potest mollissimè, deligatura à sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteorū verò circumductus fundum sinus sine dolore constringat, paulatim vero soluatur vsque ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui circumdato, sed ita iuxta oras descisso, vt sanies queat excerni: quod fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medicamento ob effluxum laxo: fines id adusque solutionem, qua tertio quoque die facta id ipsum auferes mutabisq̄; : quod toti sinui circumdatum est relinquens. Nota verò erit an sinus ima coaluerint, si sanies probè emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat: insuper eodem in sinu si neque dolor aliquis sensibilis, neque tumor, sed tota regio contracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando sperandum est. At si primo alteròve die sanies quædam tenuis è sinu excernatur, nihil adeò de glutinatione despera, quippe medicamenti virtus humorem tenuem † ex subiectis partibus frequenter extundit, vnde partes sicca mediocriter factæ coeunt, & glutinantur. Tertio verò die aut quarto ab initio si cruda per os sanies euaserit, scito sinum non coisse, eodemque medicamento non insiste, nam cum propter humiditatem quāpiam, vt verisimile est, à parte decidat, nō alienum fuerit etiam mutare.

† *Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερκειμένων, id est, ex superpositis partibus.*

De

De sinibus laceris detritisq;.

Vbi abscessus tardè sectus fuerit, vel medici imperitia vel eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis diruptaq; quod Græci ab attritis vestium laciniis rhacode dicunt: nec fieri potest, vt prædictis collutionibus adimatur, glutinâre vtendum medicamine, temperatura liquido, viribus autem sicco. tale est palmulatum dictum ex chalcitide, veteri dilutum oleo, vt neque admodum sit durū, neq; manus intinctas inquinare desierit, deinde vino mediocriter vetusto maceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autem laceræ vt comprehensum est, cuti, potissimum mel, quoad emplastri spissitudinē habet coctum impositumq;: Præstiterit autem post illitionē lacero in sinu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspenso ei inspergere, vel aloën, vel thus, vel simul omnia. Expertus autem sum, tenue centaureum in hunc vsum mirabile esse medicamentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricę radix, postremo erui farina. Nonnunquam vero inter coquendū ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tolletur. Melius autem fuerit, si lebece iam à flamma amoto hæc fiant, deinde diligenter agitemus: vbi medicamentum tepidum euaserit, sinui imponatur, illigeturq; sicut expositum est.

De fistula.

CAP. XLIX.

Fistula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus nascens, ab arundinearum fistularum tralatione appellatur. Si itaq; in os desinat, curari sine manu haud potest, nisi temporis spatio, squama ultro vel os deciderit. Si vero in os nō finiat, medicamētis quæ callos elidūt & conglutināt persanabitur. Itaq; callos excindūt hæc quæ subiungā. Spondylii radix circumrasa impositaq; fistularū callos eximit, item veratrum nigrum duobus tribusve diebus insertum idē præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutionem adhibita. Iam sory crudum vel cōcrematum cum vini diluti momento ad collutionē iniectum: item sory & crocomagma cum hydro melite, vel elateriū terebinthina exceptū in penicilla cogito, impositoq;, vel laserpitij radices succum infundito. Id quod sequitur callos consumit: æruginis drach. duodecim, ammoniaci drach. duæ, excepta aceto in longū inducuntur.

Collyrium quo fistulis exterendis vtor.

CVTTAE

GVTTAE ammoniaci, atramēti sutorij, æruginis, misyos, chalcitidis, gummi pari modo excipiuntur aceto. ALIUD ex his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmiæ, misyos, atramenti sutorij, æris combusti, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri eneris non experti vrina & finguntur collyria, ex quibus no fistulæ imposito, panis mica aqua madens extrinsecus superaccommodatur, mutaturq; sæpius donec inflammatio conquirit & crusta exciderit. ALIUD quod in Alexandria cecepi, Anchusæ radicum, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, luminis scissi, atramenti sutorij, aloës, singulæ vnciæ, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. ALIUD. Atramenti sutorij drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ drachmæ, excipito ammoniaco & vtor. Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cum mulla purissima octupla in collyrij formam redacta, repurgatur. Vbi vero callum eliseris, iis quæ carnem procreant vti opportunum est.

Collyrium ad carnem generandam.

ALOES, myrrhæ, ammoniaci, ouorum putaminum combustorū cineris, æquale pondus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq;. ALIUD. Myrrhæ, aloës, thuris, malicorij, æqualis modus aqua excipitur, quidam vero taurino felle, carnes etiā oleo quod immaturis vis expressum est eluuntur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirum quanta res felicitate successerit. Postquam vero carnes produxeris, glutinatorio vtendū medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cum fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neque callum adhuc, sed sordiciem tantummodo contraxerit, primum lixiuiam demisi, deinde eandem tantisper inibi permittens dum sordes excidisse sperassem, medicamentum applicaui. Est autem id quod recinino oleo constet superius commemoratum.

De vlcibus disruptis.

CAP. L.

Nonnulla vlcerū cicatrice obducta, frequēter haud magno tēporis interuallo, iterū inflammatione tentantur rumpunturq;: siquidē osse quodā affecto, interdū caro circumdata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse videtur: verū cursu humoris valido paulatim ex osse in alto cōtabesceēte, tū inflāmatio, tū pus oboritur, quod cicatricē deradit.

Curatio

Curatio igitur eiusmodi vlcerum tantam requirit siccitatē, ut os affectum decidat. Huius autem sinus concauos promptē replebunt papaueris syluestris ficiq; folia cum polenta subtiliore parte leuigata, atque ex vino applicabis, vel alterci semen, & atramentū sutoriū pari pondere contrita imponētur, vel peucedani radix de subito squamas ossiū separat.

De articulorum vlceribus.

CAP. LI.

Cum articuli carnosus partibus sicciore existant, exulcerati sicciore medicamenta requirunt. Probē igitur facit pastillus Polydæ ex vino subactus donec sordidū fiat spiritus. Item quæ similiter huic desiccant medicamina. Item marina, muriaq; frequenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis iis vtendum est quæ maiori etiam siccandi virtute pollent.

Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia educunt. CAP. LII.

Aculeos, arundines, in super spicula & spinas extrahit vtrumq; anagallidis genus, aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, alterci semen laeuigatum inspergitur, arundinis radix contusa melliq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito educit.

Si ex vena, arteria ve, & naribus sanguis profluat. CAP. LIII.

Particulis sanguinem fundentibus, figura ei quam in sinibus exposui contraria, rectē adhibebitur, nempe quæ sursum vergat, neq; id tamen immodicē, nam periculū est, ne dolore oborto, vas rursus sanguinem profundat: cum nihil æquē sanguinis profluuium excitet, inflammationesq; augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erumpit, statim digitum ori vlceris vasculi iniicito, innitens leniter premensq; citra dolorem. nam simul & sanguinē continebis, & grumum vulneri induces. Quinetiam si altius deliteas vas quod sanguinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, & magnitudinem, item vena sit, an arteria: deinde si exiguum vas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt vtendū est. Optima vero eius generis sunt, quæ obstruendi vim obtinent, vnde Græcis emplastica dicuntur, ex resina fricta, farinæ triticæ polline, gypso composita, similiaq; ouī cadido macerata, & cum leporinis pilis imposita: at si amplum vas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter circūages, sanguine represso: siquidem vena extiterit sine funiculo sanguinē his ipsis medicaminibus sistere tētabis: si arteria,

teria, alterum è duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto uase præciso sanguinem coërcebis. Est, cum magnis quoque venis funiculos circumdare cogimur, quemadmodum nonnunquam easdem totas transuerfim nimirum amputare, in cuius rei necessitatem venit, in venis quæ à penitioribus rectè sursum feruntur, præsertim per arctū quoddam spatium, aut principes particulas, sic enim utraq; pars utrobique & reflectitur: & vulnus à vicinis corporibus premitur contegiturque: tutius autem fuerit utrunque facere, funem quidem radici vasis circū dare, quod autem inde procedit abscindere. his sic peractis, vulneri celerrimè carnem inducere, priusquam funiculus à vase decidat, si enim subito carnem contraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod Græcè vocatur aneurysma sequitur. Dignosces autem num vena an arteria sanguinem profundat inde, quod huius fluior tenuiorq; sanguis existat, & cū pulsu vacuetur, † illius autem nigrior, & sine pulsu. Subsequens igitur est omnium optimum quæ nouimus ad carnem inducendā medicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias uti securissimum est, item ad colli vulnera, ipsarūmq; venarū iugularium quas sphagitidas Græci vocant, etenim & harum sanguinem citra vinculum cohibet. Recipit autem thuris lachrymæ pinguisimæ partem vnam, aloës in mollioribus quidē corporibus partem dimidiatam, in durioribus equalem, ac in vicem lachrymæ thuris, tenuissimæ eiusdem partis tantundem, cum oui albo subigitur, dum mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo excipitur, mox vasi ipsi, tum vlceri vniuerso copiosissimè imponitur. Deligandum verò extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor aut quinque amplexus super ipsum vas † profluit, iniicietur. hinc ad radicē ipsius distribuetur, postea ubi tertio solueris die, si tutò adhuc medicamentum vlceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circūdabis ac veluti cōtegens iterum, deligabis quemadmodum prius. at si sponte sua primum reiecerit linamentum, vasis radicem digito leniter comprimens, ne videlicet quippiam confluat, hoc quidem sensim auferes, alterum verò impones, atque hoc modo quoad carne obducatur vas, curabis, ita ut semper acclius particulæ figura sine dolore seruetur. At quæ crustas generant, quoties illæ decidunt, nudam magis partem quàm na-

turaliter esse debet, efficiunt, multisq; iam ex iis quibus crusta decedit, sanguinis profluuium quod egrè suppressi queat superuenit, quanquā & his vtendum est cū magna vrget necessitas. Maximam verò necessitatem vel crustam inducentibus medicaminibus, vel ignitis ferramentis vtendi puto, vbi ex erosione putrescentis alicuius profluuiū sanguinis concitatur. Quinetiam cū in huiusmodi affectibus totū quod putredinem expertum est exciderimus, tutius est vel ipsius quasi radicem adurere vel medicamentis quæ crustam faciunt vt: hoc autē maximè tum in pudendis, tum in sede fieri cōsuevit. At scopus crustam generantium medicamentorum erit calor cum astringione, quemadmodum in chalciride, misy & atramento sutorio habetur. Quæ autē ex calce viua conficiuntur, vehementiora quidem his sunt, ceterum quia calx non astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hære autem ipsas longè est vtilius, quippe ad basim earum caro supernascitur, efficiturque valis profluentibus veluti operculum, at huiusmodi sanguinis profluuiam isatis satia si inspergatur probè coëreat, vel gallæ combustæ. Porro ipsa ferramenta ignita ex aceto aut vino restringere oportet. In vniuersum sanguinis profluuium sistunt, simplicia quidem, aloë, thus, cuiusque pars subtilior, terra samia, ærugo ferri, lanarum crematarum cinis tenuissimus similiter, sterces asini & equi, bitumen modicum, malicoriū, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne, tum crudum tum combustum, resina fricta, vitis cortex, aut folia arida, platanorum galbulorum pollen tenuissimus, maximè cum humorem concretum deposuerit: priuatim autem ex naribus profluuium imposita reprimant iunci acuti semen, vrticæ foliorum succus, chalcitis, anthyllis cōcremata, pili leporis, ferulæ medium vsum cum aceto, & sterces asinum siccū vel humidum, succus porri cum thure, ellychnio exceptus: composita verò ad quodlibet sanguinis profluuium hæc quoque faciunt, spongia recens in liquida pice mersa & bitumine circumlita, olla recenti cōcrematur, cineris partibus duabus, miscentur plumbi & stammeos, singulorū pars vna. **ALIUD.** Thuris lachrymæ, cuiusque partis tenuioris, sulfuris ignem non experti, æqualem modum inspergito. **ALIUD.** Chalcitidis drachmæ viginti, lachrymæ thuris vel tenuioris eius partis drachmæ sedecim, resinæ frictæ, gypsi, combustæ,

busi, singulorum drachmæ octo. ALIVD crustas inducens sanguinèque reprimens. Chalcitidis, æris combusti, atramenti sutorij, misyos tosti paria pōdera, item Rhodia dicta, & Xanthe probè sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. ἡ πλεῖος μελάντερον τε καὶ παχύτερον, &c. *venæ autem nigrior & crassior sine pulsa.*

† Rectior est scriptura in veteribus lib. ὀνῶνις ξηρὰ ἢ ὑγρὰ. id est, *Ononis sicca vel humida. Quid autem sit Ononis, Dioscorides & Galenus docent.*

De nervis conuulseratis.

CAP. LIIII.

Nervis vulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obtinent, acumine, inflammatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres & cōuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium ob commercium quod nervi cum cerebro obtinent. Interim verò in aliis quoque ambientibus particulam vulneratam locis inflāmationes, & abscessus ex ipso nervo vulnerato ob coherentiam solent accidere. Ratio igitur est, cutis vulnus apertum inglutinatūque relinquere, quò per id sanies effluat. At si punctus in conspectum non veniant, etiam duabus lineis sibi continuis incidere præterea oportet. Remedio autem est, si corpus plethoricum sit & magna vrit inflammatio, primum à sanguinis demissione auspicari: si verò vitiosis repletum sit humoribus, etiā purgatione utendum est. Medicamenta verò vulnere applicentur quæ dolorem leniant, & effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim diuisione. Itaque aqua calida, quam reliquis inflammationibus sit accommodatissima, vulneratis tamen nervis est inimica, ac præstiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit experts, ad sensum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admodum tutò adhibetur. Verùm ex medicamentis idonea est terebinthina resina, per se quidem, in pueris & mulieribus & iis qui molli sunt carne, cum euphorbio autem emollita, in duris corporibus: & si nonnunquam duriora contigerint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasinata verò in nervis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhibebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam,

in lixiuio, cum oxymelite coctam. Si putredine careant punctura neruorum, recte cerato vteris, quod recipit cere quadrantem, euphorbij vnciam, aut columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum etiam terebinthine vnciam: ut autem emplastri figuram induat medicamentum, vncie vni euphorbij, sex vncias singulorum sequentium, cere, resinae frictae, olei, picis liquidae iniicies. At si in vicem resine propolim pinguisimam indideris, multo id reddes praestantius: atque hoc ad nervos punctos laudatum est remedium: idem & a rabioso cane morsus efficax est. Aceti sextarius, picis pinguis libra, opopanax quadrans: opopanax aceto solutus magis laeuigatur, pix liquefacta mixtaque coquitur: medicamentum compunctis nervis idoneum est, ut quod os puncturae non sinat conuiere, quemadmodum nec in his qui a rabido cane morsi sunt, vlcus in cicatricem coalescere: sed efficax solis duris corporibus: sin autem in pueris, aut molli carne praeditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut opobalsamo, aut oleo veteri liquefacere. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem viuam, aut euphorbium, aut sulfur viuum, aut syluestris columbae fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut liquorem cyrenaicum, aut castoreum, ac in medicamento libram, dictorum alicuius vncia debet iniici. Facit autem bene neruorum vulneribus & praefertim puncturis: quin & in agro ubi nullius copia datur, propolim recentem pinguemque vulnere poteris inducere, aut fermentum maxime vetustum, per se aut cum propoli mixtum, vel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuio cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut subtiliore polenta, idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Caeterum quae relaxant cataplasmata in neruorum vulneribus semper vitare oportet. At si nervus non punctus, sed plane cesus vulneratus fuerit, cute etiam quae interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectusque, non transversim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acris nullis utere, quippe nudus cum sit nervus, vehementem ipsorum vim ferre nequit. Quare calcem quae saepius aestiuo tempore lota sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quae
ex

ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, ro-
faceo largiore liquefactū. Sed ea adhibenda cura est, ne quid
ex iis vulnus contingat. quandoquidem neruus ipse & sensi-
lis maximè est, & temperamēto suo frigidus, & principum
corporis partiū primati cōtinuus, imò ne oleo quidem eius-
modi vlcus irrorare cōuenit, hinc enim sordidum redditur.
Abluēda igitur à vulnere sanies est molli lana specillo subū-
torio circumuoluta. Quòd si omnia ex animi sentētia pro-
cesserint, etiam vino dulci madefacere citra periculum lice-
bit. sed in robustioribus Polyidæ pastillo in linamentum il-
lito cum sapa calida vti. postquam neruum denudatum cō-
texeris, linamēta extrinsecus circūducere oportet ex medi-
camento quod angustis vulneribus faciat, nempe eo quod
euphorbio præparatur, aut fimo columbarū: sed ita vt etiā
sanas partes ampliter comprehendat. Quum verò transuer-
sum nerui vulnus est, maior conuulsionis metus impendet,
ac quæ ad curationem vulneris spectant. hīc quoq; sunt ea-
dem, quanquam nonnulli in vulnere adhuc recenti futuris
vsi sunt, ac medicamento aliquo conglutinatorio: verū fu-
turas non summæ nimium cuti, sed altius moliri conuenit,
ne quæ in imo sunt inconglutinata dehiscāt: rursus cura ad-
hibenda est, ne ab acu neruus compungatur. Caterū in sum-
ma sciendum erit, in neruorum vulneribus medicamentum
naturā calidius quod puncturis medetur, diuisionē nerui nō
posse curare, vt qui roſionem ipsorum feruorēq; sustinere
nequeat: neq; quod diuisionibus medetur, puncturis conue-
nire: non enim virtus ipsius altè quā angusta est cutis diui-
sio, penetrat. Victus itaq; adhibebitur tenuior, lectus mol-
lis, oleūq; calidum alis, capiti & ceruici superfunditur, at si
in crure neruus vulneratus sit, inguinibus, inferioribus vē-
tris partibus, & locis vicinis: balneo in totum donec inflam-
matio inclinauerit, abstinendū est, quum aquæ cōtactus ne-
quaquam, vt dixi, ipsis cōueniat. Quoniā verò nonnulli citra
id manere cōsuetudinis gratia nō sustinent, siquidē læsa par-
ticula in manu fuerit, cōnādū est quatenus fieri potest, ipsam
aqua seu calida, seu multo magis frigida nō madefacere. Si
pes vulnus acceperit, quoniā fieri nequit vt nō madescat, vbi
lauacrum ingressuri sunt, emplasticū aliquod medicamen-
tum vulneratæ parti superaccōmodabis, iterū extrinsecus
linteolos multiplicatos plures oleo imbutos iniicies, iterum

fasciam ex linteo à foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius superfundes, cū æger in solium descēdet: vbi lauerit, omnia quę imposita sunt abiicies, ac prædicta totius curationis ratione vteris. Cōtusi verò nerui vbi simul cū his cutis cōtusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarū lomento & oxymelite postulant, nonnunquā adiicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picē liqui dā admisce: sin autē citra cutis cōtusionē euenerit, magis discutiens adhibebitur, nempe oleū calens, anethinū dico, superfusum continuē, aut rutaceū, aut irinum, aut amaracinū, Quod si totus neruus præcisus sit, periculū quidem nullum sequetur, verum particula debilis manebit. Curatio autem eius cōmunis est cū ea quę aliis vlceribus accommodatur, hæc quidē ex simplicioribus remediis in neruis conuulneraris curatio abunde est. quidā verò cōpositis vti cōsueuerūt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melanchloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorū & cōpositionem, & vtendi modum septimo libro reperies. Sed quia nonnulli præpotētium etiam sumptuosius ad neruorum vulnera remediis vti volunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorū, hæc, cinamomi, dictamni, fœniculi, singulorum vncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ vncia. ALIUD. Liquoris cyrenæici vncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc valet. Cere vnguentarię quadrans, vnguēti spicari aut foliati, aut nardini libra, pompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum vncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronuntiauit.

*De articulorum contractione seu ligatione, quæ ancylo-
sis dicitur.* C A P. L V.

ARticulos ex humoribus infarctis ac neruea quadā tensione contractos, detentōsque, ancyas, & ancyloses appellare consueuerunt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Communiora igitur his remedia conueniunt, quę in particulis scirrho induratis ac adeo quę in resolutis cōmemorata sunt, propria verò magis, irroratio ex hydrelæo, in quo decoctū sit lini semen, fœnugrecū, althæa, laurus, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum sicyonium. Vbi his artus irrorati fuerint, accommodantur primū acopa
simp

simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromium, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophanum, & quod Asanito attribuitur. Validissima, Lisoponium appellatum, & Pœcilum: emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum verò quod recipit bdellii, adipis vitulini, suffiminis ammoniaci, iris illyricę singulorum drachmas sedecim, opopanacis, galbani, cachryos, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, cerę libram semissem, resinę terebinthinę tantundem, irini sedimenti quod satis est, & vini quantum sufficit: tunditur hoc medicamentum. Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa vero & emplastra, medicamentum medium est diapternes variis confectum misturis. Verum acoporum vsus molli adhibebitur & continua frictione, ita vt simul affectum articulum experiare, an flecti possit, & extendi.

De articulis relaxatis.

CAP. LVI.

LAxantur subinde articuli ob longos febrium morbos, colicos & resolutorios, præsertim vbi calidior ipsos humidorque intemperies occupauerit: atque motus inde impeditur. Succurrit his acacię succus aqua dilutus & parti superfusus: aut rubi, aut myrti, aut lentisci, vel vlmi radicum corticis decoctum congruet, aut malicorium applicatum, aut myrti folia, cum cerato myrteo imposita. Nam colligantes nerui firmari desiderant facultate quę astringat desiccetque. huiusmodi igitur medicamenta articulis imponi debent, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, & palmulatum quod vinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi vero eiusmodi impotentiam à frigore fieri putantes, deinde calidioribus vñ præfidiis, maiorem noxam intulerunt.

De lumbricis.

CAP. LVII.

TRes sunt vniuersę lumbricorum differentię: prima teretum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia & putredini accommoda, qualis in pueris aliisq; voracibus colligitur: nō autem ex calida, acri, aut melancholica substantia. Hę siquidem alimenti naturam egressę, lumbricis procreandis ineptę redduntur. e contrario autem, biliosa potissimum recrementa

X 4

etiam hos perimunt. At si quando flaua bilis vnà cum lumbricis infrà, aut etiam vomitu eruperit, ipsos quidem intestina obsidere, humorem vero biliosum ventriculi os aut aliam quampiam particulam occupare scito. Cuiusque igitur ipsorum differentiae speciem, generationem, locum, notas, curationemque exequemur, à rotundis exorssi.

De rotundis lumbricis.

TERETES igitur lumbrici speciem habent omnibus perspicuam, quòd sanè aliis frequentiores sint in gracilibus plerunq; intestinis consistunt, & superiore ventriculum subeunt, ideoq; frequenter per os reiciuntur. quibusdam & è naribus redditum sunt: atq; hoc genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium initia orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, toto ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriae mandauit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & ventris, tussis exigua cum siccitate irritatè: nonnullos comitatur singultus quoq; & somnus cū palpitatione, iūq; sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expergescunt, & iterum sopiuntur pulsus inæquales & febres augescunt inordinatè, quæ cum extremorum perfriktione, tertiam, interim quartam, die vel nocte accessionem sine rationem habent. Infantes autem etiam mandent lingua inaniter exerta, & dentibus stridēt, oculis cōniuent, voluntq; cōquiescere, excitantibus ipsos indignantur, oculi apparent, genæq; rubescunt, ac rursus liuent: atq; hæc paulatim & ex intervallo. Quibusdam nausæ & rosionis causæ stomacho peculiare creatur, atq; ægri cibum respuunt, compulsi autē ad cibum nausæabundi vix quod assumitur deglutiunt, vel etiā assumptum reuomunt, plerisq; vero aluus descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neq; esurie, neq; euacuatione modica suborta. Atqui non in omnibus omnia quæ iam commemorauimus signa inquirere oportet, sed nonnulla ex eo quod præpollet, interim & plurima. Hæc autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt roduntq; febris autem calor vapores sursum cerebro transmittit prauos, ex
putri

utrida in vētriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus amborum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere conuitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alij produnt se lumbricos vidisse, qui ex inguinibus ægri eruperint. Cæterum occisos hos omnes prius educes: occides autem, amaris potissimum vsus remedijs. Cum igitur febris & lumbricorum communis sit curatio, cōueniēt auxilia simpliciora: potui igitur dabitur chamæmelorum decoctum vel myxariorum, vt appellant, vel ipsa myxaria decocta esui dantur: item sereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida vel cum posca, vel myosotidos herbæ decoctū, vel cornus ceruini ramentum, vel minium synopicum tenuissimum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeāt, quā enim amarū est, lumbricos occidit: quā lubricum, detrahens ipsos cū stercore reddit. At si inflammationem distentionemq; viscera experiantur, cataplasmate vtendum est, quod lini semine, farina lolleacea, absinthio & bryoniæ radice constar, ex hydromelite vel etiam humido fotu ex oleo chamæmelino, vino, absinthij semine, & aloë, præcordiis accommodato. Vbi vero nō vehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est. Cum ad integritatem ventum est, efficaciora quoq; vsurpantur, quale est decoctum seriphij vel calaminthæ, vel filicis, vel cardamomi semen, vel mali punici acidi radicis ius ad tertias redactū, vel fricti cumini, vel nitri fului, singulorū scrupula tria, vel sandonicū vel abrotanum, vel etiā ambo simul, cum melle in catapotia coacta, vel lupinorum amarorum scrupuli terni vel brassicæ, vel erucae semen læuigatum, vel absinthinum, quod etiā solum frequenter abunde fuit. Dantur autem & terna lotæ aloës scrupula: quod remediū est laudatissimum: in validioribus illota quoq; aloë vrimur. quia vero infantes aloën cochleari non admittunt, supinis fasciola ipsis detētis, ore adaperto per clysterium quoddam valido munitum canali, inuitis aloën quā penitissimè transmissam iniicimus. Atq; hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficulter possunt tractari: quibus etiam cibos subinde sorbiles, quemadmodum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterum & cyphi &

masuaphium rectè dabitur, item cornu ceruinum combustum cum pipere & melle vel oxymelite, reliquæque ex oxymelite ipsis dare conabimur: præstiterit autem si acerum scillinum fuerit, præsertim ætate prouectioribus, aut sinap cum oleo & aceto ad cochlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuiio infestantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantaginem aridam assument, ex æque enim vtriq; & fluori & lumbricis efficax est. Cataplasma his accommodabitur ex farina ordeï cruda, filici, absinthio, farina lupini, sandonico & abrotano. Iam vero & malicorium acacia, galla, vel balaustium admiscebitur. Quoniam vero nonnulli subinde amaras portiones ceu ingratas respuunt, ex iis quæ modò cõprehensa sunt, dabuntur nõ manifestò amara. His accedent insuper chamæpitys, marrubium, helenium, baccæ lauri, acacia, thymus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus, polypodium, iris, cnicon, erythrodanon, spinæ ægyptia cum pipere, singula sex scrupulorum instar item decoctum menthæ, mori radicis succus decoctumve, petroselinum reliquaq; odorata semina. extrinsecus autem inducitur aloë cum melino & vino. hoc & appetentiã excitat, quæ vix magno negotio recipitur: miscetur autem sæpius aloë absinthium: aut felle taurino, cum amaris quibusdã prædictis vmbilicum impleto: aut oleum ex rhododaphne factum sæpe delinetur, aut liquor cedrinus & solus & cum cerato, toti ventri imponitur, aut pix arida trita inspergitur, vel mentha, vel melanthium cum rosaceo, vel etiã seriphij decoctum ipsis admiscebitur, vel fraxini persicæ folia in pollinẽ derrita applicamus. Utendum verò est & medulla cerui, vnguinis modo, in vmbilico, inferiore ventre & lumbi: ceratumq; adiungatur, si res postulet, hoc, Aloës, absinthij, farinæ lupini, seriphij, melanthij, singulorum scrupula sex, ceræ vncia & semissis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida lauigantur. Porro ab inferioribus partibus mulsam iniicere sæpius expedit, quò lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant: si autem putrefacti in alto corporis non excernantur, sed potius vapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloës, aut medicamenti amari ex ea confecti portione, quandoquidem etiam in aliis mediocris alui vacuatio, nõ expers est præsidij.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice. ὁ πόνος τοῦ οὐλοῦ
 & αὐτοῦ, oculi cavi apparent.

De

De latū lumbricis.

LATVS lumbricus mutatio est (vt ita dicam) adnatæ in anteriori intestino membranæ in materiam animalis modo nobilem , quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili , vel pars ipsius excernitur : dissolutus vero , non coalescit : & nunc in iis etiam qui febri carent , abundat : nunc febricitantibus accidit , ex longo morbo continuas stomachi rōsiones inferens , ac impotentem ciborum appetentiam . Nam quod animatum euasit , in intestinis obiectum rapit alimentum , vt alio statim opus sit , & nisi assumpserit , intestina rodantur , His occupatos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas , cum inæqualitate : at quod certissimum est indicium , cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur . Curatio concordat , potio enim ex acrisus petita , & aliorum esus , tum filicis vel centaurei decoctum , & potum & ab inferioribus partibus inditum , vel calaminthæ vel dictamni , vel pulegij : dabitur autem in aluum & muria . Præbire vero hoc medicamentum quod sequitur , neq; iis qui aliis lumbricis infestantur , inutile est , si febre potissimū vacauerint . Nitri rubri , piperis , cardamomi pares portiones : dātur terni scrupuli cum vino aut aqua calēte . **A L I V D** eclegma . Piperis , baccarum lauri purarum , cumini Aethiopici , mastiches , pares modi , mellis quod satis est : datur cochleare vnum mane , & dormituro . At si efficacius id fieri desideres , nitri quoq; rubri parem portionē adicies . **A L I V D** . helenij , suffiminis ammoniaci , piperis in alio filicis , singulorum drachmæ quinque , cum oxymelite calido : tempore interposito dabitur euphorbij drachma , vel duæ prouectioribus potui . **A L I V D** . Filicis acetabulū , nitri drachmæ duæ , datur vnum cochleare aquæ euacuatione prius facta : satius autem erit si etiam scammoni momentū assumat . **A L I V D** . Mali punici acidi radicū corticis in summo decorticati drachmæ quatuor , piperis tātundem , cardamomi drachmæ sex , marrubij drachmæ duæ , melle dantur , porro prius assumpto . Verum vt ex toto affectus discutiatur , theriacem quoque exhibebis , si valida febris non prohibet .

*De ascaridibus.***CAP. LVIII.**

Ascarides , vt modò etiam diximus , specie lumbricorū continētur , vermib⁹ similes quæ in extremo lōganone

&

& musculi anum stringentis *σφιγτης* Græcis dicitur, initio reperiuntur, vehementem locorum horum pruritus excitantes: generant speciem hanc praua alimenta, perfrectio, & ciborum corruptio. Vacuari, igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momento, vel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitæ syluestris, aut absinthij, aut chamæleotis, aut anchusæ, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanon, simplicibus quidem, acacia, aut hypocystide cum nitro, aut rhu syriaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum vino: compositis autem Andronis pastillo, similibusq; Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis peruium foraminibus, quales ab utero metrenchytæ appellantur: aut carnem salsam commodè impositam deligamus, quamdiu sustineri possit, eamque frequenter mutare oportet. Caterum communiter omnes quos lumbrici male habent, pili ichneumonis iuuant, suffiti. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui facile in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec vires superari permittunt, propter quas & vinum aquosum exhibebimus: frequentius autem nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariant. dabitur autem cibus, tum præcipuè quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles agris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, verbi gratia, pyris, aut malo cotonio, aut malis punicis, præcipuè acidis, à foris autem ventri remedia continentia inducuntur, de quibus supra dictum est.

De dracunculis.

CAP. LIX.

IN India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitantia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit locus suppurat, & cute ipsius adaperata, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipuè abruptus. Quapropter nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo sus

aspiciendam ne vniuersim, sed particulatim molis pondere decidat. Alij verò hos damnant quòd nihilo magis pondere molis plumbeæ dracunculus abrumpatur, & dolores varios concitet. iubent partem in aquam dimitti calidam, quò dracunculus tepesfactus foras prorepat, deinde digitis ipsum membratim extrahere. At Soranus neque animal prorsus, sed nervosi cuiusdam substantiam esse putat, quò opinionem motus solum præbeat, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, Sorano & Leonidæ, aliisq; visum est, calida superfusione & cataplasinatis concoquentibus in his vti ex mulla, farina triticea, aut hordeacea. Est cum emplastri vsus eiusdem potentia probant. Conuenit autè & quod ex baccis lauri & quod ex melle constat: emortui siquidem horum vsu dracunculi, nimirum quod continetur corpusculum excidit. Suppuratione autem facta, nisi exciderit, cutis diuidenda est: vbi denudaueris, quod continetur auferes, & cutem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri sit maturando.

*

FINIS IIII. LIBRI PAVLI AEGINETAE,
IOANNE GVINTERIO
MEDICO INTERPRETE.

*

PAVLI AEGII

NETAE LIBER V.

IOANNE GVINTERIO


ANDERNACO IN-

TERPRETE.

*

*Quomodo quis ab omnibus communiter virulen-
tis bestijs se tueatur.*

CAPVT I.



DE VIRVLENTIS bestiis præcipientes, ab
iis quæ in omnibus huiusmodi communi-
ter proficiunt, exordiemur, ita, vt quomo-
do quis ab illarum iniuria se tueatur, prius
expediamus. Si igitur aliquis necessitate
quapiam coactus, loco feris frequenti ob-
dormiat, vbi potissimum salamandrae aut phalangia, aut
serpentes aliqui abundant, horum cauas latebras allio in
aqua detricto, aut aliqua ex herbis quas exponemus, obtura-
re conuenit. Suffitus autem rectè excitantur ex cornu cerui-
no, caprarum ungulis pilisve, lapide gagate, bitumine, bdel-
lio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melanthio, peucedano,
viticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachryos radice,
cunila, aut ex reliquis grauitè olentibus aliquo. Culces au-
tem propriè persequitur suffitus ex atramenti sutorij, me-
lanthij syluestris, seminis cumini, paribus modis. item fimus
bubulus eosdem fugat. Ad hæc etiam ignes incendere cre-
briores vincit, fugiunt enim magna parte feræ eorum
splendorem. Cæterum torum substernere ex hastula regia,
nepita, vitice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano, ex-
pedit. At si toto huiusmodi toro vti non datur, † stratis sal-
tem imponenda sunt. Iam vero animum adhibere oportet
iis quæ coquuntur, aquæ & vinorū cadis, vt exactè sint oper-
culari. Focus autem non sub arboribus quibusdam excita-
bitur,

itur, præsertim pinu aut picea. in his enim salamandræ, & rucæ lethales crebræ versantur, quæ ab ignis tepore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia vasa, si non fuerint operata. Qui vero tutiores esse volunt, iis cõuenit etiam ceratum corpori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruini cornus exigua, vel etiam æthiopico cumino. peculiariter autem maluæ folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & vesparum morfu præseruant.

† Hæc ita leguntur in antiquo libro, περιξ γὰρ τῆς τρώουνης ἀντὶ τῆς ἰδίας, id est, circum lectum saltem ipsa ponere oportet.

Communis omnium qui à virulento quopiam morfi vel icti sunt, curatio.

C A P. I I.

QUOD si feriri aliquem aut morderi à venenato animali contigerit, homo adhibendus est qui vulnus exugatur, non tamen cum ieiunum esse oportet, verum etiam vino os collaïsse, & oleum in eo continere. Deinde particulæ commorsæ, si admittit, cucurbitulam cum multa flamma adhibere oportet, sicut vicinæ etiam partes scarificentur. Nam virus vnâ cum sanguine, & spiritu rursus ita extrahitur. Item exulcerata adurere ac crusta obducere, adeoque præcidere conueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cerastes, vipera, similesq; aliæ sunt quemadmodum Galenus memoriæ prodit, vinitorem quendam à viperæ morsum, vbi feram cognosceret, falce læsum digitum statim abscidisse, atque in totum periculo liberatum. At si venenum per corpus fuerit dispersum, sanguis statim demittendus est, præcipuè si is qui percussus est, plethoricus existat exhibere cum cibis edendum piper aut allium conducit: potui, vinum validum: recentibus vaporibus, & conuenienti naturæ caliditate, corporis temperamentum reple re, deinde iis oblinere, quæ commorsam partem possunt calefacere, & vellicare. Imponetur itaque cinis brassicæ aut fici aceto mistus, aut lixiuia, aut garum, & cape cum polenta aut pane: item porra abunde cum sale, aut pix liquida cum sale, calida: aut cedrus, aut fimus caprillus. Conuenit autem ipsis acetum calidum quoq; superfundere, in quo nepita sit incocta: aut acetum & aquam marinam aut acetum cū muria. Cæterum locis affectis gallinæ, & magis galli gallinæ, aliaue animantia per medium dissecta, calida imponi debent. Nā virus transsumunt euocantq; , & dolores mitigāt.

Emplast

Emplastra quoque vtiliter applicantur, tum hoc quod salerni illud quod cachry & adarce constant: in totum, quæ acrioris sunt potentia. Omnes vero communiter & morfi, & icti à quocunque tandem virulento animali, præterquam interiora omnino offensa non sint, potabunt serin, aut ericen, aut astragalon herbam cum aceto, aut bitumen, aut paliurum similiter, aut veteris rhu decoctum, aut mustela inueterata drachmæ duæ ex vino sumptæ, præsentis sunt remedio, vel marinæ testudinis sanguis, aut castorei drachma cum diluta vini portione, aut roris marini tantundem, aut sicyoniæ radicis aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut viticis semen, aut cupressi pilulæ, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen, aut baccæ lauri, aut cæcer fluuiatilis tostus aut elixus: item composita hæc Theriace vtilis est.

Theriace aduersus virulenta & lethalia venena, viperæ morsus, & scorpionis ictus.

BRYONIAE, opopanacis, iridis illyricæ, roris marini radicis, zingiberis, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ drachmæ quinque, lachrymæ thuris, rutæ syluestris, singulorū drachmæ tres, farinæ crui drachmæ duo: singuntur pastilli vino, danturq; singuli qui treis obolos pendeant, ex eodem vino. Caterum purgatio omnibus conueniet, desudationes, & theriace ex viperis assumpta.

De rabiosi canis morfu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur.

C A P. III.

EXordium sermonis à rabiosi canis morfu capere, quàm ab aliis maluimus, quòd animal & fœcundum prouentum, & contubernale homini existat, rabieq; sæpius corripitur, & ægrè caueri possit, ac periculum ab eo sit inuitabile, nisi multis aliquis & conuenientibus vsus fuerit præfidiis. Rabiunt canes plerunque in æstu vehementiore: vt autem Lycus memoriæ mandat, interim etiam per frigora maxima: rabidi autem & potum & cibū auersantur, siti premuntur, neque tamen bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, saliuam & copiosam & spumantem ædunt, muti in totum sunt, & veluti insani, vt ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt itaque sine latratu omnibus pariter & bestiis, & hominibus, mordentq;. vbi momorderint, statim quidem nihil molestiæ adferunt, præterquam ex vulne

vulnere dolorem: postea verò aquę metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cum cōuulsione, totius corporis rubore, præsertim faciei sudore, & anxietate accidit, aquam fugiunt, & dum vident, & dum admouentur: nōnulli etiam omnem humorem: alij canum ritu delatrant, & obuium quemque dentibus appetunt, morfuque suo in alios eandem affectionem transferunt. Porro accidentium, aliorū quidem causa manifesta est, occupatis scilicet veneno partibus vniuersis: metum verò aquę nonnulli ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitum mutata. verum Rufus talem melancholię speciem ipsis oboriri pronuntiavit, veneno humorem illum imitato: quemadmodum alios melancholicos nouimus alia timere. quę causa superuenit etiam iis qui dicunt canis qui momorderit imaginem in aquis opinari se videre. At ex iis qui hoc vitio sunt occupati, nullum, præterquam vnum aut alterū, superuixisse, ex historia didicimus, eosque non à rabioso cane morsos, sed ab homine quodam morso vitium adeptos. At ante affectus huius occupationē multi etiam quos canis momordit, seruati sunt. hinc igitur curatio auspicanda est. Quoniam verò subinde, eo quod tūc aquę metus non inuadat, (magna enim ex parte circa quadragesimum ferè à morfu diem solet ingruere, quibusdam & post sex menseis. proditum est nonnullis post septē quoque obuensis) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbitrati sunt, properarunt vulneri cicatricem inducere: vnde ipsi causam huic affectioni dederunt. hac autem probatione vsus deprehendes, morsus rabiosi ne canis fuerit, an nō. Iuglandibus nucibus concisis vulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponentur: ac primum sanē non attingent, fame autē vrgente si edant, rem considerato. Nam canis qui momordit si nō fuerit rabiosus, viuent: si rabidus, sequenti die peribunt. atq; tunc ad vulneris dilatationem properandum est, iterūque post paucos dies eadem probatione vtendum, & si nō perierint gallinacei, tunc vlcus ad cicatricem perduces, nullum veritus periculum. Hanc itaq; probationem Oribasius tradit. Quod si ex commemoratis indiciis accuratē canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quę aperiundi vim habent, vtemur. Primū igitur ex aperiuntibus est, quod

pice, aceto quàm acerrimo, & opopanace constat, in capite de neruorū vulneribus explicatum: at si qui morsum accepit, delatationem cutem habeat dilui: ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: vel vlcera prius fomentis adiuta, allio obduces. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

Aridum ad crustam in canis rabiosi morfu excitandam.

SALIS folsitij drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim, scillæ tantundem, rutæ viridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubij seminis drachma: vtitor primū arido vt crustam inducat, deinde cum rosaceo, vt crustæ excidant. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, vt minimum, sine cicatrice seruentur.

Cataplasma quod oras vulneris latus in rabidi canis morfu seruat.

CEPÆ cum sale & ruta inducuntur, aut laserpitium cū sale, aut salsamentum vetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut allia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrum, singulatim, aut cum sale: aut iuglandes nuges, cum allio, sale & melle, aut cinis fici, cerato exceptus. vulnus autē aqua abluetur, in qua decoctum sit chamamelum, & syluestris lapathi radix. Nōnulli & ferro candenti vlcus adurunt. Cæterū potui assument comorfi, simplicia quidē, lycium, absinthiū, liquorem silphij, chamædryn, scordiū & poliū: composita autem hæc, cancerorum fluuiatilium, sarmentorum vitis albæ, in cyprio vase, aut æreo combustorū, cochlearia duo, gentianæ radicis læuigatæ cochlear vnum, cum vini meri veteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato. aliqui verò & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capiēs autem cancos dum luna increfcit, priusquàm sol exoriat. iis autem qui eodem die non biberunt, duplicem portionem exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex viperis rectè datur. Purgare expedit medicamento ex cucurbita syluestri, ita vt quotidie id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideritidis heraclis, quam & dialyson appellant: nonnulli verò & iecur canis qui momordit, edendum dederunt. Cæterum victus ratio talis adhibenda est, quæ simul veneni vircis hebetet extinguatque, simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, vini dulcioris vetusti & meraci, lactisque potio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedim

dimentum aliquod non præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscissio vel cucurbitulæ vel vstio non adhibenda est, vt quum iam venenum penitus secesserit: medicamentis autem quæ euocent, Græci metasyncritica vocant, vt consilium est, aquæ metu videlicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per veratrum.

Ad morsus canis non rabiosi. CAP. IIII.

Canis non rabiosi morsus, quum & ipsi virulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, lata manu morsum ferito, in super nitrum cum aceto tritum ex alto in partem fundito, deinde spongiam recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidâ imposito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet: vel erui farinam oleo maceratam imposito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cum aceto tinsa inducito, aut cepam tritam cum melle, vt origani comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: vel marrubium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale. ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admonetur. peculiariter enim his efficax est: inflammatione confluentes, argenti spuma trita ex aqua oblinito.

De vespi & apibus. CAP. V.

Apiû ictu dolor sentitur, locus rubescit, propinquæ partes tument increscuntque, aculeus in vulnere relinquitur. In vespi autem similia quidem, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraque lutum, & bubulus simus, illita: & lac ficulneum, aut læuigata mori arboris folia, aut malux: aut farina ordeacea ex aceto imponitur. quinetiâ muria aut marina aqua fouere conducit.

De phalangijs. CAP. VI.

Phalangiorû morsu, locus ipse quidem rubescit, & veluti punctus per ambitum apparet, nō autem tumet neque incalescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu vexatur. Comites notæ percussorum sunt perfriçtio, tremor, corporis

grauitas, sudor frigidus, dolor validus, pallor, continua vrinæ excernendæ incitatio: quibusdā & vrinæ difficultas, colicis intensio, oculi hument: inguina & poplites intenduntur rigentq; cōuulsorio modo, valida stomachi rosio vrget, lingua sermonem manifestò non explicat, vomitus aquæ vel aranearum textis similium erumpit. sunt etiam quibus per vrinas, & aluum eadem descēdunt. demissi igitur in aquam calidam dolore liberantur, ac rursus validè indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerem ficulneum cum sale læui ex vino maceratum, imponas; aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto madefactam. Iam & vlcera fouere marina aqua calidiore, aut apiastris decocto, cōducit, eiusdēmq; folia imponere. ad hæc balneum frequentius vtile est, atq; his potionibus medicis vti: abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læuigatis, platani cortice, trifolij herbæ feminæ, myricæ semine, singulorum drachmis duabus cum vini cyatho & viridium cupressi foliorum aut pilularum decocto, vino temperato. Ferunt nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cū lacte & apij semine datum, periculo subtrahere.

De araneæ ictu.

CAP. VII.

Est quoddam etiam aranearum genus quod percussu validos dolores circa media præcordia excitet, item ruborem, & vrinæ difficultatem, nonnunquam & suffocationem. Leuantur autem ictu hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut viticis seminis, aut albæ populi foliorum potu, vel alliis solis assumptis & vino meraciore superbibito iuantur.

De scorpionis ictu.

CAP. VIII.

A Scorpione ictis locus quàm primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nūc feruor, nunc frigus vicissim inuadit, acceditque dolor qui itidem modò decrescit, modò intenditur. comitatur ipsos sudor, horroris sensus, tremor, extremorum perfriictio, inguina his attolluntur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum vulneribus, ipseq; scorpio qui percussit minutim contritus, vlneriq;

neriq; impositus, sibi remedium est. post hæc est sal tritus cum lini semine salutariter imponitur, item althææ herbæ semen: succurrit & sulfur viuum resina terebinthina exceptum: similiter etiam galbanuni splenij modo dilatatum impositumq; nepitâq; læuigata & applicata, & ordeacea farina in vino parata & in rutæ decocto exhibita. auxiliatur his etiam trifolij herbæ semen læuigatum iniectumque. Ad hæc, potiones hæc conueniunt: aristolochiæ drachmæ duæ, præsertim corticis cum vino, gentiana tusa, pulegiumque abundè decoctum, item baccæ lauri numero decem læuigata, nepita cum posca largiter incocta, cyperis cum vino, ruta similiter, lac ficulneum & laserpitium, si adsit, si desideretur, parthico liquore vtendum erit. benefacit etiam trifolij ocimique semen epotum. idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinionem imposita omnium autem horum vicem præstat balnei continuus cum multo sudore vsus, vini potio plenius diluta. Porro composita hæc potari debet: sulfuris viui fabæ Aegyptiæ instar cum piperis granis octo, in dimidia vini hemina: vel liquor laserpitij cum cancro detrito in vino: aut melanthij, cumini æthiopici, viticis seminis, pares portiones cum vino.

Ad scorpionum periculosorum & phalangiorum ictus.

Fecis drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syluestris seminis drachmæ tres, castorij, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine hirudinis marinarum. dantur quaterni oboli cum vini meraci vel aceti cyathis tribus. A L I V D. Pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis drachmæ duæ, liquoris laserpitij drachma: exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

De scolopendra terrestri & marina.

C A P. I X.

AT si scolopendra momordit, communiter quidem locus affectus in orbem liuescit attolliturq;, aliquando feci similis, rarius autè ruber apparet, exulceraturq; statim ab ipso morsu adeo vt vix magno labore curari queat. præter hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur peculiariter autem iis qui à marina scolopēdra impetiti sunt, aquosus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Plagæ igitur imponi debet sal bene tritus vel ruta læuigata, aut cinis aceto maceratus, aut scilla. Fouēdus locus

est muria cum aceto. Archigenes autem oleo calido libera-
liore fieri id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur ari-
stolochia cum vino, aut serpillum, aut calamintha, aut syl-
uestris ruta, aut trifolium, aut succus radice hastulæ regie
dimidiæ hemina mensura cum vino.

S Ad stellionis transmarini morsum. CAP. X.
Esamo trito cataplasmatibus modo obducito.

Q De fele. CAP. XI.
Viâ fele mordentur, validè quidem dolent, & locum
affectum liuidū habent, sed statim cepæ & allia ictui
applicata, auxiliantur. in super eorundem esus, vino meraco
superassumpto, remedio est.

V De mure araneo. CAP. XII.
Bi verò mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsati-
les, & in singulis dētiū eius animalis ictibus, rubores: pu-
sula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes o-
mnes liuent: cute pustulæ dirupta, album vlcus apparet. nam
ad membranas neruofas deraditur, ad hæc, excidunt etiam
partes exesæ de passionibus oborta, his quæ serpunt simili: præ-
ter ea etiam intestinorum tormina comitantur, vrinæ diffi-
cultas, & frigidi madoris vndique eruptio. Auxiliatur ipsis
galbani spleniū per se impositum, vel tritum cum aceto, vel
ordeacea farina, cum oxymelite applicata, ipseq; mus ara-
neus qui momordit dissectus admotusq; sibi est remedio. ad-
uersatur etiā pyrethrum illitum, vel mali punici dulcis co-
rium incoctum, vel malua syluestris, vel allia contrita, vel
sinapi læuigatum cum aceto: itē ex calida muria fœtus con-
ducit, deinde ordeū vsum ex aceto applicatum. Potui pro-
pinabitur abrotanum ex vino coctum, aut sisymbrium, aut
serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut
teneræ cupressi pilulæ cum oxymelite, aut pyrethrum cum
vino, aut chamæleontis radix, aut hœdi agnive coagulum,
aut gentianæ radix, aut verbenaca, quæ etiam imponitur
cataplasmatibus modo: ipsumq; murem qui momorderit, exa-
ctè detritum cum vino bibunt. Efficax hoc etiam quod se-
quitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drach-
mæ quatuor. porrò ad muris aranei & scolopendræ mor-
sum, sal cum liquida pice rectè applicatur, aut cedria cum
melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthæ
folia, vel ordeum etiam cum aceto.

D.

De vipera tum mare tum fœmina.

CAP. XIII.

IN vipera tum maris tum fœminæ morfu similiūve animalium virus iaculantium, dolor loci statim ab initio sequitur, mox totius corporis: apparent etiam in morfu duo foramina paruo inuicem spatio discreta, fluitq; ex his sanguis humorq; saniosus, deinde oleosus, postremò etiā æruginosus, quem nonnulli virus viperarum esse dicunt. præter hæc tumores iuxta morsum subrubri luidique assurgunt, corporis color perit: vertigines oculorum, stomachi resolutio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam vomitiones biliosæ, vrinæ angustia: insuper pustulæ in commorsa parte erumpunt, veluti in ambustis: item depassio ipsam inuadit, ad viciniā procedens, gingiuarum his cruentatur, accedit etiam tremor, sopor, & frigidi sudores. minori autem cum periculo liberari, quos vipera mas, quàm quos fœmina mordit, videntur: ex his ipsis minus periclitantur qui cibum præsumpserunt. In curatione autem præstantissimum remedium est, alij esus, & vini meraci potio, adco, vt si aliquis vti sustineat, nullum præterea remediū desideret. eduntur etiam vtiliter & porra & cepæ & salsamentum quàm acerrimum. Sunt qui & ranas in cibo elixas dederunt. benefaciunt & hæc quæ sequuntur cum vino singulatim pota: testudinis marinæ sanguis resiccatus cum cumino syluestri, coagulum leporis, aut hinuli tribus obolis, ceruini genitalis sicci, anchusa tenuifolia tota, hanc autem nonnulli etiam collo suspendunt, porri succus dimidiæ heminae mensura ex mulsa, apiastri foliorum succus, syluestris ruta, gallinarum cerebrum, panacis radix cum vino incocta, agarici drachma, iuniperi baccæ, hastulæ regiae radix, pistacia trita, viticis semen, mustelæ inueteratæ siccataq; drachmæ duæ: echini radix succusq; canceri fluuiatiles aut marini per se, cumq; herba pedicularia, sale & polio: aristolochiæ radix cum myrrha, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta. atq; hoc quod subiungam mirificè efficax est.

Oribasij ad viperarum morsus.

Anisi acetabulum, piperis, drachmæ quatuor, aristolochiæ corticis, opij, castorij, myrrhæ, singulorum drachmæ: passo lauigata in pastillos instar fabæ Græcæ cogito, & pro viribus cuiusque exhibeto, cum ternis diluti vini cyathis.

ALIVD, ex Lyci cōmentariis medicamentum viperae mor-

sibus praesentaneum. Myrrhae castorij, piperis, sandarachae, singulorum drachma, anethi seminis acetabulum: laeuigata ex passo dantur. **ALIVD**, Ex Archigenis commentariis. Cancros viginti cum farinae triticeae quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaque nepita & salis momento, pastillos fingito & siccato: in usu, cum lacte applicato, vnumque cum mulla potato. At si fluuiatiles cancores desideres, marinis vtor. extrinsecus autem plagae inductus caprarum firmus ex vino strenue auxiliatur: aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccae lauri, aut nepita, ericae, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origanum viride laeuigatum, gallinacei pulli dissecti, † & protinus calidi impositi: farina erui cum vino macerata crebro emplastri forma illita, raphani cortex laeuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxymelite, cucumeis sylvestris folia cum tenuissimo farinae ordeaceae polline, fex vini similiter cum farinae polline, ruta cum sale & melle, surfures in aceto coctae, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Foueri debent trifolij decocto aut pulegij, aut muria aceto adiecto. Quum autem subcruenta pustulae euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle obducito, dum consanescant. At ex viperis antidotum proprie his & potum & plagae impositum efficax est.

† Melior est vetus cod. ἐπιτιθέμενοι διεμύει καὶ συνεχῶς ἐπαλλάττομενοι, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

De amphibena & scytale.

CAP. XIII.

Consimilia ex horum moribus eueniunt, eademque ipsis auxiliantur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

De dryino. Galeni haec praefatio.

CAP. XV.

DRyinus in quercuum radicibus vitam agens, tam malefica parataque ad nocendum vi est, ut calcatus solum, pedes hominis cute nudos relinquat: totisque cruribus tumorem laxum quera oedema vocant, copiosum excitet. Ad haec quod multo magis est mirabile, ferunt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem vitij administrauerint & si quis vliscendi studio interemerit, dicunt hunc prae admodum olere, illoque suo foetore omnium aliorum odorum sensum auferre. Letis ab hoc animali tumor circa locum vi-

tiatum

latum cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assurunt. aliquando aquosa sanies emanat, stomachi erosio veniat, & torsiones. Congruit ipsis aristolochia vino potatem trifolium herba, radixq; hastulæ regiæ consimiliter assumpta. prodest cuiuscunq; quercus fructus læuigatus, & potus. Itidem ilicis radices tusæ, & loco admotæ auxiliantur.

De hæmorrhoo, & prestere seu dipsade.

CAP. XVI.

Qui hæmorrhoi ictum sensere, validos experiuntur cruciatus, admodum exigua angustaq; redduntur corpora ex dolore continuo, multus ex plaga sanguis erumpit: & si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rumpitur, funditq; sanguinem. cruenta excernuntur recrementa, sanguis qui defluit, in grumum concretus est: tussi ex pulmone sanguinem reiciunt, quæ euomentes etiam sine remedio intereunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis urget, sitis tanta excruciat, ut nec extinguere nec intermittere possit, copiose potum ægri hauriunt, eadem tamen siti conficiuntur, tamquam nihil planè hausissent, similesq; toto habitu sunt iis, qui anæxia potus nihil hauserint. unde propter continuam potus assumptionem prester ab urendo, dipsas à sitiendò serpens appellatur. Multi autem veterum ab hæmorrhoo & dipsade commotos ceu desperatæ salutis & conclamatos esse putauerunt. Porro si specialia aduersus feram præsidia desideremus, communia tentare oportet, ac protinus scarificatione vitionemq; adhibere: & si liceat partem vitiatam præcidere. deinceps autem acria cataplasma imponi debent. vtilia sunt omnium ciborum acrium esus, præsertim quæ ex fassamentis peruntur, vini meraci potio, & lauacrum. hæc autem continuè, & exiguis temporum intervallis subinde adhibenda, priusquam morbi corripuerint. nam ubi illi semel emerferint, nulla medicorum ope iuuantur. Cæterum remedia quæ loco inducuntur, contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portulacæ folia contrita ex aceto, polentam, rubi folia cum melle læuigata, plantaginē, hyssopum, allium album, porrum, rutam, vrticam, hæmorrhoi præter iam dicta etiam hæc benefaciunt, vitis folia cocta cum melle læuigata. per os autem hæmorrhoi ipsius caput crematum potui datur, aut allium cum irino oleo: esui dantur etiam vuxæ pallæ.

De natrice quam Graeci hydron dicunt.

CAP. XVII.

Natricis morfu vlcus factum dilatatur, & liuescens augetur, sanies ex eo nigra, copiosa, & foedi odoris, qualis ex depascente vlcere, excernitur. Curatio mali, tēporis processu, & vix procedit. imponetur itaq; morfibz origanum laue, ex aqua maceratum. confert & cinis quercus, oleo tēperatus: vel ordeacea farina cum melle deliquato bibitur, item aristolochia drachmis duabus diluta vini potione, vel in poscā duobus cyathis: deinde marrubij succus aut decoctum cum vino, aut nasturtium sylvestre, aut semen hastulæ regiae seu flos, aut fœniculi semen cum vino: item recens fauus cum aceto comeditur.

De Cenchro.

CAP. XVIII.

Quod si cenchrus nocuit, morsus eius viperæ similis est, putredo comitatur & carnes intumefactæ prius, vt in aqua inter cutem, defluunt, lethargo veterinôq; premuntur. Testatus Herasistratus est, iecur iplis, vesicam, & colon affici: resecit siquidem iplis, partes quodammodo corruptæ inueniuntur. His igitur lactucæ semen cum lini semine applicatum auxiliatur. succurrit & satureia trita, ruta sylvestris, serpillum cum hastula regia lauigatum: potui vero datæ protinus, centaurii radice drachmæ duæ cum ternis vini cyathis: aut aristolochiæ radix similiter. nasturtium itidem & gentiana, potu conducunt.

De Ceraſte & Aspide.

CAP. XIX.

Tria aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam chersæam quasi terrestrem vocant, mox eam quæ chelidonia dicta est, tertiam ptyada appellarunt, quæ omnium est perniciosissima. siquidem erecto collo, extensoq; pro distantia loci, ad quem dirigit, venenum in hominem iaculatur. hanc memoriæ tradit, reginam Cleopatram, quum Antonio deuicto Augustus eam capere vellet, sinistrae mammae admouisse, morsamq; ab ea interiisse, vt quæ longè celerriam mortem inferat. Porro ceraſtis morſu locus cum duritie & pustulis intumescit, emanat ex vulnere sanies, modò nigra, modò subpallida & porraceo colore: totum corpus varicum modo attollitur, genitale arrigitur, mens alienatur, oculi obscureſcunt: postremo, conuulsione vt in tetano pereunt. Verùm aspidis morſus acus puncturæ similis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copiosus, sed

exi

exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine voluptate comitatur. Quapropter rectè Nicander cecinit:

Et vir perit absque dolore.

MVTATVR color & virescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continuè reuellitur, palpebræ sine sensu veluti in somno commouentur, atq; inter hæc morsprehendit, ne tertia quidem diei parte dilata. His itaque vtriusq; membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eòq; sine mora, si fieri potest, præcidendū est. & in his & propinquis partibus omnem carnem circumsecare statim, & radicitus vsq; ad os excindere oportet. deinde reliquæ ferro candenti exiccandæ sunt. etenim horum virus, sicut & basilisci, taurino sanguine similiter, celerrimè sanguinem in arteris & spiritum coagulat.

De basilisco.

CAP. XX.

Hæc bestia rarò quidem hominum oculis occurrit. Erastistratus autem hæc inquit: quum basiliscus momorderit, plaga sub aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, castorij drachmæ tres potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc experti non sumus.

De pastinaca marina, & muræna.

CAP. XXI.

IN marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliantur ipsorum moribus lactis ficulnei guttæ quatuor aut paulò plures, cum ramusculis serpilli tribus aut quatuor, & quæ ad vyperas commemorata sunt.

De dracone marino.

CAP. XXII.

Marini draconis ictum plumbo infricato, aut serpillio trito obducito, aut lente elixa, aut sulfure cum aceto, aut dracone ipso euiscerato. foueri locus vrina humana debet, absinthium cum diluta vini potione bibi: aut elelisphacus, aut surculi ficulnei, in dulci vino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

De scorpione marino,

CAP. XXIII.

Scorpij marini ictum sanat nullus piscis dissectus impositusque, sulfur viuum cum aceto infricatum, bacçæ lauri tres tritæ potæque.

Quomodo testudinis marina sanguis præparetur.

CAP. XXIII.

Testudinis marinae sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili vase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. concretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq; operculi instar vasi cribro, in sole reponito: siccatum excipiens vitior aduersus viperarum morsus, vt prædictum est, drachmis duabus cum vno aceti cyatho. sequenti drachmis quatuor, cū duobus cyathis: tertio die, drachmis octo cum tribus aceti cyathis.

De crocodili morfu.

CAP. XXV.

AD crocodili morsus nitrum cum melle tritū vsq; dum vlcus repurgetur, imposito: deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui à crocodilis commorſi, adipe ipsorum imposita vulneribus, exactè fuerint adiuti.

De hominis morfu.

CAP. XXVI.

Non extra institutum fuerit, cum virulentis bestiis, etiā hominis morsus conscribere. siquidem maligniores multo aliis vlceribus apparent, præsertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus vsus, & præsertim lenticula. Communiter itaque quæ in aliis virulentis commemorata sunt, etiam in his extrinsecus per initia morſibus applicare conueniet, præter ea quæ nimium acra, adurentiaq; sunt. peculiariter autem oleo morſum prius illitum, fœniculi radice cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutans. Emplastro autem hoc vttere, quod recipit squamæ aris, galbani, æruginis singulorum vnciam, ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium: plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamā: vbi coierint, quæ liquari possunt adduntur. Finita autē inflammatione, communis vlceris modo etiam hæc curabis.

De venenis.

CAP. XXVII.

Qum de virulentis bestiis succinctè tradiderimus, proximum fuerit, vt de venenis sermonem aggrediamur, simplicia quidem referentes eorumq; notas & remedia, tum communia, tum specialia: composita autem ex studio omitemus. etenim nonnulli variorum medicamentorum lethalium compositiones exposuerunt, quæ nocere magis, quàm iuuare legentes possunt. neque enim exacta horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, vt etiam
cong

congruum ipsis remedium queas adaptare. Quum igitur hæc varia ex superante in ipsis vi appareant, id etiam aliquis rectè quod exhibetur, varium adaptans, nonnunquam ex æquo, nonnunquam ut excellat, medebitur. Incipimus itaque & hic rursus à præcautione.

De venenorum præcautione.

CAP. XXVIII.

DE venenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa, & declinare præcipit, longè difficillima est. propterea quòd ij qui huiusmodi insidias homini clàm machinantur, tanto id astu faciunt, ut vel peritissimus quisque decipi possit. siquidem amaritudines venenorum dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorem odorientis additis operiunt. interim ceu ad sanitatem, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est ab sinthiū, abrotanum, opopanax, castorium, venena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta solidioribus, vel obsoniorum varietate adumbrantes, ipsa offerunt. vnde cui in suspitione huius doli vita fuerit, vitare eum oportet condita elaborataque cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulces, acidas, & falsas. potissimum vero aquæ quod satis est præsumere oportet. restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur. veruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniuriis venenorum, est efficacior. Conuenit enim quum suspicio mali medicamenti accepta fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere venena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cum nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mala medica dicuntur: item naporum semen drachmæ pondere cum vino, aut nepitæ folia, aut terram quam lemniam sphragidè vocant, aut rutæ folia viginti: nullumq; nocebit venenum. Iam verò antidota cum vino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tutò admodum præseruant, quale est quod terrestri crocodilo cõstat, dia scincu dicitur, & quod à variorum animalium sanguine dia hæmaton vocatur, & Mithridatium. hoc aliquando etiam ipse rex Mithridates vsus est, quotidie præsumens, ut à lethali medicamento se vindicaret, præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamento epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi vitam ademit. Quoniam verò etiam citra insidias propter necessitatem aliquando locis desertis nociuis

versan

versantes, fortè sub arboribus, vt picea aut pinu cibum assumunt, diligenter attendendum est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labantur animalia, & vasa, tum quibus hauritur vinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquantur, exactè operculentur, quemadmodum in virulentorum animalium præcautione expositum est.

Communis venenorum quomodocunq; assumptorum curatio.

CAP. XXXIX.

AT si nonnulli lethale venenum sponte sua, vt mortem sibi consciscant, assumpserint, qualia multa in hominū vita solent accidere, aut etiam aliquorum insidiis, siquidem nobis constet quod veneni genus potatum sit, protinus ad conueniens ei remedium descendemus, vt in horum enumeratione dicetur: at si medicamen exhibitum tunc nobis fuerit incertum incognitumq;, conuenit statim ad ea quæ communiter ad quæcunque venena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil planè in medicina spei est, ægris propter moram iam deploratis, desperatisq;. Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cum aqua exhibito, vomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrum cum aqua calida ingeri debet: aut malux, lini & seminis, aut tragi frugis, aut fœnugræci, aut vrticæ seminis decoctum. Non enim solum vomitionibus euacuabunt, sed aluum quoque subducent, & venenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum hebetantia, præsertimq; oleum. quod manifestò inde licet cognoscere. Si nanq; cutis exulcerandæ studio, cantharide aut calce viua, aut eiusmodi quodam acri vtaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imò neque corpus astringere potueris, oleo præunctum. Præterea vomitus non modo quòd nocuum euacuat, vtilis est, sed interim haustu venenum odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore. cerussam, vel gypsum: concretis grumis, lac aut recentem sanguinem: halitus grauitate: virus qualitate & odore, leporem marinum, & rubetam ranam ostendit, vt per hæc ad accommodata singulis remedia via non sit difficilis. Admiscabitur autem oleo malux decoctum, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguibus, vel gallinarum: aut ex lignorum cinere facta lixiua. Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum.

otum, vinum copiosum & vetus: & quæ adipe aut butyro constant. Verum iis quæ in ventriculo hærent, per vomitum ablatis: quod intestinis illapsum est, clystere acriore evacuabimus. Post hæc lac potui dabimus. nam ab hoc quod efficit, & venenosum est, facile immutabitur. Iam vero medicamenta omnibus communiter convenientia offeruntur, uale est, minium lemmium, abrotanum, agaricum, erysimum, eryngij radix, pastinacæ erraticæ semen, vel nepitæ, cardum gallicum, castorium, medulla viridis ferulæ, nerij, quod rhododendron est aut rhododaphne flores, marrubij succus, laserpitium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, peucedani liquor & radix, aristolochia longa, rutæ sylvestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur. danturque singula drachmæ pondere cum vino. Efficax in id est, polij herbæ decoctum & picis liquidæ linctus. generosissimè etiam opitulantur antidota superius comprehensa, magisq; ex viperis theriaca. non autem easdem vireis habent, si post medicamenta lethalia, assumantur, quas præsumpta. quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad affectum cauendum est sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quintuplo post præstetur, adiuuat: idq; non semel die, sed bis etiam. sic enim & Galeno illi admirando visum est.

Enumeratio simplicium venenorum.

CAP. XXX.

INter venena, animalia quidem sunt vitæ noxia hæc, cantharis, buprestis, salamandra, piceæ eruca, lepus marinus, rana rubeta, & mutescens palustris rana, hircines deuorata: ex seminibus, altercum, coriadrum, psillium, cicuta, melanthium: ex liquoribus, meconium, opocarpasum, thapsiæ succus, elaterium, mandragora: ex radicibus chamaeleon, aconitum, thapsia, ixia, veratrum, agaricum nigrum, ephemerum, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide nascatur: ex ramosis & oleribus, smilax, quam nonnulli thymium vocant, Romani taxum, solanum furiosum, quod etiam dorycnion appellant, sardoë herba, quæ species est ranunculi, papauer corniculare, pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi: ab animalibus autem, sanguis tauri recēs, lac cui coagulatum sit admixtum, mel quod ad heracliam nascitur: metallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentum sandarachia, argenti spuma, adarce, plumbum, & quod vocatur argen

argentum viuum: ex iis quæ domestica & in quotidiano vitæ usu sunt, vinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum, aut frigida aqua similiter.

De cantharide.

CAP. XXXI.

Qui catharidem assumpserunt, eos notæ grauissimæ commitantur. ferè enim à stomacho vsq; ad vesicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum similem pici aut cedri-
no liquori habent, dextra præcordiorum parte inflammationem experiuntur, urinam difficulter, sæpe etiam sanguinem per eam reddunt: item per aluum ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent. præterea animo linquntur angunturq; & vertiginibus laborant: tandem vero mente alienantur. Succurrit ipsis vomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terræ cimoliæ drachmæ quatuor cum mulsâ, nuclei pinei, cucumeris semen. Adiuvat bene & ius pingue ex bubula factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agnina, aut ouillæ, aut porcellorum, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixæ: vinum iridem dulce, & copiosum, thuris corticis drachmæ quatuor. Post cibû iniicitur per clysterem cremor oryzae aut chondri, aut tragi, aut ptisanæ, aut maluæ, aut lini seminis, aut althææ, aut fœnugræci. interim etiam mulsâ cum nitro intestino absterfo, conuenit hæc rursus inferere, postea vero inflammatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt. deinde & lauacris aquæ dulcis vtendum est, item vnguentum irinum rosaceumque potui dabitur.

De buprestî.

CAP. XXXII.

Buprestî potione absorpto, in gustu viroso simile quippiam percipitur, dolor stomachi ventrisq; vehemens commitatur, eademq; partes in speciem hydropici intumescunt, extima totius corporis cutis intenditur, urinaq; cohibetur. Profunt ipsis quæcunq; aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & vomitu, & clystere factas, ficus aridæ, item earum decoctû ex vino. Vbi vero periculum iam de suo acumine remisierit, declinatque, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac muliebre bibere, conuenit.

De

De Salamandra.

CAP. XXXIII.

Quibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodam & resolutione vrget, partes quædã corporis in orbem liuoribus variantur, vt subinde permanente veneno, putrefacta defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in cantharidibus dicta sunt. propriè autem resinam è picea, aut pinu, vel galbanum cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpitios, aut vrticæ folia cum liliis in oleo decocta, testudinis marinæ vel terrestris oua elixa, ranunculorũ ius esculentum, incocta simul ipsi eryngij radice.

De pinorum eruca.

CAP. XXXIII.

Pinorum eruca pota, statim sequitur oris palatiq; dolor, valida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorũque cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, & stomachi fastidium vrget. Succurri debet nõ aliter quàm iis qui cantharidas biberunt. priuatim autem in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

De marino lepore.

CAP. XXXV.

Leporis marini potum, gustus sequitur piscibus virois non absimilis, tẽpore procedente aluus indolet, vrina supprimitur: si quando autem eruperit, purpurei coloris cernitur. præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderruntq; pisceis omneis: sudor foetidus erumpit, biliosusq; vomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiuari autem debet hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continuè exhibito, aut maluæ radice & foliorum decocto, aut cyclamini radice trita ex vino, aut veratri nigri, aut scamonix liquoris drachma ex mulla, anserisque sanguine recenti adhuc calido. item caneros fluuialeis solos, si sustinet, offerre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoq; possunt comedere.

De rana rubeta & palustri.

CAP. XXXVI.

Rana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, pallorẽque intensum, buxo similem, egrè spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat, aliquando etiam semen sine voluntate prorumpit. facile autem post vomitum reficiuntur, multa meraci vini portione assumpta, arundinis radice drachmis duabus, aut cyperi totidem. Cæterum co-

gendi sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

De hirudinibus.

CAP. XXXVII.

Hirudines deuoratas, cum aqua & adhuc rescentis faucibus, inde adeo dignoscas, quod vetriculi os veluti exustione vellicatur mordeturque; atque haec etiam nota est hirudinis deuorata, nonnunquam & sanguinem floridum, hoc est viuum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas murice sorbitio expellit, aut betae folia cum aceto, aut niuis glebula cum posca epota, gargarizandum quoque nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhaeserint, in calidam aquam descendant. item lupinorum farinam assument, frigida in ore retenta eximentur. quippe frigida aqua appetentiores, ad eam festinant profiliuntque. Nonnulli cimices iis quibus sanguisuga deuorata erat, exhibuerunt. ego autem (inquit Galenus) aliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

De chamaeleonte.

CAP. XXXVIII.

Chamaeleonte nigro assumpto, valida superuenit ventris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione, tremor, mox conuulsio incidit. item vomitiones pituitosae & spumantes, quibusdam etiam singultus aduenit, vox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce vinum aquosum calidum, vomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentaque ex cataplasmatibus. ad eum vero qui suffocationem parit liuoremque, absinthium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, vel radicularum: forusque praecordiorum congruet.

De alterco.

CAP. XXXIX.

Si altercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente alienatur ebrii modo: facilem tamen curationem recipit, mulsa liberalius pota, & lacte, praecipue a sinino: sin minus, caprillo, aut vaccino: sicuumque; siccarum decocto, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptum, praeterea vinum falsum cum recenti adipe suillo & passo: vetricae semen similiter, vel nitrum cum aqua conducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepae, & allia, singula cum vino sumpta. Caterum conquiescere cogendus qui altercum hausit, ut id sicuti qui vinum biberunt, concoquat.

De

De coriandro.

CAP. XL.

Coriandrum latere propter odorem non potest: potum verò raucitatem facit & mentem mouet, consimiliter remulantis. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, totius corporis ipsorum odor coriandrum indicat. Adiuuantur, vbi id oleo aut irino vngueto, vt supra monstratum est, eduxerint, vino meraciore cū absinthio, & per se potio: ouis- que vacuatis in sese detritis, cum muria sorptis: ad hæc muria ipsa bibitur, & ius salsum & gallinaceum & anserinum: postremo passum cum lixiuia sumitur.

De psyllio.

CAP. XLI.

Psyllij potu totum corpus refrigescit torpētq; cum resolutione & tristitia, vt animum despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

De cicuta.

CAP. XLII.

Cicutā potā caligo vertiginēsq; insequūtur, vt nec minimum videre liceat: item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur: vltimoque conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodum & in aliis, vomitu eam eliciemus, deinde hac euacuatione vsq; quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad vini meraci potionem veluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes: in quibus interuallis lac vaccinū, aut asininum, aut absinthium cum pipere & vino, item castorium, rutāq; & mentam cum vino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmam, aut piper cum vrticæ semine ex vino, aut tenera lauri folia: similiterq; laserpitium, aut eius liquorem cum oleo & passio. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

De papaueris liquore.

CAP. XLIII.

Papaueris liquorem, epotum, subsequitur veternus cum perfrictione & pruritu adeò vehementi, vt subinde veneno incalescente tanta oboriatur prurigo, vt qui id biberunt, ab ea excitentur, adhuc toto corpore veneni odor sentitur. Saluti est post vomitiones oleo factas, acri vri clystere. itē oxymel cū sale potū proficit: aut cū calido rosaceo, mel: præterea merū copiosius, cū absinthio & cinnamomo: necnō acetū calidū per se: insuper nitrum cū aqua: origanum cum

lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsūmq; piper cū castorio & oxymelite, vel satureiæ, aut organi decocto, vino addito. Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admouetur, & in aquam calidam deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum vino aut passo, vti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

De carpesia liquore.

CAP. XLIIII.

CArpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & cicuta, auxiliamur.

De mandragora.

CAP. XLV.

Accidit mandragoræ potu quàm primū sopor, viriū resolutio validus veternus, vt nihil à morbo qui lethargus dicitur differat. quibus antequàm horum aliquod eueniat, vomitus conducit: post hunc, aqua mulsa, nitrum, & absinthium cum passo, aut vino dulciore sumpta. caput rosaceo foueri & aceto debet. corpus excitari commoueriq; adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū, ruta cum aceto trita, pix liquida, lucernarum funiculi combusti extinctiq; Quod si ægrè excitentur, etiam quæ sternutamenta mouent, adducenda, aliisq; communibus remediis in his quoq; vtendum est.

De aconito.

CAP. XLVI.

Aconitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde verrigines, præsertim in exurgendo, & oculorum humiditates inducit, thoracis, grauitatem & præcordiorum, ita vt multi flatus erumpant. In quo vitio vomitu venenum educi debet, & aluus clystere subduci. Portiones contra aconitum hæ proficiunt, organi, rutæ aut marrubij cum vino, aut absinthij, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos. Prodest ipsi & opobalsami drachma cum vino. item coagulum hœdi, aut leporis aut hinuli cum aceto. adhuc ferri recremētum aut vinum in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum sit restinctum. insuper lixiuium cum vino, & gallinacei elixi carniūve pinguium ius cū vino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculiariter aduersus aconitum conducit, in Heraclia Ponti, vbi & aconitum nascitur, holoeros appellatur, Athenis, didonia: in Eubœa, sideritis.

De

De ixia.

CAP. XLVII.

IXia quæ & vlophonos dicitur, odorem habet & gustum quum sumitur ocimi, linguæ inflammationem validā inducit, mentem abalienat, atque omneis naturaleis excretiones suppressit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamen eiicitur. Adiuuatur læsi ab ea, postquam vomitionibus fuerit educta maior veneni portio, aut alius soluta, absinthij diluto cum vino plenior aut aceto aut oxymelite poto: item rutæ syluestris semine, vel laserpitij radice: similiter tragorigani decocto cum prædictorum aliquo, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Laserpitio, singulis oboli pondere. Pro sunt cum vino etiam nucis iuglandis nuclei lauigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pondere. Proficiunt itidem chamaeleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidem cum aqua multa. vtiliter & acerum calidum bibitur.

De ephemero.

CAP. XLVIII.

Ephemerō, quod nonnulli Colchicon eo quod in Colchide nascatur, vocant, aut bulbum agrestem, epotum protinus, totum corpus prurire facit, velut vrtica & scilla tactum irritatumque: interiora erodit, stomachum vrit cum ponderosa grauitate. Inualeſcente autē malo, cruenta strigmentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, vt salamandræ, vomitionibus & clysteriis: sed antequam vireis sibi asciscat venenum, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpilli decoctum cum lacte bibendum: aut polygonij succus, aut furculorū vitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum medullæ, aut myrtorum cum vino. item ipsorum myrtorum in lauorem detritorum, maceratorumq; in aqua, dilutum potum auxiliatur: benefacit itidē castanearum interior tunica, si cum aliquo è succis quos prædiximus, assumatur: origanum quoq; cum lixiuia potū, in idem efficax est. Adeo verō exactum præsidium est lac vaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, vt hoc præſente nullum aliud desideretur.

De smilace.

CAP. XLIX.

Smilax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis taxus nominatur, pota perfrictionem totius corporis & strangulatum, mortemque maximè præcipitem inducit: quibus

omnia auxiliantur, quæ & cicuta epotæ.

De solano furioso, quod dorycnion à nonnullis dicitur. CAP. L.

DOrycnium potum, quod aliqui solanum furiosum appellant, gustum quidem ceu lactis repræsentat, singultus crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatâ sanguinis educationem: per aluû mucosa feruntur simillima torminosis. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secutum, quæ in ephemero dicta sunt, vomitus dico & clyster, & quæcunq; potû venenû possunt excernere. Propriè autê ipsi succurrit aqua mulsa aut lac asinum caprillumve, & dulce vinum tepidum cum anisi modico potum: item amygdalæ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyliæ cruda pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

De sardonio.

CAP. LI.

QUæ sardonio herba nuncupatur, ranunculi species est: pota autem vel comesta mentem abalienat, conuulsiones adfert cum labrorum contractione, vt risus imaginem præbeat, à quo affectu etiam risus sardonius non laudabili diæterio inter homines iactatur. Cui vitio priuatim post vomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibitæ, lactisq; potio. item corporis totius respersio inunctioque, ex medicamentis quæ calefaciunt petita. vincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & valenter infricare. summam, vt in conuulsione tota curatio administranda est.

De papauere corniculato.

CAP. LII.

PAPAUER quod corniculatum appellatur, esum potumve, eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem quoque curatur remediis.

De pharico.

CAP. LIII.

PHARICUM dictum toto gustu nardium syluestrem repræsentat: potum verò resolutionem cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, vbi vomitu fuerit educum, absinthium cum vino propinatur: item cinamomum aut myrrha, aut nardum Cilicium, quod nonnulli isatin vocauerunt: aut spicæ nardi drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cum passo misti: aut iris crocique flos ex vino. Caput ipsorum dera sum farina ordeacea cum ruta trita, & aceto cataplasmatibus modo obducere conuenit.

De

De toxico.

CAP. LIIII.

TOxicum inde nomen videtur accepisse, quod barbari sagittas, quas toxemata vocant, eo illinant. ubi potum est sequitur labrorum & linguæ inflammatio, metis furor, qui coëceri non possit, variis obnoxius imaginibus. eo-que difficilem curationem recipit: raro etiam nonnulli qui id biberunt vitæ resituuntur. Oportet igitur continere ipsos vinculis & cogere, & vi adigere, ut vinum dulce cum rosa-cco bibant, reddantque per vomitum. Item raporum semen cum vino potum peculiariter ipsis confert, & quinq; folij radix, hircinus caprillusve sanguis potui datus. ad hæc, quercus cortex aut fagi aut ilicis cum lacte laugatus potusque proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, vel trita cum pulegio, ex aqua pota: prætera amomum, & balsami cum vino semen. Qui vero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum vitæ tempus transigunt.

De fungis.

CAP. LV.

Fungorum alij genere, alij copia offendunt, integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim communi præsidio resistendum est, & qui eos hauserunt, oleo ad vomitum cogendi. Mirificè his proficit lixiuium ex sarmentis aut ex pirastris surculorum cinere cum posca, sale vel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, vim strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eadèmq; in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarum elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthij, cū vino, in super mel delinctum potumq; cum aqua. Prodest apiasrum cum nitro, panacis radix & semen cum vino, flores vini combustæ, cum aqua, aut atramentum sutorium cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam vero nonnulli fungi à venenatis corrosi non modò strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & sicum decoctum, origaniq; ad hæc ex aqua mulsa, vomitus confert, in calidam descendere, & crudam farinam ordeaceam præcodiis ad mouere.

De sanguine taurino.

CAP. LVI.

Sanguis tauri recēs occisi potus, spiritus difficultatem & strangulatum procreat, dum tonsillarum & gutturis meatus cum valida conuulsione obstruit. Iam lingua iis qui san-

guinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & vestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo vomitus vitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coeuntem soluere, & aluum subducere possunt, vt grossi liquore suo pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitij radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere, rubique succus cum aceto. Iam verò aluus rectè subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa fœdi odoris egeri: stomachus & venter ordeacea farina cum aqua mulsa obduci debent.

De lacte intus congelato.

CAP. LVII.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo quod in grumos coit gelaturq;. Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas cum qui lac hauit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitij radix liquorve cum posca: idem præstat thymus cū vino, & è cinere lixiuia. salsum verò nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum trāsit. nec vomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

De melle quod in Heraclia nascitur.

CAP. LVIII.

MEl quod in Heraclia Ponti prouenit, aut esum, aut bibitum, eadem pericula quæ aconitum, infert. quare & eadem vtrique conueniunt remedia. Facillimè autem curantur qui id hauserunt, continuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

De gypso.

CAP. LIX.

Gypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: vnde transferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos conueniunt. datur etiam in hoc malo malux decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas vomitiones procreat, corpora deradi non sinit: quod lapidescens gypsum facit. Porro conducit & oleum in mulsa, & ficuum decoctum, lixiuiaq; è ficulneo, aut è sarmentorum cinere facta cum vino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetove. Clyster ex passio & malux decocto in anum dabitur.

D.

De cerussa.

CAP. LX.

Cerussa propter colorem facile deprehenditur, quoniam sponte sumpta palatum & linguam, dantiumque commissuras albefacit. præterea singultum, tussim, linguæ siccitatem, extremorum perfriktionem, cum menthis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aquam mulsam, aut ficuum, aut malux decoctum propinare. item ac calidum, vel sesamum cum vino tritum, aut lixiuum è vitium sarmentis: aut oleum amaricinum, siue irinum, vel persicorum ossa cum ordeï decocto: vel lachryma thuris, vel prunorû gummi, aut vlmî humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam vomitus continuè cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, vel liquoris scammonia ter- ni oboli cum aqua mulsâ poti.

De calce, sandaracha, & auripigmento.

CAP. LXI.

Calx, sandaracha & auripigmentum pota, ventris & intestinorum torsiones cum vehementi rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ vomitiones facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibisci & malux succus, decoctumque lini seminis aut tragi, aut oryza: lac præterea copiosum, aqua mulsâ, iura pingua, bonique succi.

De argenti spuma.

CAP. LXII.

Spuma argenti pota, quam Græci lythargyron dicunt, grauitatem stomachi, ventris, & intestinorum, cum torsionibus. validis infert: nonnunquam & intestina pondere vulnerat disrumpitque, vrinam impedit: corpus eorum qui eam biberunt, intumescit, & coloris plûbei fiunt, & deformitatem acquirunt. Adiuuantur, secundum vomitiones, agrestis hominis semine cû vino: myrrha drachmis octo, absinthij, hyssopi aut apij semine: aut pipere, aut ligustri flore cum vino: palumbium fimo arido cum nardo & vino.

De plumbo.

CAP. LXIII.

Plumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumæ pericula: eademque requirit præsidia.

De argento vino.

CAP. LXIIII.

Et argentum viuum potum, eadem quæ spuma argenti infert, atque eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur. adhæc prodesse ipsis videtur lac copiosè datum. cæterum & hi vomitionibus sollicitabuntur.

*De veratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syl-
uestri, nigella, & pappis.*

CAP. LXV.

HAbenda cura est & eorum quæ iuandi gratia exhibentur, saepe vero non minora aliis pericula adferunt cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe veratrum album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum. hæc enim strangulatus excitant, aut magis quam opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent, sistimus. iam vero quæ paululum nocere videntur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent: cuius generis est sylvestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus vomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

De familiaribus ac domesticis, nempe vino & aqua frigida.

CAP. LXVI.

Aqua frigida subito ac cumulatim pota, vinumque meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, validisque exercitiis strangulatus & dolores concitat. in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminens periculum dissolvit.

LIBRI QUINTI FINIS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRE-

TE.

*

PAVL

PAULI AEGLENETAE LIBER VI.
IOANNE GVINTERIO
ANDERNACO INTERPRETE.

*

Proæmium Chirurgicæ.

CAPVT I.



QVONIAM chirurgica in partes duas diducta est, vt vna sit quæ carnis vitia tractet, altera quæ ossium, tam in rupturis quàm luxationibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit in præsentia exordiemur, consuetudo & hîc vsû compendio. Rursus igitur à superioribus auspicantes quomodo caput, præsertim quæ eius vertex vratur, exponemus.

Quomodo caput aduratur in lippientibus, ægrè spirantibus, & elephantîcis.

CAP. II.

CUM humor oculis influit supernè, cumquæ difficilis vrget spiratio quæ humiditatis excrementitiæ copia è capite inferius in thoracem transmissa, & particulas indidem continuo suo cursu offendente contrahitur, caput per medium hoc modo vrunt. Vertex ad cutem prius tonderetur cutis ad usque os ferramentis candentibus, nuclei modo rotundis aduritur. quod, vbi crusta deciderit, raditur. Nonnulli vero vbi id ipsum os addusserint, faciunt vt squama inde recedat exigua, quò facîle humores illinc perspiratu dissipetur euacuenturquæ; seruato diu vlcere, deinde sic ipsum ad cicatricem perducunt. At in elephantiafi curanda, quinque nonnulli crustas in capite excitant, vnâ in priori parte supra siniciput, alteram hac inferiorem, paulo superius quàm frons habetur, vbi ferè pili desinunt: ac aliam in occipitio, quod Græci opisthocranion vocant, reliquas duas iuxta ossa à squamis

squamis dicta lepido, de quæ superius aures conglutinant: vnâ ex his, parte dextra, alteram sinistra: atque ita pluribus squâmis detractis, & copiam, & crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi prohibent. Iam lieni quoque aliud ferramentum adigunt, vt primo melancholici recrementi opifici per crustam in cute excitatam medeantur.

Cum humor capitis cutem inflat, ea q̃; intumescit & prementi digitocedi hydrocephalon dicitur.

C A P. I I I.

SI humor natura aqueus capitis cutem subit, vitium propriè hydrocephalon appellatur: accidit autem pueris quàm primum in lucem æduntur, capite ab obstetricibus parum dextrè presso, aut ex causa latente, aut ex vasis vnus, pluriûve ruptura & sanguine qui emanat in ociosam inutilemq̃; mutato substantiam, aut materia ob meatuum raritatem resudante, ac inter cutem & membranam quæ caluariam integit, pericranion Græci vocant, erumpente: vel enim inter hanc, & cutem humor consistit, vel inter pericranion & os, vel inter os & cerebri membranas. Cum itaq; cuti & membranæ caluariam integenti, humor interiacer, tumor sequitur, tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, & paucis particulis subiectus: digitis prementibus facillè cedit, & rursus assurgit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sanè respondent, sed tumor durior multò est & lentè cedit, vt qui etiam pluribus corporibus sublit, dolorq̃ue magis vrget. Si inter cerebri membranam & os humor se receperit, tumor quidem erit, sed qui prementi non cedat, neque tactu sit mollis, tamen violenter pressus cedat, siquidem os infantium recens adhuc compactum facillè cedit, præsertim cum futuris rarefactis humori transitus foras pateat: cognoscitur ex facili inde quòd humor cum illum constringere volumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totum in diuersa agitur, frons ipsis foras producta est, oculis cernunt inconniuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis non est manus adhibenda, & si maximè nonnulli chirurgicorum terebra perforatum os exemerint, vt in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & membranulam quæ sub cute caluariam cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo substante,

vna

na linea per medium transuersa caput incidendum : si membranula caluariam inuoluenti & osi colluuius interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus : si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinē H literæ. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamētis commodè partem deligabimus, & usque ad tertium diem œnelæo perfundemus, inde solutam medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur. CAP. IIII.

IN longis oculorum defluxionibus, tum vertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ situs ex loci pulsu facillè deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento ducta, duos digitos longa, usque ad os diuidere oportet. Quod si in conspectum ita non venit, incidendum circiter trium digitorum interuallum, atque tunc manus iniicienda; sic ut arteriæ transuersim dissecentur, quousque & pulsabilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentum os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariam sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem contrahat, rasoque osse penicillum ex panniculo vulneribus debet insinuari, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

Quomodo vasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumq; aduſtio sit administranda.

CAP. V.

IN hemicranicis, & in iis, quorum oculos aut longus, aut etiam acutus dolor ex calida, acriq; fluxione infestat adeo ut in temporum quoque musculis calor, laxusque tumor, œdema vocant Græci, excitetur, omnes medici vasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur primum in temporibus pilis, digitis vasa notabimus, sic ut fomenta præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit: vbi iam vasa oculis sese obiecerint, atramēto notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistrae manus nostræ digitis, tum ministri leuabitur, ipsumque vas superficialia linea incidemus, deinde vbi totum penetrauerimus hamulis eleuatum & à membranis vicinis instrumento quo illæ detrahuntur, denudatum, suspendemus vndiq

undiquaque liberum, et si tenue vas fuerit, per hamulum cum, elato ei circumductoq; membranam detrahemus, ita ut partem quoq; ipsius apprehendamus. At si magnum est, duplex acu funiculus subiicietur, aut linum crudum, aut aliud quoddam validum, ac quamprimum vas in rectum scalpello diuisum, sanguinis quantum satis est fuderit, in utroque extremo quod denudatum est, lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus, aut cum soluetur auferre conuenit. Nonnulli etiam candentibus ferramentis citra sectionem vasa adurunt plagis satis altis. ubi iam ferro negotium absolutum est linamentis carptis siccis vulnere oppleto, splenium quoq; superaccommodatum deligabimus. postquam solutum fuerit, medicamenta carni generandae accommoda, tum arida, tum quae linteolis conceptis illiuntur, nec non cicatrici inducendae apta, ad curationem absoluendam inducimus, nimirum ubi vincula deligaturae computruerint exciderintq;.

Quomodo fons incidatur, hypospathismum vocant. CAP. VI.

Instrumenti species nomen administrationi dedit: utimur autem hypospathismo, in quibus fluor multus, & calidus in oculos defertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidam & discursus veluti vermium, aut formicarum oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iubebimus, ut inferior gena moueatur, cauentesq; musculorum ad tempora motionem, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte incidemus, latas quidem singulas duos digitos, altas adusque os, trium digitorum intervallo inuicem discretas, secundum sectionem tenuem, spatham subiicientes à linea quae in sinistiore tempore ad mediam tendit incipiemus, totum quod interiacet excoriantes cum membrana quae caluariam incingit, deinde rursus spatulam à media ad reliquam demitemus. Deinde scalpri quod scolopomachærion dicitur, aciem in primam coniicientes lineam, ut acutum ipsius latus carni quae ab interna parte cuti cohæret accommodetur, retusum vero, ossi. propellemus ipsum adusque mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendantia vasa præcidentes, non autem usq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremam ipsum deducemus, similiter vasa amputantes. Vbi mediopriter sanguis effluerit, extusis grumis, tria linamenta torilia singulis incisuris inseremus, panniculumq;

inque implicitum aqua madentem superiniectum deligamus. Postridie cœnelæo non solum vlceribus respergis, sed etiam temporum musculis, auribusque propter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu vtendum, & asilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ estat, absoluemus.

Quid agendum in sincipite secando, Periscyphismum appellant Græci.

CAP. VII.

[N] quibus multa, & in alto vasa fluorem copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transversis coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscyphismus Græcè vocatur. Hoc morbo laborantium comites notæ sunt tales. Primum oculi alimentum non sentiunt, exigui, & ad visum impotentes, sunt anguli erosi, palpebræ exulcerata, & pili ipsorum deflui, lachrymæ tenues admodum & acres cum calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & vehemens vrget, sternutamentum continuum. Itaque, derafo capite, transversam lineam sine musculorum in temporibus, motus offensa, vt dictum est incidemus, quæ à sinisteriore temporum parte incipiens in alteram desinat, habeatque terminos, vbi motus nullus est, paulo superius quàm frons habetur, ducta: sic vt futura capitis per verticem tendens ad aures, Græcis dicitur *σιγαμνία*, vitetur. Leonides per mediam frontem lineam deducit. Cæterum osse detecto, penicillis, aut linamentis pluribus inuicem separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & vino oleoque mixtis vt prius dictum est, aspergemus. A solutione cum inflammatio iam declinauerit, os radetur, quoad caro suppullulare incipiat, rationemque carnis producendæ accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus videntes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonix resinæ partem vnam. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandam conficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa vasorum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

De superioris palpebræ futura, aliisque modis.

CAP. VIII.

GRæci appellant *σιγίλαον*, cum naturali pilorum palpebræ ordini, alij præter naturam pili succrescunt: quod vitium ex fluida affectione contrahitur quândo humor qui influit,

fluit, copiosus quidem, sed rosionis & acrimoniae expers fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebrae pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, sutura utimur: interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compungunt. Aeger itaque in sedili collocabitur, vel aduersus, vel à sinistra, superiorque palpebra inuertetur: siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breueis, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspide specilli post filum in rugas plicaeque coacta inuertetur, & subtus linea interius quam pili pungentes habeantur per cilium ducetur, à maiori angulo usque ad minorem pertinentes. filo autem post interioris sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicitum obducientes, supercilium attollemus, aliaque parua linamenta implicita summis angulis imponentes famulo posteriori stanti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atque tunc lineam verum modo rectam, obeliam Graeci vocant, primum scalpello futuris aptato incidemus paulò superius quam naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem unde & verum similis linea inceperit, in tantam vero sublimitatem tendentes, ut totam cutem quae superflua est circumscribamus, desinentesque similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem repraesentet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo totam hanc cuticulam excoriabimus, deinde vibicibus spongia ter quaterve ablutis, oras vulneris contrahemus, à media auspicantes, acum vero per ipsam interioris sectionem transmittentes: porro filum ex lana esto. Caeterum quod eius superfluum est amputabimus, non prope futuras, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa pendeat, eamque per frontem exporrectam, cum emplastro quodam conglutinante applicabimus, palpebrae autem pilos à futuris, cuspide acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis

nunis & securus est. Nonnulli excoriationem fugiunt, eoq; post ductam subtrus lineam, volsella palpebris continendis accommoda, hoc est, ad palpebræ ambitum apprehendendū figurata, id quod superest cutis, eleuatum, scalpro amputāt, ac futuras, vt comprehensum est, adiiciunt. At si in parte aliqua solum palpebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere conuenit, deinde linamenta implicita posca madida imponemus, deligabimúsque imbuentes ipsam partem posca aquosa vsque ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac superflua filii parte abscisa oblinemus palpebras, vel croco, vel glaucio, vel aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, vt, croceno dia rodon. At si inflammacionem futuræ patiantur, etiam emplastrum aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & veluti lacte infuso oculū leniemus, laxiores autem redditas futuras amputando abstraheamus. Notus mihi quidam est qui palpebra, vt dictum est, excoriata, futuris non vteretur, sed medicamento cicatricem inducente curationem absolueret. Nam vulnere ad cicatricem veniente, palpebram ex parte attollens pilos extra inclinare coëgit. Quemadmodum igitur alius quispiā ne excorians quidem palpebram neq; externis duabus vtens diuisionibus, sed interiore solum adhibita, palpebræ rugas digitis vel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut lamellis quibusdam palpebræ longitudinem æquantibus, latitudinem angusti scalpelli, quod venis secandis adhibetur, superfluam totam cutem mediam prehensam cōstringebat, vtriusq; ipsius terminos deuinciens. Atque hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arundinulis aut lamellis excidebat, ita vt nulla ferè cicatrix appareret.

Quomodo palpebræ medicamento vrantur.

C A P.

I X.

Visionem palpebrarum ex vrente medicamento factā, omnes, vt vno verbo dicam, veteres damnauerunt, tum propter medicamenti acrimoniam oculis insidiantem, tum quòd ex immodica vstione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellant, in quo hiantibus palpebris qualicunque de causa lumen offenditur. Quoniam verò multi à pilis semper punctionem experiunt, ne vocabulum qui-

A

dem futurae frequenter audire sustinentes, detinent plerumque nos etiam inuitos, tanquam aliis destituti praesidiis vitionem per medicamentum adhibemus. Compositio vero medicamenti hae recipit, calcis viuae partes duas, saponis gallici vel communis totidem. Quidam etiam aphronitri partes quatuor laeuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio, e ficu, aut quercu, aut vrina pueri impubis excipientes mucrone scalpelli palpebrae iniciemus, tantum in myrtacei folij figuram, adurentes, quantum etiam in descriptione comprehenderimus. vbi iam primo medicamenti impositione cutis fuerit adusta, eo spogia ablato rursus aliud iniciemus, tam diu id cuti inhaerere sinentes quousque nigrescat. Sin id non affectu fuerimus, etiam tertio inducetur. Postquam vero cutis nigruerit, & reliquum iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis & superfusionibus, quousque crusta deciderit, utemur. Inde rasilibus linamentis & penicillis teneris, cicatricem moliemur.

Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum dicitur.

C A P. X.

Lagophthalmon vocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit autem hoc vitij, aut naturaliter, aut ex cicatrice vulneris, eiusque; vel sua sponte facti, vel ex futura, vel vitione, ut nuper dicebamus, parum dextrae administrata: in qua etiam solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra crassitiem amplam habeat. conuenit enim ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentum diductis, etiam deligatura prorsus usque; ad absolutam curationem uti, ita ut non nimium sicca, sed relaxantia magis vnguina adhibeantur: quale est foenugraeci succus superfusus & basilicum tetrapharmacum quod linteolis illinatur resolutum.

De inferioris palpebrae futura & vitione per medicamenta.

C A P. XI.

Quot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, tot etiam inferior. Etenim ultra naturae suae modum excreescens, inuertitur, & phalangosim, & distichiam sustinet. Eodem igitur modo quo in superioris palpebrae futura, utendum est, ordine inuerso: primum lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediat, deinde recta. Subtus vitanda est sectio, quoniam palpebra inferior pondere suo genuino promptè inuertitur. Caterum reliqua curatio

ia

superioris palpebræ sutura tractata, hic quoque cōueniet, præter quàm quòd filorum excessus fronti non sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manum extimescens, stionem potius è medicamento deligas, hanc quoque iam raditam habes.

De ectropio.

CAP. XII.

Quemadmodum superiori palpebræ vitium vocatū lagophthalmou, ita inferiori ectropion oboritur: verū id intercedit discriminis, quòd hoc non è natura prouenit, sed nonnunquam ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente concitarint: nonnunquam ex sutura, aut inartificiofa vstione palpebra inuertitur. Acu igitur duo lina trahente carunculam transsuemus, à sinistro inferiore angulo ad dextrum deducta. Deinde lino vtriusque ipsius extremis admoto, carunculam per acum attollemus, atque ita ipsam scalpello excindemus, auferentes simul cū ea & acum. Atque si figuram palpebra receperit, & æqualiter sit conuersa, satis manu profectum est. Sin autem postea quàm caro fuerit ablata, adhuc inuertatur, auersum scalpellum quam partem Græci cyathiscum nominant, iuxta cuspidem, palpebræ sectæ subiiciemus. ac in externa illius parte duas incisas lineas, à duobus factæ sectionis angulis, auspicantes, in acutiem quandam ducemus, easque in vnū cogentes, particulam Græcorum literæ Λ similem amputabimus, vt eius acuta pars infra spectet oculum, latitudo supra, cilium appellatum respiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente cōmittemus, duabus futuris contenti. Quòd si verò suturæ, aut vstioni fertur acceptum ectropion, etiā sub inferioribus palpebræ pilis per ipsam primam cicatricē lineam simplicem incidemus, labrisque diductis linamenta inferemus, ac aliis præsidis, quæ in lagophthalmis comprehensa sunt, vtremur, præter quàm fomentis, vsque dum sutura fuerit conglutinata.

De anabrochismo & vstione ferramento adhibenda. CAP. XIII.

In quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculū irritent, sed circiter vnus, aut duo, aut plurimum tres, inuicem propinqui, anabrochismum græcè dictum, probamus, isque sit hunc in modum. Per acus tenuissimæ auriculam capillus muliebris, aut simplicissimum byssinum linum transmittitur, duobus simul extremis commissis, vt quod

inferitur duplicē habeat ansulā, alterūmq; huiusmodi filiū aut capillus ansulæ iniiciatur: traductaq; acu per cilium ubi pilus enatus apparēt, pilum, pilosve ansulæ impositos, auriscalpio detrahemus. Et si quidem palpebræ pilus prehensus est ansulā attrahimus. Sin verò vnus, aut plures exciderint, per injectum principium rursus ansulam deorsum trahemus iterūmq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahemus. At si vnu duntaxat pilus gracilis oculum pungat, etiam alterum ex naturalibus palpebræ pilis simul euellemus, inunctum prius gummi, aut alio quodam glutinante, deligabimūsq; donec pilus coalescat. Nonnulli autem vñtionem præponunt anabrochismo: palpebram inuertunt, extractoque vulsella pilo pungente siue vno, siue duobus, vel etiā tribus, candens aut specillum, quod vtroq; extremo in cuspidem abeat, aut auriscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentum loco adigunt, vnde pilus, pilosve sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus pilus nascitur.

De hydatide.

CAP. XIII.

Hydatis pinguis quædam est substantia, palpebræ cuti præter naturam substrata. In aliquibus autem, & præsertim pueris ceu natura humidioribus augescens, malorum superuenientium causa redditur, dum oculum pondere suo grauat, eoq; fluxionem excitat. palpebræ igitur ipsis subter supercilia aquam inter cutē representant, nec vt par est sursum possunt attolli. Si verò digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, quod medium intercedit, inflatur. Horis autem antelucanis potissimum defluxione tentantur, neq; contra solis splendores cernere sustinent, sed tamē illachrymant, continuīsq; lippitudinibus infestantur. figurato igitur commodè ægroto, digitis duobus, indice & medio paululum distantibus palpebram constringemus, collectionem quandam hydatidis ad medium digitis interpositum molientes. Ministro autem posterius stanti caputq; ægrotantis firmiter continenti iubebimus per medium superciliij palpebrā modicē attollat. Nos sumpto in manus scalpello, ipsam per medium lineā transversa diuidemus, non maiore quā in sanguinis per venas detractione fieri solet. alta verò vt totam cutem diuidat, vel etiam hydatidem ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. plerique siquidem altius demisso scalpello, vel mēbranā quæ à cornu similitudine

Cera

ceratoides dicitur, violarunt, vel certè palpebræ musculōs onuulnerarunt. Atq; si quidem protinus hydatidis in cōspectum venerit, ipsam extrahemus: sin minus, iterum diuisionem leuiter mollemur. Vnde si apparuerit digitis cum lincolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiam circumactam mouendo extrahemus. vbi ablata fuerit impluitum panniculum posca madentem impositumque deligabimus. Sunt autem qui & leuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inferant, vt si ex hydatide quippiam fuerit reiectum, ipsam consumat: postquam solueris si desit inflammatio collyriis quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio vrgeat, cataplasmatibus ad ea inscriptis, alijsq; præsidijs medebimur.

De palpebris commissis.

CAP. XV.

Superior palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cum membrana adnata, interim etiam cū ea quæ ob cornus similitudinem græcè ceratoides appellatur, ac morbus oculum tractatu difficilem efficit. Couenit igitur vel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, vel ea per hamulum eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana vulneretur, atque inde procidentia occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamentis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaque ouo madente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyriis utemur.

De chalazis.

CAP. XVI.

Chalazium otiosi humoris in palpebra cōcretio est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus transuersa linea incidi debet: deinde auriscalpio, vel aliquo huiusmodi instrumento Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, futuris oras commitemus, ac emplastro utemur. Si ex igua est, omisis futuris, curationem absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, vt per cartilaginem ipsa pelluceat, inuersa palpebra & transuersim intus diuisa, chalazion tolletur: quo facto, muriant vulnere infundemus.

De verrucis & encanthide.

CAP. XVII.

Palpebrarum verrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis vulsella prehensis, scalpelloque amputa-

ris chalcitidem laeuigatam imponemus.

De vngue oculorum, quod pterygion à Græcis vocatur.

C A P. XVIII.

Pterygion neruosa membrana est: quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minorem ad interiora progreditur, officitq; oculo, quod motû ipsius, bulbi contractione impediatur, & quod progrediens, totam pupillam cõtegat. Cũ igitur facilius curationẽ recipiant, quæ tenuia sunt, & albicant, hũc in modũ admoũeda manus est. Diductis palpebris, vnguẽ hamulo modicẽ inflexo exceptũ attollimus. Acũ verò, pilũ equinũ, aut linũ validũ ducentẽ, ac paululũ inflexam per summa ad vnguis dimidiũ traicimus. Et lino quidẽ vnguẽ deligatũ sublimẽ eleuamus, pilo autem partem pupillẽ proximã defecantes, vsq; ad extremũ excoriamus. Reliquã partẽ maiori angulo vicinã scalpello futuris dicato ex basi abscindimus, ita vt angulicã carunculam relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper descendat, rhyada Græci vocant. Aliqui lino vnguem eleuatam vt diximus, scalpello in id accommodato, totum illũ excoriant, cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingãt. Post manus administrationem momento salis in leuorẽ detriti loco iniecto, lanã ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione, muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflãmatio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

De staphylomate.

C A P. XIX.

Staphyloma est tunicæ Ceratoidis, vnã cum rhagoidi, debilitatæ: aut vitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio. Admouemus autẽ huic vitio manũ, non vt visum abolitum restituamus (nam id fieri nequit) verũ vt moderatũ agrotanti decorem conciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiecta, deinde alteram acum duplex linum ducentem ab angulo qui ad manũ spectat, ad alterum per basim staphylomatis transmittere oportet, manenteq; prima acu, duplici lino amputato, staphylomatis aliam partem sursum, aliam deorsum filis deuincire: atque tunc acu detracta lanam oui liquore imbutam imponere. Post solutionem blandis infusionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylomate decidant.

De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur.

C A P. XX.

De

DE oculis purulētis Gal. verba apponere abūdē est, quæ in eū modū habēt. Nostra ætate medicus quidā ocularius cognomēto Iustus, etiā cōcussione capitis plerosq; hypopyos persanauit. collocās enim eos in sella reſtos, accipit ea ipsorū vtrinq; à lateribus cōprehēdēs, mox quatitabat addeō vt pus ipsīs descēdere palā videremus. mā sit autē deorūm propter grauitatē substātiæ, tamerū hypochymata nequaquā manerēt nisi quis admodū diligēter ea infarxisset. Ac progressus iterū idē Galenus (inquit) frequēter autē multū simul puris vacuauimus tunica ea diuisa quæ cornus speciē refert, paulō supra locū quo vniuersæ inter se tunica cōmittūtur. nomināt autē locū Græci nūc irim, nūc Stephanē hoc est coronā. Hoc quidē Galenus in cōmentario de morbis curādis prodidit. Cæterū post puris euacuationē, vlcus ex mulla aut fœnugreci succo, melle addito infusionibus re purgātes, deinceps reliquā purgationē accommodabimus.

De suffusis.

CAP. XXI.

Suffusio, ocioſi humoris in cornea mēbrana iuxta pupillā concretio est, que visum impedit, aut certē ne clarē oculus cernat, efficit. Accidit potissimū ex perfrictione ac imbecillitate spiritus visorij, eoq; senes magis & lōgo morbo cōfectos inuadit. sit etiā ex vomitu violētius cōcitato & ex ictu, alijsq; pluribus de causis. Verū de ijs suffusionibus quæ nondū radices egerūt, nullā manus administrationem requirētibus, tertio libro comprehensum est. In hoc autē eas quæ iam confirmatæ sunt & ex toto concreuerunt, notis suis describemus. Omnes igitur suffusione laborantes lucem vident aut multam aut paucam, cōque discrimine suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tum eo quod hebetudinem & glaucoma experti lucem omnino nullam cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suffusionum & concretionem & differentiam, item quomodo his manu mederi conueniet. Oculus suffusione tentatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculum premittitur, eique adducitur, simulque hac illac exprimitur, deinde oculo apertō & mente ei adhibita suffusionem conspiciamus. In ijs enim quibus humor nondum coalat, suffusio quædam ex digiti impressione oboritur. ac prius latioſior apparet, rursus in suam & figuram & magnitudinem recurrit. At in confirmatis suffusionibus nulla

A 4

immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniam vero commune hoc est indicium & eorū in quibus modicè, & illorum in quibus supra modum humor concreuit, colore ipsos discernemus. Nam si ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffusio habeat, moderatè coaluit, & ad educationem idonea redditur: si verò gypso & grandini similis color suffusionis est, supra quàm par est concreuit. Sed quia hæc à Galeno didicimus, collocato ægrotante aduerso lumine citra solem, oculū sanum accuratè deligabimus, & diductis alterius palpebrīs recedemus ab iride appellata ad minorem angulum, quantum specilli cuspis spatij continet, atque rum punctoriij stili mucrone locum designabis quem puncturus es: in sinistro quidem oculo dextra manu functionem obiens: in dextro autem sinistra. Atque inuersa punctoriij specilli acie quæ ad extremum rotunda est, valenter impingimus, & partem designatam vsque ad vacuum intus sinum penetramus: idque tam altè fiet, quàm pupilla ab iride nuncupata distat. Ex superiori igitur parte vertici suffusionis stilum punctorium adigentes, (videtur autem conspicuè ferrum, quod tunica cornea pelluceat) humoris colluiem per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululum. Sin autem recurrerit, rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilum tollemus, leniter circumuertendo. Post hoc oculo aqua eloto pauxillum salis cappadocici instillabimus, lanamque oui luteo cum rosaceo madescensem impositā deligabimus, ita vt sanum quoque oculum comprehendamus, ne vnà commoueatur. Cæterum collocantes ægrū in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum conquiescere, tenui vti victu, adusq; septimum diem illigatum, nisi quid prohibeat. Post hunc solutis ligaminibus visum experiemur, ostendentes ei res quasdam visibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quod ex continuo nimium intuitu promptè rursus suffusio repleatur. Si inflammatio vrgeat, etiam ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

De ægilope.

CAP. XXII.

A Egilops, tumor est abscessorius inter maiorem angulum & nares proueniēs. Vix curationem admittit, tum partium tenuitatis causa, tum periculi, ne oculus consortij lege

lege indoleſcat. Si igitur per ſummâ ruptus fuerit abſceſſus, totum id quod eminet uſq; ad os excidendum. Et ſi ad malas ſubluuiſ deciderit, totam ipſam explicabimus. os autem cariem nondum ſentiens, rademus. Quòd ſi iam carie vexatum eſt, ferro candenti acuto ac in cuſpidem abeunte, aduremus, ſpongia frigida madente, oculo impoſita. Sunt qui poſt carunculæ exciſionem terebra uſi, humorē, aut pus in nares deriuarint. Nos autē ſatis habuimus eoſq; ſolum ferramenti ad ægilopem accommodatiſ adurere, ut ſquama abſcederet. Ab uſione lenticula melle adiecto quod phacomeli vocant, vel malicorio cū melle reliquiſq; ſiccantiſ præſidiis utemur. At ſi ægilops ſerpat ad angulū, ſummaq; inuadat, nequaquam tūc ſcalpello, quo aut pterygia, aut venas ſecamus, media anguli parte ad abſceſſum reſoluta, carnes ex alto educemus, itē mediocriter deſiccabimus. Vitri autem puluiſ tenuiſſimus ipſiſ inſparſus, mirabiliter deſiccet. Ad hæc aloë ſimiliter cū fuligine thuriſ. Reliquam vero Aegilopum medicinam, tertio libro ſumus executi.

Si meatuſ auditorij non perforati ſint.

CAP. XXIII.

Hic affectuſ à prima natali die contrahitur, membrana quadam auditorium meatum obſtruente, nunc per ſumma, nūc in alto. poſtea accidit præcedente in audiendi meatu exulceratione. ſiquidem caro ſupernaſcens ipſum occludit. Itaq; ſi membrana auditum impediens altē inhæreſcit, difficiliſ erit adminiſtratio. Tentandum tamen eſt, tenui quodam inſtrumento ipſam incidere. ſi in ſummo fuerit, ſcalpro quod Græci ſcolopomachærion appellant, hanc diuiſam, ubi uſuſ exigat, etiam auferemus. At ſi caro ſupercreuerit, hanc pterygiſ apto ſcalpello aut ſpecillo polypis idoneo tollemuſ, deinde tortile linamentum ex viliore panniculo, ſpatioſo meatuſ ſinui aptatum aqua imbuemus, inuolutumq; chalcitide leuigata, aut huiuſmodi quodam arido in meatum demitemuſ, ne ruſſuſ caro enaſcatur. Si inflammatio male habeat, protinuſ id auferemus: Si fundat ſanguinem meatuſ, ſpongiam aqua frigida imbutam impo-
nemuſ. aliſque conuenientibuſ utemur remediis.

Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda.

CAP. XXIII.

Solet etiam in aurem incidere, non modò calculuſ, ſed etiam vitruſ, faba, & ſiliquaruſ grana. vitruſ itaq; &

A 5

calculus suam seruant magnitudinem: fabæ autē, & filiquarū grana, aliaq; id genus, naturali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur vel auriculario specillo, vel hamulo, vel vulsella hæc extrahere. Aut violenta capitis concussione, aure super circulum quendam imposita. Iā verò calamo hæc subinde extraximus, exurgētes etiam aquam auribus illapsam similiter, cera calami ambitum, qui auri iniicitur, obstruentes ne spiritui vsquam sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, eduximus specillo lana inuoluto & in resinam terebinthinam, aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamēto quod sternutamentum prouocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horum quidem nulli cesserit prius quā inflammatio, conuulsio, & omnino periculum fuerit subsecutum, manu, & ferramenti ipsa auferemus: figurabitur itaq; egrotus, vt auris auersa sit ad basim ipsius post appellatam fibrā, & lunata utemur diuisione exigua, auersaq; specilli parte corpusculum quod insidet, eximemus. Hoc ablato vulnus suturis commitemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

De polypo.

C A P. X X V.

Polypus tumor est præter naturam in naribus oboriēs, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carnem repræsentet, tum quod suo complexu quemadmodum ille, captantes vlciscitur, nares ipsorum comprehendens, ita & vitium hoc laborantium nares obstruit, id efficiens vt & difficulter respirent, & sermonem agrè exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi, & maligni, ceu cancri naturam induentes, attingi nō debent. Molliores autem, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & narium meatu sinistra manu explicato dilatatoque, spatula ad id facta in myrtacei folij modum acuta orbiculatim polypum, aut carunculam dextra præcidemus. illic acie ferramenti imposita, vbi naribus coaluit: secundum hæc instrumento in oppositum cōuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purū naris meatum viderimus effectum, ad curationē descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorij acie

acie relictum corpus cum tensione, agitatione, & rasura valenti auferemus. Malignos & perucaces polypos candentibus ferramentis adurere consilium est. inde remediis vstioni dicatis vti. Postquam ferro satis effectum, spongia detergemus, ac poscam, aut vinum in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumenta non comprehenderit. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumve digitorum longitudinis in nodos constrictum, per specilli duplici cuspide præditi foramen transitemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inseretur: idem per palatum, & os eicientes vtraque manu extrahemus, tanquam carunculas nodis defecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habentes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absumemus simul & locum exiccabimus. Postea vero pastillis cicatricem ducentibus vtemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint: Græci vocant colobomata. CAP. XXVI.

Curta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci vocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ vulnerum contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dein suturæ illis iniici debent, & conglutinantia.

De epulidibus, & parulidibus.

CAP. XXVII.

Epulis carnis tuberculum est iuxta dentium aliquem in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidem itaque vulsella, aut hamulo eleuatam præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamenta inferimus. Vidi autem subinde scalpello, quo venas secamus, ipsam duntaxat punctam, & pure vacuato confanxisse. post ferrum, vino collui præcipimus. In sequenti die malsa, tertio Antheron, puluerem vulnere inducimus vsq; dum curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si cōgruis medicamentis non curetur: candenti ferro ipsam aduremus.

Quæritur

Quomodo dentes eximantur. CAP. XXVIII.

Dens qui eximetur vsq; ad receptaculum suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primùm replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo exemplo, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea vino, aut posca os colluetur dum confanescat. Quoniam vero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpris excindemus: qui non coaluerūt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluūq; in eo est, deteremus, adiectasq; ipsis, vt verisimile est, squamas auerso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabimus.

De ligatione linguae quod ancylion dicitur. CAP. XXIX.

Ligatio linguae quae ancylloglosson Græcis appellatur, aliàs naturaliter accidit, mēbranis durioribus magisq; à prima origine minutis linguam cōtinentibus, aliàs ex acquisito ob cicatricem quamptiam duriozem sub ipsa ex vlcere contractam. Qui igitur ex natura hoc vicij habent, eo quod tardè sermonem explicare incipiunt & vinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non præcedente, cognoscuntur. Qui vero ex acquisito, cicatricem manifestò conspicuam habent. Collocari igitur debet ægrotus in sedili ea figura vt linguam ad palatum suspendeat, & nerueum illud vinculum transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio prouenerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationem soluimus, cura adhibita ne particulas altè latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quæ sisti nequeat, frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida aut posca vulnus debet elui. deinde medicina vtendum quæ relaxet & carnem inducat.

De tonsillis.

CAP. XXX.

Quemadmodum glandulae scirrhus induratae, strumae appellantur, ita etiam tonsillae inflammationem experitæ, & supra naturalem modū auctæ, & veluti desiccatae, deuorationi spirationiq; negotiū exhibētes, è regione vtrinq; sibi inuicem oppositæ, eodem partis vocabulo, tonsillæ, Græcè antiades vocantur. Quibus cum adest inflammatio,

scal

scalpellum ad mouere cautio est. vbi illa modicè conquirit, manum admoliamur, præsertim albis, contractis, angusta basi firmatis. Nam humiditate flaccescentes, rubicundæ, amplam basim habentes, facillimè sanguinem profundunt. Collocato igitur homine aduersus Solis lumen, iubebimus vt ore hiet, ministro caput continente, alteroq; linguam spatha ad id facta quam Græci glossocatochon appellant, inferiori maxillæ apprimente, nos hamulo per tonsillam trajecto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita vt non membranas simul euellamus. Deinde totam ipsam ex basi amputabimus scalpro ligationi dicato, ἀγνυλότομον nuncupant. Sunt enim duo eiusmodi instrumenta, aduersos acie inflexus habentia. Postquam vna fuerit succisa, ad alteram eodem modo vice conuersa veniundum est. Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit. At si profluuium sanguinis eueniat, etiam rubi & rosarum, myrti; diluto egelido vretur. Si vero copia sanguinis prorumpat, plantaginis & symphyti succo: item ex electro, pastillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debet. Cesante autem profluuiio, proximo die, rosarum flore, croco & amylo cum lacte perungentur ex aqua, vel oui liquore candido, vel hydrososato. Si sordes vlceribus increuerint, etiã ex melle & collutiones, & illitus commodè adhibentur.

De vua.

CAP. XXXI.

Grgulio tanquam aliquod vocis plectrum subinde de stillationem à capite recipit: idemq; præter naturam autus, si oblongior, tenuisq; fuerit, Columella nuncupatur: si vero crassior ab ima parte, & rotunda, Vua dicitur. vtrunque autem nomen à similitudine factum est. Si igitur vniuersalibus, nempe & per sanguinis dimissionem, & medicamento adhibitis vacuationibus non abigatur, neque etiam remediis loco admotis, quæ astringant, repellantq;, vel etiam discutere possint, cesserit, ad scalpellum veniemus: ne continuo irritatu, tussis, vigiliæ, interim etiã strangulatus subsequatur. Quæ igitur contractæ sunt, rotundæ, non oblongæ, cruentæ, vel subnigræ, non attingi scalpello debent. Tenuæ autem, oblongæ, per summa graciles muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodum, sed albicantes, ex curandæ sunt. hæ siquidem protinus inflammatione liberantur. Id autem ex vua præciditur, quod præ-

200

rer naturæ modum eminet. Etenim si ad finem illa præcida-
tur, extremam omnes thoracis regiones noxam percipiunt:
& vox intermoritur. Itaque figuratur ægrotus in sedili con-
tra Solis lumen, iubeturq; magnum hiare. deinde vulsella,
aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferiorique
parti adductum scalpello vuïs aut suturis accommodato,
præcidimus. inde quæ in vasorum sectione comprehensa
sunt, agemus. Sæpe vero, aut propter laborantis timorem,
sanguinis profluuij metum, medicamentive siccitatem fer-
rum vitantes, adurente potius medicamento hanc absumi-
mus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in pal-
pebrarum vstione dictum est, aut eius generis alio, vuæ vstæ
sinus implere, ac homini magnum hiare iussu lingua per fa-
mulum forfice constricta, instrumento adaperto tantam v-
uæ partem comprehendemus, quantam etiam sumus am-
putaturi. Cæterum spissitudinem medicamentum habebit
neque liquidam, ne diffuens ab vuæ deerret, subiectas au-
tem partes adurat, ob quod ægro interdiciamus, ne per to-
tum vstionis tempus deglutiat, neque omnino duram, quò
facilius vuæ incidat, & si ex vno ipsius iniectu summa vuæ
pars nigruerit, abundè est: sin minus, etiam bis vtemur, æ-
gro per totum administrationis tempus inclinante ore, in
terram, vt salua eliquescens simul cum medicamento parti-
culis extra os euadat, siquidem hora vna emoritur: excidit
autem tertio, quartove die. Secundum vstionem, lana molli
aut stuppa indice digito inuoluto quæ gurgulioni circum
adhærescunt, extergemus, vel etiam aqua os collui iubebi-
mus. At ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino, tum
in his, tum in illis quibus consillæ ademptæ sunt ex confor-
tij lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus, & perun-
ctionibus similiter vtemur.

Quomodo spinæ gutturi eximantur.

CAP. XXXII.

Deuorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium,
aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur
in conspectum veniunt, vulsella, quam Græci propriè
appellant acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas
fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores mo-
les esse deuorandas, vt, caulem lactucarum, aut buccellam
panis. Alij vero spongiam puram mollemq; exiguæ magni-
tudinis lino illigatam deglutire iubent, linoq; apprehenso
retrahi,

trahi, idque frequenter efficere ut spina impasta spongiæ ducatur. Leonides autem iubet cataplasmati uti, quæ conquant, cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, ut spina in pus redacta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante ventriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod infixum est nobis non conspicuo, vomere iubebimus digitis aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infixum una cum vomitu educetur.

Quomodo aspera arteria incidi debeat.

CAP. XXXIII.

Chirurgicorum præstantissimi hanc quoque administrationem literis prodiderunt. Antyllus itaque hunc in modum scribit. In synanchicis quidem, ut in ea parte dicitur quæ visus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mento inflammationem experiuntibus, aut etiam tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, incolumi sanè ipsa arteria, ratio est sectione uti, quod periculum strangulatus euitetur: deinde cum infra arteriæ caput spatium trium ipsius quatuorve circulorum manuum adegerimus, partem nonnullam ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam enim diuidere securum non est, tum quod hic locus excarnis sit, tum quod vasa procul à loco diuiso sint dissita. Itaque inclinato ægroti capite retrorsum, ut arteria reddatur conspicua, transversam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, nec cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet: deinde sic ipsi arteriæ incidens, vasis, si fortè occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit: Coniiciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quod spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quod vox intercisâ sit. ubi vero de strangulatu metus amplius non est, oras vulneris renouabimus, mox suturis commitemus, ita ut solam cutim citra cartilaginem suamus, utemurque medicamento quod cruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili verò curatione utendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

De abscessu.

CAP. XXXIII.

Quod

Quod abscessus carniū, vel partium carnosarum cor-
ruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quorq;
eius sint differentiae, quarto libro abundè tractatum est.
Nunc autem quemadmodum manu scalpelloq; ei meden-
dum sit, exponemus: cum omnino in pus transierit. Hoc au-
tem deprehendimus inde quòd dolores, febris, si praecesserit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora
tunc appareant. vbi iam tumor in acutum fastigiatus est, &
pus digitis innixis occurrat, praesertim cum summa occupat
abscessus, tunc ad scalpellum veniundum est. Si vero neque
ad tactum occurrat, neque fastigietur, eo quòd in alto deli-
tescat, aliis mutationis notis attendentes, manum admolien-
mur. Sciendum vero est crudos interim ipsos priusquam ex
toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principi-
bus particulis vicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis
necessarium assidua putredine pariter contabescat. Porro
abscessus ano proximos crudos antequàm in totum ematu-
ruerint, dissecari Hippocrates praecipit, veritus ne perfora-
tionem experiantur. Inciduntur ergo non omnes simili li-
nea, sed naturali quidè, vt in fronte: & pilosis locis, vt in ca-
pite, cura decoris quantum licet, habita. Recta vero linea
artus secamus, veluti in musculis, diligentia adhibentes ne
& nervos & arterias & principales particulas attingamus:
interim in rectum, interim transversum abscessu prout cuius-
que usus exigit, diuiso. In minoribus vnam scalpello sectio-
nem molimur, in magnis plures, iuxta amplitudinis rationem
vbique ea quae tenuiora sunt & effluxioni idonea, inciden-
tes. Illos sanè abscessus qui plurimum fastigiantur, crudi,
tenuis, & emortui sunt, praecidimus trianguli, aut mirtacei
folij, aut alterius anguli figura, cum circularis ad cicatricem
recipiendā sit in idonea. Qui vero non in fastigium attollun-
tur, eos simplici duntaxat linea dissecamus. At vbi magnum
sinum inuenimus, si cutis superiniecta carnosā sit, & queat
conglutinari, diuisione loci ea duntaxat vtemur, quae hu-
moris effluxui conueniat: Sin tenuis, admodumque excar-
nis, totam in longitudinem simpliciter dissecabimus, & post
simplicem diuisionem si corpora vtrinque sita gracilia val-
de & non carnosā videantur, ipsa tollemus. Administrato
iam scalpelli munere, spōgia locus abstergi debet: si paruus,
est abscessus, vnaque diuisio, simplex linamentum inferemus:

Si

Si magnus est & plures incisæ lineæ, implicitum aliquod in longitudinem linamentum lemnifcon Græci vocant, ipsis demittimus, ipsas similiter plagas linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida, aut posca vtendum. si ita non substiterit, chalcitidis pollinem inspergemus. eoq; frequenter ob flaccidam humore putredinem vtemur. Splenia si hyems est, & partes sint neruosæ, œnelæo imbuta deligabimus: si æstas, & partes carnosæ, aqua cum oleo, aut ipso quoque vino cum vino frigido tincta illigataq; sequenti die eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem vbi soluerimus, spongiaque deterferimus tetrapharmaco quod in linteola illinitur, vtemur. Si inflammatione caret vomica, idem fomentum & medicamen linamentis illitum accommodabimus. Si inflammatio adest: cataplasma, quod concoquendi vim habeat, iniiciemus, superfusionibus antea vsi: vbi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum sinus, glutinantibus remediis, vt quarto volumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

De strumis.

CAP. XXXV.

Struma quæ græcè chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à chœradis petris, aut suibus, quod numerosæ sobolis existât, aut quod colla habeant glandulosâ. Oriuntur autem strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut vtrunque vna, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent attractu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu fit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum vsui, hoc modo tractandæ sunt. Superficiarię igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbensibus dissoluntur: orarum cute hamulis distenta, membranæ liberantur, vt in vasorum confectione, quam angiologiam vocauimus, expositum est, ac paulatim eximuntur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatę corporibus eas cõtinentibus vndiquaq; liberabuntur, animo adhibito ubiq; ne arteriæ, quas carotidas vocant, & nerui re-

B

currentes violentur. At si vas aliquod diuisum, opus obscurer, funiculo id excipietur, vel per medium amputabitur, nisi magnum fuerit: vbi in arctum strumæ basis venerit, dextræ ipsa præcidetur: ac indice demisso tentabimus num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod vas aut etiam plura subinde iuxta strumæ fundum esse suspicemur, nō ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere cōuenit, quò particulatim citra periculum sua sponte excidat. quo tempore medicamento in linteola illito, curatio tentabitur. Si verò inde excindatur, oras commitemus. omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atq; si nihil superuacuum habuerint, inde futuris iungemus. Sin ex strumæ tumore cutis redūdet, parte ipsius myrti instar ablata, futuris vtemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

De steatomatis, atheromatibus & meliceridibus. CAP. XXXVII.

HAec quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis variant, quòd abscessus propriè dicti inflammationem dolorémque testentur, & acrem humorem, ac rodentem cōtineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Caterum illa inter se quoq; differūt, quòd humor in steatmate contentus, sicut appellatio ostēdit, seuo sit persimilis. In atheromate, pulti frumentaceæ. In meliceride, humor mel repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modum. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tardè quidem funditur: cito autē rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumæ, incisione, excoariatu, futuris & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana vulneretur, vnde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerunque in brachiali, talo & articulamentis motui dicatis exhibet, quemadmodum etiam struma vel tota, vel portio ipsius relicta. quòd si huiusmodi quippiam fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedentibus medicaminibus reliquias absumere.

De aneurysmate. CAP. XXXVIII.

Aneurysma tumor blandus tactu est, digitisque cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo, hunc in modum scribit. Arteriæ apertæ affectus, aneurysma vocatur.

catur. Fit autē eadē quoq; conuulnerata, quoties incūbens ei cutis cicatricem quidem contraxerit, maneat autem arterie vulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriarum pulsu, imò etiā premētibus nobis tumor omnis euanescit, substātia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hęc quidem Galenus. Nos autem ipsa aneurysmata hoc modo inuicē discernimus. Quæ ad aperta arteria fiunt, proluxiora apparent, & in alto cōstituantur: digitisq; impressis ceu strepitus quidam exauditur, cū nullus sonus in iis quę rupturæ feruntur accepta percipiatur: illa verò rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & ceruicem infestant, aliāq; loca, eximie magnitudinis aneurysmata, curare propter vasorum amplitudinem non tentabimus. Quæ verò summas partes, artus vel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidē ex aneurysmate tumor obuenerit, cutem linea recta in longum incidemus, deinde hamis diductæ oræ sicut in vasorum dissectione dictū est, excoriabuntur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per medium: vbi cū ambienti membrana vnita fuerit, curatione pus maturante utemur vsq; dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transsuendum. Et post acus traiectum ansulam forfice præcidere oportet, atque sic duobus filis hīc illic tumore deligare, veluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuoluantur, altera etiam transmittenda est acus per totū quæ priorem premat similiter duo fila ducens: amputata ansula ex quatuor filis cōflata, ita tumorem ex lino deligabimus, vel tumore per medium ad aperto post excretionem, cutem adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex vino & oleo imponentes, remediis in linamenta illitis utemur.

De aspera arteria tumore qui bronchocele dicitur.

C A P. XXXVIII.

GRandis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomē claturā ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est. alius enim adipe tumet, alius partiū illarum di-

B 2

latione accidit. Atq; hunc notabimus veluti & aneurisma-
ta, desperatūq; fugiemus, nō aliter ac vniuerſa aneurisma-
ta quæ periculofam habeant adminiſtrationem: præcipuè
verò quæ circa ceruicem oriuntur, ob arteriarum magnitu-
dinem. Qui adipe inturgeſcit, ita vt ſteatomata curari de-
bet, diſcretis, præteritiſq; vaſis, eo nimirum modo quem in
ſtrumis expoſuimus.

De ganglijs.

CAP.

XXXIX.

G Anglion, nerui eſt in nodum cōcretio, ex ictu, aut labo-
re proficiſcens. plerunq; verò in manus iunctura, quā cū
brachio cōmittitur, talo, & articulamentiſ abſoluitur: quā-
quam in aliis quoque partibus proueniat. Hæ comitēs ſunt
notæ, tumor, concolor, renitens, indolensq;. At ſi violenter
premas, ſtupidum ſenſum experitur, non in alto, ſed ipſa ſub
cute radices agens: & ad latera quidem transferri poteſt: ſi
autem vi adigas: tum antè, tum poſt, nequaquā poteſt. Quæ
igitur in cruribus aut brachiis aut ſummis partibus oriun-
tur, excindere tutum non eſt: periculum enim ne particula
reddatur mutila. At quæ caput aut frontem inuadunt, cute
ſcalpello diuiſa curamus, & ſi quidem parua fuerint, vulſel-
la comprehenſa ex baſi præciduntur: ſi maiora, hamis tranſ-
fixa excoriataq; tolluntur: oras ſuturis commiſſas, medi-
camento ad cruenta apto perſanamus.

De venæ ſeſione.

CAP.

XL.

E T ſi omnibus ſatis cōſtet, quomodo vena incidi debeat,
tamen ne parti chirurgicæ aliquid deſit, & propter ar-
tificioſas ipſius diſtinctiones, omittendum non eſt. Primum
itaq; venæ ſeſionis cōſiliū eſt, vt ſanguis qui redundat, eua-
cuetur. Copia verò ipſius duplici modo capi demōſtrata eſt,
vno ad vires, venę licet plenæ nō appareant: in quo ſtatu, ho-
mo protinus imbecillis ac inualidus redditur: natura ceu ad
graue aliquod onus ferendum impotente. Altero, vaſa quæ
id continent, in alia loca pondus transfundere ſpectantur:
& ſi virtus haud cum moleſtia ipſum toleret: in quibus ru-
ptis interdum venarum commerciis, ſanguinis ſputum, aut
aliæ fluxiones accidunt. Copiæ igitur, quæ ex viribus æſti-
matur, corporis grauitas, nota eſt. Venarum copia tum ex-
tenſione, tum quòd illæ plenæ tument, agnoſcitur. vtraque
autem, vacuationem neceſſariam indicat. Itaq; primo quo-
que die ſanguinem uſu id exigente demittes, ſola in ventri-
culo

culo ciborum concoctione, aut etiam perfecta in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob causam aliquam sanguinis detractio prætermissa fuerit, vel ultra septimanam cum mittere alienum non est, si necessitas postulet, & vires non dissuadeant. Caterum qui venam incisurus est, id habet inspiciendum, num multa stercoris retentio intestina urgeat. Quod si ita deprehensum est, molli clystere alius ante vacuari debet: ne venæ putridam aliquam excrementorum colluuiem ab intestinis attrahant. Iis igitur qui ob morbi necessitatem, sanguinis detractioem requirunt, quouis tempore venam incidemus, si particularium duntaxat in febribus accessionum vigorem seu statum excipiamus. At si continens febris extiterit, matutinum omnino tempus magis idoneum est. Qui verò nullo morbo urgente, sed præcauendi illius gratia sanguinis vacationem postulant, his verò opportunum est. Porro in ætatibus usque ad quartumdecimum annum sanguis mitti non debet, sicut etiam post sexagesimum, nisi necessitas quædam inuitabilis huc nos compellat. in summa, imbecillis viribus præditi, hanc vacationem vitabunt. Caterum in particulis recens inflammatione tentatis, ex opposito inanitionem moliri conuenit: in vetustioribus, ex propinquo: siquidem ex multis corporis partibus sanguinem mittemus: frequentius autem ex interiori cubiti vena. Verum id considerandum venit, interiori & alariæ dictæ venæ, per totum, arteriam subiici: mediæ neruum: superior quæ & humeraria dicitur, periculi experta est. Ac in capitis morbis humerariâ incidimus. In his qui infra ceruicem affligunt, alariam: mediâ vtrisque conuenit. Fascia igitur arcta partem aliquam circa brachij musculos deligare oportet, & frictione manuum alternante, repletam venam vsui commodam transversim per totam ipsius latitudinem solam diuidere. Etenim maiores hac plaga, ægrè cicatricem admittunt. arctæ nimium inflammatio nem experiuntur, præterquam quod crassioris succi transitum impediunt. In quibus autem & secundo & tertio die, interim verò & quarto sanguinem detrahendum esse speramus, obliquius vena secari debet, quò manus inflexu dehiscens non protinus cicatrice obducatur, sic enim visum est Antyllo. At quantum euacuabitur, ex virium robore, & morbi magnitudine meriemur. Si humoris copia subest,

& materia efferuescit, vna vice vsq; dum anima deficiat extrahemus, virtute videlicet robusta, sic autem vt ager non ex humoris in ventriculum cōfluxu deficiat: ob quod etiam multi ante iustam vacuationem per initia statim animo destituuntur: verū eius deliquium his vacuati humoris ratione obuenire oportet. Iam verò si magnam vacuationem res postulet, vires autem sint inualidæ, distribuēda erit inantio: ac primum parcius detracto sanguine denuo idem auferetur: si res exigat etiam tertio. Cēterum vacuare solemus corpus vniuersum non modo in plethorica affectione, veluti & Galenus tradit, sed etiam propter affectus magnitudinē, quanquam totum corpus humoribus videas cōmoderatum, quemadmodum in sanguinis ex naribus, aut alia parte profuio, quod non copia excitauerit: ac vacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam in valida inflammatione idem faciendum est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippitudine, & iis quæ tam præcipiti modo vrgent. Nam dolor & partis inflammata calor defluxioni præbent occasionē, licet vniuersum corpus superfluitatibus careat. Quapropter parcius id tunc faciendum est, vacuatione adhibita, quæ potissimum laborantis ætati, & naturæ competere videatur: consideratio etiā anni tempore, loco, & egrotantis consuetudine. Porro in quibus propè venam quæ diuidetur magna quædam est inflammatio, quemadmodum in pleuriticis & iocinorosis, optimū est expectare, dum color sanguinis, & substantia mutetur. Diuersus autem est in inflammatione sanguis, à naturali: quoniam largius incallescens, siquidem prius erat crudior, rubicundior, magisque flauus euadit: si autem talis prius extiterit, in nigrum adustus mutatur. Non tamen ex toto mutationem ipsius expectare consilium est: sed etiam ante illam nonnunquam cessare conuenit, idque duplici de causa, aut ob virium imbecillitatem, quas solui ex pulsuū tactu cognosces: sunt enim ipsi inæquales vehementia, & magnitudine, vel etiam languidi, & robur fluxionis inclinans imbecilles iam vires notat: vt propter inflammationis malignitatem: nonnunquam enim nihil remittit, sed vehementer impacta est. At si nihil horum obstiterit, ægérq; floridæ ætatis sit, expectanda est sanguinis mutatio, magisq; si ambiens aër temperatus fuerit. Si verò sanguis ante iustam vacuationem fuerit suppressus,

sus, id autē accidit aut propter timorē, & animi defectū aut sanguinis grumū, aut violentam constrictionem, contra singula pugnabimus: Animam deficientem, odoratis naribus admotis refocillantes: constrictionem, vinculo remisso soluentes: in grumum coactum sanguinem, vel olei infusione, vel digitorum fotu dissoluentes. Reliqua sanguinis dimittendi preparatio nulli non cognita est: verum hæc in cubiti venis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahetur in capitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, fascia cervicem vinciemus, digitis super guttur interpositis, ne suffocatus ægri intereant: repleta iam vena in fronte, acie scalpelli diuidetur. Eodem modo etiam circa guttur extantes venæ sphagitides appellatæ, ob vetustam lippitudinem aduersa scalpelli parte scinduntur, ita ut sanguis erumpat. Item venas linguæ subditas, veluti in anginis, transuersas incidimus, euitantes constrictionem. Nonnulli vero in maioribus oculorum angulis venas eminentes, sicut in longis capitis, vel oculorum morbis similem in modum diuidunt. In quibus internas quoque narium venas vel mucrone scapelli contundentes, vel quibusdam asperis irritantes disrumpunt. item post aures sitas ob capitis affectus feriunt. Quæ vero poplitem perreptant, in renum cruciatibus aperiuntur. Quæ extremas corporis partes intercurrunt, superiacentibus vinculo exceptis & manuum frictione, & pedum incessu repletæ diuiduntur. in sinistra quidem manu, cum lien malè habet, venam quæ inter paruum & anularem digitum porrigitur, præcipuè incidemus. cum iecur affligitur, in dextra. Nam extremarum partium inanitio, è longinquo magis facta efficacior molitur reuulsionem: in pede, veluti cum coxendicum dolores aut vteri vitia vrgent, eam quæ supra interiorem talum eminet, dissecabitur.

De cucurbitularum usu.

CAP. XLI.

Cucurbitulis neq; per affectuū initia, neq; cum corpora sunt plethorica, utemur: sed iis prius euacuatis, cumq; nihil particulæ influit. Vfus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Levis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachum suspendit, sanguinem attrahit, & profluētem rursus sistit, obiectis partibus admota: &

quod altè conditum est, in summa rursus educit. in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhibetur, efficacioris causis perspiratum præbet, sensibiliter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe non modò sanguinem, sed alios quoq; humores vacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata: verum si à carnosius particulis detractionem moliri statuimus, primùm cutis scapello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin excarnis magis pars fuerit, leuem prius cucurbitulam defigemus: vbi in tumore particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodabimus: & si paululum vacuare cogitamus, vna diuisio abundè est: si amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur sanguinè acceperimus, summa scarificari, si crassior, alta debent: quando etiam concretum ex ictu sanguinem educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionū altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scapellis æqualibus simul iunctis, vt vnica iniectione tres fierent plagæ: verum hoc nos inutile putantes simplici scapello contenti sumus. Alij cucurbitulis vsi sunt vitreis, vt sanguinis qui vacuatur mēsurā in extractione pellucescat: verum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores vitreis, quæ faciliè dirumpuntur. Quinetiam quæ ex cornibus, ore sugentes trahunt, minus quidem inaniunt, non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis super, linamentum ex lucerna simul cum flamma inducamus, in cutem decidens illa, grauiter adurit, vsu hoc non postulante. Est cum cucurbitulæ magnitudo subiectæ parti adæquabitur, eaq; de causa permultum cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quemadmodum etiam collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahunt. Cauendum autem ne prope mamillas cucurbitula applicetur. nam illapsæ cucurbitulis nonnunquam mammæ & inturgescunt vehementer, haud faciliè ipsas relinquunt, atque tunc spongas ex calida cucurbitulis circumdare oportet, sic enim remittuntur: si minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

Quæ

Quomodo ala adurantur.

CAP. XLII.

Humeri articulo luxato in nonnullis caput frequenter & continuè excidit, vel humiditatis superantis vitio, vel quod continuæ luxationi opportunus locus euaserit, quando aduersionem descendere oportet. Proinde ægro, aut upino, aut in sanum latus inclinato, interiorem alæ cutem quâ potissimum articulus excidit, duobus sinistræ manus digitis, vel hamulis tenuibus & oblongis eleuatam, candenti ferro adurare oportet, quousque ferramentum ex aduerso inflexum vno impressu duas crustas excitat, & si magnum intercedens harum spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in medio crustam faciemus, adurentes usque dum ferramentum vrens scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta vtriusque distæ mediam fieri consulit, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ modo. Altius autem cute non penetrabimus, quod nerui, glandulæ, ac aliarum particulæ quæ inflammatione difficultatemque functionum, excitare possint, subiecta sint: curari vero adusta debent porro cum sale trito & imposito, tum aliis præfidiis ad crustas inscriptis, postea manu operandū cautè erit.

De adnatis digitis & sexto digito.

CAP. XLIII.

Adnaſcuntur digiti in manu nunc propè maiores digitos, nunc propè exiguos, raro autè visi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum vero qui adnaſcuntur, alij per totum carnosum sunt, alij ossa in se continent, nonnunquā & vngues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, illi ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est præcisio. nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumque os excisum aut erasum, aufertur. Cæterū inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus quemadmodum etiam in ossium vulneribus declaratum est.

Quomodo purulentis adustio adhibenda.

CAP. XLIIII.

Vstio efficacissimum purulentis præsidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: vnam inter clauiculæ compagem cute sursum educta. duas

B 5

autē exiguas iuxta mētū, sic vt ab arterijs quæ carotides appellātur, recedatur. Duas itē sub mamillis ampliores inter tertiam quartamq; costam, alias duas inter quintam & sextam paulūm in posteriora spectantes: aliam, per medium pectus: rursus aliam supra os ventriculi, tres posterius: per medium dorsum vnā, vtroq; spinæ latere duas, quæ in dorso factam crustam excedant non admodum extantes. Alii, vt tradit etiam Leonides, ferro mucronato candenti per medium costæ spatium vbi abscessus est, adacto, vsque ad pus vstionem moliti sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, transuersa linea inter quintam & sextam costam ducta, & cute paululum obliquē diuisa, deinde sic scalpello membrana quæ costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atque hi cum illis qui ferro vsque ad imum adurunt, aut statim mortem inferunt, vitali spiritu confertim vnā cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

De cancro.

CAP. XLV.

Cancer, tumor est inæqualis, oris prætumidis, aspectu ceter, liuidus, & indolens, interim sine vlcere, quē Hippocrates latentem nominauit: is si cureretur, peior euadit: interim exulceratus: nam cum ex atra bile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus quidem corporis partibus accidit, præcipuē fœminarum locis, & mammis, quæ venas vndiquaque turgidas habent, quemadmodum cancer animal pedes, vnde etiam nomen sortitus est. Quæ igitur per medicamenta curatio adhibetur, quarto volumine abundē explicata est: eius autem cancri qui vuluam infestat, tertio. Quoniam vero partes putrefactæ, aut quæ (vt simpliciter dicam) naturæ modum excesserunt, ablationem sui postulant: cancris autem vuluæ manus opera nec potest, nec vtile est ad moueri: eorum qui exteriora infestant, præcipuē māmās curandi administrationem trademus. Quidam enim totam partem vitiatam ferramentis candentibus absumunt: alij totam mammam præcisam adurunt. Galenus solam administrationem quæ per sectionem fit, recipiens, hoc modo scribit. Si quando cancrum scalpello curare audebis, incepisse vacuationem à melancholici humoris purgatione oportebit, vbi iam totum quod vitiatum est exactē præcideris, sic vt nulla radix superlīt, sanguinem effluere finito, nec celerius eum cohibebis,

s, verum etiam premendo vicinas venas, crassiores ex his sanguinem exprimes: deinde aliorum vlcerum modo curabis. Hæc quidem Galenus memoriæ prodidit. Reliqua vero maligna putridaque vlcera nempe phagedænas, gangrenas & consimilia eodem tractare modo debes.

De iis quibus mammae fœminarum modo inturgescunt.

CAP. XLVI.

Quemadmodum fœminis, ita masculis quoque; pubertatis tempore, mamillæ modicè inflantur sed plerisque rursus subsidunt, in nonnullis sumpto initio crescunt pinguedine subnascente. Cum itaque; indecora hæc corporis figura muliebris habitudinis notam repræsentet, digna est cui manus admoueat. Lunata per imam mamillæ partem linea ducitur cute detracta: ademptaque pinguedine, futuris committetur. At si fortè mamilla partibus ipsius ob magnitudinem ad ima, vt in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inuicè coeuntes inferemus, vt minor à maiore comprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter futuris vtemur. At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus adempto, futuras iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

Quomodo iecur aduratur.

CAP. XLVII.

Si dolor cum grauitate iis oboriatur quibus iecur vomica laborat, carnea ipsa substantia vitriata ostenditur. Si acutus dolor magis vrgeat, puris in tunica collectio: adurere hoc modo oportet. ferrum candens mucrone tenui, paulò supra inguen qua iecur desinit, iniicitur, vt crustam vnā excitet: Vbi vero totam cutem adusserit, & vsque ad tunicam penetrauerit, pus excernetur. Ab euacuatione phacomelite, hoc est, lenticula melle addito vtemur, tum iis quæ mulsa & speciebus ad carnem creandam componuntur: postea vero etiam cicatricem ducentibus.

Quomodo lien aduratur.

CAP. XLVIII.

Cutis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, vt vnico impressu duæ fiant crustæ idque faciemus ter, quò omnes crustas numero sex habeas. Marcellus autem tridente quam triænam Græci dicunt, aut tridentisimili ferramento vtens, vno adactu crustas excitauit.

Q^{uo}

Quomodo stomachus aduratur.

CAP. XLIX.

IN longis stomachi defluxionibus, recentiores vñ sunt a
duftione. Alij ferramentis candentibus mucronatis tre
crustas moluntur, vnam iuxta cartilaginem quæ ab enfi
figura Græcis vocatur xiphocides: alias duas inferius trian
guli figura, altas vt cutem diuidant: Alij vnam duntaxat ad
hibent, ampliorem supra ipsum os ventriculi. Sunt, qui ni
ferro quidem vrant, sed ifcis appellatis: sunt autem hæ spon
giofa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia
barbaris magis vñtata. permittunt autem vulnera sine cica
trice diu manere, inò etiam magis adhuc diuidunt, vt ma
iore per ipsa difflatu os ventriculi ab influxionibus immu
ne permaneat.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

CAP. L.

QUomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius
differetia, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium
tertio volumine sumus executi: vbi & demonstratum est
illud solum aquæ inter cutem genus quo veluti in vtrem
aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare.
Atque eam hoc loco explicabimus. Itaque rectus homo sta
tuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri
potest, attingi non debet, cum adeò sit inualidus. Stante re
cto homine ministris retro assistentibus, iubebimus vt tu
morem ad pubem digitis premat, depellatq;. Nos aculeo,
aut scalpello quo vena inciditur, si ex partibus iuxta inte
stina sitis originem contraxerit, directè sub vmbilico tribus
digitis interpositis inum abdomen adusque tenuem mem
branam quæ peritonæos vocatur, diuidemus. Sin autem
primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à siniste
riore vmbilici parte dissecabimus. si à liene vitium trahit
originem, in dextra. non enim in illa parte sectionem mo
liemur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie in
strumenti excoriata, membranam quæ finit abdomen, pe
ritonæos vocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad va
cuam vsque regionem penetrauerit. Deinde per foramen
abdominis, & peritonæi, aneam fistulam scriptoriis calamis
acie similem demitemus, & per hanc humor effundendus
est pro cuiusque virium ratione, quam ex pulsus tactu de
prehendemus. Deinde exempta fistula, humor sñi debet.
Asteretur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta.

At

nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreaque, per insequentem diem rursus momentum humoris tantum virtus exigit fistula euacuabimus, atque ita deinceps faciendum est, quousque minimum humoris supersit, ita tamen, ut ubique subitam cumulatamque vacuationem vitæ, multis siquidem imperitè manum admoliti vnà cum amore vitali etiam spiritu vacuato subito hominem iugurunt: qui vero securius rem agunt, modico humore educto, ut virtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, sole, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam vero vitione super stomachum, iecur, lienem, imum ventrem & umbilicum vsi sunt, quinque rustas adhibentes. Alij ferro tenui candenti: alij iscis nupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & plerique hac curandi ratione magis consanuerunt, interim nullam in totum compunctionem (quam paracentesis vocat) experti.

De umbilico prominente.

CAP. LI.

Umbilicus indecore prominere solet, quod vitium Græcè exomphalon dicitur, interim membrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauit, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluie otiosi humoris sub umbilico contracta, interim vero carne subnata, aliquando sanguine irruente, propter venæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurysmatis, interdum non sanguine, verum spiritu solum irruente. Si igitur momentum prociderit, circa umbilicum tumor concolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsum est, præter commemorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanescentque: nonnunquam strepitum elidens, balneis, & distentionibus magis increscit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autem non cedit, neque decrescit, neque tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneque subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadem in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hanc in modum curabitur: erecto homini iubemus ut spiritum contineat, quò in omnem partem distendatur: deinde omnem umbilici excre-

scere

scientiam orbiculatim atramento scriptorio notabimus, resupinatoq; homine scalpello tumorem, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde mediū hamo eleuatum, lino aut neruo quā exasperatio est, circum astringemus (hoc enim pacto continebitur ne deuoluatur) ansulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quem cōstrinximus iuxta verticem ad aperto digitum indicem demittimus, tentabimusque diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac siquidem intestinum fuerit relictum laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si vero omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est amputabimus, vase quod (vt verisimile est) coincidit, lino deligato: mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatus per incisionem cutis factam traiectamus, & ansulis linorū præcisis, quemadmodum in aneurysmate dictum est, ex quatuor initiis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintq;, medicamentis in linolea illitis curatio absoluetur, si cauam magis cicatricem fieri semper cupiamus. Hæc quidem ad omenti, aut intestini affectum pertinet. At si caro, aut humor, aut sanguis vitium crearit, tumoris medio circulatim præciso: deinde eo quod incumbit extra peritonæum, sublato, curationem carni generandæ dicatam tentabimus. Porro si vmbilicus emineat, aut ex vasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata.

De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulnata, item de intestini, aut omenti procidentia. vbi etiam tractatur, quomodo ventris vulnera sarciantur ex commentarijs Galeni. CAP. LII.

Quomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranæ vulnera optimè queas manu curare, deinceps vni considerandum. Si igitur paruum adeò vulnus extiterit vt inflatum iam quod procidit intestinum remittere nō liceat: necessariū est, aut flatum elicere, aut vulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possis. At qua magis ratione id consequare, quā si causam vnde intestinum inflatur, è medio sustuleris? Quæ igitur ea est? nimirum, ambientis nos aëris refrigeratio: quare etiam remedium ex calore petetur. Itaq; spongia molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Præparetur autem interea vinum austerrum

in calidum. etenim hoc magis quam aqua calefacit, ac
bur intestino adiicit. At si per hæc intestini inflatio non
cesserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod
incidit, opus habet. Idonea vero ad eiusmodi sectionem ha-
bentur scalpella recta quæ Græci syringotoma vocant, id
est, quæ ad fistulas incidendas sunt accommodata. Figura
item laboranti apposita fuerit, cum in inferiori parte vul-
nus factum est, si sursum vergat: cum in superioribus, si de-
orsum, & si in dextris vulnus sit, in contrariam partem cor-
pus incumbet, si in sinistris, in dextram, atque hoc tum ma-
nis, tum exiguis vulneribus commune est. Caterum cum
intestina in proprium reponi locum debent, ex magno vul-
nere collapsa ministro dextro opus est: oportet enim ipsum,
ubi manibus suis totum vulnus à foris apprehenderit, intro
repellere, constringere ac exiguum semper suenti denuda-
re: quinetiam id quod consutum est, mediocriter comprime-
re, quoad totum exactè persuatur. Porro quæ idonea suen-
ti abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniã coi-
re abdomen cum peritonæo conveniet, incipiendum qui-
dem à cute est, atque ab externo introrsus acus demittitur:
vbi iam & cutem, & rectum musculum totum transierit,
præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius
partem eam ab interno extrorsum, atq; inde per reliquum
abdomen traiectabis: vbi hoc penitus pertransierit, rursus
ab externo introrsum, idem abdomen perforandum est: mox
vbi peritonæum quod illi quoque adiacet præterieris, & ad
oppositum perveneris, id quoq; ab interno extrorsum per-
pungi, vnaq; cum eo totum ipsi coharens abdomen debet.
Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum opposito pe-
ritonæo consuendum. Ac rursus vicina etiam cute traiecta,
iterum ab ea parte acus introrsum est inicienda, consu-
endumq; id cum opposito peritonæo, inibi quoque vicina cute
transmissa: atque hæc iterum iterumq; facienda sunt, quo-
ad totum vulnus similiter consuerimus. Intervallum vero
suturarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet,
breuissimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem
requiritur, inter suturas cutis ne alibi rumpatur, vtiliter
breue non est. quare vitato vtriusq; excessu, eligenda medio-
critas est. Iam hoc quoq; omnium vlcerum commune quo-
dammodo est, sicuti etiam ipsius quo suuntur, sili ratio.

Quod

Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proximè oras summas acum transegerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum violenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis recesseris, non parum cutis inglutinatum relinquetur. Hæc licet omnium sint vlcera communia, maximè tamen seruanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, vt peritonæum abdomini coalescere possit: quod vix sperare audeas, cum neruosum existat: aut sicuti quidam facit, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, vtpote peritonæum peritonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A vicino nobis abdomine incipitur, atque ab externo introrsum per id solum acus traiectatur. post præteritis vtriusq; peritonæi labris, ex obiecta parte à foris introrsum per vtrunq; eius labrum acus reuocatur: dein hæc rursus reducitur, atq; ab interioribus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic modus à communi, & ex prompto, quo nimirum vno adactu per quatuor labra acus traiecitur, id differt, quòd peritonæum totum intra abdomen prorsus recondit. Ceterum medicamenta ad hæc idonea materiæ illius esse debent, cuius sunt ea quæ cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortij lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Præstiterit autem si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si vero nonnihil in ipsis quoque intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, vinum nigrum, austerum & tepens erit, eoq; magis si totum vsque ad interiorem meatum peritum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunum vero omnibus insanabile est, tum propter vasorum magnitudinem multitudinemq;, tum quòd tunica eius prætenuis neruosaq; existat. accedit huc quod etiam bilem sinceram totam recipiat: adde quòd omnium maximè iecori vicinum habeatur. Ventriculi porro imæ partes carnosæ vlcera curari cum fiducia debent, siquidem fieri potest vt res bene succedat, non solum quòd hæc crassiores sint, sed etiam quòd sedes medicamenti quæ illas curabunt, adhibendis in eo loco est accommodata. At vlcera quæ os & gulam infestant,

stant, solo transitu medicamenta attingunt: quæ autem orificium ipsius obsident, ij sensus quoq; in illo acutus sanationi aduersatur. Cum autem peritonæo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, fune exceptum antequam nigrescat, ne sanguis profundatur, præcidere conuenit id quod post vinculum habetur, atque ut in extremo inferiori iam commemoratæ abdominis futuræ vinculi fines pendeant, curabimus, quò scilicet faciliè eos cum ex vulnere suppurante eructentur, eximamus.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. CAP. LIII.

IN quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecori gratia duplicem administrationis modum excogitarunt, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur: nunc subtus interiorem cutem à glândis radice scalpello excoriantes, inde inferiorem trahentes, mox linteo quodam molli ambiens præputium deligantes, ita ut linteolum aliquod quæ cutis excoriata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, longiore ipsum oratione exponens. Nos autem summatim dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullam muniis obeundis difficultatem pariat, tum quod neq; tantum indecori afferat, ut hac magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit, vitium dicitur hypospadiæon. CAP. LIIII.

PLerisque glans ab origine non perforata est: verum sub cane appellato quæ glans suspensa est, foramen habetur: unde neq; urinam facere antèrius possunt, nisi particulam versus imam ventris regionem, admodum inclinent, neq; liberis dare operam, cum semen ipsorum in uterum rectè non possit eiaculari. Omnium itaq; simplicissimus tutissimisque curationis modus est qui fit per præcisionem. Itaq; resupinato homine glans sinistræ manus digitis validè attolletur: deinde scalpelli acie ipsa iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed sculpturæ simili, ut per medium eminentia quedam glandem repræsentans appareat. Quoniã verò sepe sanguis profundi solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus, tenuibus ferramentis aduremus.

C

DVplex phymi causa est: aliquando enim sic glandem præputium tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci nō potest. Hæc species propriè periphymosis dicitur. Prior itaq; differētia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex carnis incremento quæ illic coaluerit. Altera genitalium inflammationibus fertur accepta, quoties abducta cuti retrorsum glans intumuerit, nec ultra præputiū receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationem hoc pacto tētabimus: figurato homine, ut par est, præputium in anteriorem partem attrahemus, demissisq; in summū ipsum hamulis tribus, quaternisve, ministris continendum exhibebimus, iubentes, ipsum quantum fieri potest, diducant aperiantq;: deinde si ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte præputium in tribus quatuorve locis incidemus lineis directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus: est autem duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic enim contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea plumbeū canalem glandi vniuersæ circundabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Habeat autem canalis foramen vndique æquale. sic enim huius circumpositu præputium adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & à plumbo & papyro inuoluta distentū seruatur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciundum est, siue ob cicatricē, siue carnis excrescentiam phymo generato manū adhibuerimus. Sin autē periphymosis appellata creetur, vetustate tēporis coalescit, & curationē nō recipit, nisi quis eo modo velit tractare quem ad tegendā glandem vsurpamus. Sin autem nondū coaluerit, vibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiā pluribus circularim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum attrahemus.

Si præputium glandi adhærescit.

C A P. LVI.

GLans & præputiū inuicē cōmittuntur exulceratiōe præcedente. Cōuenit igitur subtus cute, quantū licet, excoriata;

riata, acie scalpelli, aut spathula polypo accommodata, ea que resistunt dissolvere, id potissimum conantes, ut glandem pure à præputio adhærescente discernamus: quod si non fuerit expeditum, glandis potius nonnihil ad præputium assumere, quam e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissuram dissolueris linteum tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, vino astringente cicatricem ipsis obducemus.

De circumcisis.

CAP. LVII.

Non de iis qui religioso gentium more circumciduntur, nunc verba faciemus: sed de iis quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaque in iis totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cum melle utendum, vel etiam malicorio & eruo medicamenti instar quod linteolis illinitur. Si verò sanguis quandoque profluat, ferramentis lunatis candentibus utendum, quæ utrisque simul iniiciantur, & ipsi sanguinis profluvio, & vulnere depascenti. At si tota interim glans absumpta fuerit, exiguum est plumbo canaliculum imponentes meatui, per ipsum ægroto urinam reddere iubebimus.

De thymis naturalium.

CAP. LVIII.

Thymi carnosæ sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio proveniunt. Ex his, alij maligni, alij non sunt. Mitiores itaque scalpelli acie deradere convenit, & chalcitidē ipsis inspergere: in malignis, eo quod vitiatum est, exciso, adustione utendum. At si ex opposito aduersusque sibi inuicem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, non oportet omnibus ipsis confestim manum admoliri, ne præputium structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed primum interiores auferre consilium est, iisque cicatrice obductis, tunc quoque exteriores aggredi. Nonnulli verò recentiorum forfice ipsos auellentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum alij refrigerato ferro candenti eosdem deurant.

De catheterismo, & clystere vesicæ.

CAP. LIX.

Cum urina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit, aut concreto intus sanguine, aut calculo, aut alia quadam causa, catheterismo id quod superfluum est eximemus. Sumpto igitur cathetere, ætati & sexui convenienti, probe ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua lino deli-

C 2

gata per mediū, linoq; ex acuto iunco per catheteris fistulā traducto lanā foramini adaptabimus, quod iuxta catheteris mucronem est, ac forfice præciso eo quod ex lana eminet, catheterem in oleum demitemus, egro in subsellium collocato, & fomentis si nihil prohibet, irrorato: catheterē in re-
ctū inferemus vsq; ad colis basim: deinde naturalia ad um-
bilicum inclinabimus. etenim ab hac parte obliquus vesicæ
meatus existit, deinde sic cathetera adigemus. Quum verò
iuxta regionē inter scrotum, & anum, propè sedem fuerit,
rursus genitalia imposito instrumento deflectemus, in na-
turalem reducentes figuram, nā à peritonæo vesicæ meatus
sursum tendit, propellemusque catheterem vsq; dum vesicæ
sinum penetrauerit: secundum hoc, linum catheteri iniectū
retrahemus, quò vrina simul cū lana attracta subsequatur,
quemadmodum in syphonibus accidit: atq; talis demittendi
catheteris modus est. At quia subinde exulcerata vesica col-
lui desiderat, siquidem auricularij clysteres, id quod inieci-
dum est possint transmittere, illis in prædictum modū vte-
mur, in vesicam demissis: si fieri nequit, catheteri pelle, aut
vesica bubula adaptata, eoq; indito, vesicam colluemus.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

C A P. L X.

CUm alibi demonstratum sit qua ex causa calculi gene-
rentur, tum, quòd pueris in vesica magis: prouectiori-
bus, in renibus crescant, nunc rationem exponemus, qua ex-
cindi possint, vbi notas prius eorum qui vesica habentur, de-
signauerimus. Vrina igitur aquosa est, quòd in eis subsidet,
arenosum: pundendum continuo vexatur pruritu, laxatur
sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irri-
tati ægri, & maximè pueri cum calculus in ceruicem vesicæ
incidit, etiā repentè vrina supprimitur. Porrò inter eos qui-
bus calculus excinditur, pueri quidem vsq; ad quatuordec-
cim annos propter corporum mollitudinē, faciliè curationē
recipiunt: senes, quòd corpus ipsorum contumax sit, vix cō-
sanescunt: mediæ horū ætates etiam in hoc, medio quodam
modo habent, ac rursus faciliè sanantur qui maiores calculos
habent, quòd inflammationibus assuerunt: qui minores, dif-
ficulter sanantur, cōtrarias ob causas. Hac cū ita se habeāt,
ad chirurgiā profecti, cōcussione vtemur prius, interim per
famulos, interim ipso ægroto ex alto quodā loco desilienti,
quò calculus ad vesicæ ceruicē propellatur, deinde figurari
æger

æger debet, ceu rectus in sedili, manibus subter femora por-
rectis, quò in angustum vesica compellatur. Si igitur còtin-
gentibus nobis calculus in regionem scroti & ani interme-
diam procidat còcussione exturbatus, inde ad sectionē con-
uertemur. Sin minus occurrat, indicem sinistrae manus digi-
tum, si puer sit qui ægrotat, vel etiam medium, si ætatis sit
prouectioris, oleo perunctum, in anum demitemus, & su-
pinis digitis perquirentes, calculūq; occurrentem paula-
tim traducentes, in vesicæ ceruicem coarctabimus: & digito
vno, pluribûsq; propellentes ipsum in exteriora, impactum,
ministro altero manibus vesicam premere iusso, alteri præ-
cipiemus dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra re-
gionem inter scrotum & anum mediā extendat in alteram
partē, ab ea qua sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello
ad calculos aptato, inter anū & testiculos, nō per mediū lo-
cū inter scrotū & anū, sed in alteram partē iuxta sinisteriorē
clunem obliquā super lapidem qui subiicitur incidendis, du-
cemus lineā, quæ extrinsecus latum habeat spatium, intus
non amplius, quā vt calculus per id queat excidere. Inte-
rim siquidem digitis super anum innixis, aut digito vnā cū
sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exi-
lerit, vnco huic rei accommodo, iniecto eximemus. Calcū-
lo iam ablato, medicamentis sanguinē coërcentibus ex fu-
ligine thuris, aloë, symphito, vel etiam misy, & consimilibus
sanguinis profusionem sistentes, lanas, aut linamenta impli-
cita, vino & oleo madentia imponemus, & ligaminibus sex
processuum ad calculos accommodatis vtemur. At si proflu-
uij sanguinis metus, sit linamentum implicitū ex posca, aut
rosaceo aqua admixta iniiciendū est, & egro decubente cre-
brius locum perfundemus. Postquam tertio die solueris, &
hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illi-
to vtendum, ita vt frequentius ipsos soluas, curēsque propter
vrinæ acrimoniā. At si inflammatio quæpiam superuenerit, ca-
taplasmatis & superfusionibus ad eam inscriptis adiuuabi-
mus, ac in vesicam rosaceum, aut chamæmelinum, aut buty-
rum nisi aliquā nos inflammatio impediāt, demitemus si-
militer etiam si vlcus pascendo, aut alio quodā modo serpat,
aut maleficū fuerit, singulis congruētia adaptabimus. cum
vlcus inflammatione caret, lauacrum adhibetur, inde em-
plastrum dia chylon, tum lumbis tum imo ventri super ac-

commodatur. Per totum vero curationis curriculum, femora inter se conuenit deligare, & cum remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli inciderit & per vrinam reddi nequeat, præputium validè in anteriora attractum deligabimus iuxta glandis summitatem, item posteriore parte pudendi colem vinciemus, iuxta terminum ad vesicam spectantem constrictione adhibita: deinde infra colem diuidemus, super lapidem ipsum qui excidendis subiicitur, flexo autem cole calculum eiiciemus, solutisq; vinculis vlcus sanguine concreto vacuabimus. Posterius itaq; vinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurrat: anterius, ne post calculum exemptum præputij soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

De testiculorum partibus.

CAP. LXI.

PArticularum quæ circa testes habentur, finitiones cum ad ramicum incidendorum doctrinam conferant prius describemus, quàm ad illam veniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulosa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nerui testium, quos Græci parastatas & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis genitales partes dependent, spinalis medullæ ex cerebri membrana propagines sunt, cum venis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Seminaria autem vasa, venæ sunt à caua vena in testiculos sinuosis anfractibus pertinentes, unde testiculi alimentum capiunt. item tunica erythroïdes naturæ neruosa, in gibba quidem parte, atque anteriori, à testiculo libera est: in concava & posteriore, ipsi adhærescit, ex peritoneo originem trahens. Vocant autem partem hanc qua testiculo adnata est, posteriorem prosphyfin, quasi dicas adnexam. Darti vero membranæ sunt, quæ exteriorem testiculum conglutinant, iuxta tunicam erythroïdem dictam ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autem ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon dicitur.

De aquoso ramice, hydrocele dicitur.

CAP. LXII.

Humoris ociosi in particulis scrotum implicantibus colluies, tumorem excitans sensibilem, hoc nomen sortita est. Itaq; humor magna ex parte, in tunica erythroïde appellata, testiculum ambiente, in partē anteriore colligitur,

tur, quàm potissimum membrana illa à testiculo separatur. Raro extra membranam hanc erythroïdem vitium contrahitur. Subinde peculiari tunica humor comprehenditur: vocantq; hoc malum chirurgici in superadnata ortū. Quare si ob causam præcedentē, exempli gratia, particularum imbecillitatem vitium oboriatur, sanguis alimenti ratione adductus, in aquosam serosamve, & inutilem substantiam mutatur: si ex istu, sanguinea, aut fæculenta substantia comprehenditur. Communis igitur nota est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandem occasione non evanescens, sed in iis qui modicū continēt humorē, cedēs: in illis qui copiosum habent, non item. Ac quibus in erythroïde tunica humor comprehensus est, tumor rotundus paululum, & oui modo longiusculus apparet. His testiculus in conspectum non venit, vt qui vndiquaque sit implicitus. Sin autem extra erythroïdem membranā sub dartis habeatur, propter paucitatem particularum occurrit. At si humor in membrana superadnata coierit propter contractionem ex omni parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhibet: & cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: cum autē fæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liuidus apparet. At cū in vtraq; scroti parte hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicē esse cognoscēs. hoc modo scalpello curantur: derafa pube & scroto, nī si puer fuerit, agrum super sedile resupinabimus, podici pāniculo multiplici subiecto, scroto autem spongia iustæ magnitudinis, ac sedentes à sinistra ægrotantis, ministro qui ad dextram sedebit, iubebimus vt genitale in alteram partem protendat, & cutem scroti ad abdomen eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta longitudinem vsq; ad pubem ferè recta linea incidemus, quæ vicina sit lineæ scrotum per mediū secanti, diuidemúsq; tunc tunicam erythroïdem. Porro si humor in adnata membrana hæreat, quàm veratex eiusdem tunicæ eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo autem oræ vulneris diducentur, & cultro ad hydrocelicos aptato scalpelloq; dartos detegemus, crudata vero erythroïdi, scalpello quo venæ incidi solent, mediā ipsam diuidemus, per illas potissimū partes, in quibus à testiculo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipsius portione in vase aliquo excreto, erythroïdē membranā hamulis eximemus,

quàm fieri licet tenuissimam ipsius partem. Inde verò Antyllus futuris & medicina cruentis accommodata vtitur: recentiores ea, quæ quòd carnem inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putredinem expertus aliòve modo vitiatu deprehendatur, vasa cum neruo, qui ab inguinibus dependet, cremastere dicto, fune excipiemus, ipsoq; cremastere præciso, testiculus eximetur. Item in iis qui duplici laborant ramice, similiter bifariam curationem moliemur, vtrinq; per scroti partes ad inguina lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionē deorsum ad scroti extremū demisso, ipsoq; scrotū attollentes, acuto scalp pro lineam qua humoris est emissarium, incidemus, vt & sanguinem concretum & pus per eā excernamus, ipso verò scalpelli mucrone linamētū in longitudinem implicitū superiori diuisioni inseremus, & vibicibus per spongiā deterfis lanam oleo madentem per sectionem infra ad testiculum, insinuabimus, extrinsecus alias lanas vino & oleo imbutas scroto, imo vētri, inguinibus, regioni inter scrotum & anum & lumbis superiniiciebus, ac vbi linamētum triplex super hęc implicitū deligauerimus vinculo in sex processus exporrecto, congruisq; fasciis, homo decumbet lanis scroto subiectis, vt cōquiescat, pellēq; super ipsas molli explicata, quo fomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calēte, vsq; ad triduū. post hoc vbi solueris, tetrapharmaco linteolis illito in vulnere, vteris, linamētū in longitudinē implicitū ex farina ceo polline superaccommodans, extrinsecus fomenta rursus propter inflammationē vsq; ad diem septimum iniiciuntur: inde medicamento quod linteolo seruetur vtemur. Vulnere expurgato, & carne iam mediocri obducta, deinceps etiam lauacris adhibitis linamentum in longitudinem implicitum auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente, quemadmodum prius explicatum est, vtemur. At si inflammatio quæpiam fuerit, aut sanguinis profluuium, aut aliquid eiusmodi interea superuenerit, conuenienter vnicuiq; occurrere conuenit, ne semel dicta iterum repetā. Si vero vstionem potius in aquoso ramice, sicut recentioribus visum est, adhibeamus, omnia quæ ante chirurgiam, & post eā dicta sunt, exequemur, ipsum vero chirurgiæ opus sine ferro tantū & diuisione per humoris emissarium fieri debet. Decem itaq; aut duodecim ferramētis literā græcorum

im r imitantibus, & duobus gladiolis primum scrotum
erro r referenti per medium aduremus, cultello autem,
ut cæco hamo membranas excoriantes ferramento enfi
mili, has ceu præcidentes, aduremus. Nudata vero tunica
erythroïde, facile autem cum alba & tenuis existat, cogno
itur, acie ferramenti instar r literæ facti perurentes hu
morem excernemus, postea totam ipsam detectam hamulis
tollentes, ferramento gladiolo simili auferemus.

De carnosò ramice & tophaceo.

CAP. LXIII.

Caro in particulis quæ scrotum implicant alibi succe
scens carnosum ramicem producit. Nascitur autem ea,
x causa latente, testiculo fluxionem scirrhumq; experto, aut
x ictu, aut imperita post ramicis succissionem curatione:
subsequitur autem hos color vbique sui similis cum duri
tia. Si autem tumor in scirrhum coaluerit, nullus nec color,
nec sensus adest: si malignus sit, dolor vrget punctorius. Ita
que manum admoventes ægro, figurabimus ipsum, sicut &
prius, diuidemusque similiter, & siquidem ex generata car
ne, vitium testiculi creatum sit, & darton membranam &
erythroïdem consimiliter discindemus, deinde testiculo ele
uato, eoque extra erythroïdem exempto, cremastere segre
gato à vasis, hæc quidem constringemus, illum vero nem
pe cremasterem amputabimus: testiculum autem qui cum
adnata carne coaluerit, ceu alienum eiiciemus. Sin hæc car
nis generatio in tunica aliqua, aut, vase fiat, scroto diuiso
subiectisq; carni membranis, totum quod in carnem con
creuit auferemus. quod si posterior commissura carne fue
rit obducta, iis quæ ambiunt ipsam ademptis testiculum si
mul cum ea excipiemus: quippe fieri nequit, vt testiculus si
ne hac permaneat. Caterum tophi & in testiculo & in mem
brana erythroïde occalescunt, renixu multo, duritie, & in
æqualitate à carnosò ramice & aquasò discreti. His igitur
manum sicut etiam carnosò ramici admoiemur.

De varicosò ramice & ventoso.

CAP. LXIII.

Vasa in scroto, aut dartis mēbranis, dilatata, varices sim
plici vocabulo nominant. Alia vero quæ testiculum
nutriunt, si varicum more dilatentur, varicosum ramicem,
Græci cirrocelen vitium nuncupant. Notæ horum euiden
tes sunt, quippe pars affecta tumidior, obliqua modicè vix
in modū, & testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnul

la in agendo difficultates maximè in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo curamus: vbi commodè ægrum figuraueris, scrotum manu permulcetur, neruus cremaster in partem inferiorem repellitur. Facile autem is dinoscitur, vt qui tenuior vasis sit, solidior, renitensq; ceu potens validusque: æger quoq; ad depressionem ipsius indolet, & iuxta colem turbatur: vasa autem digitis nostris & ministri excepta in scroto, validèq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentum quod vasis cedendis supponitur secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriatur. vasis vt in capite de angiologia & aneurysmatis disputatum est, denudatis, acus duplex linum trahens transmittitur: ansaq; lini abscisa, vasa & in prima ipsorum dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus, & per medium recta incisa linea, & sanguine qui coferat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, vt etiam funiculi cum vasis sua sponte excidant. Leonides autem præcipit, quod si aliqua ex vasis testiculû nutrientibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendum: sin autem omnia, testiculum cum ipsis capi oportere, ne vasis alentibus destitutus contabescat. Porro ventosus ramex, quum genere aneurysma existat, Leonidi quidè non attingendus videtur, propter periculum quod in varicibus ab incessabili sanguinis profluuiis accidit. Recetiores autem quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor vasis testiculum alentibus, alia ab arteriis danton membranam & scrotû intercurrentibus: hunc quidem ceu desperatæ salutis, repudiant: illum priorem scalpello curât. discernimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constrictionem euanescat, qui à venis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo metu. Caterum curamus ipsos, vt in varicosis ramicibus comprehensum est, singulas venas fune excipientes deligantesq;.

De intestinorum ramice.

CAP. LXV.

In intestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est cum intestina sunt in scrotum deuoluta: id quod sit aut peritonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. vtraq; igitur, ruptura (dico) & extensio ex violenta quadam occasione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, propriè & propter resolutionem, & alias corporis imbecillitates, accidit. Notè vtriq; com

communes sunt : conspicuus in scroto tumor : item quòd in
 exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisque occasionibus,
 tum maior quàm prius euadat : compressus, tardè quidè re-
 rrat, celeriter autem rursus deuoluatur, supernè intesti-
 num resupinatis in loco permaneat, donec erigantur. Ster-
 nus autem in scrotum receptum periculum subinde ipsis in-
 nit : dolent enim, nonnunquam etiam impressis digitis fo-
 tum elidunt. Peculiariora ramicis ad relaxationē relati indi-
 ca sunt, quòd non vna vice, sed particulatim temporis spa-
 tio, & quod ob causas quaslibet, nonnunquam intestinum
 deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, inte-
 rno quod deuolutum est, peritonæo constricto. Ex ruptu-
 facti ramicis signum est propriū, quòd vna vice ac subito
 initio intestinum deuoluatur, idq; ob causas violentas
 duntaxat : quòd tumor immensæ magnitudinis, inæqualis,
 & per summa protinus in cute emineat, quoniam intestina
 extra peritonæum elabuntur. Si igitur rupto peritonæo o-
 mentum duntaxat in scrotum inciderit, vitium omenti ra-
 nex, Græcis epiplocele appellatur : si intestinum quoq; de-
 abatur, omenti intestiniq; ramex, Græcè epiploënterocele
 dicitur : si vero & aqua in tunica erythroïde apparuerit, com-
 posita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Caterum neque
 hos, neq; ex ruptura intestinorum ramicem chirurgiæ sub-
 icimus, solum vero ex relaxatione ramicem intestini manu
 curamus, hunc in modum. homine resupinato & cute iuxta
 inguina per ministrum eleuata, transuersam lineam incidi-
 mus, vt in angiologia explicum est. Nonnulli verò non
 transuersam, sed rectam lineam ducunt, hamuloq; defixo di-
 uisionem explicant, quæ testiculum retractum mensura ad-
 æquet, deinde rursus tot hamulis per quartam cutem trans-
 missis quot vulneris magnitudini sufficiant, cæco hamo, aut
 cultro membranas & pinguedinem subtus exoriātes, scal-
 pello præcidimus. detecto autem vndequa; peritonæo, de-
 missoq; indice digito ad posteriorem scroti partem inter pe-
 ritonæum & dartum membranam, posteriorem connexum
 soluemus, deinde dextra manu extremum implicātes ad in-
 teriora scroti, simulq; sinistra peritonæum retrahentes ad di-
 uisionem retrahemus testiculum vnà cum membrana ery-
 throïde, ac ministro vni iubebimus testiculum eleuet, ipsi ve-
 rò posteriorem adnexum ex toto simul cum membrana
 erythr

erythroïde dissoluentes, explorabimus digitis num intestini inuolutio quædam in tunica erythroïde relicta sit, & infra hanc ad aluum propellemus, deinde acu bonæ magnitudinis linum ducente duplex, decies implicitum ad peritonæi terminum qui diuisionem respicit per medium transuemus. † Succis autem linis quatuor faciemus initia, atque his per vinculum rursus implicatis, vtrobiq; peritonæum valenter destringemus, iterumq; initiis circumuolutis, astringemus quidem strenuè, vt nullum ex vasis nutrientibus adhuc possit cedere ne inflammatio inde concitetur, item secundum extrinsecus vinculum iniiciemus minus quàm duos digitos à priori distans. Post hæc vincula digiti instar ex peritonæo relinquentes, totum ipsum orbiculatim præcidemus, auferentes simul nimirum & testiculum: rursus diuisione iuxta emissarium scroti adhibita, linamentum in longitudinem implicitum iniicitur, & fomentis oleo imbutis vinculisq; vt in aquosò ramice iniectis, omnia quæ restant, quemadmodum illic expositum est, perficiemus. Nonnullos autem non imperitos chirurgos noui, qui membrana erythroïde excisa, ferramentis candentibus extremum ipsius adurerent sanguinis profluuij metu, vt est verisimile. Hi autem ipsi post scalpelli administratione agros protinus in folio oblongo ligneo, cui aqua inesset calida ad septimum diem vsq; lauabant, quinquies per diem noctemq; id facientes, præsertim in pueris, & mirificè res processit: nam citra inflammationem ipsi secabant, & funiculi vnà cum corporibus protinus decidebant. Interea vero dum agri lauabant, prædictæ superfusiones iniiciebantur. Alius quispiam præter commemorata etiam pipere trito cum oleo ceruicem ipsorum eodem tempore infricabat.

† Hic locus sic legitur in veteri codice, κόψαντες δὲ τὸν διπλόω τῆς ἀρχῆς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χασμὸν ἀντεμπλέξαντες β' ἀμφοτέρων, id est, postquam sciderimus duplicatum linum quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex vtraque parte peritonæum validè constringamus.

De inguinum ramice, bubonocèle vocatur. CAP. LXVI.

Intestini ramicem ex relaxatione creatum, inguinum heria præcedit: primum enim peritonæo nimis intenso, intestinum laxatum tunc quidem in inguina abscedit, facitq; ramicem, quem Græci bubonocelen dicunt. Hunc vetustiores

res

in eum modum scalpello curant, linea transversa per in-
 na intumescencia, tres digitos longa inciditur. Hinc
 membrana & pinguedo eximuntur, aduerso autem specil-
 peritonæo per medium detecto qua fastigiatur adigi de-
 , id enim intestina in altum repellit. Itaque peritonæum
 us restitutum utrobique aduerso specillo, futuris inui-
 na commitemur, deinde specillum extrahemus, neq; pe-
 onæum pracidetes, neq; testiculum, neq; aliud quippiam
 inentes, sed præsidio cruentis idoneo persanantes. Quo-
 m vero recentiores vstionem potius in inguinum rami-
 bus probarunt, hanc quoque non præter institutum tra-
 mus. Homo mediocriter moueatur, tussi violenta, inten-
 one, spirituq; retento. vbi tumor in inguinibus apparue-
 , locum qui vri debet, atramento scriptorio aut collyrio,
 gura triangula circumscribemus, transversam lineam per
 guma sursum ducentes, iniiciemusq; signum per triangu-
 medium. postquam æger decubuerit, candens ferrum per
 mediam notam imprimemus, primum clauatum, inde per
 anguli costas Græce r literæ figuram representans, ter-
 o laterculari aut lenticulato totum triangulum adæqua-
 mus, ministro per totam vstionem saniem panniculo ex-
 ergente: tam altè vero aduremus quousque pinguedinem
 ertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neq; enim
 gracilibus ob siccitatem ferrum altius admouendum est,
 e imprudentes peritonæum aduramus, neq; tamen in cras-
 sioribus pinguioribusq;, in quibus vel ante iustam vstionem
 inguedo apparet: sed quantum vri conueniat artificiosa
 prehendemus coniectura. Secundum vstionem sal vnà
 um porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinario in lite-
 æx similitudinem ligamento utemur, per insequentes dies
 remediis crustam adumunt, nempe phacomelite & similibus
 curabimus.

De scroto attenuato, laxoq; attritorum panniculorum modo.

CAP. LXVII.

LAxata scroti cute sine interioribus ipsius particulis vi-
 rium maximè indecorum gignitur, quod Græci racosin
 appellant. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea su-
 perfluum erat scalpello super asserem, aut durum corium,
 quod incidendis subiicitur excidebat, orasq; vulneris futu-
 ris committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve
 futuris

futuris superfluam cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post suturas auferebat, suturisque adunitam ut cruenta curabat.

Quomodo fiant eunuchi.

CAP. LXVIII.

Cum ars nostra huc tendat, ut corpora à statu qui præter naturam est in naturalem deducat, eunuchos faciendi ratio, quam Græci eunuchismum dicunt, contraria promittit. verum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibusdam eunuchos facere cogimur, explicandus compendiosè modus est, quo illis satisfaciamus. duplex itaque est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidè in hunc modum. Pueri adhuc infantes in aquæ calidæ solium collocantur: deinde ubi corpora eodè solio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescant, dissoluti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotum cum testiculis sinistra manus digitis premitur: quo facto duas lineas rectas vnâ per alterum testiculum scalpello incides: ubi exilierint testiculi cute detracta excabuntur, ita ut tenuissimum solum naturale vasorum commercium relinquatur, atque hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionem testiculorum sunt experti, nonnunquam venerem appetunt, parte aliqua ut verisimile est testiculorum inter contundendum delitescente.

De hermaphroditis.

CAP. LXIX.

Hermaphroditon vitium ex compositione Mercurij, & Veneris appellatum est, multum utrique sexui adferens indecori. Cum enim quatuor Leonide autore differentiæ existant, tres quidem in viris, vna in mulieribus constituitur. In viris siquidem aliàs iuxta regionem inter scrotum, & anum, aliàs in medio scroto muliebris pudendi pilis obsiti forma apparet. Tertia vero ad hæc accedit in qua nonnulli veluti ex pudendo quod in scroto est urinam profundunt. In mulieribus supra pudendum iuxta pubem virile frequenter genitale inuenitur tribus quibusdam extantibus corporibus vno tanquam cole, duobus autem veluti testiculis. Tertia itaque virorum deformitas qua vrina per scrotum excernitur, curationem non recipit, reliquæ tres curantur corporibus superuacuis è medio sublatis & vlcera modo tractatis.

Quo

Quomodo nymphea excidenda sit, & cercosis emendanda.

CAP. LXX.

Aruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Græcorum lingua nymphe dicitur: quibusdam immensæ magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiæ notā præfert. Quemadmodum vero nonnulli memoriæ produnt, ut quæ hanc partem arrigunt, viris similiter, & in venem ruunt. Quapropter resupinata muliere vulsella nympheæ superfluum prehensum scalpello excindimus: diligenter adhibita ne altè ipsam penetremus: vnde fluidus affectus, rhyada vocant, excitetur. Porro cercosim, cum sit carnis ab vteri ore propago quæ muliebri pudendum repleat, interim foras caudæ modo procidat, nympheæ consimiliter uferemus.

De muliebrium locorum thymis condylomatis & hemorrhoidibus.

CAP. LXXI.

Thymus eminentia quædam est, nunc rubens, nunc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: condylomata vero, excrecentiæ sunt rugosæ, quemadmodum hemorrhoides iis quæ in ano sunt respondentes, intem & sanguinem profundunt. omnes itaq; eiusmodi in mulieribus excrecentias, quæ in conspectum veniunt, inter delegendum vulsella comprehensas, ferramenti quod ex dimidio spatham refert, acie excindemus, utemurq; galla læuigata, aut scisso alumine. Nam è lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

De non perforatis & phymo.

CAP. LXXII.

Genitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodam præcedente, aliàs in imo, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundum naturam aut ex obstructione. Quod autem foramen intersepit intercluditque, vel caro vel membrana est. Cæterum hoc mali graue sit impedimentum, modo in coitu, modo in conceptu vel puerperio, aliquando mensium purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam enim medium foramine patescit. Causa igitur inuenta, vel ex promptu, vel etiam demisso speculo, si quidem commissura solum fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin autem distentio, hamulis per medium corpus siue id membrana, siue

siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppresso, iis quæ cicatricem ducunt vtemur, pessarium aliquo cicatricem inducente vinctam subiicientes, in quibus potissimum non altè admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iam phymus in ostio vuluæ succrescens pari modo curatur.

De abscessu vuluæ.

C A P. L X X I I I.

VBi abscessus circa os vuluæ prouenerit qui manu tractari queat, non promptè ad sectionem properare consilium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbunt, attenuata, idq; propter vteri excellentiam. Inter agendum vero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicem diuicatis: cubiti ipsius sub poplitibus subiicientur, & funiculis congruentibus ad ceruicem deligabuntur, medicus autem ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptram dicunt ætati accommodato. conuenit autem specillo sinus muliebris altitudinem metiri, ne maiori speculi tridente, vterum premi contingat, & si amplior ille sinu reperiatur, linamenta implicita alis imponuntur, vt super ipsa speculum firmetur. Caterum conuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro demittere, & specillum à medico contineri, testulam à ministro conuerti, vt laminis tridentis diductus sinus aperiat. Iam vero si abscessus occurrens mollis & tenuis existat, qui digiti tactu subsidet, iuxta verticem diuidetur spatula, aut specillo: ori vuluæ pure vacuato, linamentum in longitudinem implicitum, lemniscon dicunt, tenerimum ex oleo rosaceo imponetur, vel potius extra diuisionem sinui muliebri sine compulso inseretur. Extra vero summas oras & super pectinem lumbosq; lanæ succidæ aut puræ, oleo madentes accommodabuntur. Tertio die insidebit mulier in hydrelæum calidum, aut maluæ decoctum: abstergis sudoribus linamentum in longitudinem implicitum in fissuram tetrapharmaco per se, vel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis: erit autem solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplasmatibus obducetur dum inflammatio cessauerit, & vulua abscessu purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui debet auriculario clyster
re ex

e ex iridis decocto, aut aristolochie, aut melle. Cicatrix duri debet emplastro ex cadmia, soluto vino, per linamentum madidum. At si intra os vuluæ abscessus fuerit, attingi non lebet.

Qua ratione partus ex utero excutiat excidaturq;.

CAP. LXXIIII.

Quomodo a grè parienti succurratur tertio volumine tradidimus: si autem eo nihil proficiatur, ad chirurgiam merito diuertimus, id primū notantes, mulier superstes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc manū admolieremur: si contrā, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate ut in lethargo sopiuntur, resolutæ sunt, & vix possunt excitari, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui sopore premuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis commouentur, aut alimentum nō sentiunt, pulsus validè inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis: quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierē in lecto sic collocare, ut figura ipsius magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres vtrinq; contineant, aut quædam ministræ. Si verò non adfuerint, mulieris thoracem vinculis quibusdam lectulo adfirmabunt, ut ne corpus, attrahentes sequens, tractionis vim dissoluat, ac alis vuluæ diductis, per ministrum + sinistram manum contractam cū valentibus digitis extenuatis, in ostiolū inseremus, idēq; pertentabimus, & oleo infuso relaxabimus, disquirentes vbi vncum quo fœtus extrahetur, desigi conueniat. Idonei verò loci sunt quibus iniicietur, si in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentum, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, adhæc præcordia, quæ Græci hypochondria appellant: si in pedes conuertitur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus & deinde vncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis occultato, sinistra manu leniter inseremus, & particulæ cuiuspiam ex prædictis vsque ad vacua transmittemus. huic alter opponetur, quo attractio recta procedat, neq; alterā in partem inclinet, deinde æqualiter trahetur non solum recta, sed etiam in latera, quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterum non cōuenit, postea verò indicem

D

digitum vinctum, aut etiam plures demissos inter os vulvae & corpus impactum, orbiculatim circumagere, veluti ex-
 coriando: si autem iuxta rationem vncus subsequatur, in
 superiora transferre conueniet, atq; sic agere dum perfe-
 cta foetus sit extractio. Si autem manus obiecta fuerit, nec
 propter obstructionem queat conuerti, circumposito pan-
 ticulo, ne reuoluatur, modicè attrahere oportet, ac pro-
 lapsam totam ab humero abscindere, idemq; facere etiam si
 duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes,
 corpore reliquo non subsequente, ab inguinibus amputari
 oportet: deinde reliquum corpus dirigere conandum. At
 si caput iusto maius obstructionem pariat, & hydrocephal-
 on sit, id est, aquam in capite infans collegerit, spatula po-
 lypis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomachæ-
 rion dicitur, inter digitos occultato, caluariam diuidemus
 vt vacuata concidat. quòd si naturaliter amplum sit caput,
 similiter diuisam caluariam forspice qua dentes aut ossa ex-
 trahuntur, comprimemus. Si ossa emineant, hæc quoq;
 auferre ratio est. At si capite ad thoracem adacto, obstru-
 ctio prouenerit, eodem instrumento clauicularum compa-
 ges vsq; ad interiora spatia diuidentur, vt humore vacuato
 thorax concidat & collabatur: quòd si non concidat, diui-
 sas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc enim collabe-
 tur. Porro si imus venter mortuo foetu sit inflatus, aut a-
 quam subter cutem collegerit, eadem ratione ac via eum
 vacuare cum ipsis interaneis aggrediemur. Caterum si in pe-
 des deferuntur, foetus declinati facile ad vteri os dirigun-
 tur: quòd si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus,
 linamento ipsum attrahemus, eodemq; modo ea quæ am-
 biunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora
 reuersum inhæserit firmiter, sinistra manus demitteretur in
 vterum, & si os ipsius pateat, manum in ima transferemus,
 ac caput inuestigatum digitis ad os deuoluemus: deinde vn-
 cum vnum aut alterum defigentes, propter orificij inflam-
 mationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus co-
 piofisq; vtemur: item insensibus, fomentis, & cataplasma-
 tis, vt diducto ore auferatur, quemadmodum superius com-
 prehensum est. Porro latera foetus, si quidem in rectum
 diriguntur, prædictis vtemur rationibus: sin minus, to-
 tum ipsum intus dissectum particulatim eximemus, cura
 adhibita,

dhibita, ne particula quæpiam ipsius nobis nescijs intus elinquatur. Postquam manu scalpelloque administratio-
em obierimus, remedijs ad inflammationem inscriptis
tendum est. quod si profluuium sanguinis oboriatur, huius
quoque curationem accepisti.

† Huius loci multò verior est scriptura in veteri codice, *πὺ ἐνὸν-
ου χῆρα συνῶν; ἄλλω μετ' ἐνὸντων ἀκρίβην καὶ πρὸς ἀλγὸν*, id
est, dextram manum contractam cum fortibus digitis pingui aliquo
unctam &c.

Si secunda fuerint relicta.

CAP. LXXV.

Fœtu excusso frequenter accidit, ut velamentum il-
lius in utero firmiter adhærescat, quod nostri secun-
das, Græci chorion, & deuterion appellant. Diducto igitur
vulvæ ostio, secundæ quæ inibi relictae sunt, & in partem
aliquam orbiculatim conuersæ, facile educuntur. Manu
siquidem sinistra calida, inuncta quoque in fundum demissa, se-
cundas sublabentes oportet eiicere. Si autem fundo uteri
fuerint adnatæ, demissa similiter manu comprehendentes
tendemus, neque in rectum, ne vulva procidat, neque vio-
lenter admodum, sed leniter primum deducemus, huc il-
luc circumagentes, deinde paulo valentius. hoc enim pa-
cto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quod si vulvæ
os conuiere fuerit deprehensum, remedijs ad hoc com-
memoratis utendum est. Si vires non fuerint inualidæ, etiam
ijs quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex-
festili vaporari conueniet: & si os uteri diductum sit, manu
inserta, secundas ut dictum est extrahere conabimur. At si
ne sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet, se-
cundum paucos enim dies putrefactæ & in saniem resolutæ
excidunt. Quia verò grauitate odoris & caput opplent &
stomachum peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur:
ad eos autem cardamomum & ficus aridæ commendantur.

Quomodo coxendices adurantur.

CAP. LXXVI.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter hu-
miditatis copiam nonnullis excidens, vstionē postu-
lat, quod Hippocrates his verbis testatur. Quibus coxa ex
diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, citius contabe-
scit & claudi fiunt, nisi vstionem experiantur. Conuenit

D 2

igitur tunc illum præsertim locum adurere, è quo articulus excidit: sic enim humor redundans desiccabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suscipiet, quare etiam penitius illic vstionem moliri conuenit. Recentiores autem tres crustas adhibent, vnam retro vrentes in acetabuli sinu, alteram supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talum, quæ est carnosior.

De fistulis & fauis.

C A P. L X X V I I.

Cum locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis verba facere. Itaque fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis, magna verò parte ex abscessibus oritur parum dextrè curatis. Callus autem continua quædam caro est, albida, madoris expers eoque etiam doloris, neq; vena, neq; neruo ad ipsum pertinente. Interim sinus siccus, interim humidus est, nunc humor incōtinenter fluit, nunc certis quibusdam temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaperto. Aliàs fistulæ in os desinunt, aliàs in neruum, aut aliam quampiam principem particulam, vel rectè intus tendentes, vel oblique, item vel vno ore, vel pluribus peruiæ. Quæ igitur in grandes arterias aut neruos, aut tendines notatu dignos, aut membranam costas succingentem, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequaquam, vel certe, cum artificiosaq; diligentia attingere debemus reliquis hunc in modum manum admoliemur. primum tentabimus, si quidem rectè intus tendant, cultro excisorio: si oblique, specillo duplici cuspede, flexili. Huiusmodi autem sunt quæ ex stagno fiunt, item ex are tenuissima. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, notationi per specillum non obtemperantes, sinu per vnum ipsius orificiū adusto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus, num vna fistula sit pluribus oris dehiscens, an plures: ac vbi tentatum est, siquidē per summa habeatur sinus, artusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cōmodiore callum tollemus, aut vnguibus, aut acie scalpri deradentes: at si latitudinem habeat, corpora superflua, tolli debent: sin autem non summa occupauerit, sed penitius rectè tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totum callum auferemus: quod si reliquæ ipsius aliquæ remanserint, medicamento adurente eas consumemus, quod
si amp

si amplius quam sit medicamento non cedat, ferrò candente crustas ei inducemus. Cæterum si fistula in os terminatur, hoc idem quod integrum est, duntaxat rademus: vbi verò cariem aliãve quandã corruptionem experitur, quod vitiatum est, totum excisoriis, aciem inter sese oppositam habentibus tollemus, si opus sit, prius terebra perforatũ, siue ad perspiratum duntaxat, siue ad medullam vsque fuerit vitiatum. At si os quoq; emineat, caulis modo porrectum, serra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duobus loris, vnus quidẽ medium ossi eminenti subiiciemus, ipsumq; per ministrum attollemus: alterius autẽ quod crassius est, vel ex lana quoque factum, similiter medium carni quæ ossi subiacer adaptantes, initiaq; infrà prehendentes, per ipsum lorum carnẽ deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa serræ dentibus perradatur, atque hoc pacto nos excretionem molimur. Vbi verò particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gratia, membrana costas inuoluens aut spinalis medulla aut eiusmodi aliqua, inter excidendum aut serrâ concutiendum os, laminam, quæ quòd membranã cerebri custodit meningo-philax græcè dicitur, subiiciemus: non vitiato autem ossẽ, totum orbiculatim carne nudum serra eodem modo dera- detur. Fieri nanque haud potest, vt ossa circulatim implici- ta carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope articulum fuerit vitiatus, idã serra auferri debet. At si totũ subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totum adimetur. Femoris autẽ caput, aut coxa, aut spinalis medullæ vertebra affecta, attingi nõ debet, periculi quod ex arteriis adiacentibus accidit eui- tandi gratia. Hoc igitur modo ac via faciendum est, in sin- gulis vbique particularum vitiatarum situ, vicinitate, & na- turæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & labo- rantis viriũ robore considerato. Cerion autem, hoc est fau- quum sinus sit fistulosus, mellea diffluens humiditate, ean- dem administrationem curationemq; cum fistulis & aliis si- nibus requirit.

De am fistulis.

CAP.

LXXVII.

A Ni fistulæ latentes quidẽ notantur inde quòd ore non apparente dolor ipsis oboriat, & purulenta humidi- tas per anũ profundatur. Plurimis abscessus quoque indicia præcesserunt: manifestæ autẽ cultro excisorio, aut seta por-

cina demissa noscuntur. Nam instrumentū ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissio occurrit, fistula nimirū ad interiora perforata. At in iis quæ perforatæ non sunt, instrumentum digito, nō statim occurrit, sed obstat in medio corpus nō perforatum. Tortuosas autem & labyrinthi modo flexuosas agnoscas inde, quod instrumentum paululum procedat, pus autē ad illarum portionē copiosum efferatur. At quæ prope intestinum oriuntur fistulæ, agnitionem sui præbent, quod nonnunquā & lumbrici & stercus per orificiū erumpat. In omnibus autem ferē callus aliquis in orificio prominet. Itaq; fistula insanabilis est, quæ vesicæ ceruicem perforauerit, aut quæ ad femoris articulū sit, aut quæ ad ipsum longanone tēdat. Aegrē verò cōsanescit, quæ orificio caret, tū quæ delitescit & in os terminatur, multifariāmq; fissā est: reliquæ in vniuersum faciliē curantur, administratione hunc in modū adhibita: resupinato homine, ut cruribus sursum porrectis femora ad ventrē inclinet, quemadmodū fit in iis quibus clyster in aluum mittitur, si fistulæ extremū in summo occurrit, culter, aut auricularū specillum per orificiū demittitur, subiectaq; cutis simplici linea exciditur: si autem altē intra sedem fistulæ terminus finiat, demisso per orificium cultello, siquidē perforatam ipsam inuenerimus, demisso iuxta oppositam affecto ano manum indice digito, eiusdem cultelli initium adigētes & deflectentes, ipsum foras reducemus, ac corpora quæ incumbunt cultello, simplici diuisione liberabimus. At si nondum fistula perforata reperiatur, in altum vero ani dūtaxat terminetur, & tentantibus nobis indici digito occurrat, corpus intercedens cum squamosum membraneumq; sit, vehementius mucrone cultelli perforabimus, traductoq; per sedem cultro, rursus scalpello corpora quæ ei incumbunt dissoluemus, quemadmodum prius explicatum est. Si igitur terebræ aut scalpelli ad fistulas accomodati acie sinus fundum iuxta sedem perforauerimus, ipsum instrumentum per anum inserentes, illinc totum quod interiacet acie terebelli pertundemus, & post excisionem vulsella aut forfice corpora diuisionem ambientia (calli autem sunt) prehensa ex toto adimemus, musculum qui anum constringit, sphincter dicitur, ubiq; vitantes. Nonnulli siquidem rudius dum in alto sectionem molirentur, ipsum conuulnerarunt, atq; inde inuoluntaria sterco-
ris

is excretio homini accidit. At si qui timidiusculi chirurgiam fugiant, Hippocratica uti debent è lino deligatura. lubet siquidem Hippocrates, linum quintuplex crudum cultro forato vel specillo per fistulam demittere, & lini principia coniungi, ac quotidie constringi donec corpus totum quod duabus oris intercedit, dissectum, linum eructet. Si vetustate malum contraxerit, quum dissolues, etiam psaro aut eiusmodi quodam arido illito linum oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicata insertum linum iuxta prædictam rationem propellunt, quod meo iudicio non conuenit. Dum enim chirurgiam vitant, præter quod hanc requirunt, etiam curationem remorantur. de latentibus autem fistulis Leonides hunc in modum tradit. Cum autem alta pars stringentis anum musculi in fistulam dehiscit, quæ vel à sede incipiat, vel longius procedat, post notas indicatas, disquiretur instrumento quod ad sedem diducendam sit aptatum. dico autem exiguo per specillo quod Græci dioprion appellant, anum ut muliebrem sinum, distendi. At cum fistulæ os clarè apparuerit, per ipsum specilli mucro demittetur, propelleturq; in anum: lamina vero subiecta tota fistula super eam diuidetur semispathula aut spatha fistulis incidendis peculiari. Nos autem cum in talem incidissemus affectum, hoc administrationis modo uti non potuimus, quod ductus fistulæ in conspectum non veniret. Nam inter anum & eius fibulam dextra parte sita erat, instrumentum verò quod ei diducendæ erat impositum, magis operationem adumbrabat: at per digitos distendentibus anum nobis, rima quædam inter vnam quandam ani rugam ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandem vero cultelli mucronem in fistulam demittebamus ceu manu ab ea ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fibulæ inserto, cum inuenissemus quoddam inter digitum & instrumentum, tenue corpus, cumque violentius cultellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum conuersum perforauimus, vbi iam digito mucronem instrumenti foras traiectissemus, conspicuum nobis factum totum corpus quod inter fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad humoris emissarium sita erant, & ea quæ nunc à nobis facta sunt scalpello præcidentes dissoluimus.

De hæmorrhoidibus.

CAP. LXXIX.

CVM hæmorrhoidum notæ ex ipso quod vacuatur innotuerint, antequam manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanientes, simul & anum, ut promptius interuertatur & extrema ipsius pars exeat, irritantes. Resupinato igitur ægrotate aduersus lumen clarum, siquidē constrictione usi fuerimus, linum quintuplex ferramento quo ora venarum in ano extantia aduruntur, vel quo vuæ, labris hæmorrhoidum circumponentes vnamquamq; hoc fune astringemus, vna duntaxat relicta, qua sanguis superfluus emanet, quod etiā Hippocrates præcipit. Post astrictionem linamēto implicito oleo madente, & ad sedem accommodato ligamine, usi, ægro quietem indicemus, oleo tepido, aut mulsæ ventri medicantes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint vino cicatrix ducitur. Leonides autem nō è lino deligat, sed forcipe prehensas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, fuligine thuris utendum & amylo, chalcitide, vel eo medicamento quod vsta spongia simul & pice constat, item pastillo faustino ad absolutam adustionem. Alij vero instrumenti quo vuæ vruntur, concauo, medicamine quod adurat repleto, quemadmodum vuam, sic etiam hæmorrhoidas vsserunt.

De condylomatis, tuberculis, & rimis.

CAP. LXXX.

ANI condyloma loco solum ab eo quod muliebres locos infestat, differt, rugosa & ipsa sedis excrescētia, aut inflammatione, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Per initia itaq; tuberculum appellatur: cum occalescit autem, condyloma: quare cōuenit, hæc quoq;, quæadmodū illa, vulsella apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curationem absolueri. rimas autem à stercore potissimum indurescentes, & quia dum cicatrix generatur, occalescunt, inueterascuntq;, recentes, faciemus, vel vnguibus vel scalpello radentes & cicatricē ut par est, inducemus.

De ano non perforato.

CAP. LXXXI.

PVERIS recens natis, anus ex natura non perforatus interim inuenitur, mēbrana videlicet obstructus. hæc igitur si fieri potest, digitis ipsis dirumpetur: sin minus, acie scalpelli eam excidentes, vino curabimus. Quoniam vero & prouectis subinde ob vlcus non dextrè curatum anus committitur,

itur, conuenit hanc vnitionem instrumento conuenienti
irruptam curare, fistula plumbea, aut obturamine quodam
no vsq; dum in totum consanescat, commodè imposito, ne
rursus coalescat. Porro obturamentum medicamine quo-
am cicatricem ducente oblini debet.

Quomodo varices excindantur.

CAP. LXXXII.

Varix venæ dilatatio est, aliquando in temporibus, ali-
quando in ima ventris parte sub vmbilico, nonnunquā
etiam circa testiculos, sed maximè in cruribus. Hic igitur
originem plurima parte ex materia melancholica trahit. eo-
rum autem qui testiculis oboriuntur curationem per scal-
pellum iam in capite de varicum ramice tradidimus, atq;
his similiter crura infestantes aggrediemur, ab interiori fe-
moris parte incipientes, vbi etiam origo ipsorum magna ex
parte inuenitur. inferius enim, in plures distributi propagi-
nes difficilius tractantur. Loto igitur homine, funiculum su-
periori femoris regioni circundamus, iubemusq; vt inam-
bulet. inde repletam venam atramento scriptorio aut colly-
rio notabimus iuxta varicis sitū trium digitorum, aut pau-
lò ampliori spatio interposito, decumbente agro cruribus
extentis, alterum funiculum supra genu iniiciemus. Elata
autem in tumorem vena, scalpellum adigimus, quā atramē-
ti nota est, tam altè, vt cutē duntaxat scalpellū penetret, ne
venam diuidamus. vbi oras vulneris hamulis diduxerimus
& membranas cultro inflexo ad ramicem aquosum accom-
modo excorauerimus, vena detecta & vndiquaq; explicata
femoris ligamēta soluemus, vase per cecū hamum suspēso,
acum duplex linum trahentem subiiciemus, plexumq; lini
amputabimus, & diuisa scalpello per medium vena, detra-
hemus sanguinis quantum vsus postulat: deinde funiculo
superiorem vasīs partem constringentes, erectūque crus
elevantes manuum expressū, sanguinem qui in crure est
euacuabimus: deinde infrā rursus vas deuincientes, vel id ve-
næ quod inter vincula est, abscisum tollemus, aut manere
id sinemus vsque dum sua sponte cum funibus excidat, &
vulnere siccis linamentis oppleto, splenium vino & oleo
madens, iniectum deligabimus, medicamentoque ad pus
faciendum apto quod linteolis illinatur per sanabimus. No-
ui autem veteres nonnullos, funibus non vsos: alios inde
vas denudatum excindere: alios altè ipsum eleuatū cum

D 5

violentia extrahere abruptentes. Verum omnium tutissimus chirurgiae modus est, quem supra diximus. Porro varices in imo ventris suborientes consimiliter tractabimus: item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angilogia comprehensum est.

De dracunculo.

CAP. LXXXIII.

DE dracunculo quomodo medicamentis potissimum emendetur, quarto libro peregrimus.

De extremarum partium praecisione, acroteriasmon appellant.

CAP. LXXXIII.

Summis partibus nonnunquam putredine consumptis, nempe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, vel ex causa exterius adueniente, fracta, vel etiam ex interiore causa putredinem experta, & ferrula praecidi postulent, ante hanc necesse est corpora ossibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio ferrae administratio peragitur, sanguinis profluvij metus subsequitur, recte Leonides non omnia primum corpora praescindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed partem, ubi non plures neque grandiores esse venas aut arterias existimet principio celeriter usque ad os resecat, deinde os protinus serra praescindet, panniculum lineum partibus sectis circumponens, ne serra per ipsa tracta dolores pariat. Atque tunc reliqua parte excisa, ferramenta candentia vasis iniicito, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitur quod pus moueat.

De vnguium pterigys.

CAP. LXXXV.

Pterygium in vnguibus carnis incrementum est partem vnguis operiens. Fit autem in pedis manusque potissimum pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerumque; in manibus autem, ex neglecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus dico, spatio temporis vnguis radicem exedit, ipsumque corrumpit, subinde totum abolet, saepe medium vnguis admodum infestat. Iuxta vnguis autem radicem ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam, aliquando totam radicem a rosione immunem relinquit. Est quum & os corrumpat, odor adatur grauis, digitus per summa dilatetur magisque liueat. his igitur manus debet admo-
ueri, ita ut totam vnguis partem relictam acie scalpelli resecemus

mus auferamusq; , deinde exulceratam incisamq; partem
rramentis aduramus. Etenim pterygium genere depastio
t, quæ nome Græcè dicitur, neq; subsidet, nisi adustum, a-
eoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si osse & vngui
tio immunibus, exterior vnguis angulus qui delitescit, &
rnem ipsi agnatam pungit, & inflammationem excitat,
onuenit pungentem vnguis particulam tenui cultro aut
usmodi quodam subiecto sublimen eleuatam, acie scal-
elli adimere, & quod eminet medicamento crustis faciun-
is idoueo consumere. Plerique hoc modo administrationis
on sanuerunt. Si amplius fuerit vitium primùm scalpello
rcum adimemus, mox remedium ex medicamentis pe-
emus.

De vngue contuso.

CAP. LXXXVI.

QUoniam vero subinde ex ictu vnguibus contusis dolo-
res subsequuntur, qui ad manus operationem nos
ertrahant, satis est Galeni verba hic apposuisse, quæ sonant
hunc modum. Vnguibus contusis præsens planè reme-
ium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem ex-
erti sumus, quum pulsus doloresq; vehementissimi obo-
iuntur. Ceterum linea obliqua, non recta in imum, supernè
leorsum scalpello acuto debet incidi, vt sanie excreta, secta
æ vnguis particula veluti operculum quoddam subiacen-
ium efficiatur. At si in rectum supernè deorsum lineam du-
xeris carnis excrecentia quam Græci *ὑπερσάρκωσις* vocant,
diuersum nimirum corpus à carne quæ vngui subiicitur per
mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus do-
loresprehendūt, quos in reduuiis nominauimus, carne quæ
sub vngue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi
sectione dolorem protinus agro adimi videre licet, per dies
insequentes commodū est, nobis subsectam vnguis carnem
leuiter attollentibus, vnguis saniem excernere, ac rursus
subiectæ carni quemadmodum dixi, vnguem operculi mo-
do imponere: reliqua vero digiti totius medicina vti conue-
nit quæ leniat, discutiâtq;.

De clauis, myrmeciji, & verrucis.

CAP. LXXXVII.

Clauus rotundus callus est, coloris cādidi, clauorū capi-
tibus similis: toto corpore, sed pedū solo digitisq; præci-
puè enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentū. Ita-
que circumscribitur vulsellaq; apprehensus, scalpro acutæ
acici

aciei, aut quo venæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro vtuntur. Myrmecia verò cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundum, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoque totum corpus, præsertim autem manus infestat. nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt veterum galorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta, ex basi myrmeciæ auferre. Alij ærea aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam vulsellâq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At verruca, quæ acrochordon græcè dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, vt suspensa esse videatur. Nominata vero sic est, quòd chordæ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltem aut pilo deligabimus. Noui plerosque & has & prædictas omnes excrescentias ferramento extincto, vt dicunt, consumpsisse.

De telis è corpore extrahendis.

CAP. LXXXVIII.

CHirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maxime necessariam esse poëta Homerus his versibus innuit.

Vir medicus multis alijs præstantior, vt quæ

Corpore tela trahens, medicamine vulnera curet.

PRIMUM itaq; telorum differentia enumerari debent. differunt autem tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, viribus. Materia quidē quatenus hastilia aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa vero tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut vitrea, aut ossea: aut arundinea, vel etiā eadem linea, tot enim differentiæ potissimum apud Aegyptios reperiuntur. figura autem, quatenus alia sunt rotunda, talia vngulosa, nepe triangula, alia sulcata quæ & gonchota dicuntur, alia trifulca, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carent. ac cuspidatorū, hæc cuspides posteriora spectantes habent, vt dum extrahuntur contra defigantur: illa in anteriora, vt propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, vt dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, contractas, quæ dum

in

in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine variant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut vnum digitum æquent, quæ sanè & myiata apud Aegyptios vocantur, alia medium inter hæc locum occupant. Numero autem quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia concavum: ac quædam firmiter ligno infixæ sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus veneno quædam sunt oblita, quædam non. Atque hæc sunt telorum discrimina. Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulneratis, & in bello, & extra bellum, sponte, & inuito, quacunque occasione, ac qualibet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne extrahuntur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus enim per summa telum impactum est, euulsione eximi debet. similiter etiam quæ altè inhaerent, obiectæ vero partes si conuulnerentur, sanguinis profluvio aut dolore ex consortij lege periclitantur. At propulsatu utimur in quibus altè telum infixum est, & partes obiectæ breue spatium continent, neque nervus, neque os, neque eiusmodi aliquod diuisionem impedit: osse autè conuulnerato euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuum fuerit, inde extractionem moliemur: si occultatum est, conuenit autore Hippocrate, modò vulneratus possit, in ea figura constitutum nosse, in qua etiam vulneratus est: si non possit, iacentis certè quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus. & si quidem in carne fixum est telum, manibus extrahemus, aut eius hastili quod etiam attracton appellant, nisi exciderit, ligneumq; id potissimum sit: si excidat forcipe qua dentes radicésve, euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo belulcum Græci vocant, aut alio quopiam instrumento accommodo, extractionem moliemur, nonnunquam etiam carnem prius incidentes, si vulnus instrumentum non recipiat. At si etiam in opposita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi quæ infixum est, diuisis iis quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes ut dictum est, vel per eam partem in quam retendit propellentes, vel si hastile exciderit, demisso instru-
ment

mento propulsorio ita ut neruum, aut tendinem aut arteriam, aut eiusmodi aliquod necessarium vitemus, protrudere oportet. turpe siquidem est, dum telum extrahimus, peius eo malum efficere. Et siquidem caudatū telum sit (hoc autē specillo deprehendemus) fœmina propulsorii instrumenti demissa accommodataq; telum propellemus: si concauitatem, marem. Telum vero exemptum si sculpturas quasdam habere, ceu aliorum tenuium ferramentorum quæ ipsis imposita esse possint, appareat, specillo rursus vsi, si illa inueniamus, eadem ratione & via auferemus: sin oppositas cuspides, ut verisimile est, telum habens non exilierit, vicinus ei locus diffecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, detectumq; telum eleuantes, modeste extrahemus. Nonnulli vero exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum euellunt, ne carnes à cuspe radantur. & si vulnus inflammatione vacauerit, futuris vsi cruentorum modo curabimus: si inflammationē experiatur, fomentis, cataplasmatibus, & consimilibus medebimur. Porro si venenato telo quis ictus est, totam carnem quæ veneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam quod est sana carne differat. pallida enim, subliuida, & veluti emortua apparet. Aiunt autem Dacos & Dalmatas cuspidibus elenium & ninum dictum oblinere, idq; vbi sanguini vulneratorum obuenerit, hominem occidere: comestum vero ipsis innocuum esse, & nihil mali efficere. At si telum ossi inhaeserit, rursus instrumento experiemur, & si quidē caro impediat, hanc adimemus aut diducemus: si vero etiam altē in osse lapsum est, quod cognoscimus si firmiter id infixum nulla vi commoueatur, excisorio cultro osse quod iuxta est exempto, aut etiam terebra prius perforato, si crassum sit, telum liberabimus. Porro si in principem aliquam particulam telum defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur, aut pulmonem, aut iecur, aut ventriculum, aut intestina, aut renes, aut vuluam, aut vesicam, quum iam notæ lethales apparuerint, & euulsio præsertim multum cruciatū vexationemq; accersitura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod nihil sumus profecturi, etiam conuitiandi occasionem idiotis præbeamus. Si vero exitus fuerit obscurus nec in cōspectum veniat, præfati periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem abscessu quoq; in aliqua vitæ necessa-

ria

ria parte oborto, præter opinionem consanuerunt, quum & iecoris fibræ, & omenti partem, peritonæiq; & totam vuluam subinde ademptam fuisset, nec mortem inde subsequutam, memoriæ prodatur. Est quum guttur de industria subinde in anginis diuidamus, vt in capite de ipsius incisione dicebamus. Telum itaq; si in his relinquatur, in præsentaneam mortem præcipitat, præterquàm quòd artem etiam inhumanam ostendat: si eximatur, fortè etiam salus subsequitur. Porro principalium particularum vulneratarum agnitio non est difficilis, vt quæ ex accidentium proprietate, excrementis, & particularum situ, inueniatur. Si enim cerebri membrana vulnus accepit, dolor capitis validus subsequitur, oculi feruent, rubentq; , lingua agitur, mens desipit. Si cerebrum percussum est, ægri concidunt, vox nihil sonat, facies peruertitur, bilis vomitus sequitur, sanguis per nares erumpit, per aurem humor albus pulticulæ similis emanat, sanies per vulnus exit. At si in vacuam thoracis regionem telum defigatur, foramine spatioso permanente spiritus erumpit. Corde vulnerato iuxta mamillam sinisteriorem, telum apparet non penetrans, sed ceu alteri impactum, ac nõnunquam pulsatilem motum ædit, sanguisq; niger effertur, si transitus pateat: extrema frigescunt, sudor emanat, animus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pulmone ictò, si spatiosa laxitas est, sanguis ex plaga spumans vacuatur: quum non est, ore magis per vomitum redditur, ceruicis vasa attolluntur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri, frigidi appetentes. In sepro transuerso vulnerato, telum quidem iuxta spurias costas defixum apparet, inspiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore per totam humeri partium compagem. Quòd si abdomen vulnus acceperit, id ex recrementis innotescet, quum latum intus spatium existat, vel etiam telo exempto, vel hastili intus fracto, succus ex ventriculo euacuatur, ex intestinis stercus, interim & omentum, vel intestinum procidit. Vesica autem vulnerata, vrina excernitur. Itaque in cerebro eiusq; membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quæadmodum in capitis fracturis mox dicetur. in thorace autem, nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrem intercostalium incisionem, vel etiam vna excisa costa, lamina quæ membranam custodiat subiecta, euellemus. Similiter in vêtre, vesica,

cate

cæterisq; in alto particulis, si quidem telum subsequatur, citra negotium eximemus: sin minus, rursus diuisione adhibita medicina vtemur, quæ cruentis conueniat. In ventre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastroraphia dicitur, accommodabitur, quem in modum comprehensum est. At si in grandiore quodam vase, exempli gratia, in iugularibus venis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam magnis arteriis quæ alas vel inguina intercurrunt, telum defixum, copiosius sanguinis profluvium propter exemptionem minetur, ratio est hæc funibus antea ex vtraque parte constringere, deinde teli euulsionem moliri. At si particulae plures confixæ fuerint, verbi causa, brachio cum thorace coniuncto, vel cubito cum aliis corporis particulis, vel pedibus inuicem, siquidem non per totas vtrasque partes telum penetrauerit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, veluti etiam in vna euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte serra refecata, particulatim singula faciliori figura extrahimus. Quoniam vero & lapides subinde vel buccina, vel plumbum, vel simile quippiam ex funda mittitur, tum vi, tum quòd angulosa sunt defiguntur. Agnosces igitur ea, quòd moles aspera & inæqualis illabatur, item quòd non omnino in rectum tendit diuisio, sed amplior, & caro veluti contusa liuidaq; appareat, adhæc, quòd cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata instrumento quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli parte, aut vulnerario specillo recipere. si autem fieri potest, etiam forfice extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus insederunt, quæ vulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu occupatæ & dirupto exiliere.

†Hic locus sic descriptus est in vet. Cod. τὰ δὲ γωνιωτὰ καὶ τοῦτων τὰ μὴ διχλῶχινα, τὰ δὲ γλῶχινωτὰ καὶ λόγχωτα καλούμενα, τὰ δὲ τριγλῶχινα, id est, alia angulis habentia, & horum quidem alia duos angulos habent, alia verò angulum habentia, quæ lonchota, id est, longa vt hasta, alia tres habent angulos &c.

De fracturis, & quot ipsarum sint differentie. C A P. L X X X I X.

Proximum fuerit tradita carnis vitiorum manu scalpellove curandorum ratione, etiam de ossium fracturis, dico sanè etiam luxationibus, sermonem instituere, quoniam & ipsæ chirurgiæ generi subiiciuntur. & primum de fractu

fracturis agam, iisq; prius quæ in capite fiunt, tum quod inter carnis & ossium chirurgiam medium locum obtinent, tum quod omnibus partibus caluaria præcellit. In vniuersum igitur fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, à violentia quadam extrinsecus accidens. Cæterum plures fracturarum sunt differentię, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc est, ad raphani speciem, alia schidacidon, alia es onycha, alia alphitidon, alia cata apothrausis, id est, iuxta refractionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est transuersim per crassitudinem facta, quæ etiam sicyedon & cauledon nonnullis appellatur, ex cucumerum & caulium fracturæ similitudine. Schidacidon autem, quasi assulæ modo, est oblonga ossis fissura. es onycha, quasi dicas in vnguem, iuxta partem aliquam recta est fissura, in extremo lunata: quæ etiam calamidon appellatur. Alphitidon, ad farinæ similitudinem dicta, est quum os in multas tenuis partes finditur, quæ & ipsa caryedon à quibusdam vocatur. Refractio autē, quæ apothrausis dicitur vel etiam præcisio, est quum pars ossis per summitatis rupturam auferitur, vt ablata superinnatet. Atque tot fracturæ constant differentiis.

De fracturis capitis.

CAP. XC.

Fractura in capite peculiariter caluariæ est diuisio, nunc simplex, nunc multifida, à vi quadam exteriori facta. Porro differentię capitis fracturarum hæc numerantur. Rhogme, id est fissio, Eccope, hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, id est corporum appropinquatio, Camarosis, hoc est testudinatio, in infantibus etiam Thlasis quod est contusio. Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os viciatum foras emouetur. Eccope caluariæ fissura est cum ossis offensi ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, apoplepsimon nonnulli vitium appellat. Ecpiesma in multas partes caluariæ effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os viciatum ad interiorem cerebri membranam descenderit. Camarosis diuisio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ modo exaltata relinquitur, vt Galenus tradit, ac intro à sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranaq; innituntur, quemadmodum

E

in ecpiemate. sic enim ille existimat. Alij etiam trichismou, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autem trichismus arctissima rhogme, sensum plerunq; fallens, eoq; latens: quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert. Thlatis caluariæ diuisio nō est, eoq; nec fracturam rectè dixeris eiusmodi affectionem, verū est ossis caluæ in interiorem partem impulsio, aut indexio, concavitate integra caluæ continuitate tantum efficiens, vt licet in plumbeis ex crudoq; corio cōfectis vasculis, si foris percutiantur illidanturve, conspiciari. Porro contusionis huius duæ existunt differentie: vel enim calua per totam ipsius crassitiem contunditur, vt frequenter etiam cerebri membrana abscessu occupetur: vel omnino à caluaria hæc per totum aut non per totum premitur, sed iuxta exteriorem duntaxat superficiem vsq; ad laminam secundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechema, quasi dicas ab Echo responsionem, addiderint. Ea est, à contraria ictus parte facta caluariæ fractura. At falluntur hi, quoniam nō sit in hominis calua quæ admodum in vitreis quibusdam vasculis fieri illi docent. illa siquidem vacua sunt, ideoq; id pariuntur: calua autē hominis vndiq; plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissura caluariæ, quæ aliarum complurium capitis partium ictarum lapsu, vel citra cutis continui solutionem generatur: quæq; postea abscessu in ea facto, eodemq; secto, apparuerit, in opposita ictus parte factam esse ipsis videtur. atq; hoc vitium quemadmodum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis facta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod percussit, deprehendes, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut violenter impactum. Item ex symptomatis quæ ictu superueniunt, exempli gratia, verriginibus, voce amissa, aut subito collapsu, præsertim in engisomate, aut contusione, aut ecpiemate, aut interiori camarosi cerebro compressio: itē ex notis quæ à sensu capiuntur. Si enim ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptè cognoscemus: si autem diuisio non per totum ierit, aut angusta sit, fracturam tamen esse suspicemur, cute diuisa, & oculis, & specillo demisso eam pernoscemus. Si enim ex aliis quæpiam fracturis fuerit, inde manifestum euadet: at si rhogme solum angusta & pilosa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liquido, vel etiā ipso atramento scriptorio infuso, os rademus, ipsa nanque rhogme

rhogme nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu insistere, quousq; signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranam vsq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabimur utrū mēbrana ab osse recesserit, an affixa permaneat. Si enim ipsa manet, inflammatio nulla vulnus infestat, æger paulatim febris liberatur, & pus coctum apparet: si recesserit membrana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit colorem, pus tenue & crudum effertur, & si medicus rem negligentius tractet, nec perforatione vsatur, hoc grauiora oboriuntur symptomata, nempe bilis vomitus, conuulsio, mentis delirium, febris acuta, in quibus manum admoliri nō oportet. Quod si his absentibus membrana cerebri non abscesserit, rhogme autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, vel si vsq; in altum penetret. Sin autem tantum vsq; ad laminam secundam, quæ diploë dicitur, fractura peruenerit, eousq; radendum est, vel etiam con fractū os eximēdū, quemadmodū docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quum vulneratum susceperis, hyeme quidem ante diem quartum decimum omnino os auferre tentato: æstate, ante septimum priusquā commemorata oboriātur symptomata. Caterum manum hoc modo admolieris.

Caluarie fracturæ curatio.

DE RASO super vulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuò se secanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autem alteram esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in vertice angulos excoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum existat: si quidem sanguis fertur, linamentis ex posca obiectis cohibebimus: sin minus, siccis. deinde implicito linamento ex vino & oleo iniecto, conuenienti vinculo utemur. sequenti die, nisi recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os vitiatum aggrediemur. Collocato igitur in sedili agroto, aut recumbente prout vulnere conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitum qui ex appulsu redditur, vinculum aliquod vulneris soluemus. linamentis omnibus exemptis, & spongia deterfis sordibus, iubebimus ministris duobus, ut tenuibus fasciis circūpositis, quatuor angulos corporum quæ fracturæ incumbunt, attollant, & si quidem

os fuerit imbecillum, aut natura, aut fracturæ vitio, id scalp-
 pris excisoriis acie inter se aduersis, auferemus, primum ca-
 uis excisoriis scalp-
 pris, quos Græci cycliscos vocant, à latior
 incipientes, mox angustioribus, deinde specilli modo angu-
 stis, malleolo sensim adactis, ad capitis concussionem ute-
 mur. Si autem validum os fuerit, prius eo terebellis quæ
 mergi non possint, quas ab argumento abaptismos dicunt
 perforato, (eiusmodi vero sunt quæ paulo interiorius quàm
 cuspis acuta est, eminentias habent, quæ ipsas ad cerebri
 membranam demergi prohibeant) per scalp-
 pra circuncisio-
 ne vsi, id quod vitiatum est, auferemus, non subito, sed par-
 ticulatim, si quidem fieri potest, digitis: si non, forcipe, au-
 vulsella qua vel ossa vel pili apprehenduntur, aut eiusmodi
 quodam instrumento. Locus autem qui inter foramenta est
 tantum spatium cōtinebit, quantum maximi mucronis spe-
 cilli longitudo. tam altè verò descendet, vt interiorem ossis
 superficiem accedat, cura adhibita, ne membranam cerebri
 terebra attingat. Quare etiam terebram ossis crassitudin-
 respondere conuenit, compluribus id genus ad hoc prepara-
 tis. At si fractura caluariæ vsq; ad secundam laminam dun-
 taxat peruenerit, ad hanc etiam vsq; solum forāda est. Ossis
 iam ablato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ pro-
 uenit, rasorio aut quodā scalpello excisorio adæquabimus,
 laminam quæ membranæ custos est, subiicientes, ac ossicu-
 lis quæ remanserant, vt verisimile est, aut spiculis ingeniosè
 ablatis, linamenta inferemus, quem modum diamotosin ap-
 pellant. Hæc ratio chirurgiæ cōmunior simul & promptior
 est, & periculo vācat. Item modus qui per lenticulatum ex-
 cisorium scalp-
 prum fit, mirum in modum Galeno commen-
 datur, sine foratione, post insculptionem cycliscis scalp-
 pris factam, ipsum adhibenti. Scribit itaque hunc in modum.
 Si verò vnā semel partem nudaueris, ac scalp-
 prum qui
 in cuspide præfixam habet retusam leuēque lenticu-
 læ speciem, aciem verò per longitudinem erectam, sub-
 miseris, vbi latam partem lenticulæ super membranam
 defixeris, malleolo feries, diuidēsque sic caluariam, ita
 siquidem agentibus, omnia quæ requiruntur, euenient.
 Nam membrana, ne si dormitans quidem, agas, latæ tan-
 tum lenticulæ parti occurrens violari non potest. Quòd
 sicubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoque adhæ-

ren

rentiam innoxie dirimit rotundum lenticulae extremum, subsequitur autem praeventem eam à tergo ipse scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias At quæ administratio ferris & modiolis, quem choenicion siue choenocida Græci vocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, improbata est, sed administrationem quā in rhogme exposuimus, probat. Idem vero modus ossium excindendorū conueniet in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantum vero excidere cōueniat. Galenus nos docebit, hunc in modum manifestò scribens. Quod vehemēter est confractum id totum auferri debet: si vero ab eo fragmenta quædam longius excurrant, quæadmodum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad extremum non oportet, illud probè scientes, nullam inde noxam sequuturam, modò reliqua omnia ritè sint confecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo vulnere æquali, rosaceo madenti, cerebri membranam operiemus, exiguaq; lanæ stuppam similiter rosaceo imbutè prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implícitum duplex in vino & oleo aut ipso rosaceo tinctum, toti vulnere circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neq; hoc astringentes, verum ut linamenta solū retineat. Viçtus adhibebitur qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem, ubi vincula dissolueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces quod cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, superaccommodas membranæ ali quod ex cephalicis distis aridis, vsq; dum carne oppleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdam summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in vulneribus comprehendimus, admoventi debet.

De cerebri membranæ inflammatione.

QVONIAM frequenter cerebri quoq; membrana post chirurgiā inflammationē experitur, ut non solum caluariæ crassitudinem, sed etiā cutem ipsius excedat cum renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & cōuulsio aliq; grauiā symptomata vel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuta quadā ossis

eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut perfriktione, aut multo esu, aut vini potione, aut alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta occasione inflammationem contraxerit membrana, ea protinus amputanda est: sin ex latenti, magis pugnare conuenit, † vt pote sanguinis dimissione, si causa non obstitit, victu qui inflammationi congruat. Item loco induci remedia debent, calentis rosacei fottus & superfusio ex althææ decocto, aut fœnugræci, seminis lini, chamæmelorum, similibumq; cataplasmata verò ex cruda ordeï farina, aut lini semine, cum prædicto decocto & gallinarum adipe, adhæc fomentum ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio meatuique auditorio oleum aliquod inflammationem prohibens instillabitur. Viscerum quoq; cura habenda est, cataplasmatibus adhibitis, item toti corpori prospicere, consilium est, in calidam id aquam, vt par est, collocantes inungentesq;. Si perseuerat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento quod bili ducendæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

† Rectior est scriptura veteris libri. πλείον ἀγωνίζεσθαι προσύκειν ἢ φλεβοτομίᾳ χρῶμεύας εἰ μὴ αἰὲρ κολύοι, ἢ ἀσπίξ, ἢ τῇ πρὸς φλεγμονὴν ἀρμοζούσῃ διαίτῃ. Id est magis pugnare oportet, vel venam secantes, si nihil prohibet, vel inedia, vel victu inflammationi conuenienti.

Si membrana cerebri nigruerit.

CEREBRI membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, † mel triplum rosaceo miscentes & per linamenta id applicantes, curabimus, deinceps & reliqua admouentes. At si nigrities sua sponte prouenerit, idq; in imo potissimum, cum aliis grauib; indicis, attingi tunc nō debet, vt quæ natium calorem emortuum innuat. Noui quendam qui post annum quàm affectu conflictaretur, caluaria perforata superuixerit. erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariūque habens per quod etiam membrana ab offensa immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μέλιτι τριπλῶν ροσάκων. Id est. melli triplum rosacei miscentes.

De nari

De naribus fractis contusisque.

CAP. XCI.

Narium pars ima, quum sit cartilaginosa, frangi non solet, sed contundi, sima fieri & perueriti: superior quæ olea est, nonnunquam frangitur. In his autem deligaturam damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquam in his quæ ex ictu per medias naris emineant. in his enim convenientem fasciam, cum medicamine imposito assumit, ut compressæ nares naturalem figuram recipiant. Fractis igitur naribus, in ima quidem parte, indice aut paruo digito demisso in exteriora diriguntur: in interiore, etiam scalpelli nucleo id faciendum est, primo statim die, aut non multo post. Quum veto decimo die naris ossa continentur, extrinsecus indice magnoq; digito hæc efformare congruit. Ut autem figura quam fingis non concidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, vnum singulis nasi foraminibus, & si altera duntaxat naris pars sit peruersa: eaq; sinere conuenit, donec os aut cartilago contineat. Nonnulli fistulas ex anserum pennis panniculis replentes, naribus insinuarunt, quod figura custodiatur, & respiratio non impediatur. quod non necessarium puto, quum spiritus per os trahatur. At si inflammationem nares sentiant, medicamentum aliquod quod eam arceat indemus, exempli gratia, ex succis inscriptum, aut quod oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod. vel ex triticea simila & thuris fuligine seu gummi vnâ incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationem, tum ut nares contineantur. Quod si in alteram partem nares distortæ, Hippocrates postquam commodè eas figuraueris, oblongam habenulam digitali latitudine iubet circumdari, alteram ipsius extremum taurino glutine, aut gummi illitum summæ narium parti agglutinari, ex latere quò inclinant. vbi illa exaruerint, habenam transferre per aurem oppositam versus occiput, & frontē oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediā dirigantur figurā. quod nō admodū recentioribus placuit. Porro minutim cōfractis nariū ossibus, diuidere ipsas, aut superiorē ipsarū partē cōuenit, ac fragmenta ossiculorū vulsella auferemus, suturis diductas partes committētes ac commodantēsq; ipsiū remedium quod cruētis aptum est, & cōglutinat. Sin autem extra nares vlcus fuerit excitatum,

E 4

linamentis in longitudinem implicitis curabimus. Sunt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicunt, vsque dum cicatrix fuerit obducta vsi sunt, ne caro ex vlceribus supercreseat.

De maxilla confracta, & aure contusa.

CAP. XCII.

DE aure contusa tertio libro tractatum est, tanquam huiusmodi affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas frangitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per transversum fissâ, introrsus cauata fuerit, promptum sanè est cognoscere. Opus autem est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igitur & medio digito in affecti os demissis, interiorem fracturæ extantiam, probe foras compellere conuenit: altera manu foris eam excipiente. Restitudinem verò maxillæ ex eiusdè dentiù æqualitate deprehendemus. Quòd si fractura per trāsuersum facta fuerit, primū tēsiōne, deinde retractione, quā antitalin vocant, partis in cōtrarium, vsus, ministro eam continente, vt dictum est, dirigere aggredieris: porrò denteis in parte confracta diductos, inter se, vt Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro, chrysolino dicto aut chrysonemate: quoniā vero huius facultas non omnibus conceditur, lino valido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo. Verūm si quidem cū vlcere fractura euenerit, specillo tentandū, num tandem etiam refractionis ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os vnum refractum aut plura remanserint, idoneo instrumento auferentes, futuris oras vlceris committemus, & medicamento cruentis apto vsi deligabimus: sin autem citra vlcus contigerit, ceratum simplex maxillæ impositum cōuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispensabitur. habenulæ vtrinque per aureis ad summam maxillam, inde rursus ad occiput, mox ad mentum, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub unam occipiti partem, distribuuntur, vbi & fasciam desinere oportet. Super hæc rursus vinculum aliud fronti circumdatum, quod epizalema Græci dicunt, post caput coniungetur, omnes prædictæ fasciolæ id circum astringēt. Alij vero tenuem ferulam, quēadmodum alij corium, quod æquè sit longum impositum maxillæ, deligāt, vt commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiam, quasi dicas capistrum, vtuntur. At si

vt ra

traque maxilla in summo mento auellatur, qua etiam par
e coeunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus,
ursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus,
eligato: fac congrua vsus ligatione, tenui ac sorbili alime
nto aegrotantem nutrirī iubeto. Nam mandere ipsi inimicum
est. Si aliquid emotum à figura conuenienti putaueris, ter
tio die soluens, iterum illigato, quod tam diu facies, quàm
callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra
treis potissimum septimanas, quoniam laxa & medullæ ple
na est. Quod si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduer
sus hanc quidem rum fomenta, tum cataplasmata negligere
oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te
cupierim.

† *Antiq. codex. καὶ τῇ προσήκοντι χροσάμηνος ἐπιδείσει κίλαντον ἡγε
μῆν λεπίδας καὶ ῥοφιατώδεις τροφὰς χρωμένους, & congrua vsus
ligatione, iubet vt quiescat & tenui ac sorbili victu vtatur.*

De iugulo confracto.

CAP. XCIII.

Iugulum, quod etiam clauicula dicitur, quum naturali
ter figuratum est, interiore ipsius extremo, cum pectore
committitur: exteriorē, cum summi humeri compage, seu
articulamento adunitur. eoq; si humerum, aut ipsum susti
nens brachium, fracturam quacūq; tandē parte experiatur,
quā humerum suum spectat, plerunque infra interius ex
tremum fertur, vna cum brachio detractum. Præstiterit au
tem per transversum potius quàm assulatim, aut arundinis
modo, hoc est, in longitudinem clauiculam frangi, quod
vulgo receptum est. Nam transversum confractū, extēsiōne
compressioneq; digitorum promptē in naturalem figuram
revertitur: cætera vero eminentias habent, quæ ægrè pos
sint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinem quo
cunq; modo, iugulum fractū fuerit, duo ministri, vnus ad hu
merum eiusdem lateris fractæ clauiculæ manibus circum
infectis, brachium ad exteriora simul & sursum trahens, al
ter oppositū humerum, aut certē cervicē attrahens, retra
ctionem à se, quam Græci vocant antitafin, molientur: me
dicus suis digitis fracturam diriget, prominentiora pellen
do, ima foras attrahendo. Quod si maiorem retractionē à se
desideret, orbiculum bonæ magnitudinis ex panniculo, aut
lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subiiciēs, cubitum

lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictum est, exequetur: si autem id nequeat, extremum claviculae iuxta humerum in alto situm ad superiora, aegrotante resupinato, educet cervicali quodam mediocri, dorso subiecto, ministro humeros duos ad ima deprimente, ut os claviculae quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturam conformabit. Porro si partem aliquam iuguli refractam, instabilem, aut etiam pungentem percipiamus, scalpello in rectum diuisam eadem auferemus, ac reliqua scalpris excisoriis, lamina quae a tuendis cerebri membranis menyngophylax dicitur, aut alia quae excidendis supponitur propter firmitatem claviculae subiecta, exaequabimus & si quidem inflammatione careat, suturis: si aliter est, linamentis utemur. & splenis diuersis praeparatis ad ossis eminentis inclinationem, maiora ex eis & crassiora superaccommodabimus, si inflammatio infestat, oleo imbuta: si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe propter alam subiecto, conuenientem inducemus deligaturam, per axillas, affectam claviculam, scapulas quae, prout res exigit, deligantes. & si quidem ad ima retenderit pars claviculae humero proxima, latioris habenulae dimidium, eiusdem cubito subiicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autem vinculi dimidio, manum, quemadmodum in iis fit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si versus superius extremum inclinauerit, quod rari est, brachium suspendi non debet, verum resupinus aeger decubebit, & tenui nutrietur victu. si vero opus est, etiam fomentis adiuuabitur, sed pro ratione, usque dum callus eam firmarit. id quod fit plurima ex parte diebus viginti.

De scapulis.

C A P. X C I I I.

SCapulae quae latae sunt & mensae figuram representant, non franguntur: iuxta spinam vero fracturam sustinent, nunc compressae, nunc rupturam simplicem expertae, interrim etiam refractae. Compressionem itaque tactu cognoscimus, si caua occurrat, stupore proximi brachij, & dolorem pulsatilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci doloreprehenditur: ambo autem ratione qua inflammationem arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur: leuis ac modica fascia conuenienti adaptatur: aucta vero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & suturis, ut prius dictum est. Fasciae autem & hic similiter ut in clavicula

ula iniiciuntur: incubitus oppositi lateris conueniet.

De pectore.

CAP. XCV.

Medium pectus, diuiditur imprimaturq; : summum, re-
fringitur. Rupturam itaq; per medium factam dolor
oci & inæqualitas sequitur, & strepitus digitis innixis elidi-
tur: impressionem vero dolor vehemens, spirandi difficul-
tas, tussis, mēbrana quæ costas incingit dispuncta, nonnun-
quam etiam sanguinis eruptio, partis cōfractæ cavitās, & in-
cedēdo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quam
in scapulis prodidimus. In impressione autē adaptatio Hip-
pocratis adhibebitur, quam ille in clauicula quæ foras pro-
cesserit, vsurpat, per incubitum supinū cervicali dorso sub-
iecto, scapulisq; constrictis, ita ut costæ vtrinq; manibus si-
mul contrahantur. Iam vero costis lana obtectis circularem
adhibebis deligaturam, lorīs prius in rectum subditis, post-
ea duorum initia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fa-
scias decidere prohibeant.

De costis.

CAP. XCVI.

EX costis quæ pleuræ & spathæ Græcis dicuntur, ossæ
quidem omni in parte rupturam sustinent: spuræ au-
tem, in ea tātum quæ spinæ adiacet. nam hīc solum ossæam
habent naturam: in exteriorē parte in cartilaginē dege-
nerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. No-
tæ ipsarum non sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis
explorantibus occurrit, strepitusq; & ad confractum addu-
ctio. Quod si intrò spectauerint, dolor vehemēs punctorius
sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, quod aculei mo-
do membranā costas integrentem conuulueret, item ægra
respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. &
reliquas vtiq; declinationes digitis licet conformare, eam
vero quæ intrò spectat, nequaquam, quod tendi nequeat. vñ
de alii cibum flatulentum vberemq; assumi iubent, vt fra-
ctura ex inflatione & tēsiōne foras propellatur, quod neces-
sarium nō esse puto. Nihil enim cōmune adhuc inter se ha-
bēt, tū thorax, tū viscera nutritoria, præterquā quod inflā-
matio etiā ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulā adgluti-
nāt, q̃ à ratione & via curādi alienū nō esset, nisi particularū
ex attractu, collectione, fracturā amplius ad interiora pro-
pellerent. Quapropter Soranus hūc in modū scribit. Lanis
oleo calido madentibus partes conteguntur, & linamentis
impl

implicitis intercostale replebitur, vt deligatura æqualis iuxta orbicularem cirunductum veluti in pectore fiat. Omnia vero vt in pleuriticis fieri debent, ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, quòd membrana costas cingens vehementer compungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas tegens cõuulneretur, prius subiecta, ossicula quæ pungunt ingeniosè excindere ac eiecere oportet. postquam hoc feceris, ea sanè quæ inflammatione carent coniunges, & cruentorum modo curabis: quæ autem illa affliguntur, linamentis oleo madidis operies vitum curationemq; adhibens inflammationi dicatâ. Decumbent ægri ea figura quam facilius tulerint.

De coxarum & pectinis ossibus.

C A P. X C V I I.

COxarum aut ilium ossa rarò quidem franguntur, sed easdem cum scapulis differentias sustinent. Franguntur enim in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimuntur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pulsusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter compressionem. adaptationem vero scapulis similem postulant, auersantur autem solam ex chirurgia eius quod fractum est, exemptionem per externas partes. nam si opus sit, digitis conformantur. deinceps autem etiam aliam curationē moliri oportet, fomentis vtendo, & concaua ilium linamentis adimplendo, quò deligatura ceu fasciis circularibus superiniectis, æqualis efficiatur. Eadem etiam dicenda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

De vertebris, spina dorsii & sacro osse.

C A P. X C V I I I.

Vertebrarum complexus interim sanè contusionem, rarò vero & fracturam experiuntur. propter quæ contusis spinalis medullæ membranis, vel ipsa etiam medulla, nerui in doloris consortium adducuntur, & mors præceps subsequitur, magisque si ceruicis vertebrae affectus infestarit, vnde præfatus periculum, siquidem fieri potest, audebis etiam sectione ossiculum quod premit eximere: si minus, ratione saltem qua inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus vertebrarum aliquis vnde spina constat, fuerit refractus, digitis tentantibus promptè occurret, dum refractione mouetur, rursusq; in locum transponitur. Conuenit autem

tem

em id quod refractum est auferre, cute extrinsecus incisa: uturisque commissa, remedio cruentis idoneo vti. Caterum esse sacro confracto, index sinistrae manus digitus in anum remittendus est, dextra manu quod confractum est, quatenus licet, in naturalem figuram reducere oportet. Si autem aliquid refractum sentiamus, hoc quoque diuiso, deligaturam curationemque congruam adhibebimus.

De brachio.

CAP. XCIX.

IN brachio confracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus est. Lignum, inquit, oblongum manubrij ligonis modo, per summa fune deligatum, obliquum ex trabe quadam suspendere oportet: collocato autem homine in sublimi quodam erectius, quam iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocathendon dicitur, manum ipsius super commemoratum lignum traducere, ut medium ligni alae eius transuersim adaptetur. manum autem inflexo iuxta rectum angulum cubito, minister procumbens continebit, deinde graue aliquid, exempli gratia, lapidem aut pondus plumbeum vel eiusmodi quippiam ex cubito suspendens, sinensque pendere sublime, ita fracturam conformabis: vel loco ponderis, famulus ad ima brachium detrahat. Nonnulli verò loco manubrij ligonis gradu scalae vti sunt. Soranus hunc in modum tradit: ægro in sedili collocato, vel, quod satius est, resupinato quò minus molestiae sentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipsa cum brachio coniungitur, & ex ceruice suspensa, ut angulosa ipsius figura seruetur, ministris duobus iubeamus, huic, supra fracturam, illi, infra digitos circumponant, atque sic tensionem perficiant. Quòd si valentiore opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, vnum, supra fracturam: alterum, infra. atque vni famulo super ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funium tradentes, iubeamus in diuersa brachium distendere. At si summus humerus fracturam senserit, dimidio vinculi, quod ciria dicitur, alae subiecto, reliquam partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositum est retrahente, antitafin, hoc est à se retractionem uti dictum est, moliemur. quemadmodum sanè si cubitus confractus fuerit, illi vel iuncturae manus cum brachio funis iniicietur. Ossibus iam fracturae probè coaptatis, distentio quidem remittetur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem

dinem deligabitur. Porro si fractura inflammatione vacet, recensq; sit, lineis utendum fasciis oblongis abunde, circa treis quatuorve digitos latis, aqua madetibus, aut etiam posca: si inflammatio adest, lanis tenuibus mollioribusq;, oleo imbutis: & si quidem in medio brachij fuerit fractura, initium fasciae super fracturam iniicietur: ubi bis terve illigaueris, sursum fasciam ducere conuenit, ut (quemadmodum inquit) sanguinis influxiones excipiantur, atq; illic finiatur. Iam vero & secunda fascia uti oportet, initium eius similiter supra fracturam iniiciendo, atque alia eo modo quo in priori: rursus autem supernè deorsum, atq; iterum sursum reuocare, illic etiam sic terminabitur. Porro constrictio mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius aegrotantis iudicio. At si iuxta summam humeri compagem contigerit, priore fascia illam & scapulas, & pectus comprehendens, ut deligatura fiat quam Graeci geranida appellant, perque secundam usq; ad cubitum dispensabis, ac inde ad supraposita recurre, cum summo humero scapulas pectusq; comprehendens, primæ fasciolæ similiter. Quod si iuxta cubiti flexum fractura obuenerit, etiam cubitum colligare expedit, ita ut angularis figura conseruetur. similiter in aliis quoque artubus, nimirum cubito, femore, tibia, cum fractura in parte, aut etiam iuxta articulum & non in medio membro existit, post articulum fasciam iniicere expedit. Recentiores itaque secundum deligaturam protinus ferulas etiam iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat: veteres autem, à die septimo ferulas accommodant. nam intra hunc inflammatione declinante membrum redditur tenuius. At Hippocrates tertio quoque die ligamenta solui iubet, ne tensio quæpiam, aut motus præter solitum contactæ particulæ obueniat, aut eius quod iam infixum fracturæ est, perspiratus prohibeantur, propter quos non solum noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur. Itaq; aquæ temperatæ tantum superfundere ratio est, quantum saniem discutere sufficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere conuenit, ceu partes non amplius saniem excernere desiderent. imò etiam calli obfirmatio hoc modo feliciter prouenit. Cæterum ferulæ iuxta sequentem rationem

nem

nem debet inilci. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur membrum crassitudine fuerit æquale, similiter: si inæquale, partibus magis concavis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie ferulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stappa ferula mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non minore quàm digiti spatio inuicem distantes, easq; moderatè constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas propius accedere articulum prohibeamus, præsertim iuxta anteriorem flexus partem. vlcera siquidem in ipsis nonnunquam & neruorum inflammationes pariunt, verum illic laxiores ipsas esse oportet, quemadmodum valentiores, ubi fractura curuatur. Præstiterit autem thoraci etiam brachiū mediocriter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruerat. At si quandoque inflammatio fuerit, (eam verò agnosces ex ambiente tumore, ac rubore, & quòd membrum nūc multò magis quàm prius stringatur) vel si confractum membrum, distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, vel econtrario strictiora, quàm par est, inueniantur solutis ipsis deligatura instauranda est. Resupinari igitur ægrotus debet, ita ut super stomachum manum contineat: brachio subiicietur molle quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, præsertim quum vrget inflammatio, quādo etiam cibus tenuis exhiberi debet: postea mediocris, ad calli generationem quies indicitur vsq; dum fracta occalluerint. occalescunt autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro vsus fueris, emplastris ad fracturas factis persanare conuenit. hæc tractandi ratio omnibus aliis propemodum confractis artubus conuenit.

De cubito, & radio.

CAP. C.

Cubitus radiusq;, interim vterq; iuxta eundē locum frangitur, interim alter duntaxat, vel in medio, vel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaq; deterrimum est quum ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur. siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut veluti insideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maxime intentionem validiorem molie-

RMG

mur: si uterq; , similiter intendemus , manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici continget. At si valentiore opus sit intentione, ambobus potissimum confractis, non solum manibus, sed etiam funibus intendere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Ceterum omnis deligatura, & reliqua præsidia, una cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum vendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

De summa manu, & ipsius digitis.

C A P. C I.

Brachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articulo-
rum ossa, quum laxa fistulosaq; natura sint, contunduntur quidem plerunque, raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodam æquali aduersus sedebit, priusquam manum imponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa conformabit, pollice & indice digito prius compressa. deligatura utetur, quo tempore vrget inflammatio. Nam propter laxitatem facile in ipsis callus amplior concrescit. At si acies digitorum, aut digitus simpliciter confractus est, siquidem magnus & pollex appellatus, fuerit, post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueatur: si ex aliis quispiam, vel index, vel parvus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui utrinq; habentur, vel etiam omnes deinceps ligari una debent, melius enim conquiescunt. quemadmodum si confracti ferulis quoq; colligentur.

De femore.

C A P. C I I.

EAdem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorem promouetur. etenim in his naturaliter dilatatum est. instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, una, supra fracturam posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem contineat, trademus: infra autem fracturam fune circumposito initia ad intentionem alteri ministro.

nistro exhibebimus. Quòd si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturam iniicimus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiam ipsum implicito quodam fune continemus. hanc autem partem restituimus agro decumbente, & crure exporrecto: quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circà diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinam, comprehensum est.

De patella.

CAP. CIII.

Patella os laxum est ac molle, validè corporibus superiore & ima parte comprehensum. frequenter sanè contunditur, rarò autem frangi solet. sustinet autem rupturam per crassitudinem, & in tenuia fragmenta finditur, cum vulnere, vel sine vulnere. Nota vero conspicua (motus enim continuitatis intercidit) & cauitas & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariam fissa est digitis eousq; committitur, donec fracturæ labra suprà sese contingant, & inuicem iungantur: quæ vero in tenuia fragmenta fissa est, manu conformatur. etenim callo non generato, eò quòd pars vtraq; per musculos cognatos & neruos, à femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamen multitudo distentionis contrahet, & functionis difficultatem affectis inducet, neq; enim laborantibus ipsis diutius genu sustinet, & obambulando illi impediuntur, præsertim ascensuri: siquidem in æquabili per planiciem motu actionis difficultas occultatur: in ascensu autem, eo quòd genu, in crucis eleuatione & positu non inflectatur, deprehenditur. Iam vero osiculum si quod pungit, eleuatum prius eximito, ac curationem consentaneam adhibeto.

De tibia.

CAP. CIIII.

Tibia cubito respondens, eandem curationem recipit. etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Græcis, quasi fibula, latinis sura dictum easdem fracturarum differentias recipit in omnè enim partē distorquetur, quū ambo ossa cōfracta fuerint: in treis autem, quū alterū, intra & extrà: tibia quidē, retro: sura, anterius. quapropter etiā ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculis superioribus, quæ fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circundaris, interim

F

femori. Nam quum genu sit validius, articulum integrum per tentionem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, vt in cubito dictum est: reliquavt in capite de brachio tradidimus.

De pede summo.

CAP. CV.

TAlus nequaquam frangi solet, eo quòd vndequaq; tibia, sura, & ossè quod ob tessaræ similitudinē vocatur cyboïdes custodiatutur muniaturq;. At os quod à cymbæ figura dicitur scaphoïdes, & supernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ipsumq; cyboïdes, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manûsq; digitis sunt, franguntur. quare etiam quæ de illis diximus, ne eadem reperantur, illinc huc transferre consilium est.

Quomodo crus reponi debeat.

CAP. CVI.

Femore fracto, aut tibia, non minori cura repositionem ipsius, quàm reliquam curationem obibis. Nam partiū cōfractarum æqualitas, hæc porissimum probè administrata, cōseruatur. Nonnulli igitur canali, quam solenam Græci dicunt, nunc lignea, nunc fictili, membrum fractum, aut etiā crus ipsum reposuerunt: alij verò sola ea quæ cum vulnere fracta sunt, eo quòd hæc ferulis nequeant constringi, in totum verò solenarum vsum posteriores damnarunt, multis sanè de causis, sed præcipuè, quòd ipsarum duritia partibus negotium facefferet. Neque tamen alienum est, artus cum vulnere fractos ferulis excipere, vt ostendemus. Aeger itaque resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum crurī æquale, in longitudinem vtroque contractum & inuolutum, vt canali per mediam cōcauitatem oblongam proportionē respondeat, subiicietur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longū crus cōcauitati huic canalem referenti, insinuabitur. à lateribus alia vestimenta lanæ'ue apponentur, ne membrum in latera declinet, pedis autem ima pars asserculum rectum panniculo circumdatum, propter mollitiem, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarum duarum triūmve, vestimento canalīs modo preparato subiicientes fractum membrum ipsi leuiter deligabimus. At si æger nō tolerans conetur pedem totum contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde blandè cū asserculo deligare, ne inuiti inter dormiendum, vt verisimile est, pedem

pedem contrahant. Aliqui verò etiam stragula lecti per medium pertundunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen urina & sterqus reddatur, usque dum callus coalescat.

De fracturis quæ cum vulnere incidunt. CAP. CVII.

Fractura cum vulnere facta, siquidem sanguis profundatur, hunc prius sistemus: si inflammatio fuerit, praesidiis in eam efficacibus utemur. Carnibus contusis, partem affectam scarificabimus, metu, ne in gangranam incidat, sublatro: at si illa quoque accesserit, aut alia quæpiam serpens putredo, convenienter occurremus. habes autem horum singulorum curationem quarto volumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neque ossa largiter denudata sint, hamulis futurisque usque, remedio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut verisimile est, & pungentia innatantiaque primum auferamus. Quod si magnum aliquod os emineat non commissum propter magnitudinem, in inrensione huic prospicies. Siquidem Hippocrates femore & brachio fractis ossa excedentia statim eiicere dehortatur, periculum his futurum prædicens ex inflammatione, quam tensio crearit, vel etiam conuulsione, ut credibile est, musculorum nervorumque. Tempus verò nonnunquam administrationem commodam inuenit. In quocunque igitur osse quod ex sede sua excidit, manum admovere volumus, nequaquam in inflammatione aggrediemur, sed primo statim die, antequam inflammatione occupetur: aut nono, inflammatione iam finita. Adaptamus verò ossa veste quam Græci mochliscon vocant, est autem ea instrumentum ferreum septem octove digitos longum mediocriter crassum, ne inter commouendum inflectatur, acutum in summo latumque, & leuiter inflexum, cuius acutum extremum superposito ossis tuberculo subiicientes, ex altero in oppositum tendentes simul, & mediocri intensione membri facta, inter se sineis fracturæ committemus. quod si facere nequeamus, scalpris excisoriis obuersas acies habentibus quod eminet auferemus, aut ferra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiumque asperitudine adæquata, & membro directo, medicamentis quæ in linteolis illinantur, curabimus. Maxime autem animum adhibere oportet in membris conjugalibus, aut à iugis appellatis, altero autem in ipsis osse particulatim ferra abscisso, ut membrum in contractum maneat, etiam

intensione accurata vtemur. deligatura verò hoc modo adhibenda est. Circulares itaq; fasciæ, partibus vulneris utrobique innci debent: obliquæ verò, per vlcis longitudinem, ut in literæ Græcæ X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc vlcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliâmq; comprobata vfu materiâ. Hippocrates pissera emplastro in linteolis vtitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ iniiciuntur. aliqui verò per initia ipsas accommodant, vlcis locū vitantes, & pro vfu urgente ipsas cōstringentes, vel rursus remittentes. In quibus autem squama ab offe recedet, notabimus quidem hoc, inde quòd copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem vlcibus vacua inanisque facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem vtemur, hamulo autem, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum validiore deligatura vtemur. porro per totum vlcis tempus medicamentum aliquod ex iis quæ inflammationē arcent linamento illitum, vulnere incumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus solui debent, quā aliæ suprâ dictæ maneant, ut in capite de brachio expositum est.

Si prater modum fracturæ callus obducatur.

CAP. CVIII.

Immodici fracturarum calli indecoram omnino speciem efficiunt, nonnunquā etiā functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remediis admodum astringentibus vtemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam vero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, effecimus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris vsi.

Si distortum membrum callus firmit.

CAP. CIX.

Quibus membrum distortum callus firmaverit, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente, praesertim si in pedibus fuerit, repositionis quidem modus non recipiendus est, ut qui extrema inferat discrimina. verum si callus nondum radices egerit, laxantibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & columbarum stercore, aliisque medicamentis quæ à callo soluen

uendo porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & confractiōe hunc dissoluemus. Quod si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortium ab ossē liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius à me dictum est.

Si fracturæ callo non firmentur.

CAP. CX.

FRacturæ nonnullæ sine callo permanent, suprâ definitū naturæ tempus, aut ob continuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motum intempestiuum, aut fasciarum copiam, aut quia totum corpus alimentum nō percipit, in quibus etiam tenuius fieri membrū contingit. Itaq; cum alias occasiones, tum maximè corporis incediam tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibum subministrando sufficientem, item lauacra, & reliquas animi voluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanantur comitantes, hæ inter alias sunt præcipuæ, si fasciolaræ cruorem referant, etiam non oborto vulnere, quod forsan accidit, calli substantia quādo coalescit fistulis ossium insperfas sanguinis guttas extundente.

De ossibus luxatis.

CAP. CXI.

QUum luxationes fracturis proximæ sint, de iis verba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, ut summum dicam, quum articulus à proprio sinu, ad insolitum excidit, in qua motus arbitrarius impeditur. differētias ipsius alias dicere non habemus, nisi eam duntaxat quæ ex maioris minorisque ratione sumitur. quum enim articulus in totum exciderit, communi generis vocabulo affectus Græcis exarthrema, latinis luxatio dicitur: quum autem aliquatenus duntaxat emotus est, aut vsque ad superficiem è sinu elapsus, pararthrema.

De maxilla.

CAP. CXII.

RUrsus à superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum malæ sint immobiles, luxatione non periclitantur. maxilla autem toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tutò insinuata sint: modicā verò peruersionem quam pararthrema vocauimus, subinde experitur, quod ob musculos qui ipsam continent ex cōtinuo mandendi loquendiq; exercitio in mollitiem elanguescentis, qualibet de causa facilè laxetur, quod verbū apud Hip-

pocratem *σχῆται* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus sponte in proprium locum reuertitur. verum de maxilla in totum luxata, satis est illius verba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua existunt. Scribit itaque hunc in modum. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autem subinde oris hiatu, quomodo etiam aliæ plures musculorum neruorumq; peruersiones, id efficiunt. Clarum itaq; hinc potissimum est, quandoq; exciderit. Nam maxilla in anteriora propellitur, & ad contraria eius vnde prolapsa est, peruenit, os isq; tuberculū iuxta malas tumidius apparet, difficulter ægri maxillā committunt. Qualis autē repositio ipsis congruat, manifestò liquet. alium enim continere caput oportet, alium comprehendentem ab interiore parte & exteriori digitis iuxta mentum hiantem hominem quàm mediocriter potest, primum quidem maxillam commouere aliquandiu, & huc, illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere, vt laxam maxillam habeat, simulq; remittat, & cōcedat, vt repente potissimum laxetur, tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio siquidē est illam ex peruersione in naturalem statum reducere. Oportet autem maxillam in posteriora propellere, item cōsequenter his committere, neq; hīare. Insertio igitur hæc etiam in aliis figuris fieri non poterit. medicina autem modica sufficiet, splenium appositū ceratū fascia laxiore deligare. Sed tutius est, resupinato homine firmare caput ipsius puluinis subiectis quàm plenissimis, vt quàm minime cedat. Cæterum vlnuerati caput aliquis continebit. Sin autem vtraque eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidem adhibebitur: verum committere minushios possunt, vt quibus prominentiores maxillæ sint. rectitudinem autem indeflexam maximè cognosces. dentium & superiorum & inferiorum terminis, secundum horum directam aciem confert illas quā citissimè inserere. quomodo autē inserentur, expositū est. Quod si locis suis non insinuētur, periculū de anima subsequetur ex febribus continentibus, & torpido Caro. Nam muscoli hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carum inducunt. venter solet his biliosa deicere, vel sincera pauca, & si etiā vomāt indiscreta eiiciunt. hi igitur decimo die potissimū moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos subinde vti sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiā super luxatam
maxil

maxillam adhibitis, quando potissimum ægrè potest restitui, hominèque humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

De clauicula & summo humero.

CAP. CXIII.

Clauicula interiori quidem extremo nō excidit, vt quopectori committatur. vnde ne mouetur quidem in ipso. At si violentia cuiusdam acuti extrinsecus ferientis auellatur, quemadmodum fractura ipsius instaurari debet. Extremum autem, ipsius quod humeri articulamento inseritur, non admodum sanè excidit, à bicipiti musculo summoque humeri tuberculo prohibitum. imò neque violento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animantia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, vt verisimile est perueriti contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenis multiplicibus accommodatis vnà cum deligatura decenti: eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in resiccatissimis mortuorum cadaueribus occultatum, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachij caput excidisse, etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concavum autem, id vnde excidit. verum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

De humero luxato.

CAP. CXIIII.

Brachij caput scapularum sinui insertum, excidit quidem frequenter, verum neq; in superiorem partem, vt quod scapularum processus ancoræ similis impediat: neq; in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriorem, ob muscoli bicipitis tendinem, ipsumq; humeri fastigium. Sed rarò quidem in interiorem exterioremq; prolabitur, continuè verò, præsertim macilētioribus, ad ima atq; his sanè facilè & excidit & rursus inseritur: multa autē carne præditis contra, rarò quidem elabitur, sed ægrè in sedem suam compellitur. Quibusdam itaq; etiam non luxatis, ex ictu frequenter elapsi loco membri suspicio oritur, eo quod valida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnosces: affectus humerus si cum sano conferatur, multum differt, quum exterior eius pars vnde excidit, cōcaua appareat, vt in summo

humero eluxato diximus, quod acutius quàm naturaliter esse debet, apparet, & brachij caput elapsum in ala manifestò occurrit, ac manus huius cubitus à costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur, neq; ægri manum extenso cubito ad aurem possunt reducere, neque alium motum multiplicem per eam moliri. In pueris itaque vel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, etiam nodo mediij digiti flexi eminente medici manus, vel ipsius affecti, sanæ manus, si non puer sit, frequenter restituta est, vt inquit Hippocrates. valētius autem hoc modo luxata inseruntur. Homo lotus & superfusionibus laxandi virtute præditis vsus, resupinari humi debet, & pila mediocris vel coriacea, ver alia quæpiam non admodum mollis alæ accommodabitur, ac sedens medicus aduersus ægrum, iuxta latus affectum, si quidem dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet pilæ alæ suppositæ, si sinister, sinistri. ac affectam manum prehensam ad pedes trahet, simulq; calcaneo alam in diuersum propellet, ita vt aliquis post caput ad alterum humerum resistat, ne corpus circum diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ humero subnixo perficitur, quod Græci κατὰ μίσην dicunt. Adolescens, aut longior ægrotante, aut altius consistens iuxta affectum latus, ægri indidem collocati alæ suum ipsius humerum subiiciet, & manum eleuatam ad ventrē suum attrahet, vt reliquū ægri corpus post eū qui humerum suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit, alius quispiam puer leuis ex ipso suspendetur. Nam manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus faciliè elapsum articulum reponit. atq; hoc etiam ligno quod Græci hyperon dicūt, efficiamus. Est autem id lignum oblongum, rectū, quod in pauimento super aliud quoddam solidum ponitur. huius igitur summum extremum rotundum, quod non admodum crassum neq; tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedentis, subiicietur, iuxta totam ipsius longitudinem. Ac manu per lignum istud porrecta & detracta, reliquo autem corpore contrà inferius vergente, vel sua spōte, vel alio quodam trahente, restitutio fiet. atq; hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodum in confracto brachio per tensionem fieri dicebamus. hic autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis alæ

alæ possit adaptari & brachij caput propellere. Porro si ob
verustatem affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis
facessat negotium, utemur etiam ratione quæ per spatham
ligneam, amben appellatam fit. Est autem ambe lignum
quod longitudinem duorum cubitorum habet, latitudi-
nem quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alte-
rum extremum rotundum, quod etiam promptè in alæ si-
num ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon vocatur, ex-
tremum. hoc itaq; extremum panniculo circumdatum, quò
lenius existat, capitulo brachij iuxta alam accommodabi-
mus, totam vero manum ad lignum intensam cum eo deli-
gabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum. dein-
de ligno obliquo inter duas columnulas rectas adaptato,
vel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut
ala per transversum gradui accommodetur, manum infra
trahentes, sinemus in alteram partem reliquū corpus in sub-
limi pendere. tunc enim articulus ingreditur. Vbi fuerit
repositus, mediocris ex lana pila si quidem inflammationem
pars non sentiat, sicca: si sentiat, oleo madens alæ iniecta, de-
ligabitur. per hanc autē alam & humerum & alteram alam
vinculi deligationes literæ X figuram potissimum appare-
bunt. ita ut in hūc modum facta deligatura super affectum
humerum accommodetur, brachium autem costis collige-
tur, ipseque cubitus & summa manus, ex ceruice deuincian-
tur, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimum
diem vel tardius ubi fascias dissolueris, mediocri uti frictio-
ne præstat, eo quòd corpore solidiore facto, articulus ita fir-
metur, ut non facile prolabatur. Quod si autem crebro pro-
labatur, aut humiditatis vitio, aut ob aliam quampiam iam
diu factam elabendi viam, ad vñionem veniendum est, si-
cut suprà comprehendimus. Quam autem vel infantibus
in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementi-
bus, particula fuerit luxata, necdum reposita, in humero
quidem carnes nihil à naturali figura deficiunt, neq; enim
manus quodcūq; opus perficere impeditur, os autem bra-
chij breuius permanet, non augefcens, ac tales nominantur
galiancones. In femore etiam os incrementum non sentit, &
rotum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre
nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manēti-
bus quæ subiiciuntur partes, omniū iniuriis expostæ sunt.

Quanto cubiti articulus humero magis varius creatus est, tanto plus negotij prolapsus exhibet, & tardius quidem excidit, sed difficilius reponitur, propter tuberculorum sinuumq; frequentiam. Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur, quæ casum parathrema dixi, sæpe vero etiam ex toto in omnem partem prolabitur, præcipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcunq; prolapsus sit, & sinu vnde excidit apparente. Hæc verò potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Cōuenit autē protinus membrū reponere priusquam inflammatione occupetur: si quidem eam expertum, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maximè si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubito fiunt maximè dolorifica est & periculosa. Quod si modicè articulus inuersus sit, moderata etiam intentione restituitur. sic vt ministri manū exprorectam iuxta brachium cubitumq; contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excelsit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationē subito manus in flexu instaurat: vt palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora verò, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, violenta potissimum extensione efficitur: quæ in posteriora, flexu similiter vehementi. Quod si luxatio perseveret, etiam validam magis intensionem vsurpabimus, eiusmodi vero est potissimum quæ Hippocrates in brachio confraçto exposuit, vbi ligonis manubrium adhibebat. Porro recetiorum aliqui hunc in modum adaptant. ministris duobus manum vt dictum est, interdentibus, ita vt alter sursum ad alam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistēs, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac vbi iusserit vestimentum contractum in oblongum vel latam fasciam manibus ipsius simul & ægrotantis brachio circumdare, & in exteriora imaque propter summam manum retrahere, ipse deinceps cum tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Cæterū manus prius oleo illini debet, vt lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentiū manū vi prematur,

tur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modū figurata manu, ex spleniis & conuenienti deligatura curationem petemus.

De brachiali & digitis luxatis.

CAP. CXVI.

BRachialis digitorumq; luxatio nullum facessit negotium per se, nisi cum vlcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum vlcere sunt tractabitur. At sine vlcere luxatis, mediocri intensiōe, & remediis quæ inflammationem pellunt, medebimur.

De vertebris spinæ.

CAP. CXVII.

Vertebræ spinæ si ex toto prolabantur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ vel quamlibet compressionem non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus autem subinde affligitur, nunc in priorem partem distorta, ac vitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato vocant: interim vero in latera, quod scoliosin nuncupant. Quum igitur multæ simul vertebræ paululum adeò peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotunditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab vna vertebra ampliter peruersa id fieri. Nam magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur intorsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo quod per ventrem, antè oppositio fieri nequeat. qui enim in scala sic affectos intendunt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tussim, aut flatum excitant, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abundè ostendit. Quoniam vero subinde cuiusdam ossiculi spinæ fractio facta, cauum locum repræsentat, quemadmodū in capite de fracturis comprehensum est, aliqui vitium lordosin esse crediderunt, deinde hoc celerius per sanato (promptè enim callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certè difficilem recipiat. his etenim vrina supprimitur, alius non responder, corpus inhorrescit, postea etiam sine voluntate excrementa prorumpunt. Hæc autem eueniunt, neruis & musculis consortij lege laçessitis, ac celeriter agri moriuntur: præsertim si superiores & ceruicis vertebræ affectum fuerint expertæ. Cui vero iam

rò iam inde à paruulo potissimum vertebræ gibbatæ protuberant, vitium longum esse neq; celeriter mortē sed morbum accerfire, & insanabile Hippocrates prodidit. At quibus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidem per scalam, & rectam ægri suspensionem ac vteri inflationem adhibitæ, ridiculæ sunt. sola autem Hippocratis adaptatio sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignum magnū quod tantam longitudinem ac latitudinem habeat, vt hominem excipiat, aut scamnum huic æquale, prope parietem deponere, ac iuxta hunc ita extendere, vt in longitudinem pede non amplius absit, & vestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus infringatur, (erit autem hic lotus antequam super lignum scamnūmve insideat,) deinde loro pectus ipsius bis circumdatum, per alas iuxta dorsum vincire, initia lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atque hoc super paumentum iuxta ligni aut scamni subiecti extremum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex superiore parte continendum tradere, vt imo quidem extremo contra fixo, altiore supra caput tracto, opportuna fiat intentio: altero autem loro pedes simul & superiores talorum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lumbos ita vt huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema horum ligamentorum coniungemus: alij autem ligno pistillo respondentem, similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum pistillum repræsentans, ad prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus vt per ligna retractionem in diuersa moliantur. Quidam vero asellis dictis hanc efficiunt. sunt autem hi axes qui contra rectum lignum vertuntur: vtroq; huius magni ligni aut scamni latere iuxta extrema ad pedes, caputq; sita, lora inuoluantur. Quum autem sic intentio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus: si autem vsus postulat, etiam super ipsum insidebimus, nullum veriti periculum. At si ne sic quidem spina instauretur, & æger pressionem ferat, vtile est parietem adiacentem in longum canalis modo exculpere è regione gibberi, vt sculptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit agrotatis spina, neq; multo humilior, imò sculpturam prius præparatam esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris al-
terum

terum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibiter spina dirigatur. verum, ut inquit Hippocrates, sola intentio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc verum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intentionem prædictam, sine cōstrictione videlicet, moliri: post adaptationem vero, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis vertebribus comprehendat, loro lineo aut stuppa propter duritiem involuta, vertebribus ipsis imponi & conuenienter deligari debet. victus adhibebitur tenuis. At si post hæc quadam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu vtendum est. aliqui vero plumbeam laminam vsurparunt.

De coxa luxata.

CAP. CXVIII.

QUum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, qua tota sede promouetur, atque ex his, magis coxæ articulus. quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, quod elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoq; articulus ob vim quandam vehementem sinu suo exciderit, etiam multa luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem differentiæ, proueniunt, quatuorq; modis, imò locis coxa luxatur, vel enim in interiorem partem, vel exteriorem, vel priorem, vel posteriorem, prolabitur: verum intrò quidem & extrà continue, & multo frequentius intrò: in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorem partem coxa prolapsa est, iis crus affectum, si cum sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeunt, & in regione scroti & ani intermedia tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus autem in exteriora promota est, iis contrariæ notæ eueniunt. siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anum in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priorem partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non autem ad interiorem partem inclinare possunt, incedere conantes. Vrina his supprimitur, inguina intumescunt, nates rugosa ex carneq; apparent, calci inter ambulan

bulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, non aut poplitem, aut genu extendunt, neq; inflectere possunt prius quam inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris caput eminet. Quibus sanè iam inde à pueritia, aut certè longiore temporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, etià præsidium nihil promouerit, mēbro iam in orbem coacto. Quibus autem continenter excidit, hi curationem Hippocratis assument, quapropter statim reponi luxata debent. vetustæ siquidem coxæ luxationes, nullo modo confanescunt. Communiter itaq; in quatuor luxationibus instauratio cōgruet, tum quæ conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensione. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunquam femur continentes circumagentesq; huc illuc, articulum reposuimus. Quòd si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & valenter ad inguina quam iurime flexo, id quod requiritur effecimus: sin autem his non cesserit, intensione vtendum, primū per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiāq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circudent. Quòd si etiam valentior desideretur intētio, funibus contextis aut implicitis, vel loris crus deligare, omnino quidem supra talum: vt autem genu nihil patiatur, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionem vincire necesse non est, verum, vt dictum est, manibus subter alas comprehendatur, loriq; mollis & validi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus antè per inguina & clauiculam: postè per summas partes, duoq; lori initia ministro trademus, deinde omnes simul trahentes, vt ægrotantis corpus eleuetur, intensionem molientur. hic quidem intendendi modus communis est quatuor femoris luxationum differentiis, priuatim autem in singulis modus quo ossa vecte in sedem suam compelluntur, Græci mocliam dicunt, euariat. Intensio enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionē quæ scrotum & anum interiacer, trajecti medium inter femoris caput ipsamque regionem à scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. At adolescens quidā duabus vlnis affectum femur, quā crassus

sius est, circumdatum, in exteriora valenter extraher. Atque
 hic modus inferendi aliis expeditior est, cui si articulus non
 cesserit, aliis quoque utendū, variis quidem magis, sed hoc
 efficacioribus. intendi etenim hominem super lignum gran-
 dius aut scamnum oportet, in quo etiā spinæ gibbero vitia-
 tos intendimus. Insculpentur autem per totum ferè oblon-
 ga quadam ceu fossæ, quæ latitudinē altitudinēque tri-
 um digitorum, non maiorem habeant, dissidentes inuicem
 nō magis quā digitos quaternos, ut vecte iuxta extremum
 in ipsis resistente, in quācunque partē conueniat restituatur
 membrum. Per medium autem lignum aut scamnum, aliud
 impingatur lignum pedalis longitudinis, ligonis manubrij
 modo crassum, ut sub hoc intenso homine, lignum medium
 inter regionem à scroto ad anum porrectam & femoris ca-
 put consistat. Simul enim corpus iis qui à pedibus trahunt
 porrigi prohibebit, eoque ne usu quidem sæpe venit in con-
 traria ex superiore parte intensio: simul autem intenso quo-
 que homine ipsum lignum femoris caput foras propellet.
 ac intensio ad superius dictum modū administrabitur, præ-
 fertim pedis. Quod si ne sic quidem in sedem suam redierit,
 impactum lignum rectū auferri debet, ex latere autem hu-
 ius situs utrinque singula ligna infigentur, tanquam postes,
 non minus quā pedalis longitudinis. his aliud lignū ada-
 ptabitur gradus scalæ modo, ut trium lignorum figura H
 literam repræsentet, nam paulò inferius summis, medium li-
 gnū accommodabitur. Deinde in sanum latus iacēte homine
 sanum quidē crus inter hos postes subter gradum quodam-
 modo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte su-
 per hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur,
 substrato prius ei multiplici vestimento, ne femur cōtunda-
 tur. aliud autem lignum mediocriter latum tantam habens
 longitudinē ut à femoris capite vsque ad talum subiectum
 pertineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est
 hæc intensio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus,
 detrahare ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut vio-
 lentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cæ-
 terum est & alius reponendi modus sine intensione per li-
 gnū, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit,
 ægrotātis molliter costis alligare oportet, & pedes utrosq;
 valido loro molli per talos & super genu deuincire, ut qua-

tuor

tuor digitorum spatio inuicem distent: intenso autem affecto crure duobus digitis magis quàm alterum, hominem suspendere, vt caput cubitos duos à terra absit. Adolescens vero aliquis peritus vlnis suis femur affectum comprehendens quàm crassissimum est, vbi & caput femoris, subito pendere ex homine cogetur. facile nanque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, vt qui non multo apparatu peragatur, sed veluti miserabilè ipsum, pleriq; medici auersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit luxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas partes ferri conuenit, inguina dico & clauiculam. medicum autem ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quæ insculptæ sunt, ministro quodam vetitem ad sanum clunem ne cedat, obliiciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine intenso vir quidam validus dextræ manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul ad ima genu versus constringet. At si in posteriora prolapsus est articulamentum, non opus est quidem hominem in sublime vsque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intenderetur, vinculis non perilia, sed in crure, vt nuper dictum est, porrectis. Iam verò vti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, vbi & articulus excidit. atq; hæc sanè de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniam vero propter copiam humiditatis, veluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, visione vtendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

De Genu articulo.

CAP. CXIX.

Genu in treis parteis promouetur, interiorem nimirum, exteriorem, & iuxta poplitè. in priorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdè igitur intentionis vtentes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus, decenter deligabimus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes vt particula diutius immobilis conseruetur.

De tali articulo, vbi etiam de pedis digitis agitur. CAP. CXX.

Tali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si toto loco mutatus est, vehementiore indi

indiget auxilio. Tentandum itaque & hic per manus validiore intensione uti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoque longum aliquem & validum palum inter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens, ad pedis intentionem non cedat, imò prius defigetur, quam homo decumbat. Quod si magnum illud lignum adest, quod pedale aliud lignum per medium habere defixum diximus, super hoc intensiorem moliemur, ministro vno femur continente retrahenteque, alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumque pedem alius ad ima continebit. A repositione deligari tutò pes debet fasciis ad superiorem pedis partem, aliis ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. In hoc casu usque ad dies quadraginta in quiete homini perseverandum est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, vel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quadam intensiōe, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usque dum consanuerit, in lectulo perseverante. Caterum digitorum peruersio, ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruersisque, postquam instaurata sunt & conquierint, inflammationem in articulis, ut verisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, mollientibus remediis persanabimus, quorum materiem nullus qui in artis operibus versatur, ignorat.

De luxatis cum ulcere.

CAP. CXXI.

IN luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflammationis enim extensione iis qui adiacent nervis & musculis, dolores validi, convulsiones, & febres acutæ oboriuntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quò principalibus sunt vicina, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaque horum repositionem, valentiorémque deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntque præsidis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis super-

G

esse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis confu-
lit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac in-
ter initia statim quum pars adhuc inflammatione caret, pro-
lapsum articulum mediocri intentione reponemus. quod si
secundum animi institutum euenerit, persistemus, sola ra-
tione quæ inflammationem arcet, vtentes: si inflammatio
quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædictorum contige-
rit, rursus eicere ipsos necessariū est, siquidē citra vim por-
rigatur. at si hoc quoq; discriminē metuamus, (nō enim por-
rigentur forsan inflammata) satius est per initia in maiori-
bus quidem articulis repositione supersedere. vbi verò in-
flammatiō declinauerit, (id autem fit post septimū nonūm-
ve diem) præfati etiam periculum, quod ex repositione fu-
turum sit, tum quod si non repositum fuerit, claudi omni-
no superuiuent, conabimur tutò, administrationem obire,
vtentes, propter commoditatem, etiam veste. Porro vlceris
curationem vt in fracturis cum vlcere dictum est, admini-
strabimus.

De luxatione cum fractura facta.

CAP. CXXII.

AT si luxatio sine vlcere cum fractura euenerit, cōmu-
ni intentione & per manus conformatione vtendū est,
vt in simplicibus fracturis docuimus: cum vlcere autem rur-
sus, ex fracturis cum exulceratione & luxationibus priua-
tim expositis, congruam administrationem petemus.

FINIS LIBRI SEXTI, IOAN-

NE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

PAV

PAULI AEGI- NETAE LIBER VII.

IOANNE GVINTERIO


ANDERNACO IN-

TERPRETE.

*

De temperamentis, quæ per gustatus qualitates deprehenduntur.

CAPVT I.



DE SENSILIVM corporum temperamento, coniecturâ ex odoratu aliquam sumere, haud est securum. Nā inodora, substantiis crassâ quidem sunt, sed quanto sint calore, & frigiditate prædita non ita constat: odora verò, & tenuia quodammodo sunt & calida, sed quatenus id sint, neutiquam ostenditur, eo quòd substantiam habeant inæqualem. Multo adhuc minus ex coloribus exactè quid licet colligere, cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiuntur. Verum in gustatu omnes similiter particule corporum gustabilium, vt hoc vocabuli vsurpem, linguæ obiciuntur, sensumque mouent: vt manifestò ex ipso quoque temperamentorum vires deprehendamus. Quod igitur astringit, cogere, obturare, densare, repellere, incrassare, atque ante hæc omnia, refrigerare, siccareque est idoneum. Acidum incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpurgare citra calefactionem potest. Acre, similem acido effectum præstat, extenuando purgandoque, sed acidum refrigerando euariat: acre, calefaciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissipat, rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amarum, meatus expurgat, abstergit, extenuat, incidit succorum spissitudinem, sine calore manifesto. Aquosum frigidum,

G 2

incrassat, cogit, cōtrahit, obturat, sensum aufert, stuporēque inducit. Salsum contrahit, stringit, condit, siccatur, citra insignem caliditatem frigiditatemve. Dulce laxat, cōcoquit, emollit, rarefacit: oleosum humectat, emollit & laxat.

De ordine & intervallo temperamentorum.

CAP. II.

MOderatum sanè medicamentum ita ut temperatura ei respōdeat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec humectet, nec refrigeret, nec calefaciat, ipsum neq; siccum, neq; humidum, neq; frigidum, neq; calidum nominare convenit. Quod autē siccus est, aut humidus, aut calidus, aut frigidus, à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in vnoquoq; excessu, quatuor, quantum ad vsum spectat, ordines statuisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod utiq; nos calefacit, sed nō euidenter, ut illius rationali quadam demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum, & humidū quodcunq; demonstrationem requirat, nondum actionem validam neq; euidentem sortitū. At quæ manifestò iam siccare vel humectare vel calefacere vel refrigerare possunt, ad secundum huiusmodi ordinē referentur. quæ vehementer iam sed non summè id faciunt, tertio annumerantur. quæ verò sic calefaciunt ut crustas inducant, quarti sunt ordinis. similiter quæ refrigerant, ut iam sensu priuent, hæc quoq; ad quartum relegantur. Porro siccus medicamentum nullum est inuenire quarti ordinis, si non vratur. Nam si quod summè exiccat, id planè vrit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx. Tertij verò ordinis siccantium potest aliquod esse etiam non vrens, quemadmodum quæ vehementer astringunt omnia, è quorum numero est omphacium, rhus, & alumen.

De particularium simplicium medicamentorum facultatibus.

CAP. III.

Abrotanum.

ABrotanū & calefacit & siccatur in tertio abscessu, discutiendi incidendiq; facultate præditum, modicè verò astringit, totiūq; corpori cum oleo infricatū, rigores circuitu remeantes persanat, stomacho minus amicum est. crematum maiores in siccando vires acquirit, quàm quòd ignem non est expertum. Capillorum defluuia quas alopecias vocant cum tenui quodam oleo inunctum explet,

Agg

Agallochum.

AGALLOCHVM lignū est Indicum Thuię ligno simile, odoratum. Mansum animę suauitatem commendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota drachmę pondere, flaccidū ex superflua humiditate stomachū resolutūq; cōfir-
mat. Ad hęc iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulat.

Agaricum.

AGARICVM radix est, in arboris trunco prognata, corpore fungoso, quę ex aëria terrestriq; substantia coaluerit, vis eius est discutere & crassos humores incidere. Viscerum maximē obstructionibus purgando medetur.

Ageraton.

AGERATON vim habet discutiendi, & leniter etiam inflammationem quodammodo arcer.

Agnus, qui vitex dicitur.

VITEX qui gręc agnus vel lygos appellatur, in tertio ordinatum calefacit tum siccatur, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandę facere creditur, nō modō commanducatus potusq;, verū etiam in cubitum substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infarctus liberat epotum. Frixum autem minus est flatulentum, & facile in membra distribuitur.

Agrestis, gramen.

GRAMEN Parnasi admodum vtile est. Siccatur & modicē refrigerat: tenuiūmq; partium & subacerbum existit. eoq; cruenta vulnera glutinat: Decoctum eius calculos' confringit.

Anchuse quatuor.

QVATVOR sunt anchusę, non eiusdē omnes facultatis. Nā onoclēę appellatę radix astringēdi vim habet & quidam subamarū, ad lienis renūmq; dolores efficax, cataplas-
matis autē modo cū polentis applicata erysipelatis succurrit: folia minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuiū bibuntur. Quę dicitur lycopsis, astringens quodāmodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos verō seu Alcibiadios nūcupata medicatior quodammodo, viperarū moribus succurrit forma cataplasmati adhibita, alligata, & comesta. Quarta omnibus aliis breuior, sine nomine propemodū, maiore quā Alcibiadios, amaritudine donata: latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

Adarce.

A D A R C E veluti spuma quædam est aquæ falsæ in cre-
miis & arundinibus concreta, tantum verò acrimoniæ ha-
bet & caloris, vt extrinsecus cum aliis imposita ferè vrat:
intrò eam assumere nulli licet.

Adiantum.

A D I A N T V M siccatur, extenuatur, & modicè discutit, calore
ac frigidityte medium quodammodo est: Alopeciiis igitur
medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, è pul-
mone reiectiones deficcatur, alui profluuium sistit.

Aizoon, semperuiuum.

S E M P E R V I V V M duplex, refrigerat quidè ex tertio ab-
scellu, deficcatur autem astringitq; mediocriter. Hac ratione
igitur valet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesque
ex fluxione concitatas conuenit.

Actonichon.

De Aëtonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

Athera.

A T H E R A pulticula est sorbilis è zea molita, aut è fru-
mento confecta infantibus accommodatur. Item cataplas-
matis vice illinitur.

Aegilops.

A E G I L O P S discutiendi facultate prædita est, vnde etiã
indurescentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculo-
rum fistula est, opitulatur.

Aegiros, populus nigra.

P O P V L V S nigra in primo ordine calefacit, modicè siccatur,
& tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto cataplasmatibus
instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quæ verò ex
ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis: & mala-
gmatis, fructus cum aceto potus comitiales auxiliatur.

Aedæon, hoc est, pudendum masculi cerui.

P V D E N D V M cerui masculi siccatur tritumq; ex vino po-
tum, viperarum moribus subuenit, miscetur autem com-
positis remediis.

Aethale, fuligo.

A E T H A L E & lygnys in litera L, exponetur.

Aethiopsis.

A E T H I O P I S similia verbasco habet folia, radicis deco-
ctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinè reiciē-
tibus,

tibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

Sima sanguis.

SANGVIS frigidus nullus est, verum suillus, humidus est, & minus calet, humano maximè temperamento similis. Columbarum vero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranæ infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Noctuæ sanguis cum vino aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, virginum mamillas tuetur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarum, chamelæontis, & ricinorum qui in canibus hærentes inueniuntur, sanguis facit. Galenus autem hæc facto rei experimēto falsa esse pronuntiat. Caprarum vero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renūq; calculos conterit. Gallinarum cohortaliū sanguinis è cerebri membrana profuua coercet. Agnus comitalibus prodest: hœdinus nuper coagulatus circa heminæ dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, sylvestriū caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equarum quæ sunt expertæ admissuram, remediis exedentibus, *συνπικνὰ* Græci vocant, admiscetur. Antidotum ex sanguinibus quod in lethalia medicamenta efficax est, anaris, hœdi, & anseris, sanguinem recipit.

Aera, lolium.

LOLIUM calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertingit, iridi facultate simile.

Acacalis.

ACACALIS fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorū efficacibus miscetur.

Acacia.

ACACIA tertij quidem desiccantium ordinis est, primi vero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerba & terrestris.

Acalyphe, vrtica.

VRTICAE & fructus & folia tenuē habēt substantiā, citra quæ rosionē siccāt, tumores discutiūt, abstergūt, ventrē subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiā ad venērē incitāt.

Acanthus.

A C A N T H V M alij à nigro colore foliorū melamphillā appellant, alij pæderoten, vis eius est discutere & siccare.

Acanthium.

A C A N T H I V M tenui calidāq; natura præditum, convulsis auxiliatur.

Acantha leuce, spina alba.

S P I N A alba radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, eoq; & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumq; doloribus succurrit: semen tenue calidumq; est, qua vi convulsioni quoque medetur.

Acantha, id est, spina Aegyptia, vel Arabica.

S P I N A Aegyptia, secūdū alios Arabica, astringit siccaturq; impensè, vnde & sanguinè, & alias defluxiones retinet.

Acinos.

A C I N O S ocymo similis, mediocres astringendi vires habet, ideoq; aluum & menses pota sistit, applicata vero panos & sacros ignes perfanat.

Aconitum.

A C O N I T V M, quod quidē pardalianches dicitur, exedentem lethalemq; vim habet, quā ob causam intrò non assumitur: extrinsecus tamē in carnibus quas exedi oporteat, vtilicet. quod vero à lupis lycoctinō dicitur, similes priori vires sortitum, priuatim lupos, vt illud pantheras enecat.

Acoron.

A C O R O N in tertio abscessu calefacit & desiccatur, radice ipsius ad ciendam vrinam, lienisque scirrhum vtimur: cæterum membranæ oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

Acrides, locusta.

L O C V S T A E vrinæ angustis præsertimque mulierum, odoris suffitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus cum vino salutariter bibitur.

Acte, hoc est, sambucus. & chamaacte, id est, ebulus.

S A M B V C V S, & ebulus qui chamaacte dicitur, quasi humilis sambucus, vterque desicandi facultatem obtinet: modicè discutit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquam per aluum educit.

Als, sal.

S A L quilibet vim habet vehementer siccam & astringen-

Item: vnde quicquid in corporibus humidum est, id omne epascit, reliquum astrictione leuiter contrahit, qua ratione ad condimenta omnia adhibetur, putredinemque arcet: rematus vero sal magis discutit.

Althæa.

ALTHÆA seu ebiscus species est maluæ syluestris, visus discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phlegmata concoquit, radix autem & semen reliqua sanè intensa habet, verum exterit etiam vitilignes abstergitque præciue autem semen calculos quoque confringit.

Alimon.

ALIMON dissimilarium partium est, salsum gustu & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, lactis itaq; & seminis vberitatem conciliat.

Alcea.

ALCEA syluestris maluæ & hæc genus est, in vino pota intestinorum torminibus & erosionibus medetur, multo magis ipsius radix.

Alcyonium.

ALCYONII genera omnia quidem abstergunt discutiantque, acri qualitate prædita, sed milesium (est autem vermiculum purpureumq;) cæteris præstat: quare combustum, pilorum defluuia, quæ alopecie dicuntur, impetigines, vitiliginisque abstergit. Porro, quod in superficie læuorem habet & vehementer acris est, non modò abstergit, verum etiam excoriat. Postremò, quod lanis succidis respondet, omnium est imbecillimum.

Alme, quæ muria dicitur.

MURIA nulli alteri mixta substantiæ, similes habet salivares vires, sed imbecilliores aqua temperata: at salforum piscium oliuarumque colymbadum muria valentius abstergit, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores clystere iniicitur.

Aloë.

ALOË calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq;, aluum subducit, lota vero minus detergit, sed stomacho gratior est, inflammationem prohibet, & vlceribus cicatricem inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus,

Alos Anthos, id est, salis flos.

F L O S salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abundè discutiens.

Alos achne, id est, salis spuma.

S A L I S spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidem illo magisque discutiens, sed minus contrahit.

Alsine, auricula muris.

A L S I N E, quam alij muris auriculam vocant, vim habet helxinæ similem quæ refrigerat humectâtque, quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

Alypon.

A L Y P I semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumptum cum sale & aceto, veruntamen intestina leuiter exulcerat.

Alysson.

A L Y S S O N quod à cane rabido morfos iuuet, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, absterioriaque vi præditum, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorque cutis est, exterit.

Alopex, vulpes.

V V L P E S viua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi vim oleo conciliat, adeò vt humores altè fixos in cutem extrahat, hinc articularij in solio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratum vero moderatiorem reddidere.

Amaracus.

A M A R A C V s tertio in ordine calefacit, secundo desiccatur.

Amarantus.

A M A R A N T V S extenuat, incidit, menseis cum vino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulso omneisque fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

Ambrosia.

A M B R O S I A cataplasmatismodo imposita vim habet astringendi repellendique.

Ami.

A M I ad terrium calefacientium siccantiumque ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficax, semen ipsius longè utilissimum est.

Amiantum.

A M I A N T V M in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod

quod in ignem coniectū accenditur quidem inflammaturq̃;
sed non comburitur, vtuntur eo nonnulli in desiccantibus
psilothris.

Ammos, arena.

A R E N A littorum maris affatim desiccatur, feruefacta Sole
quas subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorum in
a coopertis: torrefacta autem ad sicca fomenta in salis, &
nilij vicem adhibetur.

Ammoniacum thymiana, quod latinis ammoniacum suffimen, &

ammoniaci gutta dicitur.

A M M O N I A C U M thymiana liquor est tanta molliendi
virtute præditus, vt scirrhus & tophos discutiat.

Amurca.

A M V R C A secundi calefacientium siccantiumq̃; ordinis
est, eiusq̃; intensi, hac etenim ratione vlcera in siccis quidem
corporibus curant: in aliis autem intendit, irritatq̃;

Ampeloprasum, agreste porrum.

A M P E L O P R A S U M, seu porrū sylvestre acerrimū est ca-
lidissimūq̃; in summo ordine, quamobrē etiā exulcerat,
inciditq̃; viscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

Ampelos agria, vitis sylvestris.

V I T I S sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi fa-
cultate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

Ampelos hemeros, vitis sativa.

V I T I S sativæ facultas respōdet sylvestri, sed imbecillior est.

Ampelos leuce, vitis alba, quæ & bryonia dicitur.

V I T I S albæ, quam & bryoniam & psilothron appellāt,
germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæq̃; ciendæ
sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida,
vnde fit, vt lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem
cum ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

Ampelos melena, vitis nigra.

V I T I S nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori
consimilis est, nisi quod inefficacior.

Amygdala.

A M Y G D A L A quæ quidem amara sunt extenuant, visco-
sos crassosq̃; humores altius hærentes euellunt, tum cutis
vitia abstergunt: arbor eandem vim repræsentat: dulcia ve-
ro amygdala moderato calore donata sunt.

Amylon.

A M Y L O N ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato
conficitur, quæ (aquā dico) quinquies in die mutatur: quum
autem

autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quam superfuderis, furfures secernere siccaréque ad solem oportet protinus antequam ace scat. Cæterum vis eius est refrigerare mediocriter, & siccare, & actia lenire.

Amomum.

AMOMVM acoro virtute, respondet, sed hoc quidem siccatur magis: illud autem expeditius concoquit.

Anagallis.

ANAGALLIS vtraque vim habet abunde abstergentem subcalidam quoque nonnullam & attractricem, ut etiã aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

Anagyris.

ANAGYRVS frutex est grauis odoris, acrisque, calefacit & discutit, semen tenuius, & vomitui ciendo est.

Andrachne, portulaca.

PORTULACA tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat, qua de re etiam caufone laborantes ventriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suodentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictionem vero, & intestinorum tormina & sanguinis profluvia coërcet.

Androsamon.

ANDROSAEMI duplex genus est, alterum ascyrrhon vel ascyrrhoïdes nominatur specie hyperici, alterum dionyfias. semen ipforum purgat, folia autem magis desiccant.

Androsarces.

ANDROSARCES amara acrisque herba est vis eius est discutere & desiccare potum ipsa, tum semen ipsius urinam promouet.

Anemone.

ANEMONAE omnes vim habent acrem abstersoriamq; item extrahendi, & oris vasorum recludendis, idoneam quapituitam illiciunt, lepras tollunt appositu, & lacin mammas suggerunt.

Anethum.

ANETHVM calefacit in secundo ordine intenso siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, vstum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, ex humidi

iditate nimia flaccidis vlceribus applicatum confert: viri-
e autem humidius minuſq; calidum eſt, & concoquit.

Anthyllis.

ANTHYLLIS duplex quidem eſt, ſed vtraque vlcera
erſiccat, quæ chamæpityi reſponder, tenuior eſt, quare
etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem
abſtergit.

Aniſum.

ANISI ſemen acrius eſt, in tertio abſceſſu calefaciens,
ſiccantſq; hinc utiq; & vrinam mouet, & flatus diſcutit.

Antirrhinon, vel anarrhinon.

ANTIRRHINON ſiue anarrhinon perſimilem ingui-
narię vim obtinet ſed minus efficacem, atq; ex illo hoc quo-
que cognosces.

Anonis, vel ononis.

ANONIS ſiue ononis calida facultate eſt, præſertimque
eius radix, cuius ſuccus cum vino potus vrinam ducit, calcu-
los conterit, cruſtas rumpit & dentes mitigat.

Aparine.

A PARINE, quam alij philantropon, alij omphacocar-
pon appellant, modicè abſtergit & deſiccat, item tenue quip-
pam in ſe continet.

Apios, pirus.

A PIOS temperatura inæqualis eſt, terreſtre aliud ſorti-
ta, aliud aquoſum ob quod manducata ſtomachum iuuat ſi-
timq; arcet, admota vero forma cataplaſmatis, ſiccant refri-
geratq; mediocriter.

Apocynon, aut cynocrambe, canina braſſica.

APOCYNON aut cynocrambe, dicitur autem & cyno-
moron quòd celerrimè canes enecet, eademq; vi maleficiũ
& lethalis homini eſt, fœdi admodum odoris, & calida ci-
tra ſiccitatem, vnde etiam diſcutiendi facultatem applicata
repræſentat.

Apochyma.

APOCHYMA pix eſt verus quæ à nauigiis deraditur, tu-
mores diffundit, ſiccant & diſcutit.

Arachne, araneus.

ARANEVS cum emplastro ſubactus, impoſitusq; fron-
ti, & temporibus tertianarum februm circuitus finit, vt
Dioſcorides memoriæ mandauit, tela ipſius applicata ſan-
guinis

guinis fluores sistit, & vlcera in summa cute ab inflammationibus tuctur.

Argemone.

ARGEMONAE facultas est abstergere simul & discutere.

Arisarum.

ARISARVM multo breuius est aro, acriusq; , radicem oliuæ magnitudine obtinet.

Aristolochia, malum terræ.

ARISTOLOCHIA omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas vtilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematidis hoc est sarmentacea, odorata quidē sed imbecillior. Longa verò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quàm rotunda.

Arcentos, Iuniperus.

IUNIPERVS calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidē similiter, sed in primo gradu siccatur.

Arction.

ARCTION, prosopites, folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discutit quidē siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius vetusta vlcera persanant.

Arction.

ARCTION verbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, vis eius est tenuis, siccans, & mediocriter astringens.

Armeniacum.

ARMENIACVM, vim habet abstersoriam simul cum modica acrimonia & minore astringitione, hinc etiam oculariis medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis vsum habet.

Arnabo.

ARNABO, odoramentis adnumeratur, ob quod vnguentis potissimum expetitur, calida siccaq; potentia præditum in tertio ordine, cassia & carpesio simile, vnde Posidonius vbi cinamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

Arnoglossum, plantago.

PLANTAGO refrigerat pariter & desiccatur in abcessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astringitionis non nihil adsit, quare ad maligna vlcera, fluxiones, putredinesq; , temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoq; profluvia cohibet & plurimis con-

gruit,

uit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & rigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

Aron.

ARON calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri cauda & absterforia substantia & hoc generatū, radices ipsius validiores sunt, dracunculus autem efficacior.

Arsenicum, auripigmentum.

ARSENICI vis est caustica, vtuntur eo & in pilis abo-
dis, quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit,
flum verò tenuius redditur.

Artemisia.

ARTEMISIA vtraq; secundo in ordine calefacit, siccatur
primo, tenui substantia prædita, eoq; renum calculos com-
minuit, & vteri fomentis accommodatur.

Artos, panis.

PANIS illitus magis discutit quàm triticum, ceu & salis
& fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ altè hæ-
rent, fermentum idoneum est.

Asarum.

ASARVM similè acoro virtutē habet, sed magis intēsam.

Asbole, fuligo pictorum.

FVLIGO qua pictores vtuntur, ex vitrariis officinis su-
nitur, vim habet discutientem, adeoq; acrem, vt & vrat, &
exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem
perducit.

Ascalabotes, stellio transmarinus.

ASCALABOTES animal ad reliqua sanè inutile est, sed
scorpionum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: ex-
petitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

Asclepias.

ASCLEPIAS calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsio-
nibus cum vino pota competit, venenatorum autem morli-
bus & maleficis mammarum muliebriumq; locorum vitiis
applicatur.

Ascyrrhon.

ASCYRRHON in androsimo expositum est.

Aspalathus.

ASPALATHVS dissimili cōstat virtute, acri & astringen-
te, & ob vtramq; siccatur, idcirco & putredini, & fluxionibus
utilis est,

Aspa

Asparagus.

ASPARAGVS petræus, aut myacanthinus abstergit vtrique, sed calore, & frigiditate medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Item dētium doloribus medetur.

Asplenon.

ASPLENON tenue quidem est virtute, non tamen calidum, hac vtrique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

Astaphis, vna passa.

ASTAPHIS domestica sanè concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, sylvestris autem acris adeò est, vt pituitam per os educat, & vehementer abstergat.

Aster atticus, siue inguinalis herba.

ASTER atticus, quam alij herbam inguinalem vocant, ob hoc ipsum quòd non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixta est virtutis, discutientis, & refrigeratoriæ.

Astragalus.

ASTRAGALVS frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse non ignauiter deficcat: vlcera itaq; vetusta ad cicatricem perducit, & aluum fluentem radix in vino pota sistit: plurimus in Phæneo Arcadiæ nascitur.

Asphaltus, bitumen.

BITVMEN ficit, calefacitq; in ordine secundo, quare vlcera cruenta glutinat.

Asphodelus, hastula regia.

ASPHODELI radix vim habet detergentem discutientemq; concremata autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior euadit, quo fit vt alopeciis medeatur.

Atractylis.

ATRACTYLIS seu cnicum sylvestre ex spinosorum genere habetur, vi siccante, & mediocriter calida.

Atriplex.

ATRIPLEX humectat sanè in secundo, refrigerat in primo ordine, qua de causa etiam ventrem celeriter permeat; semen ipsius vi pollet absterforia, vnde ictericis ex iocinoris obstructione accommodatum est.

Aphace.

APHACE lenticula modo astringit, sed manducata agrius

egrius concoquitur, valentius siccatur, mediocriter calefaciens.

Aphronitrum.

APHRONITRI vis est discutere & abstergere, ut non solum sordida exerat, sed etiam pruritu, quippe sanem dissipat, medeatur, potum verò stomacho nocet.

Aphros, spuma nitri.

SPUMA nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior substantia, ob quod & levis, farinae modo existit.

Achras, pirum agreste.

PIRUM agreste eandem piro domestico virtutem habet, sed magis intensam, quapropter magnis vulneribus glutinandis est.

Absinthium.

ABSINTHIUM calidum primo abscessu est, siccum tertio, astringenti, amara, & acri simul donatum qualitate: quibus biliosos in ventriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentiam nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENUMERATIO EORUM QUAE
AB INCIPIUNT.

Balanus myrsefica, glans vnguentaria.

QUOD intra vnguentariam glandem veluti carnosum est, abstergendi incidendiq; cum astringente vim habet, eamq; ob causam drachmae unius pondere cum multa pota, facile vomitiones ciat, & inferiorem ventrem subducit, cum posca verò ad viscerum obstructions conuenit: item cutis vitia cum aceto perunctum abstergit. Cortex verò ipsius valde astringit.

Baccharis.

BACCHARIS odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius radicis decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menseis citat, folia ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

Balanstium.

BALAVSTIUM, sylvestris punice flos est, valide astringens, sicca & frigida facultate praeditum, itaq; summae cutis ulcera ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

H

Balsamum.

BALSAMI, quod veluti lignum est, siccatur & calefacit in secundo ordine, subtilémque habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proximè hunc virtute accedit, sed minus tenuis est.

Ballote, marrubium nigrum.

BALLOTE quod alij marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facultatis, impositum cum sale rabidi canis moribus medetur.

Batus, rubus.

BATI fruticosum, abundè astringit & siccatur, qua de causa & vulnera committit, & defluxiones sistit, radix autè præter astringentem, non parum etiam subtilis est, unde renum calculos confringere est idonea, fructus si maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem & acerbus est & validè siccatur, præsertim retorridus. Eadem etiam flos efficit.

Batrachion, ranunculus herba.

RANUNCULI quatuor sunt genera, omnia excellenter calida, sicca, acris, vrentia, adeò ut vlcus cum dolore excitent; quibus si modicè utaris, cutis vitia tantùm exterunt, radix autè arida sternutamentis cicudis est medicamentum.

Batrachi, rana.

RANAE aduersus virulentorum morsus in iusculo eduntur. Crematarum ranarum cinis maximè siccans redditus, sanguinis eruptiones sistit & alopeciis cum pice liquida medetur.

Bdellium.

BDELLIUM tum Scythicum tum Arabicum scirrhus emollit, præsertimq; recentes, Arabicum verò vrinæ ciendæ est, calculos comminuit, & cruda concoquit.

Betonica.

BETONICA herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potissimum locis petrosis, qua & in renum medicinis vtuntur. Est autem apud Romanos alia quædam betonica dicta, quâ Dioscorides nominat cefiron, alij verò psychotrophon, eò quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem: at vltra quod vrinam ciet, etiam aliis multis benefacit, potissimumque radix ipsius, cum hydromelite pota vomitionem mouet,

mouet, folia autem aluum subducunt.

Bechium tuſſilago.

TVSSILAGO, quæ Græcis bechion ſiue bechicon inde dicitur, quòd tuſſes & recta ceruice ſpirantes, ſuffitu iuuat, conſtat ex calida aquoſaq; ſubſtantia.

Blitum.

BLITVM eſculentum olus eſt, humidum frigidumq; in abſceſſu ſecundo.

Bulbus.

BVLBV eſculentus amari ſimul & aſtringentis modicè compos eſt, ſiccatur glutinatq; vulnera, & abſtergit. Qui autem vomitum cit, calidiorẽ quàm alter repræſentat.

Botrys.

BOTRYS, quam alij ambroſiam, alij artemiſiam dicunt, planta eſt inſigniter odorata, hæc cum vino pota, ſub recta ceruice ſpirantibus quos orthopnoicos appellant, ſuccurrit.

Bubonium, inguinale herba.

BVBONIUM in attico aſtere dictum eſt.

Bugloſſum, lingua bubula.

BVGLOſſVM humidum calidumq; temperamento eſt, eamq; ob cauſam vino iniectum lætitiã animi conciliare dicitur.

Bunium.

BVNIUM quod alij arction appellant, calidum eſt, vrinæ & menſibus educendis accommodatum, huic reſpondet & pseudobunium.

Bupreſſis.

BVPREſſIS animalculum eſt cantharidi ſimile, reponitur itaq; ſicut & illa.

Butyrum.

BVTYRVM concoquit & modicè diſcutit, in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præſertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

Buphthalmon.

BVPHTHALMON ſimilem habet chamæmelo florem, ſed multo maiorem acriorẽq; ideo & diſcutientem, adeò vt cerato mixtum duritias remolliat.

Brathy, herba Sabina.

SABINA, cupreſſo ſimilis calefacit ſiccaturq; in tertio ordine, tenuiſſimaq; eſt, extenuat & diſcutit pota, tũ in putredines

cupresso similiter efficax est.

Britannica.

BRITANNICA astringit & conglutinat, sylvestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes persanat.

Bromus, auena.

AVENA similem hordeo obtinet facultatem, siccatur & modicè citra corrosionem discutit, iam & nonnullius astrictionis compos est, unde & alui profluviis subuenit.

Bryon thalassion, muscus marinus.

MVSCVS marinus, refrigerat simul & astringit, eoq; feruentes inflammationes cataplasmate admotus, iuuat.

Bryon, muscus.

BRYON, quod alij splanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisque inuenitur, discutiendi simul & molliendi vim moderatam obtinet potissimum quod cedris adheret.

Bryonia.

BRYONIA dicta est vitis alba.

Initium literæ G.

Gala, lac.

LAC omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius vim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas. id verò quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atq; ideo acrimoniam obtundit: coctum verò lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, praesens fit remedium dysenteriae, & acrium in ventrem defluxionum. Caterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliaq; acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillum, hinc asininum, ouillumq; postremo vaccinum.

Gale, mustela.

MVSTELAE concremata cinis abundè discutit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inarefacta aut inueteraq; mustela comitialibus auxiliatur.

Galion.

GALION à coagulando lacte dictum est, a paring simile, sic candi

candi vim, mediocremque acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis eruptiones & ambusta, congruit.

Galopsis, vel galiopsis.

GALOPSIS, quam alij galibdolon appellant, vrticæ similis herba est, lævior autem, & fœdi odoris, scirrhosos tumores dissipat & emollit, item ad vlcera serpentina facit in cataplasmate impolita.

Garum.

GARVM calefacit exiccatque efficaciter, ac ideo aduersus vlcera putrida extrinsecus eo vtuntur, præterea contra intestinorum tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

Gentiana.

GENTIANA radix efficax admodum est extenuare, perurgare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

Geranium.

GERANIVM id quod foliis respondet anemonæ, radicem habet esculentam, quæ cum vino drachmæ modo pota vteri inflammationes dissolvit. altera geranij species ad medicinam inutilis est.

Ge, terra.

OMNIS terra desiccatur, quæ vero alterius substantiæ expers est, etiam sine morsu id facit. at si ignea quædam ipsi qualitas admixta sit lotionem hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium particularum quæ siccari possunt curationi accommodata est, Aegyptio igitur luto vtuntur contra aquas cutem subeuntes, & lienosos affectus, ite ad fungosos laxosque tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnium minimum, quæ sphragis dicitur, siccatur pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti vires habet, vlceribus malignis cum aceto aut vino medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, & depascentem dysenteriam intestino mulsâ prius, deinde muria per clysterem eloto, coercet. Minium rubricum vehementius, quàm lemnium obstruentibus quæ emplastica dicuntur, miscetur medicinis, & pota lombricos interimit, sed multo lenior est Samia quàm Lemnia terra, ceu glutinans & viscosa, quare vtendum ea est in his quæ leniri oporteat. & sanguinis reiectiones, quacunque ex parte fiant, compescit. Selenusia & Chia maiore abstergendi

virtute pollent, idéoq; mulieribus ad nitorem cutis & leuorem in facie utilis est, vlceribus carnem & cicatricem inducit, præsertim ambustis. Cimolia mixta facultatis est, refrigerantis discutientisq; idq; illota. lota verò magis refrigerat, & ambustis ex postea medetur. Ampelitis, est autē ea quæ vitibus inungitur, quòd innascentes ipsis vermes enecet, siccet & discutit egregiè citra erosionem. Cretica, aëria est, & sine rosione abstergit. Erethrias euidenter astringit, concretata verò & elota sine rosione desiccet, præstantior verò est cinerea. Pnigitis similes cimoliæ vires repræsentat, sed colore nigrescit. Armenia, quam etiam bolum nominant, summè desiccet, vnde dysentericis, alui fluxionibus, sputo cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, vlceribus humidis, & pestilentialibus vitiis strenuè opitulatur. Cæterum cum vino tepidi diluto bibitur: si febris adsit, cū aqua. Alana autem gleba Armeniæ vim obtinet. Ochra vim habet discutiendi exedendiq; reprimi igitur supercrescentia vlcera, & caua cum cerato mixta replet.

Geras, senecta, anguis.

SENECTA anguis affatim siccet: aceto igitur subferuefacta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuium cum melle tritum delitumq; oculorum aciem maximè iuuat.

Ges entera, terra intestina, seu vermes terreni.

LUMBRI CI terræ detriti neruorum vulneribus impositi, repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

Gigarta, nuclei acinorum vix.

NVCLBI acinorum vix, desiccant ordine secundo, refrigerant primo. quum itaq; abundè sint acerbi omnibus alui vitiis fluidis, conueniunt.

Gingidium.

GINGIDIUM calorem non adedò manifestum sortitum est, cæterū siccet in abscessu tertio, & astringit, quæ de causa & stomacho vtile est.

Glancium.

GLAVCIUM astringit, sed ita vt etiam nonnihil gustati sit ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi erysipelatis non tamen validis succurrit.

Glaux.

GLAVX herba calida & humida temperamento est, vnde ad lac generandum efficax est.

Gle

Glecon, pulegium.

PVLEGIUM calefacit, & extenuat vehementer, vnde si cataplasmate applicetur ruborem excitat, & crassios viscososque humores e thorace & pulmone emolitur.

Glaos, sordes balnearum.

SORDES balnearum calefaciunt modicè, emolliunt, discutiunt, rhagadibus ani & condylomatis accommodatæ.

Glycyrriza, dulcis radícula.

GLYCYRRIZA tepidi humidique temperamenti est, ali cuius etiam astrictiōis particeps, vnde, & asperitates læuigat, non arteriæ tantum, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

Glycysside, pæonia.

GLYCYSIDE quam: liij pentameron, nonnulli præoniam vocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccantem, cui etiam astrictiōis nonnihil inest, quapropter menscis ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalæ pota cum vino: at si hoc austerum fuerit, alui quoque fluores coërcet, adalligata verò puero, morbum comitalem abigit.

Gnaphalium, centunculus.

CENTUNCVLVS dictus est gnaphalium quòd foliis ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, vtamur. sunt autem calida & modicè astringentia, atque hinc ad dysenterias cum vino austero bibuntur.

Gongylis rapum.

RAPI & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, veneremque excitant.

Gordilion.

GORDYLION alij seseli appellant, calidum est, vrinæ & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctæ, quæ in thorace hærent, educit.

Gyris, pollen farinaceus.

POLLEN virtute respondet amyio, sed calidior est.

Gypsum.

GYP SVM vim habet siccantem opplentemque, propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit temperatum cum polline candido oui liquore, vltum vim opplendi non similiter retinet, verum magis siccet & repellit, præsertim cum polca.

Quæ à D incipiunt.

Dades, teide.

TEDAE acce quiddam habent, item vim concoquendi, & abstergerendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

Damascena.

DAMASCENA, quum ad pruna ventum erit, exponam.

Damasonium.

DAMASONIUM absterforiam quandam vim obtinet, qua calculos conterit, & quæ per aluum diffluunt, ad vrinas deriuat.

Daucus.

DAUCUS, quod & staphylinus dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & venerem mouet. Syluestris dauci semen minimè flatus creat, sed vrinam & menseis citat, quem admodum & herba ipsa.

Daphne, laurus arbor.

LAVRI arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus: radice cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum vi no odorato triobolari pondere porus.

Daphne herba, laurus alexandrina.

DAPHNE herba, quæ & Alexadrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menseis & vrinas commouet: laureola vero, quæ daphnoïdes græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas humilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

Dermis, pellis.

PELLIS ouina recens detracta, calens adhuc iis qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellis combusta & cum aqua lauis imposita phymata discutit. At viperæ pellis detricta impositaque, alopecii mirabiliter pilos reficit.

Dermata, hoc est, pelles seu coria veterum calceamentorum.

CORIA veterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatorium, unde ex calceis pedum attritis nondum inflammatis, ambusis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

Dicta

Dictamnion.

DICTAMNVM tenuius est virtute pulegio, cætera simili. quod autem vocatur pseudodictamnion imbecillius est.

Dionysias.

DIONYSIAS dicta est in androsæmo.

Diphryges.

DIPHRYGES mixtæ est facultatis: habet enim quippiam astringens & mediocriter acre, ideoque malignis ulceribus præsens est remedium.

Dipsacos, quod labrum veneris dicitur.

DIPSACI spinæ radix in secundo ordine desiccatur, nonnullam vero abstergendi vim simul obtinet.

Dorycnion.

DORYCNION simile temperamento est papaveri & nandragoræ, immodicè refrigerans: siquidem modicum, stuporem inducit: copiosius assumptum, interimit.

Dracuntium, dracuncululus.

DRACUNCVLVS simile quidam aro habet, sed eo acrius, amarius, calidius, tenuiusque est. Item astrictionis nonnihil habet coniunctum. Radix ipsius pota viscera purgat, & peruiacium seu malignorum ulcerum excellentissimum est remedium: folia respondent: semen valentius est.

Dryopteris, filicula.

FILICVLA dulcis, acris, & leuiter amara est: radix acerba est, cæterum vim habet exedentem, qua & pilos abolet.

Drys, quercus.

QVERCVS & folia & fructus siccante & tepida vi polent, quamobrem vulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio nēbranosum, fructus carnem ambit, cum valentius astringat, ad fluxum muliebrem, aliosque fluidos morbos exhibetur.

Quæ ab E incipiunt.

Ebenus.

EBENI ligni vis est excafactoria, deterforia, & subtilis: unde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, aliisque oculariis miscetur medicinis.

Encephalos, cerebrum.

CEREBRVM leporis coctum detritum, comestumque: infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli vero tre-

moribus succurrere manducatum, literis prodiderunt. Atque li cerebrum cum vino potum ad venenatos morsus efficere Diofcorides pronuntiat, & sanguinis e cerebri membranis eruptionem cohibere. Cameli cerebrum Galeno autem siccum cum aceto potum, comitiales persanat. Idem famustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum, infantium dentitionibus exactè opitulatur.

Elea, olea.

O L E A E ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerant, fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus est, immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi vim repræsentat.

Elea, hoc est olea Aethiopica.

O L E A E aethiopica lachryma ammoniaco tenui simili vires habet extensorias, quare ad cicatrices, albugines, heretudinesque oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores si cauis ipsorum iniciatur, efficax est: nonnulli vero sylvarum ricam esse hanc oleam asserunt.

Elaon, oleum.

O L E U M ex oliuis drupis dulce calidumque; mediocriter est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur, Græci omoribes appellant, tantæ astrictionis particeps est, quantæ etiam frigiditatis. Eorum vero oleum morsu ac rosione caret. vetus quato diutius reseruatum, tanto magis calefacit, discutitque; præsertim si iam inde ab initio tenuis extiterit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem penetret combibaturque. huiusmodi nimirum est Sabinum: quod autem ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit, squalidissimumque; id est, pro oleorum ratione. ricinum verò æquales veteri vires obtinet: reliqua verò nempe sesaminum aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus constant, vires quoque, diuersas præ se ferunt.

Eleomeli.

O L E U M in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cum aquæ hemina, crudos humores biliososque ex aluo educit: qui verò id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

Ela

Elaterium.

ELATERIVM succus sylvestris cucumeris fructus ap-
latur, in secundo ordine calefaciens: quod menseis pro-
cat, foetus appositum propter summam amaritudinem ne-
c, euacuationem etiam ex naribus cum lacte instillatum
litur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam, non-
quam etiam sanguinem extrahit.

Elate, abies.

ABIES arbor calefacit siccaturque ut nigra populus simi-
r: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

Elatine.

ELATINE herba est parietariae similis, mediocri frigi-
ate & astringitione donata.

Elaphoboscus.

ELAPHOBOSCUS virtutis est calefactoriae & siccae in-
undo abscessu, substantia tenuis.

Eleisuaeus, salvia.

SALVIA euidenter calefacit & leuiter astringit.

Helenium, inula campana.

HELENIUM calidum est & siccum cum excrementitia hu-
ditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoraci
mores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

Eleoselinon, palustre apium.

ELEOSELINON in aquosis natum locis idem potest
mod hortenfe apium, licet maius ipso existat.

Ebur.

EBORIS ex vngue ramenta si obducantur, reduuiis pro-
nt: item osium dentiumque ipsius quum sint siccae facul-
tis & absterforiae, huiusmodi miscentur medicamentis.

Helcysma, argenti excrementum.

HEL CYSMA, argenti est excrementum, viribus plumba-
ini respondens: quippe astringit, simul atque extrahit, quod
t ut emplastris quas pharas appellant & iis quae cicatricem
ucunt, admisceatur.

Helieborus, veratrum.

VERATRUM utrumque calefacit & desiccatur in tertio ab-
cessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa
utis vitia conuenit: nigrum vero si fistulis inseratur tribus
diebus callum exerit.

Helechryson.

HELECHRYSON alij chrysanthon, alij amarathum appel-
lant,

lant, coronarius est frutex, comā aurum referente, quæ cum vino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, ex mulso pota menses educit, sanguinemq; concretum dissolvit, & destillationibus auxiliatur.

Helxine, parietaria.

HELXINEM alij perdicium, alij parthenium, quidam sideritim, quidam heracliam nuncupant, vis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

Helxine.

HELXINE quæ & cisampelus dicitur, vim habet discutiendi.

Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.

PANICVM simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus inductum, cæterum & alui fluores deliecat.

Empetron.

EMPETRON, quod ab aliis prasoïdes nominatur, pituitam & bilem purgat. est etiam salsum, quare absterisionibus accommodatur.

Epithymum.

EPITHYMVM in tertio abscessu siccatur & calefacit, thymo efficacius.

Epimedium.

EPIMEDII virtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa, quod si obducatur, mammas erectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

Epimelis.

EPIMELIS, quæ etiam ab Italicis rusticis vocatur vnedon, malus est sylvestris, cuius fructus acerbus & stomachi inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

Epipactis.

EPIPACTIS, quæ & elleborine appellatur, aduersus venena & iocinoris affectus bibitur.

Erebinthus, cicer.

CICER quod quidem consuetum legumen est, flatum creat, valentis materiæ, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem menses elicit: at crios appellatum, hoc est, arietinum, alius magis urinæ ciēdæ est, decoctum ipsius præsertim nigri calculos quoque in renibus conterit: quod autem orobizum ab eruo vocatur,

ur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt validiora.

Eria, lana.

A N A E quidem sordidæ fomentis vtiles sunt, nam pinctudo ipsarum, quæ *æsypon* Græci appellant, butyri modo concoquit: at quæ sordibus carent, materiæ rationem taxat obtinent: concremata vero vim habent acrem, calidam, siccam simul & tenuem, vt etiam flaccidas ex vligine verum carnes protinus absumant.

Erice.

ERICE vi pollet discutiente citra rofionem, sed floris potissimum, & foliis vtendum est.

Erinon.

R I N O N aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ in mellis drachmis quatuor illiti, oculorum fluxiones sanant, succus aurium doloribus benefacit.

Hermodactylus.

HERMODACTYL I radix & per se, & ipsius decoctum in habet purgandi, priuatim etiam arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, verum stomacho nimis quàm luerfatur.

Herpyllum, serpillum.

SERPILLVM calefacit, vt & vrinam, & menstrua commoueat.

Erythrodanon, rubia.

ERYTHRODANO N rubra tinctorum radix est, acerbamaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, vt cruenta quoque vrinam & menses euocet: ac cutis vitia quæ absterfionem postulant, exterit.

Erysimon.

ERYSIM I semen igneum calefactoriumq; est, vti naturtium, quare in fermento tostum, thoracem purgat in clegmatis assumptum, duritiaq; emollit, & cæcos caneros ductum adiuuat.

Euzomon, eruca.

ERVCA, & ipsa priori similis temperamento, flatulenta est, ob quod ad venerem instigat, semen ipsius vrinam quoque mouet. Cæterum syluestris domestica valentior est.

Eupatorium.

EUPATORIUM tenuem vim & incidentem sine conspicuo

spicuo calore habet, quæ iecur obstructum expurgat, est & nonnullius astrictiois particeps.

Euphorbium.

EUPHORBIVM adurentem vim sortitum est subtilemque; aliis liquoribus similiter.

Ephemeron.

EPHEMERON, non venenum illud sed quod iris sylvarum nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis, & discutientis.

Echidna, id est, vipera.

VIPERAE carnes calidæ & siccæ temperatura evidenter existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc multi quos elephantia malè habebat, esu potuque ipsarum sanauerunt: quæ in maritimis, aliisque locis aridis degunt, magis ad sitim faciendam sunt efficaces.

Echinus herba.

ECHINVS herba quidem, acerba est, quæ repellat, & siccet.

Echinus, erinaceus.

ERINACEI autem terrestres, caro inueterata siccataque validè discutit exiccatque; pota igitur elephantibus, malo habitu præditis, & aliis plurimis auxiliatur: pellis ipsius concremata vehementius siccet & discutit, alopecias cum picæ liquida peruncta sanat. Marini erinacei quod esui idoneum est, urinam citat, & aluum reddit facilem: testis cremata, terrestri respondet.

Echion.

ECHION, alij doriada, nonnulli alcibiadion vocant, spinosa herba est, quæ non modò à serpente commorlis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur.

Hepsema, sapa.

HEPSEMA mustum decoctum, quod alij siraxon appellant, calefacit modicè & concoquit, est autem medicamentum & emplasticum, & rosionis expers.

Quæ à Z incipiunt.

Zea.

ZEATritico viribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat. necnon vim opplendi quam

nam vocant emplasticen, obtinet.

Zingiber.

ZINGIBERIS radix impensè quidem calefacit, sed non imo statim occurru, quòd ineuicta cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facilè perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

Zythus.

ZYTHVS composita est substantia, etenim acris est, ceu putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate acida, eoq; craui succi habetur.

Zyme, fermentum.

FERMENTVM & ipsum contrariis constat qualitatibus, nippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris, in eius qui ex salis & farinae natura contrahitur, compos itquare non mediocriter calefacit atq; discutit.

Zomos, Piscium ius.

RECENTIVM piscium ius esculentum aluum per se, & cum vino potum deiecit, priuatim verò in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxatilibus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale. tē corū quæ testacea cute integuntur, tellinarū, hiatularum, ochularū, & veteris galli cum sale diutissimè excocti iusculum, ventrem subducit, e contrario gallinae ius comprimit.

Quæ ab H incipiunt, quod Latini in E longum vertunt.

Hedysinus, Menta.

MENTA in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat: sed amari quoq; nonnihil obtinet, quo lambricos enecat. Quà verò acerba est, recētes sanguinis reiectiones coërcet.

Hedysarum.

HEDYSARVM aut pelecinos amarum est, leuiterq; astringit, unde potum stomacho gratū redditur, cæterum viscera obstrueta repurgat.

Helictropium.

HELIOTROPIVM maius, quod & scorpiurum vocant, calidam, siccam, & abstergentem vim præ se fert, cuius decoctum potu educit pituitam, bilemque: applicatum verò semen ipsius myrmecias & huius notæ vitia perficcat. Minus autem heliotropiū, & hæc abolet & latas tineas interimit.

terimit, si cum semine suo adiecto, nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur.

Electrum, Succinum.

ELECTRUM populi albae lacrymam dicunt, quae iuxta amnem Eridanum destillat, & in spissitudinem coit, aureo colore, quod si laeuigatum bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinem compescit.

Hemerocalles.

HEMEROCALLIS radix viribus lilio respondet, perinde ac illud ambustus opitulatur.

Hemionitis.

HEMIONITIS astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

Hepar, Iecur.

IECUR rabidi canis tostum comestumque, iis qui ab eo commorati sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris inflati fannies lusciosos iuuare instillata: vaporemque eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse: manducatum vero comitiales coarguere. Idem praestare & hircinum ferunt. Adhuc lacerta iecur dentibus corrosis impositum, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. A sinuato tostum comitiales, si ieiuni id manducet, adiuuat. Apri iecur recens inarefactum tritumque cum vino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotum, calculos eiicit.

Erigerum, Senecio herba.

SENECIO mixtas habet vires, refrigerat & modice discutit.

Eryngium.

ERYNGIUM calefacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscura, nec modice parriceps.

Quae à TH incipiunt.

Thalassion hyder, marina aqua.

AQUA marina acris, calfactoria mediocriter, desiccans, & pota stomacho quidem contraria est, ventrem autem turbat, pituitamque educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

Thaliethrum.

THALI

THALIETRV M siccandi vim sine rosione habet, hinc
ulcera inueterata cicatrice obducit.

Thapsia.

THAPSIA acris est, & valenter cum humiditate cale-
facit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem
liscutit.

Theion, sulphur.

SVLPHVR trahendi & ipsum vini obtinet, calidū & sub-
stantia tenue, vt aduersus pleraque virulenta animalia resi-
stat, præsertim turturem marinum, draconemq; vel siccum
inspersum, vel saluæ quoque mistum, vel vrinæ pueri, vel
oleo, vel mellis: item scabiosa corporis vitia mirificè persan-
nat.

Thermos, lupinum.

LVPINVM, esculentum quidem opplendi viribus pollet:
amarum verò, abstergit, dissipat, & sine rosione deficcet, ti-
neas occidit inductum, & potum, item viscera purgat cum
ruta & pipere potum. nam cutis vitia extergit, tumores dis-
sipat, cum oxymelite applicatum: syluestre autem amarius
est & omni ex parte satiuo valentius.

Thelypteris.

THELYPTERON, quam nonnulli nympheam vel pre-
lin appellant, filici similis facultate, quæ cum vino pota latas
& teretes ventris tineas interimit, foetum in vtero corrup-
pit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

Thlaspi.

THLASPI semen est viribus acre, vt intestinos absces-
sus potu rumpat, menseis prouocet: ab inferioribus parti-
bus iniectum coxarum dolores finit, cruenta vacuans, ac
alioquin supra infraque biliosa instar acetabuli potum, ex-
purgat.

Thridax, lactuca.

LACTVCA olus est non summè frigidum humidumve,
sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis
inflammationibus cōuenit, præterea sitim pota restinguit,
& genituræ fluorem veneritq; insomnia cohibet: Sylvestris
lactuca hac minus & refrigerat & humectat, verum succu-
lentior existit.

Thymus.

THYMVS in tertio ordine calefacit & deficcet, glutino-

fos crassosq; humores incidit.

Thymbra, satureia.

SATVREIA agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

Thymelea.

THYMELEA, unde granum cuidium fit, simileis ei vires obtinet.

Quæ ab I incipiunt.

Idea radix.

IDAEA radix gustu acerba & viribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

Hidros, sudor.

SV DOR per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendi vis duntaxat inest, ac redditur totum discussorium. Mammis igitur inflammatione retatis efficax est remedium, & feruori ipsarum restinguendo: benefacit etiam bubonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo emolliri debent.

Ixos, viscum.

VISCVM calefacit cum acrimonia, humores ex alto valide elicit, & thapsie modo discutit, hac tamen multo est ignauius.

Ion, viola.

VIOLE folia aquea frigidaq; substantia præpollenti consistant.

Ios, erugo.

AERVGO acrem gustu qualitate præ se fert, item discutit, consumit, inciditq; non teneram modò, sed duram quoque carnem: at si momentum ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quod citra rosionem abstergat.

Hippocampus.

HIPPOCAMPVS marinum animal est, cuius concrematione cinis cum liquida pice alopecias explet.

Hippolapathum, grandis rumex.

HIPPOLAPATHVM in palustribus locis nascitur, lapathum consimile.

Hippomarathron, grande fœniculum.

HIPPOMARATHRV M cachryi proximum, magis quam fœniculum desiccatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos confringit, mensesq; mouet semen ipsius coriandro simile,

tile, respondet quidem ei viribus, sed imbecillius est.

Hippopotamus.

HIPPOTAMI, quod est equi fluuiatilis, testiculus ari-
lus potus ad serpentium morsus efficax est.

Hipposelinon, grande apium.

HIPPOSELINON cum apio domestico virtute conue-
nit, nisi esset imbecillius.

Hippuris, cauda equina.

HIPPURIS astringentem cum amaritudine qualitatē
possidet, eoq; valenter simul & sine rosione deficcet, ac vul-
nēra maxima committit, intestinorū ramicibus opitulatur,
& vitii fluidis cum vino pota medetur.

Hippophrēs, lappago.

HIPPOPHÆS, quod alij hypophyes vocant, quo ve-
steis expoliunt surculosus frutex est, ē cuius radice thapsiæ
modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmę
datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex sic-
catus ad purgationes accommodatur.

Iris.

IRIS affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis sub-
stantia, tussi utilis, humores in pectore contumaces faciles
ad excretionem facit, torsionibus ventris medetur, sordida
ulcera purgat, cum mulsā pota aluum inanit.

Isatis, glāslum.

ISATIS domestica qua tinctores vtuntur, siccandi vireis
& astringendi habet. his etiam magna vulnera in duris glu-
tinat corporibus, sanguinem erumpentem compescit, laxos
cedentēsq; tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus
resistit. Sylvestris autem quum magis rodat, magisque ideo
siccet, valentius aduersus humidās putredines pugnat, ad
cetera deterior, vt quæ mordeat: ceterum ob vitium vehe-
mentiam lienosis quoq; utiliter adhibetur.

Isopyron, aut phasiolum.

ISOPYRVM phasiolumve semen amarū ac modicē acer-
bum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & ab-
stergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatque, hinc
etiam quæ altē desident expurgat, excreationibus sanguinis
non aduersatur.

Itea, salix.

SALICIS & folia & flos facultate cōstāt quę citra rosionē
hæcet, habent etiam nonnullam astringentem, cortex autem

paulò siccior est, cuius perusti cinis ex iis habetur quæ vehementer exiccent, quippe clauos & myrmecias, cum aceto exterit.

Ichthyocolla, gluten piscium.

I C H T H Y O C O L L A E vis est opplere & siccare. rectè miscetur emplastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollendas & erugationem faciei conficiuntur.

Que à C incipiunt.

Cancanus.

C A N C A N I radix modicè siccatur, & sine rosione ad opplendum infarciendumque accommodata, quare ex vino linctamansaque tragacanthæ & dulcis radiculae modo, arteriæ scabriciem iuuat.

Cancamum.

C A N C A M V M lachryma est arboris in Arabia, myrrhæ similis, odore grato, qua etiam ad suffitum vtuntur. vis eius est obesos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

Cadmia.

C A D M I A vtraque siccatur, sed quæ botryitis quasi acinosa appellatur, tenuioris est substantiæ, placitis autè dicta crassioris. Ceterum concremata cadmia sine morfu desiccatur, abstergit, caua vlcera tum in oculis tum in toto corpore explent, & præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus efficacium magis vsus est.

Cacalia.

C A C A L I A viribus & vsu cum cancano conuenit.

Calamagrostis, gramen arundinaceum.

C A L A M A G R O S T I S siccatur, hinc succus decoctumque radicum ipsius oculariis miscetur medicinis, semen vrinam cit, & stomacho benefacit.

Calamintha, nepita.

N E P I T A tertio ordine calida & sicca temperamēto, est tenuis acrisque, menta longè valentior, siquidē est veluti syluestris mēta: facile igitur quæ altè hærent ad se trahit, eoque sudores mouet, totum corpus digerit, ac rigores febriū qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenuè. quinetiā ad coxarum dolores ab inferioribus iniicitur, & vitiosos humores in cutem erumpentes abstergit.

Calamus.

C A L A M V S odoratus in secundo ordine calefacit, & siccatur,

at, inest ei quippiā & subtile & astringens, vrinā itaq; citat, & stomachicis, tū quē vtero & iocinori faciūt medicinis tēpe-
atur. Calamus autem phragmites extergit, folia ipsius viri-
lia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit sic-
atque in tertio ferē abscessu: radicem cum bulbis applica-
am spicula & aculeos extrahere prædicant.

Campa, eruce olerum.

ERVCA olerum cum oleo inuncta, tutos à virulentorū
animalium moribus conseruare dicuntur.

Cantharides.

CANTHARIDES quæ in tritico reperiuntur luteis trās-
uerſim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis vapore suffo-
cata, ad plurima vtiles redduntur, quippe vngues scabros
cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisq; affectibus opitulā-
tur, iam verò & exedentem vrentēmq; vim habent: nonnul-
li verò etiam medicamentis vrinam prouocantibus momē-
tum ex ipsis admistum exhibuerunt.

Cannabis.

CANNABIS semen flatus discutit, & siccat, vt & genitu-
ram exarefaciat, succus ipsius viridis ad aurium dolores ex
obstructione creatos efficax est.

Canopon.

CANOPON sambuci flos est, de quo prius dictum est.

Capnion, secundum alios capnos, fumaria.

FVMARIA inde nomen sortita est, quòd succus ipsius
copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit clarita-
tem: acris amaraque est, vnde vrinas biliosas liberaliter pro-
uocat, iocinoris obstructioni languoriquē medetur, stoma-
chum confirmat & aluum emollit.

Capparis.

CAPPARIS radix extergit, probè purgat, incidit, discu-
titq; tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate cōtra-
hit, stringit & densat, quapropter lienes induratos & pota &
extrinsecus imposita, iuuat, menſeis promouet, pituitā per
os educit, maligna vlcera sanat, dentium dolores sopit, tu-
mores discutit, & vitiligines, quas alphos dicunt, auriū ver-
mes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed im-
becilliorē vim possident.

Cardamum, nasturtium.

NASTURTII semen sinapis modo vrit, vnde etiam indu-

Etum ruborem in cute excitat: cæterum crassos humores, cum aliis potum incidit, herba verò arida viribus respōdet, humida moderatior, ideòque crudam ipsam assument.

Cardamomum.

CARDAMOMVM acre quidem & ipsum est, verum nasturtio inualidius: compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

Caris.

CARIS in pollinem detrita & cum radice bryoniæ pota tineas occidit.

Canceri.

CANCRORVVM concrematorum cinis, fluuiatilium sanè siccatur, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substantiæ proprietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter efficax est: ut in aliis dictum est, marinorum cinis eximia donatus siccitate his quidem non convenit, sed iis qui magis siccari desiderant, proficit. fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & aculeos eiicit.

Caros.

CARI semen & siccatur & calefacit in tertio ferè gradu, flarus discutit, urinam movet, idque non semen duntaxat, sed etiam tota planta.

Carpesium.

CARPESIVM odoratū est tenue, viscera obstructionibus liberat, urinas movet, & renes calculo laborantes purgat.

Carya, nuces.

NUX arbor tum in coliculis tum in foliis aliquid habet astringens, plurimum autem in nucum coriis existit. succus itaque eorum decoctus cum melle, stomaticum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum vsum extenuandi vim acquirit, & sine rosione siccatur, quod in eo clauditur edēdo aptum, natura oleosum, facile in bilem conuertitur, confectumque ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flaccescentes autem vetustate nuces, cutis vitia abstergunt. At auellanæ, quas & ponticas vocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, iuglandibus æquales.

Caryophyllon.

CARYOPYLLON, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flo

ti flores cuiusdam arboris festuacei & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio propemodum ordine: qui multiplicis vsus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta.

Cassamum.

CASSAMVM hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quò suprà egimus.

Cassia.

CASSIA calefacit & siccāt in tertio ferè abscessu, tenuis abunde, acris & modicè astringens: incidit igitur simul & discutit, roburque instrumentis adiecit, postremo & menscis euocat.

Castorium.

CASTORIVM calefacit siccātque cum extenuandi viribus eximiis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum malè habent, affectibus, congruit, & refrigeratos faciliè recalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datum, idque ita, vt nullam aliam offendat particulam etiam si mediocriter febris affligat, quemadmodum in veternis & lethargis, sed & mensibus retentis proficit, & secundas expellit. at in cerebri & pulmonis vitiis etiam suffitus castorij inspiratu haustus, præclare opitulatur.

Caucalis.

CAUCALIN alij daucū syluestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccāt, vrinam mouet, & salsamento ad repositionem conditur.

Cenchros, milium.

MILIUM refrigerat in primo abscessu, siccāt, in secundo habet etiam modicam extenuandi facultatem: extrinsecus igitur in sacculis ad fouendum & cataplasmatism modo adhibendum, desiccare consuevit.

Cedrus.

CEDRVS & quæ fruticosa est iunipero similis, & quæ arbor, calefaciunt, siccantque in tertio ordine. confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem præsertimque demortuas siccāt & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurium vermeis interficit, aliâque plura facit.

Centaurium.

CENTAVRII maioris radix acris, calida, & terræ astri-

ctionis compos est. mensēis itaq; promouet, foetus corrumpit, eiicitq; , vulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris vitiis præsens est remedium. Minoris centaurij radix inefficax, est, coliculi validè & citra morsum siccant, vnde non solum ad quæ maius centaurium valet, sed etiam coxendice laborantibus, ipsius decoctum inferius iniectum, biliosa vacuat, nonnunquam & cruenta, ac valde proficit.

Ceras, cornu.

CORN V caprillum hircinūque concrematum dentes nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas compescit. Cerui autem cornu cum vino maceratum tritūque, deinde circumlitum mobileis sistit dēteis. Crematum, mox lotum, dysentericis, celiacis, sanguinem expuentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

Cerasia.

CERASIA dulcia quidem citius per aluum descendunt, austera stomacho vtiliora sunt, acida verò ob incidendi vim quam habent pituitosis excrementosisque stomachis profunt, gummi verò cerasi arboris arteriam exasperatam laeuigat, & calculo laborantibus cum vino potum, succurrit.

Ceratonía arbor.

CERATONIAE fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis particeps est.

Cephale capita.

MENARVM sale conditarum capita cremata, vim siccandi nō admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyrro sanāt. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe vsino proficit. Idem præstat etiam muris caput crematum cū melle. Milui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis comprehendi queat, cū aqua potū ani dolores finit. Lacertæ verò caput aculeos educere tradunt, myrmecias, verrucas, & clauos exterere.

Cecis, Galla.

GALLA, omphacitis, quidem medicamentum est affatim astringens, eamq; ob causam siccant, fluxiones repellit contrahitq; , laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ

flauo

uo colore, inanis magnaque est, non tantam in siccando astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & occidentias excocta iuuat: gallæ verò combustæ & aceto stinctæ, sanguini supprimendo sunt.

Cepæa.

CEPÆA portulacæ similis est, folia ipsius contra vesicæ abies vtiliter bibuntur, radix cum asparago, quem myanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, vrinæ stillidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Cera.

CERA quum temperata sit, reliquorū medicamentorum materia efficitur, ipsa verò per se ex iis est, quæ læuiter abergunt, nam & discutientē & calidā vim exiguam obtinet.

Ceryces, buccina.

BVCCINORVM testa concremata excellēter desiccatur, rosionem, vnde vlceribus maleficis accommodatur, at in his quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut vino, aut xymelite ipsis vtendum est. oleum in quo veluti caro ipso adhuc viuentiū excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

Cici, ricinum.

RICINI fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

Cinnabaris.

CINNABARIS acris mediocriter vires habet, item nonnihil etiam astrictionis.

Cinnamomum.

CINNAMOMI vis est summè tenuis, non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem referunt adeò siccatur, propter substantiæ tenuitatem. Cinnamomis autem veluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum vocant.

Circæa.

CIRCÆÆ radix calida est & odorata, quæ cum vino pota foeminarum locos purgat: semen in sorbitione sumptum lac generat.

Cisseris, pumex.

PUMEX absterforius est præsertim dentium, non modò viribus, sed etiam scabritie, coniicitur autem in medicamentis quæ carni vlceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis labes exterunt. Crematus renuior quidem, sed mordax redditur: lotus, id quod mordet, deponit.

Cisthos.

CISTHOS aut Cissaros frutex est astringens & modicè frigidus virtute, folia ipsius & germina adeò siccant, vt etiam vulnera conglutinent: at flores quum in secundo ferè gradu ficciores sint, dysenteriiis, aliisque fluidis vitiis accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida vlcera compescunt.

Cissos hederæ.

HEDERA contrariis constat viribus, vt quæ astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aqueæ substantiæ & tepidæ quū viridis est, particeps: cuius folia vino incocta vulneribus glutinandis, ambustis, & lienosis salutariter adhibentur, succus ipforū naribus ad pituitā educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederæ, vt quæ acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

Citrium, quod & malum medicum dicitur.

CITRII medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri virtute præditus, caro ipsius crassi succi est pituitæ generandæ apta, & frigida: semen discutit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendiq; vim repræsentant.

Cichorium, intybus sylvestris.

CICHORIUM picrisve tanquam syluatica feris est, refrigerans siccansque in primo abscessu: habet etiam vim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

Clematis.

CLEMATIS quibusdam daphnoïdes, aliis myrsinoïdes, nonnullis polygonoïdes, sarmenta habet oblonga, crassitudine iunci quem holoschœnum dicunt, folium verò lauri, siccandi virtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhiam dicunt, dysenteriam, & dentium dolores finit: contra venenatorum morsus rectè imponitur.

Clematis altera.

CLEMATIS altera arboribus similacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cum aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

Clinopodium.

CLINOPODII vis est calida siccaque, nondum vero adurens, sed tertij ferè ordinis.

Cui

Cnicus.

CNICI semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, quis extrinsecus eo utatur, tertij siccantium ordinis erit.

Conchylia.

CONCHYLIA buccinis facultate proxima sunt.

Cælia, venter.

VENTER mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membrana sicca potui data: verum Galenus experimento falsum utrunq; se inuenisse scribit. Palumbi ventris aus ventrem paulatim potum calculos per urinam elicit, testis est Dioscorides. Mustelæ aluus pota contra quæliet venenata amuletum dicitur.

Coccus cnidios, granum gnidium.

GRANVM gnidium semen est thymelææ, non chameæ, ut quidam opinati sunt, acri & adurente facultate præditum, hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

Coccus baphicos, granum tinctorium.

GRANVM tinctorium leniter siccatur, unde magnis & nervorum vulneribus, cum aceto aut oxymelite læuigatum, commodè imponitur.

Coccymelæa, prunus.

PRUNI fructus ventrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius, gutturi inflammationes utiliter colliguntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi vim exenuandi; testatur, ob quod nonnulli frangendis vesicæ calculis esse cum vino potum affirmant: ex aceto, puerorum inpetigines per sanare. Sylvestrium prunorum baccae euienter astringunt, ventremq; reprimunt. Nominatur hæc lanta in Asia prunum. Domestica verò pruna sicca apparent, quæ nunc Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit.

Colla, glutinum.

GLUTEN quod ex simila & polline conficitur, emplasti vim & concoctricem representat.

Colocyntha, cucurbita.

CUCURBITA humidi, frigidiq; in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si applicetur, calidas refrigerat inflammationes.

Colocynthis, cucurbita sylvestris.

CUCURBITA sylvestris validâ purgandi vim obtinet: viridis

ridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

Comaros, arbutus.

ARBUTVS, & arbor, & fructus acerbæ qualitatis est, vocant eum memyræolon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

Commi, gummi.

GUMMI siccante vi & emplastica pollet, & nimirum asperitatibus medetur.

Conia, lixiuium.

LIXIUIUM veluti cineris lotium nominatur: omnium maximè absterforium & siccās est, quod ex fici & rithymalli cinere præparatur, ac ferè iam exedens: quod si calx etiam cineri addatur lixiuium redditur adurens: quod iam etiam protoſtaſton nuncupant, clyſterium potissimum medicinis miscetur. Vehementissimum vero omnium est, quod ex sola calce conficitur.

Conyza.

CONYZA utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febriū circuitu remeantes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum mēſeis citat, & fœtus extrahit: quæ vero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

Copros, stercus.

STERCVS quodlibet calefacit, maximè siccatur & discutit: variat autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & victus ratione. itaque canum quum ossa vorauerint simus inarefactus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston vocant, potus, sanat: idem vetusta vlcera reficit, si medicamentis in ea efficacibus misceatur. Hoc angina, tonsillarumq; inflammationes cum melle inunguntur. At puerorum qui victu non superfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Luporum quod & ipsum cādidius in fruticibus reperitur, coli doloribus strenuè succurrit, non potum modò, sed corpori etiam adalligatum: alligetur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut pelle ceruina. † Caprillum stercus acrius, magisq; discutiens, scirrosos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris corporibus: crematum verò valentius abstergit, extenuatq;. Bubulum extrahendi quandam vim obtinet, ideoq; vesparum & apium iſtibus

ibus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum
 uas inter cutem præclare iuuat. Ouium verò cum aceto
 yrmecias, acrochordonas, furunculos & clauos, persanat.
 olumbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, a-
 s longè acrius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gal-
 tarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, vomit-
 one strangulantes fungos educit, præsensq; est remedium:
 hoc quoq; colico dolore conflistantibus potui quidam ex-
 hebant. Nonnulli verò & ciconiarum finum orthopnoï-
 os potum auxiliari affirmant. Murium fimus reliquis ab-
 ergit efficacius, eoq; alopecias curat, & infantium sedi ap-
 positus, ad excretionem proritat. Sturnorum qui oryza pa-
 i fuerint, abstergerendi vim præ se fert, qua cutis asperita-
 es, quas ephelidas Græci vocant, exterit. Terrestrium cro-
 odilorum fimus vitiligines, quas alphos dicunt, extergit:
 uemadmodum fluuiatilium, oculorum albugines exte-
 uare creditur.

† In Cod. antiquis, hæc verba ita leguntur. νόστος αἰγῶν, σπύραθ. i
 ιδίως ἐνομάζονται, ἀριμῆας καὶ διαφορήσιμῆς ὅτι διωάμεως τοῖς
 κέρρεμενοις ὄγκοις ἀρμότιστα, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλ-
 λων μερῶν. Ἐγὼ γὰρ ἐπὶ γένετος ἔχοντος ὄγκου χρόνιον, δύσκολον,
 κρησάμενον αὐτῇ δι' ὀξυγῆτα καταπλάττειν καὶ κελύσαι ἄλλοθεν
 ῥιθίνον ἐμβαλλομένης ἢ νόστος. Quæ verba quoniam conuersa sunt
 in latinum sermonem ab interprete Aëtij, ex quo huc tralata, tu apud
 autorem lege.

Corallium.

CORALLIUM veluti arborea planta est in lapidis du-
 ritiem coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, co-
 lore rubrum, lapidi simile, siccandi validam, astringendi
 mediocrem vim possidet, ideoq; cruentis sputis, & dysente-
 ricis vtile.

Coris animal. cimex.

CIMEX acri virtute pollet. Scribunt igitur quidam cum
 aceto potum hirudines eiicere.

Coris herba.

CORIS herba, quam alij vocant hypericon, acris est, &
 odorata, semen eius ad vrinam & menses ciendos bibitur:
 succurrit & phalangiorum moribus, item ad opisthotonon
 cum oleo inungitur.

Corianum seu corium, coriandrum.

CORI

C O R I A N D R U M ex contrariis viribus compositum est, tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ autem humiditatis tepidæ particeps, habetq; modicā vim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum frequentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodā in id efficaci discutit. Semen modicè quidem cum passō bibitum, tineas pellit: liberalius autem sumptum, mentem tentat.

Corydos, aut corydallus, Galerita siue alanda.

A L A V D A auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem cōtinuè & sæpe cum ipso iure debet.

Coronopus, pes cornicis.

C O R O N O P O D I S radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

Costus.

C O S T V S modicum quidem amaritudinis, plurimum verò acris & calidæ qualitatis habet, vnde in quibus vel calefacere particulam quampiam cogites, vel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: urinam igitur & menseis ducit, tineas enecat. Quum verò & flatulenti cuiusdam particeps sit, venerem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febriū rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

Cotyledon, acetabulum.

A C E T A B V L V M refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminueret, & urinam ciere creduntur.

Cochlea.

C O C H L E A E concremata impensè siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenteriiis, quas nondum putrelago obsedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars vna, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum tegumentis in pollinem coactæ ventri imponentur, aquam subter cutem exinaniunt, prosunt item articulariis doloribus applicatæ, quoad sua spōte deciderint: in vniuersum humorem altè insertum validè desiccant.

Cranra, cornus.

C O R N I arboris fructus acerbus, si edatur, validè ventrem astringit. folia autem & germina acerbitate vehementer siccant, adeò vt etiam maxima durorum corporum vulnera conglutinent.

Cram

Crambe, brassica.

BRASSICA quæ edendo est siccata, & manducata, & à ris imposita, non tamen acrem conspicuè vim ostendit, quæ; vulnera glutinat, & dolosa maligna; vlcera, ac tumores solui contumaces persanat: habet etiam nonnihil abstergium, quo lepras extergit. Semen ipsius potum tineas occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis aduren- vi constat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syl- vestris autem brassica, sativa in omnibus validior est, unde nec intra corpus citra noxam sumitur. Marina, subsalsa le- viter; amara, aluum solvit.

Crataegonos.

CRATAEGONI herbae semen & acre gustanti depre- henditur & frigidum, milio simile.

Crethmon.

CRETHMON salsum est simul & amarum, sed modicè, suare & vis ipsius est abstersoria & desiccans.

Crithe, hordeum.

HORDEVM refrigerat siccata; in primo abscessu, verum nonnihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento sicci- tate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo magis siccata, pituita præterquam quod largius humectat, etiam abstergit vehementius.

† In altero manu scripto his verbis hæc sunt adscripta, οἱ δὲ ἐν τῶν ἀγρίων ζιζάνιων ἀπὸ ἀγροπόλεως τῶν ἐν τῶν πυλῶν ἀδῶν, ἢ ἴσ' ἔστι, panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quàm qui ex tritico. Quæ hæc translata sunt ex Aëtio.

Crimnon.

QVOD in tritici & zeæ farina crassius est, crimnon ap- pellatur, validius nutriendum quàm polenta: ægrius autem conficitur.

Crinon, lilium.

LILII flos temperamento mixtus est, ex tenui substan- tia, terrestri & nonnulla aquosa temperata: quapropter o- leum quoque ex eo confectum discutiendi vireis, mollien- di; repræsentat, vulgæ inflammationibus accommodatum. Radix ac folia siccant, abstergunt, discutiunt; mediocri- ter, quò fit ut ambustis conferant: succus ipsorum, & ner- uorum

uorum vulneribus cum oxymelite prodest.

Crocodilion.

CROCODILII semen & succus calidam, siccam & discutientem vim præ se fert, vrinas itaque & menses mouet, radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per naris ducit.

Crocus.

CROCVS ad secundum calefacientium ordinē, primum siccantium refertur, astringit & concoquit.

Crommyon, cepa.

CEPA ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quamobrem hæmorrhoidas appositu aperit, item abstergit: vitilignes, alphas dictas, cum aceto exterit, & alopecias ocus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffus aut crassi humoris vitio hebetibus auxiliatur.

Cyamos, faba.

FABA non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatē est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoque astringat, tota ipsa faba in posca decocta celiacis, & dysentericis conducit, inducta vero cataplasmatē modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

Cyanos.

CYANOS acrem habet vim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnabaris: astrictionis quoque particeps est.

Cyclaminus.

CYCLAMINVS varias vireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discutit: cum melle, suffusis proficit, per naris purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, sed & ipsa vehemens adeo est, ut cum mulsā instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis vitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon vocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

Cuminum, cuminum.

GYMINVM in tertio ordine calefacit, vrinam mouet, & flatu

status discutit.

Cynofbatos, rubus caninus.

R V B I canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant mediocriter. at quod in fructu lanæ specië præ se fert, seu arteriæ inimicum caueri debet.

Cyparissus, cupressus.

C V P R E S S I galbuli & turiones siccandi viribus pollent, nullo calore conspicuo: quapropter vulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorûmq; ramicibus opitulantur.

Cyperus, iuncus angulosus.

I V N C V S angulosus calefacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos cõminuit, urinâ & menstrua promouet.

Cypros.

C Y P R I folia & surculi mixtis constant viribus, discutiēte & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: idéoq; decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, quas aphthas vocant, commanducata, persanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

Cytisus.

C Y T I S I folia discutientis leniter, & tepidæ naturæ sunt. quemadmodum & maluæ.

Conium, cicuta.

C I C V T A E vires summè refrigeratorias esse, omnibus constat.

Conos.

C O N I cortex & folia, pinum viribus repræsentant, sed acriora efficacioraq; sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, viridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem excreatum accommodatur: esculentus in aqua maceratus vt acrimoniâ exuat, temperatus redditur, rosionis experts, opplens obstruensq; vt etiam asperitates læuiget.

Quæ ab L ordiuntur.

Lagopus.

L A G O P V S siccæ facultatis est, quæ alui fluores desiccet.

K

Ladanon.

LADANON à cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes capellæ barbis suis & villosis cruribus succulentū & pinguius ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medicamen præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & coquens, eoq; vteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi vireis, quibus defluos capillos confirmet.

Lathyrus.

LATHYRIN & ipsam tithymali speciem esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam purgandi vim habet.

Lapsana.

LAPSANA manducata stomacho nocet, inducta verò cataplasmate nonnihil abstergit discutitq;.

Lapathum, rumex.

RUMEX mediocriter discutit: acuta rumex, quæ oxylapathum dicitur, præter id etiam paxillum repellit: semen autè præsertim oxylapathi, astringens, alui profluvia, diarrhoeas dicunt, & dysenterias per sanat, folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam comprimit.

Lemonium.

LEMONII fructus austerus cum vino cœliacis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

Lichen herba.

LICHEN herba in petris nascens muscum repræsentat, vis ei est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes arcet, & vt Dioscoridis verbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

Lichenes equorum.

LICHENES equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium venenatorum moribus mederi feruntur.

Leontopetalon.

LEONTOPETALI radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, nec non discussoria.

Lepidon.

LEPIDION, quam & hiberiada vocant ex quarto calefacien

ientium gradu est, nasturtio proximum viribus, minus autem eo deficcet.

Lepis, squama.

SQUAMA omnis validè siccatur, astringit, nec ignauiter mordet. Sed aris amplius siccatur, extenuaturque, cui nonnihil ruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clavis raditur, quæ propterea etiam helitim quasi claualem appellant. At ferri squama liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quæ propter ad contumacia maligna uel ulcera præstantior est, sed aris, carnem magis purgat & consumit.

Leucacanthum.

LEVCACANTHI, quod alij polygonatū, alij ischiada vocant radix incidit quidē, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

Leucas.

LEUCA siccatur, in tertio ordine, acrimonia uel præpoller.

Leucoion, viola alba.

ALBAE violæ totus frutex abstergerendi extenuandique uiribus possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciores: idcirco & mensis stimulant, sætus corrumpunt expelluntque, ac si quis aquæ miscura vim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

Leuce, populus alba.

POPVLVS alba aquosa, tepida, terrestrique; constat substantia, viribus absterforiis.

Libanotides, rosmarinus.

LIBANOTIDES tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes, vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi, succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ uero libanotidis decoctæ ius regio morbo laborantibus rectè bibitur.

Libanotos, thus.

THVS in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandam vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifestò astringit, siccaturque in secundo abscessu absolute, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, celiacis, & stomachicis, tum foris imposi-

tus, cum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturque; tertio in abscessu, atque nonnihil extergit: quocirca oculorum ulcera, & purgat & explet.

Lygnis, fuligo.

FULIGO specierum quorundam concrementarum, nempe thuris, myrrhae, terebinthi, styracis, picis liquidae, cedri, veluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Graecis athale dicitur, cum fumo ascendens. obtinet quidem siccantem & terrestrem tenuemque substantiam particulares autem ipsius differentiae secundum materiae combustae rationem fiunt. Utuntur ea potissimum in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnium est utilissima, ut quae mitior: contra pini, coni, & piceae valentior est, quod fit ut ad glabrescentes palpebras, desillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantisque, recte adhibeatur.

Ligusticum, ligusticum.

LIGUSTICI & radix & semen adeo calefaciunt ut mensis citent, flatibusque probe discutiant.

Lithargyros, argenti spuma.

ARGENTI spuma medijs inter metallica ordinis est, eoque; cum materie ipsa alijs medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus persanat.

Lithi, lapides.

LAPIDES omnes terrae modo desiccant, sed haematites astringit & abunde siccatur. quare etiam oculorum asperitates extergit, quum quidem inflammatione carent, ex aqua: quum vero illa tentantur, ex ovo: ceterum ad sputa cruenta bibitur utiliter, ulcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidem consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, id est, lactarius sequitur. Melitites cuiusdam etiam caloris compos est. Moroxus, quem etiam, leucographida vocant, quod praedictis omnibus mitior est (nullas enim habet vireis efficaciores) eodem moderatior, magisque; dolorem lenit, eamque; ob causam in teneris corporibus cum cerato ad cicatricem ulceribus obducendam, illo utuntur. Iaspis qui subviridi colore est, quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat: viridis autem Iaspis ad alligatus & in anulo gestatus stomachum adiuuat. Iudaicus dictus, renum calculos conterit, unde etiam recentiores recolithon appellant. Pyrites ex eorum numero est, qui valide discutit.

tiunt tumores, sanguinemque in grumos concretum: cuius quum facultas nō est, molari vtuntur. Phrygius præter quā quōd valenter desiccat, nonnihil etiam astringit roditque, vnde & repellere & discutere potest, eoq; oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiēdiq; virtutis compos, gutturis inflammationē iuuat. Asiæ petræ flos tam subtilem naturam habet, vt carnes humiditate flaccidas citra rofionem absumat. Gagates affatim siccans inflationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium lapidem vocant, æquales hæmatiti vireis repræsentat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendiq; vireis habet. Alabastrite combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangunt. Similes his vireis habent qui in Argæo Cappadociæ monte nascuntur. Similiter & ophites dictus, qui ad alligatus contra viperarum morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se complectitur appellatus, abundè siccare feruntur, idēoq; inflammatis tumoribus mederi. Naxiæ cotis detrimentum refrigeratorium esse dicunt, vt & virginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod verò ex olearia cote detritum fuerit, absterforia vi donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hamorrhoidas valere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionū ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiorem ventrem purgat, sed stomacho nocet.

Lithospermon.

LITHOSPERMON, quod alij Liosporon, alij heraclioni vocant, herbæ ætonychi dictæ, semen est lapidosum, albū, quod cū vino albo potum calculos frangit, & vrinas eiicit.

Linospermon, lini semen.

LINI semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium. manducatum flatibus creandis est, etiam si frictum fuerit.

Linozostis, herba mercurialis.

HERBA mercurialis aluum liberaliter subducit, inducta cataplasmatris modo discutit. Sciendūmq; est eius semen infricatum corporis excrecentias præter naturam, quas vulgus vocat naphia, abolere, sicut experientia comprobatur.

est. Sed viride semē esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

Litrum, nitrum.

LITRUM medium inter aphronitrum & salem virtute est, crematum magis extenuat discutitque, & si intro sumatur, crassos viscososque humores plus ceteris incidit & extenuat. Chalastrum verò (est autem Chalastra Thessaliae locus) acrius siccantiūsq; est, quare ad capitis destillationes & articulares cruciatus eo vtuntur.

Lonchitis.

LONGCHITIDIS, cui semen triangulū est, cuspidis modo, radix dauco æqualis urinam mouet: eius verò quæ scolopendrio respondet, folia viridia, vulnera glutinant, sicca verò cum aceto pota lienibus scyrrho induratis, medentur.

Lycopsis.

LYCOPSIS radix quum sit astrictoria, cum polenta admota in cataplasmate, Erysipelatis auctore Dioscoride cōuenit: si laevis cum oleo inungatur, sudores elicit.

Lycium.

LYCIUM ex diuersis genere substantiis constat, calida, tenui, & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringente, vt in secundo abscessu deficcet, calefaciendo refrigerandoque; medium est, hac de causa ceu absterforio, in oculis obscuratis eo vtuntur: tanquam astringenti, in cœliacis, dysentericis, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti: ceterum primas obtinet Indicum.

Lysimachium.

LYSIMACHIVM vim habet excellenter astrictoriam, qua & vulnera glutinat & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus, dysentericos & potum & ab inferioribus partibus iniectum, sanat.

Lychnis.

LYCHNIDOS coronaria semen calidum est & siccum in secundo abscessu, eoque absoluto.

Lotus herba.

LOTVS domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias vireis obtinet & modicè siccanteis, calore temperata est. At syluestris loti semen ad secundum calefacientium ordinem refertur, habet autem nonnihil etiam absterfo

sterforium. Aegyptiæ semen in panes quoque effingitur.

Lotus arbor.

LOTUS arbor extenuat, siccat, & mediocriter astringit, quæ de causa ad fluxum muliebrem, alui fluores pota cum vino aut aqua, aut etiam in aluum data, salutaris est, pilos de fluos confirmat.

Quæ ab M auspiciantur.

Macer.

MACER cortex est qui ex India importatur, tertio ordine siccat, inter calorem & frigiditatem medium obtinet: est etiam astringens tenuisque, unde cæliacis & dysentericis auxiliaris habetur.

Malobathron.

MALOBATHRI folium æquales spicæ nardi vircis representat.

Malache, malua.

† MALVA sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, ceu humidior, etiam imbecillior est: semen tantò viribus præstat, quanto & siccus est.

† Huic capiti addita sunt quedam in veteribus manuscriptis de dendromalache, quæ quia totidem verbis apud Aëtiū leguntur, adscribenda non putavi.

Mamiras.

MAMIRAS veluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate prædita.

Mandragoras, mandragora.

MANDRAGORA tertij refrigerantium ordinis est: mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radicis cortex vehementissimus, non refrigerat modo sed etiam siccat: interior eius pars imbecillior est.

Manna thuris.

MANNA thuris simile isthuri vircis habet, sed remissas & sensim astringentes.

Marathron, fœniculum.

FœNICVLUM calefacit in tertio ordine, in primo siccat, hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

K +

Mastiche.

MASTICHE, Chia quidem calefacit siccaturq; in secundo abscessu, ceterum composita est facultatis, astrictoria simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, ventris, intestinorum & iocinoris inflammationibus conuenit. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoque dissipat.

Melan, atramentum Indicum.

ATRAMENTVM Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quae inflammationes laxosq; tumores, oedemata vocant, rumpunt, vlceraque purgant.

Melantheria, creta sutoria.

CRET A sutoria impense astringit extenuatque.

Melan, atramentum scriptorium.

ATRAMENTVM quo scribimus abunde & ipsum desiccatur, solutum vero posca ambustis si illinatur, praesenti est remedio.

Melanthion.

MELANTHION in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam tenui natura praeditum: unde destillationibus in fauces, olfactu prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiam amarum, unde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopnoeis quoque conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

Meli, mel.

MEL calefacit & siccatur ordine secundo, abstergiturq; insigniter: coctum vero minus quidem acre redditur, deterforium, & ventri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarum mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet vires, terrestrem & calidam. At mel, sacchar quod ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed aequaleis vires obtinet, praeter quam quod nec stomacho noceat, nec sitim faciat, quemadmodum hoc Nostras.

Melia, fraxinus.

FRAXINVS nota arbor est, folia eius pota viperarum moribus succurrunt: cortex crematus, illitusque ex aqua lepras separat, ligni vero ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

Melilotos, fertula Campana.

SERTVLA campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

Melis

Melissophyllum, apiastron.

APIASTRUM viribus marrubio per omnia respondet.

Memecylos.

MEMAECYLOS arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

Mespila.

MESPILA, alij tricocca quasi trigrania vocant, fructus affatim acerbus, & vix esculentus, aluumque continens: rmina foliaque mespili impensè acerba sunt.

Medion.

MEDIUM radix vireis semini contrarias præse fert, quip-
austera est & fluxiones comprimit, ideòque muliebrem
ixum sistit: semen quum tenuis incidentisque sit faculta-
s, menseis quoque proritat.

Mecon, papaver.

PAPAVER multiplex est: hortensis quidem, quod etiam
ylacitin ceu vtricularium vocant, semen est esculentum,
cum pane assumatur, mediocriter somnum concilians. At
noceas appellatum, inde quòd semē ipsius celeriter defluat,
alidius hortensi est: manducatur itaq; non per se, sed mo-
mentum copiosiori melli mixtum. Quod veluti decidenti,
c depresso calyce est, nigrum semen habet & medicatum,
imis quàm frigidum. Quod prolixiore & proceriore con-
tat calyce, medicatius quàm cætera omnia existit, vt etiam
stuporem inducat, quousque interimat. Nam & ipsum &
ius lachryma, quam per excellentiam opion nuncupant,
quarto refrigerantium abscessui ascribuntur. Cornicula-
um papauer abstergerendi vireis sortitur, ideòque radicis
psius decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autem &
lores perquàm sordida vlcera expurgant, crustasque tol-
unt. Heraclion & aphrodes id est spumofum papauer di-
ctum, semen habet pituitæ purgandæ accommodatum.

Mela, mala.

MALIS omnibus frigida & excrementitia inest humidi-
tas: & quæ in corū censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate
cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non
tamen manifestè frigida sunt austera dulcibus quidem fri-
gidiora, sed minus humida: acida frigida quidē & ipsa, ve-
rum incidendi humores ventriculo inhaerentes vim restan-
tur: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido &
terrestri donata temperamento, ventrem suppressunt, vul-

nera glutinant pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se differunt.

Melea, malus, persica.

M A L I persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; vmbilico imposita, tineas enecant: fructus autem ipsius, nempe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumque existit.

Melea, malus, Armeniaca.

M A L I armeniaca fructus, quæ nunc vocant mala præcocia, consimiles persicis vireis refert.

Meon.

M E I radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoque vrinam & menseis cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

Milax.

M I L A X tam læuis, quam aspera, arbores amplexa, calidam acremque facultatem possidet.

Misy.

M I S Y medicamentum est ex iis quæ crustam faciunt & adurunt, valenterq; astringunt, minus autem quam chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori vetustate in misy mutantur, vt ait Galenus: à superficie incipiente statim mutatione.

Molybdæna, plumbago.

P L V M B A G O argenti spumæ vireis habet à medio temperamento ad frigidius digressa.

Molybdos, plumbum.

P L V M B V M refrigeratoriæ virtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfundatur teratúrque; aut vino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerante, ad naturalium & sedis vlcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina vero plumbea super lumbos gestata, veneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematum plumbum validius quidem siccet, sed & acrimoniæ nonnihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccet, tum maleficis vlceribus præsentaneum est remedium.

Moræa, morus.

M O R I fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliis quæ moderatam requirunt astringentem vtiliter miscetur. immaturus vbi exaruerit, perquam

nam obstruens fit medicamentum: cortex autem radice
boris etiam amaritudinis cuiusdam particeps, purgare
est, eoque latus ventris tinea occidit: foliorum autem
rculorumque vis, subducentium & comprimentium me-
a quodammodo existit.

Myagros.

MYAGRI semen pingue est. quod in eo oleosum habe-
ur, opplendi viris repræsentat.

Myaces, mituli.

MYTVLI combusti, eundem cum buccinis effectum
ræstant, propriè verò eloti palpebrarum asperitatem & al-
ugines cum melle exterūt, caro ipsorum canum moribus
iliter imponitur.

Myaron.

MYARON, quam alij melampycnon appellant, herba fe-
ulacea est & pinguis, videtur autem ipsius pinguitudo cor-
oris asperitates læuigare.

Myelos, medulla.

MEDVLLA facultatis est quæ indurata ac in scirrhum
non crescentia corpora emollit. Laudatissima est ceruina,
nox vitulina: taurina vero hircinaque acrior est, magis-
que siccatur, & quæ in artubus continetur, pinguior est ma-
gisque emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidior-
que est.

Mycetes, fungi.

FVNGI frigidi & humidum admodum temperamento sunt:
nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præ-
sertim qui inter ipsos natura cōstant putridæ qualitatis par-
ticipi.

Myosote, muris auricula.

MVRIS auricula dicta est albine.

Myxa.

MYXA arboris fructus est minor quidem prunis, facul-
tate vero cōsimilis.

Myrica, tamarix.

TAMARIX incidit extergitque, ita ut manifeste non sic-
cet, habet autem astrictionem nonnullam, qua de causa de-
coctum ipsius potum lienes adiuvat, item dentium dolori-
bus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ virtute
proximus est: cinis arboris vehementius exiccat.

Myris.

Myriophyllum, millefolium.

MILLEFOLIUM tantam siccandi vim possidet, ut vulnera conglutinet.

Myrrha, vel myrrhis.

MYRRHA in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisque est, mensibus mouendis, & humoribus & thorace & pulmone repurgandis idonea.

Myrrhine, seu myrsine, myrtus.

MYRTUS ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur: at myrrula quæ soboles myrti est, tuberosa, caudicem ipsius & ramos amplexa, vehemētius astringit & siccatur. iam vero & folia aridiora viribus magis siccant: item fructus succusque tum foris applicatus, tum intus assumptus persimileis vires præ se fert.

Moly.

MOLY, quod nonnulli rutam syluestrem, alij zarmalam dicunt, Syrii besafam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenue, hinc crassos humores viscososque incidit, discutit & urinam promouet.

Quæ ab N incipiunt.

Nascaphthon.

NASCANTHON, sunt qui nascaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos fœminarum locos suffitu vaporetur.

Napy. sinapi.

SINAPI calefacit siccaturque in quarto abscessu.

Nardostachys, spica nardi.

SPICAE nardi radix calefacit in primo, siccatur in secundo ordine, particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris, & subamaræ, iocinori igitur prodest & stomacho extrinsecus admota & ebibita, urinam mouet & interaneorum fluxiones desiccatur: sed Indica valentior est quam Syriaca, & nigrior.

Nardus Gallica.

NARDUS gallica superiori vireis habet similes quidem, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam: calidior enim est quam illa, minusque astringit.

Nardus montana.

NARDUS montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisque dicitur, commemoratis est infirmior.

Nar

Nartex . ferula.

FERVLAE semen extenuat calfacitq;: medulla ipsius vidis adhuc, astringit, eoq; sanguinem spuētibus & cœliis accommodata est.

Narce, torpedo marina.

TORPEDO marina viuens capiti imposita dolores eius cecet, idq; forsan eodem illo torpore quem membris eam contingentibus inducit: oleum in quo viua decocta fuerit, & aciores articulorum cruciatus leniendos inungitur: eadem torpedo anum procidentem coërcere appositâ fertur.

Narcissus.

NARCISSE radix adeo desiccatur, ut maximis vulneribus sit glutinandis, imò etiam tendinum præcisionibus confert, præterum abstergendi & attrahendi vim quandam habet.

Neuras, seu poterion.

NEURAS, quod alij poterion vocant, sine rosione desiccatur, ut & ipsa nervos præcisos glutinet: radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

Nerion, aut rododaphne.

NERION extrinsecus applicatum vim refert discussoria: si intus assumatur, occidit.

Nymphaea.

NYMPHAEA vireis habet sine rosione siccatur, quibus & ventrem reprimit, & genituram arefacit: verum alba radice donata valentior est, eoq; fluxum muliebrem cum vino nigro & austero pota persanat: quæ nigram refert, deterforia quoq; vi nonnulla pollet, eaq; vitilignes, alphas dictas cum aqua exterit: alopecias cum pice liquida illita replet.

Quæ ab X ordiuntur.

Xanthion, aut phasganion.

XANTHION phasganiūve fructum fert discutiendi viribus præditum.

Xiris, aut Xyris.

XIRIS naturæ tenuis est, discussoria, & extrahentis, ac nimirum siccatoria, præcipue semen, quod & urinam cit, & heni in scyrrhum indurescenti medetur.

Xiphion, gladiolus.

GLADIOLI radix trahit, discutit, & siccatur.

Quæ

Quæ initium habent ab O.

Oc, sorbus.

SORBUS arbor cuius fructus oa, à nonnullis & dicitur, astringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

Othonna.

OTHONNAM, alij herbæ esse succum in Arabia ad Aegyptum nascentis affirmant, alij lapidem Aegyptium: detegit autem eroditque, omnia quæ claritati oculorum officunt, exterens.

Oenanthe.

PLURIMVS sanè vsus sylvestris vitis: florem abundè astringentem esse fatetur: & ventrem potissimum corroborare. Dioscorides autem aliam describit *œnanthen* contrariis donatam viribus, vnde secundas eam eiicere, & urinæ stillicidio, morboque regio mederi tradit.

Oenos, vinum.

VINVM ex iis est, quæ in secundo ordine calefaciunt, siccantque: quod admodum vetustum est, in tertio: Mustum verò in primo.

Oesypus, lana pinguitudo.

OESYPVS in sermone de lanis explicata est.

Olymbi, grossi.

GROSSI acrem & discussoriam vim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

Olostium.

OLOSTIVM ficit astringitque: hinc eo adruptantur.

Omphacium.

OMPHAGIVM succus est vix immaturæ, astringens egregiè & siccans in tertio abscessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

Onagra.

ONAGRA, quam nonnulli onotheram, alij onothuris dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia vlcera mitigat.

Onoma.

ONOMA, vel onomis, vel phlomitis, vel ononis, acrem amaramque vim obtinet, eamque ob causam folia eius cum vino pota foetus occidunt expelluntque.

ONO

Onobrychis.

ONOBRYCHIS virarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio metatur, & sudores prouocat.

Oni, asini seu multipeda.

MULTIPEDA quæ sub aquariis vasis agunt, & in orum se conduplicant, discutiunt siccantque, potæ cum vino in angustis & arquato medentur, anginæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detrita cum rosaceo calfa & tene in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter stillantur.

Onyches, conchule Indica.

ONYCHES conchyliorum Indicorum opercula sunt, iæ suffitu strangulatione vuluarum concidentis feminas excitant, item comitiales: potæ verò aluum turant.

Ononis.

ONONIS radice constat quæ in tertio ferè gradu calefit, cortex ipsius extergit, & incidit, vnde etiam calculos conterit.

Oxos, acetum.

ACETVM mixta est naturæ frigida & calida, sed vtriusque tenuis, frigida tamen calidam excellit, cæterum in tertio ordine siccatur.

Oxiacanthos.

OXYACANTHVS arbor piro sylvestri & figura & viribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respondet.

Opos, liquor.

LIQVORES, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam dicuntur, calidi natura, & spirituosè insigniter: verum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuiorque.

Origanum.

OMNIA origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vireis in tertio abscessu ostendunt.

Oreoselinum, apium montanum.

APIVM montanum viribus domestico æquale est, sed inualentius.

Oro

Orobanche.

OROBANCHE sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

Orobos, eruum.

ERVUM calefacit in primo gradu, siccat in secundo, amarumque est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orminon.

ORMINON marrubio specie simile est, calidum, mediocriter siccum & abstergens. venerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos qui oedemata vocant discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domesticum est valentius.

Oryza.

ORYZA vim quandam astringentiam præ se fert: quæ etiam ventrem mediocriter cohibet.

Orchis herba.

ORCHIS herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus canis,) radicem habet bulbosam & duplicem: vis autem maioris, humida & calida, eoque veneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contrahitur venerem coercet.

Orchis, serapias.

ORCHIS, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, prior valentius desiccatur, quare laxos tumores cedentesque dissipat. Ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescens autem magis siccat. Quoniam vero substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

Osyris.

OSYRIS, ex qua medicamenta ad extirpandam, laeuigandamque cutem, Græci coremata vocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi vires habet.

Ossa, ossa,

OSSA concremata vehementer discutunt siccantque: præsertim id facere dicuntur humana: atqui suillus talis combustus inflationibus & circa umbilicum torsionibus mederi dicitur. quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talis usus, mobileis firmare dentes prædicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lic-

nem

em consumit, & vitilignes, quas vocant leucas, illitus abot, item ad venerem commendatur: femora bouis cremata otu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

Ostraca, testa.

TESTAE fornacium tritæ siccant exterguntq; hinc denfriciis accommodantur, illitæ cum aceto prurigini, pustulis, quæ appellantur exanthemata, conferunt, cerato exetæ strumas discutiunt.

Ostrea.

OSTREORVM testa cremata æqualem buccinis vim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, & lentibus nitorem cõciliat: elota rosionem amittit, ad carnẽ icatricemq; humidis vlceribus iuducendâ accommodata.

Ouron, vrina.

VRINA quælibet calida est & acris, sed humana omniũ aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. catenũ vehementer abstergit, quapropter nonnulli potione eius in peste vfi, mortem euaserũt, eadẽ lepras, vlcera putredinẽ experta, capitũq; manantia vlcera, quæ vocantur achores, & surfures per sanat. item pedum attritus nondum inflammatione occupatos. At pueri venerem nõ experti vrina omniũ efficacissima est, vnde etiam chrysocolla conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chamelorum, aluum deicit. ideóq; contra aquam subter cutem bibitur.

Que à P incipiunt.

Panration.

PANCRATION & specie & viribus scyllæ simile est, verũ imbecillius.

Paliuron.

PALIVRI folia & radix astringunt, eoq; aluum fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt: Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

Panaces.

PANACES Herculeum est ex quo opopanax dictus cõficitur, in tertio ordine calefaciens, in secũdo siccans, emolliens, discutiensq; radice cortex liquore imbecillior, habet

L

nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneum: semen ipsius menſeis quoq; citat. Aſclepion panaces & Chironium priori calidiora ſunt, hinc floribus ipſorum & ſemine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

Papyrus.

PAPYRVS ignem non experta, materia quædã efficitur: vſta, ſiccatur chartæ crematæ modo, verum papyri cinis viribus inferior eſt.

Paronychia.

PARONYCHIA inde nomen accepit quòd digitorũ reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychix, medeatur, viſ eius eſt extenuare & ſiccare, idq; citra roſionem.

Pentaphyllon, quinquefolium.

QUINQUEFOLIUM in tertio ordine deſiccatur, minimè acre, eoq; in multos vſus accommodatur.

Peplon, herba.

PEPLON nonnulli papauer ſpumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

Peplion.

PEPLION quoq; liquorem habet & magna ex parte maritimis locis naſcitur, cætera quidem inutile, ſemen aut ipsius feruidi ſaporis vt peplum expurgat.

Peperi, piper.

PIPERIS radix coſti vireis reſert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum eſt piper, humidius natura & calidum: fructus veluti acerbus immaturuſque, album eſt piper, nigro acrius, vt quod impendio magis aſſatũ ſit: vtrũque verò & calefacit & deſiccatur.

Pepon.

PEPON abſterſoriæ facultatis eſt, inde veluti caro ipsius ephelidas & conſimilia faciei viſia exterit, ſemen renes obſtructione liberat.

Periclymenon.

PERICLYMENI folia & ſemen incidendi ſimul & calefaciendi vireis obtinent, quapropter vrinã cruentam excernunt, ad ſex dies pota: ſemẽ autem ad quadraginta dies potum lienofos & agrè ſpirantes adiuuant.

Periſtereon, verbenaca.

VERBENACA adeò deſiccatur aſtringitq; vt vulneribus glutinandis, † & ſanguinis eruptioni ſiſtendæ ſit.

† Tot

† Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιτριών εις τοσόντων ξη-
 λναι τε καὶ τύφει ὥστε δύνασθαι πολλὰν τράυματα, ἔθεν ὑπὸ τῶν
 κνησθῶν τε καὶ φαγδαυνικῶν ἀντὶ χρῶνται. Id est, Peristereon vsq;
 led siccatur & adstringit ut possit glutinare vulnera. Itaq; eo utuntur
 in malignis ulceribus & ad partes vicinas serpentibus.

Persea seu persica.

PERSAEA arbor est Aegypti, cuius folia & siccant &
 stringunt, eoq; sanguinis eruptionem compescunt.

Petasites.

PETASITES tertio siccantium ordini ascribitur, unde
 & malefica & phagedanica ulcera eam usurpant.

Petroselinon.

PETROSELINI semen calidum siccumque est in tertio
 abscessu, vi incisoria præditum, urinam, mensesq; copiose
 trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

Peucedanum.

PEUCEDANI liquore & succo affatim calefacienti, di-
 scutiendi, extenuantiq; utimur, tum naribus admoto, tum in
 potione assumpto, ad pulmonum & pectoris vitia ex humo-
 rum crassitudine contracta: item ad lienem scyrrho indura-
 tum: dentibus autem perforatis impositus, dolorem protinus
 sopit, nervorumque affectibus idoneus est: radix squamas
 ossium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordi-
 ne & calefaciens & desiccans.

Peuce, pinus vel pinaster.

PINUS picæ viribus respondet, sed moderatior est.

Peganum, ruta.

RUTA sylvestris ad quartum calefacientium siccanti-
 umque ordinem refertur: sativa, ad tertium, cuius vis est
 crassos lentosque humores incidere, & dissipare, urinam
 mouere, attenuare, & flatus discutere, unde & venerem
 coercet.

Pissa, pix.

PIX arida quidem in secundo abscessu desiccatur, minus
 calefacit: liquida econtrario, imò etiam extergit, maturat,
 discutit, acrisq; est, eamq; ob causam vngueis scabros edu-
 cit, imperigines exterit, tumores maturat. Valētiōr autē est li-

quida, vt etiam suspiriosis & purulenta excreantibus, lincta subueniat: sed arida vulneribus magis glutinandis est.

Piselaon, oleum picinum, seu picis flos.

PICINVM oleum ex liquida fit pice, qua natura tenuius existit.

Pistacia.

PISTACIORVM fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, praecipue summi & odoraticorum operimenti ex vino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

Pityides.

PITYIDES fructus sunt picearum, mistae facultatis, astringentiae & acris, quam ob rem reiectionibus e pectore opitulantur.

Pityocampa, picearum eruce.

PICEARVM eruce eiusdem sunt virtutis quam cantharis & buprestis obrinet.

Pityos phlozos, picea cortex.

PICEAE cortex astringendi vim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus persanat, ventrem potus reprimat: folia etiam vulnera conglutinant.

Pityusa.

PITYVSAM quoque nonnulli tit hymalli speciem affirmant, quoniam & liquorem habet, & perinde vt illae purgat.

Platanus.

PLATANVS vi humidior & frigidior pollet, eaque de causa folia viridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulae quoniam maiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctae dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccatur vehementius & abstergit, eoque lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

Pneumon, pulmo.

PVLMO agninus, suillusque; attritus pedum ex calceis curare creditur: vulpinus sale inueteratus si bibatur, suspiriosis proficit: marinus recens detritus podagris & pernionibus succurrit.

Polemonium.

POLEMONIVM, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi viribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scyrrho induratum, radicem eius, cum vino propinant.

Pol

Polium.

POLIVM minus, quo & in antidotis utimur, tertij calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia viscera obstructa laxat, urinam mensesq; trahit: viride adhuc, magna glutinat vulnera, aridū maleficis inspersum ulceribus proicit.

Polygalon.

POLYGALON folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoque generare putatur, calidi humidique temperamenti compos.

Polygonaton.

POLYGONATVM variæ particeps est facultatis, astringentioræ, acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingrata, quæ verbis nequeat exprimi: quapropter in multipliceis usus haud est accommodatum: radicem ipsius nonnulli vulneribus inducunt, & faciei labes, quas ptilos dicunt Græci, eo abstergūt.

Polygonon sanguinaria.

SANGVINARIA habet sanè vim quandam astringendi sed humiditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi feruori frigida inspergitur vtiliter, erysipelatis, inflammationibusque calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque hac ratione siccatoria esse putatur: fœmina autem mas efficacior est.

Polycnemon.

POLYCNEMON in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoque vulnera glutinat.

Polypodium, filicula.

POLYPODIUM siccatur abundè citrà morsum: potum, inferius purgationem molitur.

Pompholyx.

POMPHOLYX sine rosione siccatur, ideoque cancris & ulceribus aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medicinis miscetur.

Porphyra, purpura.

PURPURAE crematae testis similem vim sortitæ sunt, opercula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cum aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu fœminas locorum stangulatu concidentes excitant secundasque eiiciunt.

Potamogeton.

POTAMOGETON refrigerat & astringit, perinde ut herba sanguinalis iisdem virtutibus præditum.

Poterion.

POTERII, quod alij phrynon dicunt, radices concisæ neruos præfectos & vulnera conglutinant, decoctum ipsius epotum neruorum affectibus auxiliatur.

Prasion, marrubium.

MARRUBIUM in secundo ordine calefacit, amplius autem siccatur, secur lienemq; obstructum laxat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensisq; promouet: in cataplasmate verò inductum extergit, discutitq; præcipua extersoria in cisoriaq; vi præditum.

Prason, perrum.

PORRUM mali succi est & acris. vt autem Dioscorides memoriæ prodidit, grauia facit insomnia, aluumq; bonam, urinam ciet, & extenuat: habet & abstergendi vim aliquam, qua pectoris excreationes elicit ptisanæ incoctum, semè verò ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam non nihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem suppressit.

Prinos, ilex.

ILEX simileis quercui vircis habet, sed multò ea est validior.

Propolis.

PROPOLIS calefacit quidè in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuū apertoriæ.

Ptarmice.

PTARMICAE folia sternutamenta mouent, totus autem frutex viridis sugillata, liuorésq; alios disijcit, est enim herba calida & sicca, viridis secundi ordinis, arida tertij.

Ptelea, vlmus.

VLMS siccare valet & abstergere, eoq; vulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolæ modo vulneribus circūuoluatur, cū aceto lepras quoq; tollit: radices idè præstant, si ossa fracta quæ solidari tophacia cicatrice, quæ porondicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

Pteris, filix,

FILIX vim siccandi & amaram repræsentat, eaq; foetus corrumpit, latásq; tineas enecat, instar quatuor drachmarū cum mulla pota: quoniam verò modicè constringit, vlcera citra rosionem desiccare potest.

Pycnocomon.

PYCNOCOMON discutiente vi extrahenti acriq; donatum

um est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen
reterea infixa corpori spicula extrahit, radix flauam bilem
urgat.

Pyrethron.

PYRETHRI radix adurentem potestatem occupat, dē
ium qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium
rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhuc iis
quorum corpora stupent, & resoluta sunt, efficacissimè ad-
hibetur.

Pyros, triticum.

TRITICVM in primo ordine calefacit, verum siccando
humectandoque medium est, nonnihil etiam glutinosum,
& obstruendi efficax obtinet.

Pyria, coagulum.

COACVLVM omne naturæ acris est, tenuis, discutien-
tis, & nimirum siccantis. sed leporinum comitialeis sanare
cum aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem
emendat, lac in ventre concretum soluit, similiter etiam san-
guinem: nonnulli vero cruentas pariter è thorace excrea-
tiones cohibere ipsum tradunt, equinum verò coaguluna
cœliacis & dysentericis prodesse: phocæ autem castorij vi-
reis præ se ferre.

Quæ ab R incipiunt.

Rhacos, attrita vestis fragmentum.

ATTRITARVM è lana vestium fragmenta cōcremata,
simileis eidem lanæ vireis repræsentant. Linei autem pan-
niculi quum adhuc vruntur, tenuem ex se fumū reddūt, quī
etiam destillationes in guttur liberet. & vuluæ sursum re-
currenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ virtutem acce-
dunt.

Rhamnus.

RHAMNVS siccatur in secundo, refrigerat in primo ab-
scessu, quare herpetibus & erysipelatis non admodum ca-
lidis medetur. sed teneris eius foliis vtendum est.

Raphanus.

RAPHANVS in tertio abscessu calefacit, in secundo sic-
cat: syluestris efficacior est, in ambobus autem semen valen-
tius. itaque sugillata, aliosque liuores disijcit.

Rheon, rha.

RHEON, quod alij rha dicunt compositū est ex terrestri
frigida & tenui substantia, aëreaq; calida & leniter acri, eāq;
ob causam conuulsis, ruptis, orthopnœis opitulatur: quod

discutiendi vim habeat, liuores emendat: quòd astricto-
riam, cruentas excreationes, cœliacos, & dysentericos sa-
nat, vtraque vero facultate, iocinorosos iuuat.

Rhetina, resina.

R E S I N A E omnes & calefaciunt & desiccant, verum
terebinthina principatum obtinet, discutiētis naturā, emol-
lientis, tenuis & abstersoria, eoque scabiem corrigit: & la-
rix huiusmodi est. Quæ vero è pinu destillauerit, atque hac
magis adhuc strobilina, acrior est, non ramen aut discutit
magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ
de picea, & quæ de abiete raditur.

Rhoda, rosæ.

R O S A E mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida,
astringenti, & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit,
eoque desiccatur.

Rhodia radix.

R H O D I A radix calefacit in secundo abscessu, tenui &
discutiente vi prædita.

Rhœa siue rhoë, malum punicum.

M A L V M punicum omne astringendi vireis eximias ha-
bet, quibus refrigerat siccaturque: verum dulce aliis minus: au-
sterum magis refrigerat sicciusque est & stomacho amicum,
acidum refrigerat quoque, & maiorem quandam inciden-
di virtutem repræsentat. verum acini succo magis astringunt
siccantque efficacius his adhuc malicorium quod fī-
dion Græci vocant: huic virtute respondet mali flos qui cy-
tinus appellatur.

Rhus.

R H V coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuæ & suc-
cus magno in vsu sunt, quum illa astringendi siccandi que
vim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

Rypas, sordes.

S O R D E S ex statuis æreis, aut vasīs in quibus multum
olei inhærescit, detractæ sic vt nonnihil æruginis admixtum
sit, discutiendi vireis habent, siccandi que mediocriter & emol-
liendi, eiusque immatura phymata discutiunt. At de sordibus
quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos vo-
cant, in sudore dictum est. Aurium fordeculæ reduuiis me-
deri dicuntur.

Quæ

Quæ ab Sincipiunt.

Sagapenum.

SAGAPENVUM, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, si & abstersoria quædam vis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

Salamandra.

SALAMANDRAE vstæ cinerem nonnulli medicinis exentibus, tum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, admiscunt.

Sampsuchum.

SAMPSUCHVM calefacit siccaturque in tertio abscessu, et etiam tenuis naturæ & discussoriæ.

Sandaracha.

SANDARACHA adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

Sandyx, vel siricum.

SANDYX aut siricum extenuat & siccatur, non tamen calefacit.

Sapotes, caries lignorum.

LIGNORVM caries, præsertim ulmi, humentia purgat ulcera & explet.

Sapo.

SAPPO abstergendi vim habet.

Sarcocolla.

SARCOCOLLA persicæ arboris lachryma est, opplendi & citra rosionem siccandi vireis sortita, atque ideo vulneribus est glutinandis.

Saxiphages, saxifraga.

SAXIFRAGA urinam mouet, & calculos conterit.

Satyrion, trifolium.

SATYRION, aut triphyllon humidus est temperamenti & calidi, item flatuosus, unde veneris appetentiam facit: nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca trifolium ait hyacintho simile esse, quum aëre inturgescens, semine sylvestri cnico equale habet: decocti ipsius ius superfusum phalangij aut viperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

Saura, lacerta.

LACERTAE iecur & caput suo loco exposita sunt: totum aut caput dissectum impositumque scorpionum ictibus medetur.

L 5

Selinon, apium.

APIVM tanti caloris est, ut & urinas & menses eliciat
caterum flatus discutit, praesertimque eius semen.

Seris, intybum.

SERIS subamarum olus est, admodum refrigerans hu-
mectansque, habet etiam nonnihil astringentis.

Seriphum.

SERIPHVM calefacit quidem in secundo, siccatur autem
in primo ordine, consimile absinthio, minus tamen eo astringit,
magis calefacit, animalia ventris occidit, mediocriter
stomacho aduersatur.

Seseli.

SESELIS radix magisque semen insigniter calefacit,
tenuisque substantiae est, urinam quoque citat, comitialibus,
& orthopnoea accommodatum.

Sepia testa.

SEPIAE testa per similes est ostreo quod ad vireis attinet,
sed tenuior substantia & abstergens, eoque in cinerem re-
ducta, ungues cum sale fositio extenuat: ignem non ex-
perta si infricetur, ficius exurit, & cutis labes abstergit.

Sesamoides.

SESAMOIDIS albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

Sesamum.

SESAMVM non parum lentoris, pinguisque obtinet, id-
circo opplere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum
est.

Seps.

SEPS, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in
vino pota, propriis moribus succurrit.

Sialen, salina.

SALIVA hominis ieiuni maxime discutit & abstergit,
eoque infantium impetigines illita exurit & furunculos cum
tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata de-
let, feris hominem occidentibus maxime aduersatur.

Sideritis.

SIDERITIS Heraclia & helxine dicta est, Achillea au-
tem sideritis illi quidem consimilis est, sed magis astringit,
eoque fluidis affectibus accommodata.

Sideros, ferrum.

FERRVM aqua restinctum subinde, vehementem desic-
candi vim aquae conciliat, quae pota lienosis conducit: vi-
num

um autem in quo id reſtinctum eſt cœliacis, dyſentericis, cholera infeſtatis, ſtomacho reſolutis, auxiliatur.

Sicyos, cucumis.

CVCVMIS eſculentus quidam viridis, refrigerat hume-
atq; in ſecundo ordine, caro ipſius feruidas ſolatur inflam-
mationes, ſemē abſtergendi incidendiq; virtute præditum,
vrinas mouet, & corpus nitidum efficit. aridus ſiccatur in pri-
mo ordine, magiſq; abſtergit, & ſemen, & radix.

Sicyos agrios, cucumis fylueſtris.

CVCVMERIS ſyluatici ſeminis ſuccus elaterium dictus
eſt, qui autem è radice & foliis premitur, elaterio ſimilis eſt,
ſed imbecillior: radix detergit, diſſipatur, emollit: ſuccus ſic-
candi vireis habet.

Silybon.

SILYBON ſpinofus frutex eſt, albo chamæleonti perſi-
nilis, eſui accommodatus: radicis liquor drachmæ pondere
um mulſa potus, vomitiones excitat.

Silurus.

SILVRVS ſale conditus ſi edatur arteriam humentem
expurgat, applicatus corpori ſpicula educit.

Silphe, blatta quæ in piſtrinis inuenitur.

BLATTAE quæ in piſtrinis inuenitur interanea deco-
cta contritaq; aurium dolores perſanant.

Silphium, laſerpitium.

LASERPITIUM probè calefacit, flatulentum eſt etiam
& concoctu peruicax: à foris corpori applicatum efficacius
deprehenditur, magiſq; liquor ipſius, extrahendi potēs, item
& ſuperexcreſcentia amoliendi vim quandam obtinet.

Sifon.

SISON calidus eſt, vrinam mouet, concoctionem adiu-
uat, menſeis educit, & viſcera obſtructa aperit.

Sion.

SION calidum, vrinam citat, & diſcutit, renum calculos
frangit, menſeis euocat.

Sifarum, ſiſer.

SISERIS radix cocta ſtomacho vtilis eſt, & vrinæ cien-
dæ, calida in tertio ordine: ſemen tenue eſt, diſcuſſorium,
validumq; idcirco iis quos ſingultus & torſiones circa vm-
bicum malè habent, cum vino exhibetur.

Sifymbrium.

SISYMBRIUM ſunt qui cardaminē vocāt, cardamo, hoc
eſt,

est, nasturtio assimilatū: aridū quidem calefacit siccātq; in primo abscessu: humidū autem in secundo.

Scammonia.

SCAMMONIA calefacit, discutit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositū corrumpit, lepras extergit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodino superfunditur: radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur.

Scandix.

SCANDIX sylvestre olus est, calefaciens siccansque in secundo gradu, urinam propellit, & viscera obstructione liberat.

Scingos, terrestris crocodilus.

SCINGI carnes renibus proximae, naturalibus arrigendis bibuntur. rursus semen lactucae cum aqua potum eadem contraria virium lege videtur remittere: item lentis decoctum cum melle.

Scylla.

SCYLLA incidit, calefacit & desiccet in secundo ordine: praestat autem eam assam aut elixam sumere.

Scolopendra marina.

SCOLOPENDRA marina in oleo elixa inunctaq; pilos abolet, vitta etiam pruritum excitat.

Scolopendrion.

SCOLOPENDRION asplenon est.

Scolymon, carduus.

CARDVVS calefacit, siccātq; in ordine secundo, radix eius cum vino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & alarum totiusq; corporis graueolentias corrigit.

Scordion, trixago palustris.

SCORDIVM variis pollet facultatibus, ut quod amarum, acerbum, & acre sit, purgat igitur simul & calefacit viscera, urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatq;: aridum inspersum cicatricem inducit.

Scordon, allium.

ALLIVM calefacit siccātq; in quarto abscessu: at sylvestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domestico valentius est.

Scor

Scordoprason.

SCORDOPRASON porri & allij mixtas habet vireis, & ustatum.

Scorpioides.

CORPIOIDES excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

Scorpius.

SCORPIVS terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprius remedium efficitur: marinus autem fel abet oculorum suffusionibus vtile.

Scoria, recrementum.

RECREMENTVM omne validè exiccat: ferri stercus asis amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem etritum cum aceto auribus suppurantibus mirificè profit, item iis qui aconitum biberunt: cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

Smilax, aut cactus arbor taxus.

SMILAX vel cactus arbor est virosæ virtutis.

Smyrna, myrrha.

MYRRHA è secundo calefacientium siccantiumq; ordine est: capitis igitur vulnera inspersa glutinat, item amarum vim obtinet, qua tineas, & fœtus occidat: adhæc abstergit, eoq; oculariis medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut guttur non exasperet. Bœotica myrrha vireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

Smyrnion.

SMYRNION, quidam hipposelinon, quidam apium sylvestre nominant, calefacit & siccatur tertio ordine, apio quidem fortius, petroselino autem inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

Sonchus.

SONCHVS astringit, & manifestè refrigerat, tum corpori admotus, tum manducatus: exarefactus autem mediocriter calefacit.

Sparganium.

SPARGANIVM siccandi & hoc vireis refert.

Spartos, genista.

SPARTI quo viteis ligant, & semen & flos cum mulsâ instar quinque obolorum pota, per superiora purgant, ventri albi modo sine periculo: semen autem per inferiora quo

quoque purgat: virgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

Specularium, lapis specularis.

SPECULARIVM, alij per ph scribunt spheclarium, quo nonnulli loco vitri in fenestris vtuntur, eoque diaphanes à perspicuitate appellatur, substantia gypseum, vireis habet concrematis testis aut ostreis simileis.

Spongos, spongia.

SPONGIA recēs quæ marinum odorem adhuc referuat, si cum aqua, aut vino; aut posca imponatur, vulnera glutinat, cremata acris est virtutis, & discussoria: cum bitumine autem & pice liquida vsta, appositaq; ex igne, sanguinis eruptiones comescit.

Spodium, cinerula.

SPODIVM pompholygi viribus æquale est.

Staphylinus, pastinaca.

PASTINACA urinas mouet, menseis proritat, præsertim semen ipsius & radix, folia autem abstergendi viribus prædita phagedænicis affectibus congruunt, & viridia cum melle: syluestris autem pastinaca ad omnia valentior est domestica.

Stachis.

STACHYS marrubio similis frutex tertium in calefaciendo ordinem occupat, menseis itaq; excitat, fœtus occidit, & secundas expellit.

Steata, adipēs.

ADEPS omnis humanum corpus & humectat, & calefacit, sed pro diuersis animalium temperamentis virtus eius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, vt ad olei naturam accedat, vnde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior est, & celeriter concrescit, eoq; iis qui in longanone rosiones experiuntur, ab inferiori parte iniicitur. Anserinus calidior est, maioremq; tenuitatem obtinet. Inter vtrunque hunc gallinarum, gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore omneis, & tenuitate superat, & propterea etiam vi discussoria. Bubulus inter suillum & leoninum medius temperamento existit. Vrsinus alopecis medetur, vulpinus aurium doloribus, quemadmodum viperinus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum specie calidior, sicciorq; est marium, atq; ex his eorum
ani

animalium quæ testes habent, magis quàm illorum quibus
i sunt execti, & vigentium ætate efficacior quàm aliorum.
eterum vetustate omnis adeps redditur calidior.

Stimmi.

STIMMI præter quàm quòd siccat, etiam astringionem
habet, ob quam ocularis collyriis miscetur.

Stæbe.

STOEBÆ semen & folia in tertio ordine deficcant, viri-
us donata astringentius, eamq; ob causam vulnera magna
conglutinant: decoctum ipsorum dysenteris, sanguinis eru-
ptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia applicata o-
culis ex ictu suffusis conferunt.

Storchas.

STOECHAS adaperit, extenuat, detergit, & viscera o-
mnia, totumq; corporis habitum confirmat.

Stratiores.

STRATIORES aquaticus frigidus est natura: terrestris
etiam astringendi vim habet, qua vlcera committit: non-
nulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas vtuntur.

Strychnon, solanum.

SOLANVM hortense esculentumq; astringit, & in secun-
do ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortenfi simi-
le, urinæ ciendæ idoneum semen habet acino vix æquale.
hypnotici, id est, somnifici solani radices cortex, cum vino
denarij pondere potus, somnum conciliat, semen habet ad
urinam mouendam accommodatum, ex tertio refrigeran-
tium ordine: vnde corymbi eius plures duodecim poti,
furorem accersunt. Quartum verò genus solani intus as-
sumptum, inutile est, à foris autem applicatum vlcera depa-
scentia curat, refrigerando, siccandoq; ad secundum ordi-
nem relatum.

Stypteria, alumen.

ALVMEN omne, maximè acerbum est, substantiaq; cras-
sum: tenuius autem reliquis est quod vocatur scissile, mox
rotundum, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum,
& quod placites & plinthites appellatur.

Styrax.

STYRAX calefacit, emollit, & concoquit: tussis, destilla-
tioni in fauces, & grauedini utilis, mensis idem & potus, &
appositus extrahit.

Sycæ.

Syca, ficus.

FICVS aridæ in secundo ferè ordine siccant: pingueis autem, duros tumores magis maturant, acriores deterguunt, discutiuntque, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siræon appellant, viribus melli respondet: virides autem ficus, imbecillioris virtutis sunt, utraque tamen & virides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriae sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

Syce, ficus arbor.

FICVS arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeò ut liquor & foliorum succus non rodat modò, aut abstergat vehementer, sed etiam exulceret, ora venarum aperiat, & myrmecias exterat: iam verò & purgandi vim obtinet. At sylvestris ficus, quam caprificum vocant, in omnia efficacior domestica est.

Sycomorus.

SYCOMORI fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerum, discussoria tumorum: bibitur inungiturque ad serpentium morsus, lienes scyrrho induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

Symphytum petraeum.

SYMPHYTVM petrarum contrariis constat virtutibus, habet enim aliquid quod incidat, pus in thorace & rene expurget: habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, intestinorum ramicibus. item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriarum asperitates sanat. Symphyton alterum nempe magnum, viscosum quippiam & quod pruritus excitet, repræsentat, scyllæ simile. Utuntur eo, ut superiori.

Spondylion.

SPONDYLII semina & radix virtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus, & arquatis succurrunt, radix autem circumrassa, fistulisque imposita illarum callos tollit, succus è flore ipsius expressus, veterum aurium ulceribus instillatur.

Schinos, lentiscus.

LENTISCVS in omnibus sui partibus siccatur secundo
ordi

ordine absoluto, calefaciēdo autem & refrigerando medius
fit, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astrictione
cedat.

Schœni anthos, iunci odorati & rotundi flos.

IUNCUS odorati & rotundi flos modicè calefacit, minus
astringit, tenuem naturam sortitus, qua urinam mouet &
menstruū trahit. obstructa q̃; referat in fomentis, poru & cata-
plasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed
ille calidior.

Schœnos elia, iuncus palustris.

PALUSTRIS iuncus duplex est, sed eius qui vocatur oxy-
schœnos, semē est somnificum: holoschœni autem dicti, mi-
nus, idem & capiti dolorem facit. veriusque semen frixum
cum vino bibatur, alui fluores desiccet, & mulierum flu-
iones cohibet.

Sori.

SORI vireis mīny æqualeis obtinet, longè illo natura
crassius.

Quæ à T incipiunt.

Tarichos salsamentum thynni.

CONDITANEI thynni caro acris est & desiccatoria: mor-
bis igitur à vipera, quam præterem dicunt, quàm plurimum
eius esui datur, vinūq; superbibitur liberalius, & vomitus
excitatur: eadē ad acrimonias esicatorū valet, item rabidorū
canū aliorumq; serpentium moribus utiliter applicatur.

Taurocolla, glutinum bubulum.

TAUROCOLLA aliis xylocolla dicitur, ex boum coriis
confecta, vim habet insigniter absterforiam, eoq; aceto sub-
acta, impetigines & summa cutis lepras exterit: ambustis, si
aqua calida soluatur, inflammationem oboriri nō finit: ea-
dem oxymelite soluta vulneribus accommodatur.

Tellina.

TELLINAE conditaneæ crematæ, adurentem cinerem
reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsos radicitus palpe-
brarum pilos, si insilietur nasci iterum prohibet.

Terminthos, terebinthus.

TEREBINTHVS calefacit in ordine secūdo, siccet autē
si viridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inarue-
rit, ad tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratio-
ne & urinam mouet, & lienes adiuuat.

M

Tettiges, cicada.

CICADAE crudæ ficcatae ad colicum dolorem potui datur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum toridem numero piperis granis. quidam tostas contra vesicæ dolores potui exhibent.

Teutlon, beta.

BETA nitrosam vim habet, qua abstergit, discutit, & per nareis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arceda fit idonea, & modicè discutit.

Teucrion.

TEUCRION calfacit in secundo, ficcatur in tertio ordine, vi incisoria tenuique, lienibus medetur.

Tephra, cinis.

CINIS non omnis idem exactè habet temperamentum, sed pro materiae combustae differentia euariat: acerbarum sanè arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi vim non modicam obtinet, qua sanguinis eruptione compescit, quum nullius alterius datur facultas: acrium verò, puta fici & tithymali cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

Telephon.

TELEPHION in primo abscessu calefacit, secundo autem desiccatur: est itidem abstersorium, quapropter vlceribus putredinem expertis conuenit, & vitiliginis, tum leucas, tum alphas, cum aceto abolet.

Telis, fenugracum.

FOENUGRAECVM ex secundo ordine calidum est, è primo siccum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autè calidas & induratas scyrro magis discutiendo persanat.

Tithymalus, herba lactaria.

TITHYMALI omnes è quarto calfacientium ordine sunt, acrimoniae & validae amaritudinis participes: sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentium erorum dolores finit: liquores vehementiore donati virtute, dentium canis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modicè delitos auferunt, item myrmecias, verrucas & huius generis alia tollunt: & cutis labes abstergunt, maligna vlcera, & phagedaenica, curant. Ceterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

Tita

Titanus calx.

† CALX viua quidē vehemēter adeo vrit, vt crustā indu-
at: restincta verō crustā quidē subito excitat, sed post diem
nū non amplius, calefacit tamen & consumit carnis: si la-
etur, idq; aqua marina, validas discutiendi vireis acquirit.

† Hec verba sic leguntur in veteribus libris, τίτανος ἢ μὴν ἀβέ-
στον ἢ σφοδρῶς, ἵστίον καὶ ἐσχαρῶν, ἐβιδάσκει δὲ παραχρῆμα μὴν
χρῶν, καὶ ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐστὶν, ἀδυνατεῖ δὲ ἴστος καὶ διατρίβει τὰς σάρ-
κας, καὶ δὲ πλυνθῆναι ἀδυνατεῖ γίνεσθαι, καὶ μάλιστα, καὶ πλεονέκειν πλυνθῆναι,
καὶ πορρίσθαι δὲ ἡμεῖς γινώσκοντες δαδάσθαι πλυνθῆσθαι. Id est. Calx vi-
a vrit multum, vt crustā inducat, extinguita autem statim crustā effi-
t, sed post aliquot dies vis eius remittitur, calefacit tamen & tabefa-
t carnes: Si autē lauetur sine morsu reddatur, praesertim si sapius lota
verit: marina verō aqua abluta vim digerendi habet. Quam esse huius
ci veram scripturam, ex Galeno & Aëtio facillē intelligi potest.

Tragacantha.

TRAGACANTHA persimiles gummi vires re-
praesentat.

Tragium.

TRAGIVM frutex est in Creta lentisco similis, virtute
valida in tertio abscessu, attractoria, discutiēte, & tenui: a-
culeos igitur educit, calculos comminuit, mensesque citat,
instar drachmæ potum, Sed alterum tragium, hoc amarius
est, scolopendrio assimile, nascitur multis in locis, tanta a-
stringendī virtute praeditum, vt fluidis affectibus commo-
dē faciat.

Tragoriganum.

TRAGORIGANVM origani virtutes habet, & nonnul-
lam etiam astringentem.

Tribolos, tribulus.

TRIBVLVS mediocriter refrigerat: sed terrestris sic-
cādo valentior est, aquaticus leuiter etiam humectat: vter-
que contra inflammationum generationes, omnesque influ-
xus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renum
calculos conterit.

Tragositodes, tragus frumentaceus.

TRAGVS frumentaceus zeæ respondet, sed difficilior in
stomacho conficitur, & aluum emollit.

Trigle, nullus.

MULLVS piscis continuè esus claritati oculorum nocet, crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & araneorum moribus succurrit.

Tripolium.

TRIPOLI radix calida est in tertio abscessu & acris.

Triches, crines.

PILI combusti per simile lanis cōcrematis vim obtinēt.

Trigon, pastinaca marina.

MARINAE pastinacæ aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitq;.

Tryx, fax.

FAEX vini ignem nō experta compositis viribus constat, vt quæ abundè deficcet discutiâtq;, astrictoria autem facultas ei ex vini vnde confit specie, accedit. Utendum igitur est ea tum in humidioribus, tū in fluidis affectibus, phygethla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata verò quæ etiā spheclen appellant, adurentem vim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurunt, ipsam miscemus. vngueis igitur scabros cū resina eiicit: pilos cū oleo lētiscino per noctem toram inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforiis temperatur. Aceti fax in omnibus valentior est iam dicta, magisq; astringit.

Troglodytes, passer.

TROGLODYTES passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & ctudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

Tyros, caseus.

CASEVS recens & mollis repellendi vim obtinet, leuiter refrigerans, quare & vulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiā discussoriam modicam possidet, magisq; vulnera conglutinat: vetustus, isq; pinguis magis discutiendi virtutem præ se fert, quæ articulariorum quoq; tophis accommodatus est, præsertim cum suillæ carnis & salsæ & pinguis decocto.

Quæ ab Y incipiunt.

Hyacinthus.

HYACINTHI radix bulbi speciem representans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaque impuberes diu cōseruare cum vino inducta creditur: semen leuit

cuius abstergit astringitq; idcirco arquatis cum vino datur, ut quod deficcet magis quam refrigeret.

Hyalos, vitrum.

VITRUM laue cum vino tenui & albo potum, vesicæ alculos comminuere dicitur.

Hydnon, tuber terræ.

TUBER terræ terrestri constat substantia cum modica quadam virtute tenui.

Hydrargyros, argentum viuum.

ARGENTUM viuum in medicinæ vsum non adeò accommodatur, quòd venenum repræsentet: nonnulli verò cōcrematum ipsum in cinerem, mixtumq; aliis speciebus, colicis & iliosis porioni exhibuerunt.

Hydropeperi, aquaticum piper.

HYDROPIPER, herbula est calida, sed non piperis, modo, viride cum semine suo inductum, sugillata, & tumores scyrrho induratos discutit.

Hydor, aqua.

AQUA præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq; ex peculiari sua natura: vbi autem ascititium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ nonnihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ vireis acquirit. Pluuialis autem nonnihil etiam astrictionis habet, ob quam oculariis miscetur medicinis. Qualem verò conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

Hyoseyamus, altercum, seu herba Apollinaris.

ALTERCUM cuius semen nigrum est, item cuius flauū, venenosum est: accommodatissimum verò curationibus, quod & semen & florem candidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

Hypericum.

HYPERICUM duplex est. alterum quod androsæmon & ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum verò calfacit & siccat, tenui substantia præditum, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totum ipsius semen, quòd si cum foliis inducatur viride, cicatricem vulneribus obducit, & arida verò folia inspersa vlceribus medentur, dantur etiam porioni aduersus coxarum dolores.

† Hic locus ita descriptus est in veteribus libris, ξηρά δὲ ἰππιπάρημα
να τὰ πλάσσειν τὴν ἰσχυρίαν, id est. sicca autem inspersa, prahumi-
da ulcera sanant.

Hypocoon.

HYPERCOON refrigerat in tertio ordine, papaveri viri-
bus proximum.

Hypoglossum.

HYPOGLOSSON frutex pusillus est, cuius radix & suc-
cus emolliendi virtute pollent.

Hypocistis.

HYPOCISTIS eorum quæ ad radices cisti & cistari ap-
pellati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medica-
mentum ad omneis fluidos affectus efficacissimum, ut quod
particulas siccet corroboretque.

Hypophaeston.

HYPOPHAESTON species est spinæ fulloniæ, quemad-
modum & hippophaës, ex huius capitulo, foliis, & radicibus,
succus expressus siccatusque trium obolorum pondere, cum
mulsâ pituitam & aquam euacuat, maximè congruit ortho-
pnoëis, comitialibus, & neruorum affectibus.

Hyssopum.

HYSSOPVM in tertio ordine & calefacit & desiccât, re-
nuisquæ substantiæ est.

Quæ à Ph auspiciantur.

Phaci, lentes.

LENTEs in secundo ordine siccant, medio caloris & fri-
giditatis réperamento donatæ, sed astrictionis quoque non-
nihil habent. Totum verò lentis corpus siccât, aluumque si-
stât: decoctum ipsius proritat, ideoque prior aqua defundi-
tur, quum comprimendi gratia lentes assumuntur.

Phacos, lenticula, palustris.

LENTICVLA palustris humectat refrigeratque in se-
cundo abscessu.

Phalaris.

PHALARIDIS succus, folia, & semen pota, vesicæ do-
loribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quan-
dam vim, naturamque calidam.

Phalangites.

PHALANGITES quod phalangiorum moribus me-
dea

deatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos: qua torsionibus circa umbilicum auxiliari putatur.

Phellos, faber.

S V B E R præsertim ex vinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando vehementissimum, qui medicinis ad dysenterias inscriptis admiscetur.

Philyras, tilia.

T I L I A E arboris folia, syluestri olæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris vlcera iuuantur, eorumq; decocto colluuntur: quod etiam potum & vrinam & menses trahit.

Phlomos, verbasum.

V E R B A S C I genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis: cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astringentiam vim referunt: præcipuè eius quod aurei coloris est, & quod acerbæ sint, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes ex eis colluunt.

Phœnix herba.

P H O E N I X, aliis rhu, herba est lolio consimilis, astringendi viribus donata, in vino austero pota, omneis fluidos affectus sistit.

Phœnix arbor, palma.

P A L M A E fructus qui iam ematuruit, calidus mediocriter est, visceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palmæ portio vehementer astringens est, quamobrem stomachicis, & hepaticis medicinis temperatur: longè magis astringit quod fructus enascentis veluti inuolcrum est.

Phormion.

P H O R M I O tenuis, abstersoria & attractricis facultate: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula e corporibus extrahit.

Phu.

P H V radicem habet nardi persimilem, quæ tamen ad pleuraque infirmior sit, sed vrinas magis quam ea elicit, nardi gallicæ modo.

Phyllum, folium.

P H Y L L O N, Malabathri folium est, de quo in illius capite diximus.

Phycos, fucus.

P H Y C O S refrigerat, siccaturque in secundo abcessu, ac mediocriter etiam astringit.

Phylites.

PHYLITES cū acerba quadam prädita sit qualitate non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur.

Quæ à Ch auspicantur.

Chalbane, galbanum.

GALBANVM calore tertium ferè ordinem accedit, siccitate secundum, molliendi & discussoria vi donatum.

Chalcitis.

CHALCITIDIS vires astrictoriæ, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, vsta tenuior redditur.

Chalcanton, atramentum sutorium.

CHALCANTHON aqua est in Cypri metallis coalescēs, valentissimè astrictionis cū calore nō ignauo: quod omniū efficacissimè humidās carnis conservat suo condimento desiccātq; longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

Chalcos, æs combustum.

ÆS combustum acre quiddam habet & astrictionis pariticeps est, quapropter ad cicatricem vlceribus obducendam in siccioribus corporibus præstantissimum est: si eluatur, teneris vtilius est, quàm illotum.

Chalcu anthos, æris flos.

ÆRIS flos tenuioris naturæ est, quàm æs concrematum, eiusque squama: mixtus itaque collyriis palpebrarum & asperitates, & fici exterit.

Chamaedrys.

CHAMAEDRYS in tertio ordine calefacit siccātque. lienes igitur consumit, vrinās & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

Chamaecissus, hedera terrestris.

HEDERAE terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

Chamaeleuce.

CHAMAELEUCE in tertio abscessu calefacit, in primo desiccāt.

Chamaeleon.

CHAMAELEONTIS nigri radix calefacit siccātq; prope modum in tertio ordine, est & abstersoria facultatis pariticeps, qua cutis labes exterit, item duros tumores dissipat emollitq;, & phagedænica vlcera admota in cataplasmate persā

persanat: si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Alii radix superiori proportionem respondet, sed amarior est: quæ si cum vino austero instar acetabuli bibatur, latas venenis tineas enecat: facit etiam ad aquam inter cutem.

Chamamelon.

CHAMAEMELON siue anthemis calefacit siccaturque in primo abscessu, præterea virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

Chamapitys.

CHAMAEPITYS secundo gradu calefacit, tertio desiccatur, quam ob causam & purgare & abstergere viscera, possimum iecur potest, item urinas mensisq; trahit, magna vulnera conglutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

Chamadrops.

CHAMAEDROPS, quidam & hoc chamedryu vocant, alij etiam teucrion, viribus chamedryi responder.

Chamaesyce, humilis ficus.

CHAMAESYCE abstersoria & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, verrucasque abolet, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

Chamaelea, oleago.

OLEAGO abstersoria facultate, sordida vlcera & crustas cum melle purgat.

Chelidonium, herba hirundinaria.

CHELIDONIUM in tertio ordine calefacit, valenterq; abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium quarto calefacientium ordini ascriptum, acrius est, ut induratum cutem exulceret: vngueis scabrosos eiicit: succus autem ipsius per nareis purgat.

Chelidones, hirundines.

HIRVNDINUM crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes persanat: idem oculorum claritati benefacit.

Chole, fel.

FEL omnium aliorum animantis humorum calidissimum est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pallido calidius: & flauo, æruginosum. præterea variat pro ani-

mantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rofionem aurium vlceribus medetur. Ouillum maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillum efficacius. caprimo æqualia vrisum & boum existunt. taurinum vehementius: hoc, fel hyænæ superat, rursus hyæna vincitur à pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinx hirundinis. at capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium volucrum fel, tum acrius, tum siccando vehementius est quàm quadrupedum: inter has ipsas autem gallorum & perdicum aliis est præstantius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rofione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

Chondrilla.

CHONDRIILLA intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi vim quàm illa obtinet.

Chondrus.

CHOND RVS tritico per similis est, nisi quòd glutinosior.

Chrysocolla.

CHRYSO COLLA altera in metallis reperitur, altera in rubriæris pyla ac tali pistillo in vrina pueri venerem non experti, sub caniculæ astu contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteque vi prædita maiore, quàm ea quæ in metallis inuenitur, vt etiam carnem absumat citra rofionem: ob quod vlceribus maleficis accommodata est: concremata vero minus erodet.

Chrysocome.

CHRYSO COMAE, quæ etiam chrysitis dicitur, radix acris simul & astringente vi existit, quare non multi in medicina vsus est, quanquam peripneumoniacis & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menseis educit.

Quæ à Ps ordiuntur.

Pseudobunium.

PSEVD OB VNI VM bunij speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa vmbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale & vino inductum diluic.

Pseu

Pseudodictamnion.

SEVDODICTAMNON imbecillis dictāni vires habet.

Psimmythion, cerusa.

CERUSA refrigerat & opplet.

Psyllium, herba pulicaris.

HERBAE pulicaris semen secundi refrigerantium ordi-
s habetur, siccando humectandoq; medium est.

Psoricon.

PSORICON, chalcitide duplicata, argenti spumæ mix-
efficitur, vtriusq; tamen aceto prius detritis, ac in recen-
m ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub fimo deli-
scet: sic enim maiorem siccandi vim, tenuiorem & minus
udentem quàm chalcitis, acquireret.

Quæ ab O magno incipiunt.

Oon, ouum.

OVI candidum & tenue, nullius planè rosionis compos,
mediocriter refrigerat. vtendum igitur eo in oculis, puden-
orum vlcerebus, aliisq; omnibus malignis: miscetur etiam
medicamentis emplasticis, quæ sanguinem supprimunt: lu-
eum verò pari facultate præditum medicamentis tempe-
atur ad inflammationem arcendam efficacibus: tostum ve-
rò magis siccatur, minus lenit. Porro totum ouum aceto inco-
tum si assumatur, ventris fluxiones desiccatur: si acerbum ali-
quod adiunxeris, vt, gallam, aut rhum, aut balaustium, ac fri-
geris, multò redditur efficacius: ambustis autem crudum
impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pesto-
ris vitia concoquit lenitque, & arteriæ asperitates læuigat.
Præponetur autem recens veteri: & gallinaceum reliquo-
um animantium ouis.

Ocimum.

O CIMVM secundo calefacientium ordini ascribitur: ha-
bet & humiditatem quandam excrementitiam, propter
quam neq; vrile est intus assumptum: extrinsecus autem in-
ductum discutit, & concoquit.

Ocimoïdes.

O CIMOIDES, nonnulli philæterion nuncupant, inutilis
quidē radix est: semen verò tenue est, & sine rosione siccatur.

De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili pur-

gandæ sunt.

CAP.

ALoës drachma cum aqua mulsa mane datur. qui vesperi eam exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentum in membra digerit, flauam bilem vacuat minus, trium obolorum instar assumpta, ut quæ crassiora tantum excrementa abundè educat. Ceterum quum omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola aloë conducit. qui vero amaritudinem eius non sustinent, in catapotia coactam assument. Sciendum verò est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, verbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, vacationem molirentur) verum totius substantiæ proprietate, quo modo lapis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ ventrem duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur vel ad materiam deriuandam, vel ad affectum induratum agitandum remouendumq; aut ad corpus reficiendum, mutandumq; ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendū. Iam verò sunt nonnulli etiā mixti ex prædictis modi, inuicem cōnexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui viribus polent, & mente constant, primosq; ætatis limites euaserunt, nondū verò ad extremos peruenerunt, item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeò sanguinis compotes. Tempus autem purgationis, si nulla vrgeat necessitas, vernum maxime & autumnale opportunum est.

Quæ bilem vacuent.

QUAE bilem educunt, quouis anni tempore præterquàm in hyeme rectè usurpantur: ætate verò florida, & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, vel rubri: viris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continuè corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam vrinam reddentibus, cibo vsis sicco & calido. In affectibus, arquato, tecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febris, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatis, lippientibus, siticulosi, & qui per somnū imaginibus torquentur sine febris, adhæc qui horroris discursum in corpore sentiunt, flatus acris ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus

hus immodicè æstuat, aut nausea humoribus os eius roden-
ibus euertitur: postremo, quibus ob recrementorum abun-
dantiam clyster nequit iniici: abundè siquidem inanit, sic
ut totum corpus non commoueat, nisi copiosa admodum
fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho
inherentem educat. Veratrum conuenit & acuto & lon-
go morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ
doneum requirunt, quales sunt qui insania, altera capitis
parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis
decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommo-
datissimum est visceribus, vteri & vesicæ vitiiis medicinam
requerentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ
affectionem, arquaturn, eruptiones quæ ex æthemata dicen-
tur, impetigines, vel herpetas, vel erysipelata, vel lepras. Ve-
ratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore
citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non graui-
ter febricitant, magisq; febri carètib; instar drachmæ ex-
hibetur, radicibus in mulsæ & aqua maceratis, aut cum mel-
le catapotiorum modo: verum ita exhibetur, ut ieiunium
præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegium, vel saturciam,
vel aliquod ex iis quæ subito transeunt, stomacho non ini-
mica. Scammonia perinde ut veratrum purgat, magis fla-
uam bilem: cæterum inter omnia quæ purgationem molun-
tur, aduersissima stomacho est. datur igitur iis qui febri ca-
rent & stomacho sunt meliori, ad pondus quatuor obolorum
cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodam stomacho
utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle:
item cum gummi quoq; fiunt catapotia. Colocynthidis,
hoc est, cucurbitæ sylvestris medulla bilem potissimum va-
cuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmo-
dum veratrum & scammonia, sed etiam à nervis & nervosis
partibus instar drachmæ in aquæ mulsæ cyathis duobus,
quibus & ruta incocta sit, epota: laxigetur autem accuratè,
quoniam asperitates ipsius interaneis adherentes, vlcera cõ-
citant, & nervos confortij lege afficiunt. Exhibetur rectè,
capite dolentibus, nempe quum cerebri membrana, vel ea
quæ caluariam cingit, vitiata fuerit, ut, vertiginosis, hete-
ronocranicis, cephalæa infestatis, comitialibus, apoplecti-
cis, conuulsis, ut in vtramlibet partem deprauata sit facies,
qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu vexa-
tis,

tis, orthopnoïcis, suspiriosis, vetusta tussi conflitantibus, præterea iis quos articularij dolores, & renum aut vesicæ affectus malè habent. Elaterium scammonia modo euacuat. deligendum verò porraceum, leue, & anno non vestitius, triobolari pondere cum lactis hemina læuigatum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter quàm elaterium & scammonia. datur liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguam exulcerant, eiusque viciniam.

Lathyrides bilem purgant sicut veratrum & scammonia: offerentur igitur septem octo ve, & vsque ad quindecim: robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, integras ipsas deuorare. Peplij turionum qui semper sicci existunt, instar octo obolorum in mulsâ datum bilem educit, veratri modo, & status disiccit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri vireis habet, tardum ad functionem obcundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum mulsâ, sit autem albissimum, vehementer fragile, non adeò lignosum, neq; teredinibus obnoxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsâ assumpta. Sit autem nec vetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucus purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter conuenit: ius ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duarum drachmarum ex mulsâ datur, quibus etiam veratrum nigrum, verum flos ille, gratior quidè stomacho existit quàm veratrum, minus autem purgat. Chamælææ drachmæ quatuor in mulsæ heminis duabus ad quartas decoctæ, perinde vt veratrum, purgant. Nonnulli vero chamælææ & absinthij dupla portione catapotia fingunt, exhibentq;. Aristolochiæ clematidis, hoc est farnetariæ seminis drachma in mulsâ pota, colocynthidis more purgat. Polypodij radix arida, si læuis mulsæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthis effectum præstat.

Quæ bilem atram vacuent.

M E D I C A M E N T I S atram bilem ducentibus vtemur præcipuè in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum
conf

confortia exosis, aut secessu gaudentibus, itē in his qui dum
 à morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno fer-
 uidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymum
 laudatissimum est remedium inter ea quæ atrabili vacuan-
 dæ sunt. dantur ipsius drachmæ quinque læuigatæ ex lactis
 hemina. Epithymum quod thymbræ supernascitur vt
 epithymū similiter euacuat, sed imbecillius est. Pulegium
 atram ducit bilem instar acetabuli in mulsâ potum. Tra-
 gorigani heracleotici idem modus, vti pulegium vacuat,
 cæterum ambo desiccant. Alypi semen inferius atrâ pur-
 gare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto di-
 ctum est, intestina verò si fidem Dioscoridi accommoda-
 mus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc a-
 lypias vocatur: exhiberi debet in mulsâ. Parthenium simi-
 liser siccum si poteretur eadem solet extrahere. Alysson
 cum sale epotum non aliter quàm superiora expurgat.

Quæ pituitæ vacuandæ sint.

EORVM quæ pituitam educunt vsus est in habitu frigi-
 diore & senio confectis perq; hyemem, in resolutis, apople-
 cticis, inturgescuntibus tumore laxo fungosoq; quod œde-
 ma dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in ventricu-
 lo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in mulierum
 fluore. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa ex-
 creantibus fastidiosis, & coxendicæ cruciatu detentis,
 quum mucis articulis incubuerint, aut elephantosis: maxime
 autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui
 nomen est anasarca. Styracis albi drachmæ pondus cum
 resina terebinthina æquali modo deuoratum, pituitam eua-
 cuat. Oleæ radicis cortex drachmæ instar cum vino aut
 aqua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis semi-
 nis drachmæ duæ. Cyclamini radicis drachma cum hy-
 dromelite. Scordij drachmæ duæ cum melle. Chamæ-
 pytis in pollinem detrita, exhibitaq; in catapotis. Squa-
 mæ Cypriæ drachma semis cum resina pari in catapotis
 valentius purgat pituitam. Lauri foliorum viridium ses-
 quidrachma. Cucumeris sylvestris radicis corticis oboli
 duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putami-
 nibus detractis eduntur, similemque effectum præstant.

Apij dimidium quod ad radicem est manducatum: non-
 nulli id chamæraphanon appellant, hoc est, humilem
 raph

raphanum. Bdellij drachmae duae ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

Quae aquam educant.

AQUAM elicientibus vti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab vtre ascites dicta, male habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in iis quos vlcera fluida torquent.

Squamæ Cypriæ drachma cum mulsâ pota aquam educit: aceti verò momentum superforbere oportet, ne per vomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto laue cum melle cocto potum ne fauces attineat, aquas trahit. dantur autem grana aut viginti, aut viginti quinque, aut triginta: valentioribus quadraginta. Euphorbij drachma cum melle cocto pota pituitam emolitur, magis autem aquas.

Lonchitidis seminis oboli octo cum mulsâ aquas purgât.

Cneoron similiter aquas trahit cum polenta potum. Cnici seminis drachmae quinque laeuigatae ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbenturque. Ammoniâ suffiminis drachma in mulsâ pota aquam educit. Nonnulli verò lienosis id cum posca exhibent. Simbuci corticis radicis succus instar vnciarum duarum potus cum vino aquas educit.

De compositis medicamentis purgantibus.

C A P. V.

Catapotia ex aloë.

Colocynthis medullæ pars vna, absinthij succi pars vna, aloës partes duae, scammoniae partes duae: ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur. dantur vndecim numero.

Oxymeli Iuliani.

RVTAE, origani, singulorum quadrans, thymi comæ triens, anethi fescuncia, iridis vncia, mandragoræ radicis fescuncia, agarici sextas, tedarum pinguium vnciae duodecim, cocci gnidij triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans, polypodij sextans, phylli, costi, spicae nardi singulorum vncia, rheupontici fescuncia, scillæ, sambuci turionum, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorum quadrans, asari vncia, pulegij quadrans, epithymi, veratri, acori, singulorum sextans, siij, amomi, hyperici, cumini, singulae vnciae, anisi sextans, aceti sextarij decem, mellis sextarij quinque: herbae per triduum in aceto madescunt, deinde excoctis dum amplius

plus dimidio consumptum fuerit, mel adiicitur: vbi vnita fuerint, & illis abiectis admiscetur lathyrides, costus, coccum gnidium, spica nardi læuigata, & si voles postquā perfectē coctum fuerit oxymel, illa impones. Modus summus est vncia, aut pro virium ratione: benefacit podagricis affectibus & comitialibus, ac in quibus vacuare simul & crassos humores educere opus est.

Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo.

Aloës, epithymi, caryophylli, cocci gnidij, petroselinij, rheupontici, singulæ semunciae, euphorbij scrupuli quatuor, mellis quod satis est. datur cochlearis mensura.

Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri.

ROSARVM succi sextarij duo, mellis sextarius, scammonia vnciae quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. ALITER. Mellis libra, rosarū succi libra, piperis drachmae duae, scammoniae drachmae octo, mastiches drachmae quatuor, zingiberis drach. duae. ALIO modo, quo ego vtor, Spicae nardi, asari, epithymi, singulorū semuncia: macerantur in aquae hemina per triduum: vbi mediocriter incoxeris, misceto aquae rosarum succi sextarij dimidium, mellis tantundem. Postquam adusque spissitudinē fuerint incocta, scammoniae sescuncia admiscetur.

Purgatio ex malis cotoneis.

MALORVM cotoneorum tostorum vncia quatuor, piperis vncia sex, scammoniae drachma, mellis vnciae quinque: trita exhibentur cochleario instar vnciae, aut pro viribus.

Compositio diaetru, quod est, ex malo medico, stomacho utilis.

MALI medici corticis carnisque pondo in aquae sextario vno & dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidias adiicitur: vbi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur læuigari piperis longi vncia, scammoniae tosta in fermento tantundem.

Bucellatus purgans.

SCAMMONIAE tosta vncia, piperis, apij semini, singulorum scrupulum, fœniculi, anisi, singulae vnci. mellis libra: tosta mediocriter instar vnciae dantur in condito.

Oliua purgantes.

SCAMMONIAE vncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselinij, rutae, foliorum menthae viridis,

N

singulorum drachmę quatuor, laſerpitiј drachma, palmularum vncię quinque, mellis tantundem, aceti hemine duę, oliuarum colymbadum sextarius, ſciſſarum videlicet: quidam & gari momentum addunt. Modus eſt quinque ſcrupula aut ſeptem aut nouem.

Pāſtillus purgans.

SCAMMONIAE drachmę quatuor, euphorbiј tantundem, phylli, piperis, ſingulorum drachmę duę, mellis libra, datur inſtar vncię.

Fuſca purgans, & ſtomacho grata.

CYMINI, ſcēniculi, ſingulorum vncia, pulegiј, apiј, aniſi, ſingulorum ſemuncia, epithymi, ſcammonia, ſingulorū vncia, ſalis vncię duę. Summus modus datur ſcrupulis duobus in poſca, nonnulli etiam euphorbiј ſcrupula quatuor adiiciunt.

Vinum purgans in hydropici.

SCILLAETRES vncię, apiј ſeminis vncię ſex, piperis drachma, capparidis radicis drachmę quatuor, cocci gñidiј cortice exuti drachma, foliј malabathri galbuli duo, vini hemina duodecim, mellis ſextariј tres: ſcilla contuſa vino ſuperfunditur, reliqua laeuigata miſcentur.

Halatia, quaſi dicas ex ſale conſecta, purgatio.

SALIS communis torrefacti drachmę ſex, apiј ſeminis, zingiberis, panis ſicci, ſingulorum ſcrupula ſex, aniſi, piperis ſingulorum ſemuncia, ſcammonia, epithymi, ſingulorum vncia. datur circiter cochleare.

Compoſitio dia Hermodactylu, ad podagram.

HERMODACTYLI quadrans, aniſi, cumini æthiopici, ameos, thymi ſummitatum, piperis albi, zingiberis, ſingulorum ſcrupula tria, epithymi ſemuncia: exhibentur ſcrupulis quatuor. quidam ſcrupula ſex dant mane cum condito, aut mulſa, aut aqua calida. ALITER eadem purgatio. Hermodactyli vncia, cumini æthiopici, aniſi, agarici, zingiberis, ſingulorum ſcrupula ſex, maſtichę, ſpicę nardi, ſingulorum ſcrupula duo, muſci ſiliqua, cnici ſcrupula duo. datur quatuor ſcrupulis cum hydromelo, Scammoniam, quod ſtomacho ſit inutilis, auerſamur. Si autem liberaliore vacuatione opus ſit, ſcammonia ſiliquas treis menſurę admiſcebis: loto exhibetur.

Catap

*Catapotia, quæ constant lapide armenico, arthriticis
potissimum exhibenda.*

ALOES vncia quatuor, scammonia semuncia, agarici vncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassia vncia, spica nardi vncia, scilla tostæ sextans, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibentur.

*Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficax, ad quæ ex
Hermodactylo confecta, stomacho utilis.*

ZINGIBERIS scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodii radice scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus alius est difficilis siliquæ viginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut ferè octo. vbi venter inanitus est, ad lauacrum duces, inde ouis & pane enutries.

Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.

LACTIS cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ. datur ad nucis auellanæ magnitudinem.

*Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis
singulariter efficax, & in quibus humorem cras-
sum glutinosumq; emoliri voles.*

CUCURBITIS duabus sylvestribus circumcisus semen eximetur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obtektas pernoctare sines, in sequenti die vacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri veratri triobolum adiunges, scammonia drachmā: vbi iam cum his puliculam è simila, aut panem siccum læuigatum incoxeris, inde egroto dabis tenui pridie vso victu, ad nucem auellanarum, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhibebis.

*Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidq; faciun-
dum vbi medicamentum purgans assumptum nihil
profecerit.*

CAP. VI.

SVMMATI in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius victus ratione alueris, ieiuno & concoctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere vsq; ad consummatam purgationem compelles.

N 2

Ex commentarijs Philagri.

At si inediam non tulerit, aut quod ventriculos ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria precedere habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex vino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri, idq; nondum incepta vacuatione, (vt ne cibus corrumpatur) sed protinus vbi medicamentum fuerit epotum, sic enim nonnunquam ad celerem medicaminis motionem pōdere suo opitulatur. Si verò quocunque medicamento ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neq; vacuetur, nullo accedente periculo nihil moliendum est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger vellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessario iniicitur. Si ne sic quidem venter respondeat, corpore rofionem & veluti euerfionem sustinente, lauare liberaliter inungendo oportet: vbi repletum est grauaturq; sanguinis dimissio congruet, præsertim vbi multi compos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emissitios, nō ex natura, sed acquisitō ex medicaminis potione. Vbi horum nihil infestat, sed morsus & vellicatus affligit, à balneo cibū protinus offeres, vinum liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inferes, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto autem oleum quod in aluum dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus expertē præparatum.

Si purgatio modum excedat.

CAP. VII.

SI purgatio maior sit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum vinum tenue, fuluum & flauū dari, tale siquidem celerrimè in totum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicum. Quod si euacuatio perseveret, artus vinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & nonnihil sanguinis & spiritus excipiant: dabiturque potui theriaces ex carnibus viperarum momentum. deducit enim in cutem subitoq; reuellit humorū in ventriculū confluxum, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu virosum est & medicatū. huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem diaspermaton, & Philonium appellatam: imò etiā cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polenta & mulso vti, prodest, deinde epithematis astringentibus: maximè verò ex totius corporis frictione, & medicaminum poru, adiuvatur,

tur. Aër ipſis vitandus qui frigidus nimium aut calidus exiſtat: ille ſiquidem materiã à foris intro compellit, fluorémq; auget: hic diſcutit, & vireis reſoluit. At ſi ex inteſtinorũ quæ medicamento irritantur, eroſione, vacuatio augeatur cataſtmaſmatis obducere commemorata oportet, & in aluum dare quæ acrimoniã retundunt, adipem anſerinum ſcilicet, vinum dulce, nardum & conſimilia.

De Hieris antidotis.

CAP. VIII.

Hiera Antiochi.

CHamedryos, agarici, colocynthidis medulla, ſtœchados, ſingulorum drachmę decem, opopanacis, ſagapeni, petroſelini, ariſtolochiæ ſarmentaceæ, piperis albi, ſingulorum drachmæ quinq; cinnamomi, ſpicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, ſingulorum drachmæ quatuor, mellis quod ſatis eſt, **A L I T E R.** Colocynthidis carnis drachmæ viginti, ſcillę toſtæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, veratri nigri corticis, ſcammonia, hyperici, ſingulorũ drachmæ tres, epithymi, polypodij aridi, bdellij, aloës, chamedryos, marrubij, caſiæ, ſingulorum drachmæ octo, myrrhę troglodytidis, opopanacis, ſagapeni, petroſelini, piperis cõmunis & longi & albi, cinnamomi, croci, caſtorij, ariſtolochiæ longæ, ſingulorum drachmæ quatuor mellis quod ſufficit.

Hiera Iuſti.

E P I T H Y M I drachmæ duodecim, marrubij, ſtœchados, chamedryos, veratri nigri, ſcammonia, agarici, piperis longi, ſcillæ toſtę, ſingulorum drachmę ſedecim, euphorbij, colocynthidis carnis, aloës, croci, gentianæ, petroſelini, guttæ ammoniaci, ſagapeni, ſingulorum drachmæ octo, opopanacis, polij, cinnamomi, myrrhæ, ſpicæ nardi, iunci odorati floris, pulegij, ſingulorum drachmæ quatuor, ariſtolochiæ longæ & rotundæ, vtriuſq; drachmæ duæ, mellis quod ſatis eſt. datur ſcrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulſa & ſale.

Hiera Galeni.

C H A M A E D R Y O S, piperis longi, piperis albi, ſtœchados, veratri nigri, ſcammonia, ſpicæ nardi, ſcillæ toſtæ, (nonnulli etiam epithymi) ſingulorum drachmæ ſedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci ſuffiminis, euphorbij, ſingulorum drachmæ octo: excipiuntur melle.

N 3

Hiera Rufi.

C V C V R B I T A E sylvestris, quę sicyonia vel colocynthis dicitur carnis, drachmæ octo, chamędryos drachmæ decem, sagapeni drachmæ octo, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; cinnamomi drachmæ quatuor, vel cassiæ octo, spicæ, croci, polij, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est.

Hiera Archigenis.

M A R R V B I I, agarici, chamędryos, colocynthidis carnis, stœchados, singulorum drachmæ decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, singulorum drachmæ quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulsæ per noctem vnâ in pila macerantur, deinde læuigantur, & sicca his admiscuntur: melle optimo excepta reponuntur in vitreo vase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum cõmunis est. Summus ipsarum modus est drachmæ duæ: assumatur & salis drachma, mellis heminæ duę, aque quantum satis est. Quod si vehementiores ad purgandum voles efficere, quibus scammonia non inest, iniicitur, & his singulis ex illa obolus.

Quæ sedis & umbilico illa purgent. C A P. I X.

Illitio sedis ad flatus excutiendos.

R Ut cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, vt vnus succus fiat, & penitissimè intra sedē delinitur. Efficacissimum verò est si cumini momentum & nitri assumat, vel cyclamini succum: stuppa exceptum imponitur, aut glâdis forma melle apposito, flatu siquidem multi erumpunt, ventrem leuantes.

Perunctio sedis ventrem mouens, Chexanance.

A L V M E N C U M melle læuigatum coquitur quoad fuluū reddatur, atq; hoc sedes perungitur, faciliè enim copiosa citra laborem subducit.

Medicamentum quod umbilico illinitur epomphalium dictum, ad aluum subducendam.

C Y C L A M I N I drachmæ quatuor, nitri drachmæ tres, veratri nigri & albi, singulorum drachmæ duę, colocynthidis drachmæ tres, scammonia drachmæ duæ, elaterij succi drachmæ quatuor, cocci gñidij totidem, caricarum pinguiū
vnc

uncia duæ, fellis taurini uncia.

Aliud laudatissimum.

ELATERII, lathyridis, galbani, cyclamini, veratri nigri, singulorum drachmæ quatuor, colocynthidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonia, cocci gnidij, rithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres: excipito hæc felle taurino, & vnguinis modo vtitor. Quidam verò adiungentes faui uncias septem & siccyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

Quæ medicamenta vomitum citent, & quomodo veratrum exhibeatur.

CAP. X.

Vomitum vtuntur & sani, qui ciborum humorumve copia grauantur: & acuto morbo laborantes quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis vomitum facientibus neq; sani, neq; acuta ægritudine occupati, vti permittentur: sed in longis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ validam commotionem desiderent, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originem trahens, elephantia, aqua subter cutem, melancholia, & perasimiles. Aduersatur vomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & iis qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad vomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis in id intinctis, demissisq; in guttur. item nardi gallicæ radicem drachmæ septem ex mulsâ potæ sursum valenter purgant: similiter etiam radicem betonicæ, quæ cestron dicitur, quinque aut sex drachmæ cum mulsâ sumptæ & daphnoidis tria folia viridia in læuorâ coacta comestaq;. Item elaterij obolus in aqua assumptus, sursum pituitam & bilem expurgat: & herbarum pediculariarum grana quindecim cum mulsâ crassiore, ex bulbis autem qui manducari solent, si crudi assumantur. Narcissi autem elixi sursum per vomitum purgant. idem facit apij radicis pars superior, aëri prior comesta, vocant eam nonnulli chamæraphanon, inferior autem pars per inferna purgat, tota vero sumpta vtrinque: raphani prædictis minus quidem purgant, sed utilius: ceterum conuenit ipsas acris & recetis adhuc minutim concisas, ante duas trêsvē horas in oxymelite maceratas quâ fieri potest multas, assumere, ter quaterve à cœna vomitu excitato: semel autem ieiuni voment, & sæpe oxymel absorbent: ubi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes aquam, digitis aut pinnis in os demissis voment.

N 4

Quibus modis veratrum exhibeatur.

VERATRUM dari debet, vbi lōgi valentesq; morbi sunt & spes ex aliis præsidiis adempta est, quod agrirudo omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue continuè infestauerit morbus, vt aqua inter cutem, elephantia malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus repetat, vt morbus comitialis podagra. Porro quū plures hellebore exhibendi modi existant, simplicior quidem & præparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine compuncto dissectoque veratri albi optimi radicum præsegmina inseruntur: ac vbi vna nocte in eo permanserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymelite in dictum modum agro exhibetur, nimirum vomitionibus assueto, atq; is horis quot diximus interpositis ad vomitū cogendus est. At proprius veratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquæ hemina diebus quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur: vbi expressum veratrum est, aquæ miscetur tantundem mellis: excoctū vsq; ad spissitudinem prædicto modo, laboranti exhibetur, præterquā vomere prius exercitato etiā ieiuno, probeq; defunctō cōcoctione, & cui alius respōderit, vel sua sponte, vel clystere semen bisve secundum virium rationem sollicitata. Omnium vero efficacissimus modus talis est. Dissectis veratri radicibus in sesami magnitudinē (nam in tenuissimum redactæ pollinem virium efficacia strangulationes pariunt) veratri plurimum drachmas duas, modicè vnā, imbecillioribus ptisanæ cremorū aut alicæ, aut id genus alicuius incoctam, potui dabis: valentioribus ex aqua calida aut mulsā. Incipit autem purgatio post tres quatuorve horas: quibus tardior est, ij melius purgantur. Quod si vomitus lentē oboriatur mulsā potui data, vomere ager cogendus est, pinnis oleo madidis in os demissis. si ne sic quidem proficiatur, in balneum deduci debet. Vbi iam vomere inceperit si vacuatio paulatim respondeat, nullū egro negotium facessere oportet. sin autem vellicatum aut conuulsionem experiatur, hydrelgum potui dabitur, simul & in aluum ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assument, nonnunquam fieri solet, vnde medicamentī coaceruationem facilius ferunt. Si anima deficiat, naribusquæ odorem mouent admotis & consimilibus vis

reis

is recolligere, aliisq; vt verisimile est superuenientibus casibus, eadem accommodare oportet. At multa facta inani-
one, cibus dari somnusq; permitti debet, & alia sicuti in
s qui nimium purgantur diximus, factitanda sunt. Si perse-
ret vacuatio, cucurbitulas stomacho defigere, & artus vin-
ilis excipere conuenit: sin autem pro ratione facta sit, mul-
e iusta portio propinabitur, qua superfluitates e medica-
mento reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur.
um verò in iis qui medicamenta per os abominantur, omni-
o autem hellebore potionem requirunt, Antyllus huius-
modi quodam vsus est clystere: hellebore albi drachmæ duæ
in aqua sextario per diem & noctem vnā macerantur, se-
quēti die veratrum in aqua ad dimidias coquitur, inde in
luum datur, vt vomitum concitet, superius purgat paulò
inbecillius quàm veratri potio. Vbi abundè purgatum est,
glande acri imposita, aluus irritatur, vt quod iniectum est
reddatur, & æger non amplius vomat. Facta excretionē,
nulla semel bisve intestinis abluendis iniicitur. ipse verò
Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo rufo
tribratòq; deinde cocto melle excepto, ac clysteris modo
ex helleboro præparati, superiorem ventriculum purgare, ve-
um hic est modus probatior. Nam purgationem partire in
ices nobis licet: pondus igitur sit veratri drachmæ duæ, cæ-
terum glans circumaptetur aut vinciatur stappa solidiore,
uius initium extrinsecus per sedem recipiatur, quò glan-
dem vbi satis purgando profecerit, auferre possimus. hic
nodus purgat quidem absolutissimè, non autem suffoca-
tionem aut aliud quoddam periculum inducit.

De differentia antidotorum.

CAP. XI.

PRæfatio Galeni de antidotis in hūc modum habet. Me-
dicinas quæ non extrinsecus impositæ, sed intra corpus
assumptæ affectibus medentur, antidota veteres nūcupan-
terum triplex ipsorum est differentia, quædam enim le-
thalium medicamentorum gratia offeruntur, quædam ob
pestias virus iaculanteis, quas Græci *ἰσθόλας* appellant, quæ-
dam verò morbis ex prauo victu contractis auxiliantur: nō-
nulla treis hos vsus promittunt, quemadmodum etiam quæ
theriaca dicuntur.

Hedychroi quod theriacen ingreditur, confectio.

ASPALATHI radice corticis, calami aromatici, costi,

N 5

asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum drachmæ sex, carpobalsami drachmæ duæ, mari drachmæ sedecim iūci odorati floris drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ vigintiquatuor, amomi, calsiæ, rha, singulorū drachmæ octo, nardi Indicæ, phylli, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ vigintiquatuor, croci drachmæ duodecim: vino primi meriti excepta, in pastillos eoguntur, manu in opobalsamum intincta.

Quomodo pastilli scillini preparentur.

SCILLA luto aut crusta ex panificio & opere pistorio oblita, modicè torretur, inde carnis ipsius partes, duæ, cum erui farinæ una capiūtur, simūlq; læuigātur & finguntur pastilli.

Quomodo pastilli theriaci fiant.

SVMVNTVR viperæ quatuor aut quinæ, fului coloris & recens captae, & quaternis digitis à capite & cauda amputatis, totaq; cute detracta & interaneis exemptis, reliquū corpus in fictili nouo cum anetho & sale modico discoquitur, dū spinæ à carnibus segregentur: deinde his exceptis ablatiisq; accuratè à spinis carnibus, & panis puri æquali modo addito, læuigātur omnia pariter, formanturq; orbiculi manu in opobalsamum intincta: in vmbra refrigerantur.

Quomodo paretur theriace antidotum.

PASTILLORVM scillinorū drachmæ quadraginta octo, pastillorum theriacorum, pastillorum hedychoi, cinnamomi, piperis, communis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmæ vigintiquatuor, rosarum siccarum drachmæ duodecim, scordij, napi buniados seminis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radiculae, opobalsami, singulorū drachmæ duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rheu pontici, quinquefolij radicis, nepitæ, iunci quadrati floris, marrubij, petroselini, stachados, costi, piperis albi & longi, dictamni, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, chriæ, calsiæ nigræ, nardi Indicæ, singulorū drachmæ sex, polij floris, styracis, apij seminis, seselis, thlaspis, ameos, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi gallicæ, nardi, mēu, gētianæ, anisi, fœniculi seminis, lemnæ terræ, chalcitidis tostæ, amomi, acori, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum drachmæ quatuor, dauci seminis galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorij, centaurij tenuis, aristolochiæ sarmentitiæ, singulorum drachmæ duæ,
mel

mellis attici pondo decem, vini falerni sextarii duo: conie-
 is in pilam, liquore hypocistidis, myrrha, sagapeno, dulci
 radice styrace, acacia, & opopanace, mellis momentum
 stillatur, contusaq; dissoluuntur, deinde vino superfuso,
 illa superet per triduum madescunt: inde reliqua contu-
 in unitatem coguntur, mel despumatum: ceterum in ar-
 genteo aut vitreo vase non adeo pleno medicamentum repo-
 nitur, frequenter operculum aufertur. Vfus eius est quum vr-
 get necessitas in iis qui a feris commorfi sunt & venena as-
 umpserunt, post annum aetatis septimum, sic ut instar nucis a-
 mellanae, cum tribus vini cyathis, quotidie bis bibatur. Simi-
 ter facit ad eos qui ex quadam latente causa periclitati
 sunt, corruptela quae corpus conficit, lethalis medicamenti
 qualitatem imitata, quemadmodum in pestilentia correptis
 potissimum accidit, semel quotidie. in aliis vero affectibus
 decem annis usque ad viginti, usus eius celebratur, in tussi,
 thoracis doloribus aut laterum, si febris abest, cum mulso:
 illa vrat, cum hydromelite, sub noctem ad fabae Aegyptiae
 magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus
 omnibus, si morbus recens est, ex posca: si vetustior, ex sym-
 hyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque mane,
 & vespere. At quos inflationes & torsiones circa umbilicum,
 ut morbus coeliacus male habet, ex aqua calida ad fabae
 Aegyptiae magnitudinem mane assument. ceterum appetentiam
 vehementem excitat, rigores, perfrictionem, & bilis vomitum,
 praesumptum ante accessiones discutit, menstrua ducit,
 & fetus mortuos eiicit, fabae Aegyptiae instar potum ex mul-
 sa, aut passo in quo ruta aut dictamnium decoctum sit. Item
 ad vocem abscissam valet & per se, & cum duplicato traga-
 antho ex mulso aut passo potum, atque sub lingua retentum
 liquatumque: lienosis, iocinorosisque ex posca, si scyrhus ad-
 est, ex oxymelite, aut aceti scillini sesquicyathos: in nephri-
 cis cum mulso circa fabae Aegyptiae magnitudinem: dy-
 entericis tantundem cum decocto rhus, mane & vespere. Ad
 oppituidines autem summe etiam in hunc modum temperatum fa-
 cit: antidoti & opobalsami unciae duae, mellis cyathus: mixta
 paulatim vnguntur. Item dentibus abstergit. plerique vero ut sani-
 tatem ab iniuriis vindicet, noua Luna ad Graecanae fabae ma-
 gnitudinem ex eo sumunt, decoctione bene obita cum uno mellis
 cochleari, & duobus aquae cyathis. Similiter etiam in peregrina-
 tio

nationibus eo vtuntur, quum prauū cuiusdam aëris aut aquarum in itinere suspicionem habent.

Sales theriaci.

S V M V N T V R viperæ recens captæ numero quatuor, mox salis ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cum ipso in pilam coniecto tunditur in crassiores partes gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesquilibra, centaurij tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, marrubij, singulorum vnciæ sex, scordij, apij, chamædryos cretica, singulorum libra, rutæ satiuæ seminis libra: melle attico in unitatem coguntur, & dimidia ipsorum pars in nouum fictile coniicitur, deinde quatuor viperæ viuæ, quibus adduntur etiam scillæ teneræ recentes quinq; minutim concisæ, hinc reliqua misturæ portio dimidia superiniicitur: ac vbi olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus operculum ipsius pertundes, vt per ea vapor tostionis modum significet. Primum enim videbitur fumus exire copiosus, obscurus, admodumq; turbidus, qui ignem bestias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligenter aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aërem è viperarum exhalatu viciatū inspires. Postea, vbi vapor cessauerit, & tenuem quandam flammam per foramina ciaculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quàm optime censeto, atq; ita fictili ab igne sublato tota die noctuq; refrigerantur. Deinde ollam aperito, exemptosq; inde carbones diligenter tundito, & cū hisce misturis incernito: rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singulorum vnciis nouē, fœniculi seminis, nardi gallicæ, stachyos Scythici, singulorū vnciis sex, petroselinæ macedonici, malabathri foliorum, singulorum vnciis quatuor, amomi vuæ, hormini seminis torrefacti, singulorum vnciis tribus, origani summitatum, thymi summitatū, singulorum vnciis nouem, baccarum iuniperi, piperis albi, piperis nigri, fœniculi, singulorū libris duabus, laserpitij radicis vnciis decē, coriandri seminis, zingiberis non perforati, satyrii seminis vel radicis, pulegij mōtani, scēlis mallaliorici, tordyli mōtani seminis, menthe, singulorū vnciis sex, cassiæ fistule vnciis duabus, cinnamomi vncia. Porro ego sales ipsos preparauī, non combustis bestiis, sed ipsarum patibulis quemadmodū in theriaca, sic vt hos isque cū bestius cremantur admiscerem, quò si quàm in se amarulentiam haberent, eam per

adustionem deponerent: tantumq; pastillorum modum
 eci, quantum viperarum quaternionem habere coniucie-
 n, atque hac ratione longè præstantissimi euaserunt.

Antidotum Mithridatis, dia scinci.

MYRRHÆ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, sin-
 gulorum drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlapfis, opo-
 balsami, iunci odorati floris, costi, stœchados, seselis, galba-
 n, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorei, hypocyti-
 succi, styracis, malabathri foliorum, singulorum drach-
 mæ quatuor, cassiæ nigræ, polij, piperis albi, scordij, dauci
 minis, carpobalsami, cyphios, bdellij, nardi gallicæ, gum-
 mi, petroselini, opij, cardamomi, fœniculi seminis, gentia-
 n, foliorum rosæ, singulorum drachmæ octo, dictamni, a-
 nisi, acori, phu, singulorum drachmæ tres, mœu athamanti-
 acaciæ, alui scinci, hyperici seminis, singulorum sesqui-
 drachma, vini & mellis quod satis est. Præparatur theriacæ
 modo. Galenus tradit ad eadem hoc valere, ad quæ illa, præ-
 quàm ad viperæ morsus, in eos enim Theriace effica-
 or est.

*Antidotum dia hematou, hoc est ex sanguinibus, ad omnia ve-
 nena, & lethalia medicamenta.*

PIPERIS albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni
 retici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, ru-
 e sylvestris seminis, fœniculi seminis, cumini æthyopici,
 nethi, anatis masculi sanguinis sicci, hædi sanguinis, anse-
 ini sanguinis, anatis fœminæ sanguinis, napti sylvestris se-
 minis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radicis, trifolij,
 iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum,
 singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ,
 scordij drachmæ octo, petroselini, polij, myrrhæ, nardi, sin-
 gulorum drachmæ sex, cassiæ drachmæ tres, lactis cyrenai-
 i totidē, stœchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ,
 guttæ ammoniaci drachmæ tres, mœu athamantini drach-
 mæ duæ, agarici tantundem, carpobalsami grana viginti,
 mellis cocti quod satis est.

Oxymeli simplex.

ACETI quàm acerrimi albi sextarius, aquæ sextarij duo,
 mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem inco-
 quantur, sic vt mel interea despumetur.

Acetum scillites.

SCILLA albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgata fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus sexaginta in sole madescere sinuntur, vase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proicitur, ipsum verò acetum defæcatum transfunditur. Nonnulli verò scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt. alij viridem scillam in acetum pari vtriusq; modo demittunt, sinuntq; vsq; ad menseis sex, atq; hoc modo maiorem incidendi vim acquirit. Valet autem acetum scillatum collutū ad fluida oris vitia, & plerisq; interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est. item alis compluribus efficax est.

Oxymeli Scillinum.

SCILLA partis internæ tenerioris libræ duæ, aceti acris albi sextarij quindecim, piperis, petroselini macedonici, singulorum vnciæ duæ, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallicæ, ligustici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pontici, singulorum semuncia, fœniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopi cretici, costi, pulegij, singulorum vncia, menthæ viridis fasciculus, rutæ viridis turiones quinque, mellis attici sextarius, sapæ sextarij duo, apiij viridis fasciculus: interior scillæ pars alba contusa in acetum mittitur, siniturq; diebus septem sub caniculæ æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: viridia autem non contusa in acetum coniiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excocta que vsque ad spissitudinem in vitreum vas defunduntur. Caterum præsidio hoc & ieiunus, instar potionis vtere, & cum cibo instar condimenti, est enim longè utilissimum.

Medicamentum Galeni è scilla, comitialibus potissimum efficax.

SCILLA minutim manibus contusa in vas in quo mel solet colligi, demittitur, eoq; diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sidus in superficie vase soluto scillæ corpus effluxisse deprehendes, exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur, daturque comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum.

Ipsum

Ipsūq; scillæ corpus tritum cum melle datur cochleari, atq; hoc virtute secundum est.

Philonis antidotum.

PIPERIS albi drachmæ viginti, alterci drachmæ viginti, lachrymæ papaveris drachmæ decē, croci drachmæ quinque, pirethri, euphorbij, spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis attici vel alterius generosi probè cocti quantum sufficit. datur proue Atioribus ad nucis auellanae magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est quod dolorem sopit, & somnum accerit.

At banafus dolorem leniens, pleuriticis accommodata, auctore Oribasio.

CASSIÆ drachmæ octo, spicæ nardi, anomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis despumati quod satis est, datur quemadmodum Philonium.

Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.

CARDAMOMI, castorei, opij, singulorum drachmæ tres, myrrhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorū drachmæ tres, croci totidem: excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

Medicamentum dia codion, id est, ex papaveris capitibus, & sapa.

CAPITA papaveris viridia minimè aquosa octo decemve, die postquam decerpta sunt, incoquantur cum dulcis radicula vncia, madefacta in sapæ sextario rursus incoquantur dum tabescant, vbi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defunduntur: vsus medicamenti est in febribus vbi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem defertur.

Medicamentum ex capitibus papaveris & melle.

CAPITA papaverum, vt dictum est, & dulcis radicula vncia, in aquæ pluuiialis aut puteanae sextario donec intabescant excoquantur. vbi expressa fuerint, semisextarius mellis decocto iniicitur: excocta vsq; ad spissitudinem, dantur in quibus præterquàm quod dolorem lenire, & somnum conciliare oportet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus renibusque inhaerescunt.

Dia

Dia codion, compositum.

AQUAE, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictam commode rationem, sextarius, vini dulcis heminae duae, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmae quatuor, coquuntur usque ad spissitudinem, verum stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, fertula campana & dulcis radícula aquae decocta fuerint.

Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maximè accommodatum.

MARRUBII comae libra in aquae heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proicitur, adiicitur autem aqua mellis: ea incoquuntur usque ad mellis spissitudinem. instar cochlearis exhibetur.

Ex marrubio, compositum.

MARRUBII comae, iridis illyricae, hyssopi, pulegij, dulcis radícula, apij, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum caricis in aquae sextarios tres demerguntur, coquunturque usque ad tertias, illis exemptis, aquae mellis librae duae induntur, & ad crassitudinem melleam incoquuntur.

Medicamentum ex eruis.

AMYGDALARVM amararum sextans, farinae erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorum unciae duae, mellis sextarius, vel quod satis est.

Medicamentum dodecatheon.

IRIDIS Illyricae triens, erui triens, hyssopi, vrticae seminis, dulcis radícula, fœnugræci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthij scrupula octodecim, pulegij scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

Antidotum, soteria.

SPICAE nardi scrupula trigintanovem, myrrhae scrupula viginti septem, croci scrupula triginta septem, castorij scrupula trigintanovem, opij scrupula triginta sex, petroselinij scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula novem, apij scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, cassiae

cassiae scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychoi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

Ex styrace bechicon, hoc est, tussi efficax.

AMOMI, cassiae, singulorum sextans, styracis, spicae nardi, singulorum fescuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

*Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa deflu-
xione infestatis idoneum.*

RESINAE terebinthinae drachmae vigintiocto, nardi drachmae sedecim, myrrhae stillatitiae drachmae sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmae duodecim, galbani drachmae sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

Esdra, multiplicis usus, vehementer enim desiccatur.

AMOMI scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum unum & dimidium, feniculi seminis scrupula tria, cassiae sesquiscrupulum, iunci odorati floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris unciae quinque, papaeris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricae scrupula septem & dimidium, alterci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicae nardi scrupula septem & dimidium, rutae seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi unciae tres, rosarum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerij floris sesquiscrupulum, est autem veluti fibra ex qua oritur rosa, rhododaphnes & rosae ipsius singulorum scrupula tria, rheu scrupula sex, gentianae scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthae scrupula quindecim: lycij scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhae, singulorum scrupula sex, bdellij scrupula sedecim, artemisiae succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula vigintiquinque & dimidium, asari, veteri mergi, lapidis iaspidis, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, castorij sesquiscrupulum, cimoliae scrupula sex, lisonis scrupula novem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, seselis herbae sesquiscrupulum, mellis, unciae vigintiocto, vini quantum satis est.

○

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.

MALORVM cotoneorum purorum libræ tres, coquuntur in vini peruetusti sextariis tribus, deinde conteruntur quibus piperis, anisi, ligustici, singulorum contritorum vncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam induunt. quidam in vicem vini, aceto vsi sunt.

Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & agram concoctionem probatum.

MALORVM cotoneorū maturorum succi sextarij duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis vnciæ tres, piperis albi vnciæ duæ: incoquuntur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt præparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

Quomodo paretur melaplacontium.

MALORVM cotoneorum purorum libræ sex in vino coquuntur quousq; intabescant, inde exemptæ conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiciunt, coquuntq; igne lento, ferula agitantes. vbi tam spissum totum euaserit, vt manus quodammodo non inquinet, etiam tunc addunt contusi piperis vncias tres, anisi tantundem, petroselini vnciam. Sunt qui zingiberis vnciam & mastiches tantundem misceant: deinde mixta instar semunciae formant, & cum lauri foliis componunt.

Cydonatum contusum fragmentis saluis.

MALORVM cotoneorum purorum frustulatim concisum libræ octo, in vini sextariis totidem incoquuntur temperatè, vt non dissoluantur, deinde mellis despumati libræ octo, piperis vnciæ octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes, zingiberis quincunx, spicæ nardi sescuncia, caryophylli vncia, ipsis admiscuntur: omnia contusa ac modicè incocta vsq; ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure componuntur.

Medicamentum dia trion pipereon, ex triplici pipere.

PIPERIS communis, albi, & longi, singulorum drachmæ septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorū drachmæ duæ, mellis quod satis est.

Aliud, Oribasij.

PIPERIS albi vnciæ duæ, piperis nigri, & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, fœselis, dauci, petroselini, singulæ vnciæ, zingiberis drachmæ quatuor, mellis libræ

bræ tres.

Aliud.

PIPERIS communis quadrans, albi vncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum vncia, mellis vncia vna & viginti, vel quod satis est. ego etiam thymicomæ vnciam miscui.

Diospolites.

CUMINI aceto macerati torrefacti; vncia, piperis, zingiberis, singulorum vnciæ duæ, rutæ viridis fescuncia, nitri drachmæ duæ & semis: melle excipitur.

Medicamentum dia Calaminthes, id est, ex Calamintha.

PETROSELINI, pulegij, feseleos, calaminthæ, singuli quadrantes, apiij, feminis vncia.

Medicamentum dia citriu, hoc est, ex malo medico, tardè concoquentibus efficax.

ACETI heminæ tres, mali medici carnis libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressæque proiciuntur: aceto miscetur: mellis sextarius, rursusque incoquuntur ad mellis spissitudinem: vbi incrassata fuerint, insperguntur asari, mēu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

Picra, hoc est amara, compositio Galeni.

A LOES drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorū drachmæ sex. Quidam addunt etiam iunci odorati floris & cassiæ vtriusque drachmas sex. exhibetur drachma ex hydromelite.

Picra ex oxymelte, ad stomachicos, vterum, & aquam intercutem.

A LOES vnciæ quatuor, phylli vnciæ duæ, costi, cassiæ, amomi, iridis singulorum drachmæ, fœniculi radices corticis libra, mastiches, nardi gallicæ, zingiberis singulorū drachma, piperis drachma, mēu drachma, aceti, mellis, vtriusque sesquiseptarius: fœniculum in aceto prius excoctū proicitur, deinde mel additur. Vbi vsque ad melleam spissitudinem incoxeris, reliqua detrita insperges.

Medicamentum ex lupino iecore præstantissimum.

GENTIANAE, chamæpityos, petroselini, marrubij, succi arcij, sinapis, scolopendrij radices, panacis, minij, erythrodani, brassicæ seminis, aristolochiæ lōgæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, erucæ seminis, eryngij radices, polij, echij, eupat-

torij, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenij, pares modis melle discocto excipiuntur, mulsoq; probè cocto, ad nucis auellanæ magnitudinem dantur.

Theodoretus dia anacardion.

ANACARDIORVM fescuncia, croci, crassiae, philly, spica nardi, cariophylli, mēu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmæ quatuor, acori, piperis, singulorum fescuncia, aloës vnciæ tres, saxifragæ, mastiches, iridis illyricæ, singulorum fescuncia, myrobalanorū vncia, mellis libræ sex, vel quantum sufficit.

Theodoretus altera dia anacardion.

ALOES drachmæ sexaginta, agarici drachmæ vigintiquatuor, croci, cassiæ, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorū drachmæ decem: costi, rutæ seminis, piperis albi, singulorum drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, mēu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hinc quoq; addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsa.

Medicamentum cyphoides, ad iecorosos & pectoris vitia.

VVÆ passæ carnis drachmæ vigintiquinq; croci drachma, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellij drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, vini quantum sufficit.

Aliud cyphoides, Alexandri.

CROCI, cinnamomi, bdellij, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorū drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, vuæ passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, vini Chij quod sufficit.

Dia bacani medicamentum, Hepati accommodatum.

BACANI vncia, costi tantundē, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

Medicamentum Zopyrios,

MYRRHÆ drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi dra

drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi fescuidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

Compositio pæonia.

STYRACIS calamitis drachmæ sex, thuris, amomi, croci, singulorum fescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ vncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

Catapotia Dositer ad iecur inscripta.

ALOES vncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

Oxymeli splenicum, hoc est, lieni dicatum.

CAPPARIS radicum corticis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorum vncia, myricæ foliorum, salicis foliorum, apij radices, thuris arboris, scillæ, singulorum vnciæ duæ, aceti sextarij tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci vnciæ tres. præparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

Oximeli, calculosis efficax.

SAXIFRAGAE, betonicæ, graminis, adianthi, spicæ nardi, carpesij, asari, eryngij, singulorum vncia, petroselini macedonici, rutæ seminis, singulorum semuncia, fœniculi viridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorum vnciæ duæ, capparis radicum corticis vnciæ tres, sij vnciæ duæ, aquæ, aceti, mellis, singulorum sextarij duo.

Plusca, ad conterendum calculos.

PVLECI, mastiches, apij seminis, menthæ siccæ, singulorum vncia, salis cōmunis torrefacti libra, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos, singulorū scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, vel cōmunis vncia, lithospermi vncia sex, betonicæ totidē, aceti generosi sextarij quinque: omnia cōrussa, cribrata, & in tenuissimum pollinem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quadraginta insolantur: vbi vsus inciderit, nigrum cicer, asparagi radicē, apiū, & adianthū decoquis, in huius decocti misturā heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido balneo folio propinas. Nonnulli verò pulueris ex prædictis speciebus, scrupula duodecim cū posca dictarū herba-

rum iuri temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

Conditum calculos confringens.

PIPERIS albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ, singulorum vncia, petroselini, phylli, singulorū fescuncia, rutæ syluestris seminis semuncia, mellis sextarius, vini ascalonitis sextarij sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

Q V V M VUA inceperit maturescere, hirci ætate florentis sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhibeto cū passio cretico. Quidā verò amomi & phylli, vtriusq; treis vncias miscent. Alij etiam myrrhæ quatuor scrupula.

Excicadis medicamentum nephriticum.

LITHOSPERMI, raphidis piscis combusti, seselis, singulorū vncia, ameos, cucumeris satiui, seminis, saxifragæ, vux passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli albi, lyncurij, singulorum semuncia, spicæ nardi, phu, mēu, lapidū ex spōgiis, singulæ drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, sij sicci, rubi radices, graminis, polypodij, singulorū drachmæ tres, hircini sanguinis desiccati vt dictum est, scrupula sex, cicadarum siccarū sine capite, pennis, & pedibus, triens, piperis albi drachmæ sex, mellis probè cocti quod satis est. datur instar nucis auellanæ in condito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sij, aut radices asparagi, aut rorismarini, aut quinq; folij, aut struthij radices.

Medicamentum ex lithospermo.

LITHOSPERMI, betonicæ, saxifragæ, petroselini, piperis albi pares portiones cum melle excipiuntur.

Medicamentum ex marrubij semine.

PIPERIS albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui, seminis, fœniculi, seminis, marrubij seminis, petroselini macedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ vnciæ, mellis quod satis est.

Medicamentum ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.

SPICÆ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorum scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragæ, singulorū scrupula sex, calsiæ, apij seminis, singulorum scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

Medic

Medicamentum ex sylvestris malua semine.

CUCUMERIS domestici seminis drachma duodecim, alterci seminis drachma sex, cicutæ seminis drachma tres, (alii sex) opij, fœniculi, malua sylvestris seminis, croci, singulorum drachma tres, apij seminis drachma sex, cassiæ drachma quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellanae totidem, asari drachma quatuor: passo cretico excepta datur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

Medicamentum ex bellarij nephriticum, vesicae & renum exulcerationi idoneum.

VVAE passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorum pinî recentium, singulorum vncia duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, palmularum pinguium, apij seminis, papaueris seminis: croci, singulorum drachma, myrrhæ vncia duæ: iustar drachma ex passo ieiuno propinatur.

Satyriacum antilothum.

ZINGIBERIS, satyrii superioris, singulorum drachma octo, scinci caudæ, mēu, asari, petroselini, cardamomi, seselis, singulorum drachma quatuor, erucae seminis, cinnamomi, singulorum drachma tres, hormini, piperis albi, cnicis seminis, singulorum drachma duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singula drachma, sanguinis hircini mystrum: datur drachma imbecillioribus cum lacte.

Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilia.

XYLOMACERIS, opij, rheu, singulorum scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singula vncia. excipiuntur vino spathite.

Podagrica remedia.

Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu vocatur, podagricis idoneum.

RHEV barbarici, præoniæ, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sextantes, phylli vncia, caryophylli grana quindecim, anagallidis phœnicei coloris quam vocant corallio, semuncia, aristolochiæ longæ vncia quatuor, & rotundæ totidem. datur instar scrupuli quotidie, cōcoctione probè defuncto. Incipiendum verò est ab æquinoctio autūnali, quod circa vigesimum quartum mensis septembris diem accidit, capiendumq; deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquatur quindecim dierum interuallo, atq; sic facere oportet quousq; dies quibus assumitur abstantur treceti sexa

gintaquinq; Sub caniculæ ortu omnino abstinendum est, hoc est, à vigesimo quarto die Iunij vsq; ad Augusti finem. Vitari debet venus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, menta, & lactuca non cocta, pepo nesq; piscium capita, cammari, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summarim quæ crassi succi sunt, vinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianum exercitium, vel pedibus, vel equo, vel gestatione obitum. Qui verò habitu sicciore sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

Agapeti compositio ad podagram.

P H Y L L I, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloës hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, mēu, damasonij, anagallidis, singuli trientes: vtēdi modus idem est qui in compositione diæ coralliu.

Compositio ataflos ad podagram.

P H Y L L I, mēu, damasonij, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ aloës hepaticæ, gētianæ, chamædryos, singulorū vncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorū semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæoniæ radices, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vnciæ duæ. Similis vsus est.

Procli compositio, podagræ & coxendicum doloribus accommodata.

C H A M A E D R Y O S vnciæ nouē, cētaurij vnciæ octo, aristolochiæ vnciæ septē, gētianæ vnciæ sex, hyperici vnciæ quinque, petroselini macedonici vnciæ quatuor, mēu vnciæ tres, agarici vnciæ duæ, phu vncia vna, mellis attici heminæ duæ.

Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem.

H Y P E R I C I, aristolochiæ longæ, singulorum vncia, centaury, chamæpityos, agarici, singulorum tres vnciæ chamædryos vnciæ sex, gētianæ vnciæ quinque. Nonnulli etiam petroselini vnciam addunt, mellis drachmas quinque. datur instar drachmæ.

De pastillis.

C A P. XII.

P Astilli græcè trochisci à figura rotularum nominantur. Tres sunt eorum species, alij nanq; sunt potabiles, alij in aluum dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij comprimunt aluum, aut sanguinem, aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringēdo, aut opplēdo, aut

ut desiccando eam cohibentes:quemadmodum qui cōstat
 oina ægyptia, & qui seminibus, consimilesq;: alij dolorem
 opiunt, vel quodd sensum obstupefaciunt, vt crocodes di-
 tus, vel quodd humores diffundant, veluti ex aromatis con-
 ecti: alij lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberāt, vt
 ui ex amaris amygdalis confit. Eorum verò qui in aluum
 nduntur, nonnulli acrimoniam obtundunt, vt in dysente-
 iis, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia,
 um cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo iniecti, nonnulli
 lvi aut sanguinis profluuium astringunt, sicuti qui alumi-
 ne, acacia, & omphacio constant, qualis est qui Philippo
 scribitur, vel ex spina Aegyptia, cum rosarum succo, aut
 plantaginis inditi: nonnulli adurentes, dysenteria quā vlce-
 ra depascentia exercent, idonei: ex sandaracha, auripigmen-
 to, calce: charta combusta, confecti. Inserentur autē cū suc-
 co lenticulæ aut oryzæ, sic vt intestinum prius muria elotū
 nt, ægerq; cibum & potū antea assumpserit, ne aliquid me-
 dicamenti virtutis reliquū, ad stomachum rapiatur. Cate-
 rū vtilis sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciūtur,
 ad affectus potissimum qui infra vmbilicū infestant. Nam
 superius vis ipsorū peruenire non potest. At qui delinuntur
 simileis illis vireis obtinent: verū astringentes, in herpete,
 papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertriginibus, sangui-
 nis eruptionibus, & fluidis vlceribus proficiunt: cuiusmodi
 est Andronius & Polyidæ. qui vero obtundunt, carbunculis
 & maleficis vlceribus expediūt: vt pote Leucus dictus, & dia-
 lorion. vrentes, sicut iam comprehensi, cuius generis ha-
 bentur & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis vlceri-
 bus, pterygiis, & carnosis narium vitiis accommodantur.

Pastillus aster dictus.

CROCI, opij, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis
 cretæ, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apij,
 anisi, fœlis, alterci seminis, styracis, singulorum drachmæ
 octo: vino læuigantur.

Pastillus trigonus.

ANISI seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ
 duæ, anisi drachmæ quatuor, opij drachmæ tres: aqua te-
 runtur.

Pastillus à seminibus dia spermaton dictus.

ANISI, ameos, fœniculi seminis, singulorum drachmæ

quatuor,apij feminis,opij,alterci feminis, singulorum drachmæ duæ:aqua læuigantur.

Pastillus crocodel, hoc est croceus.

ANISI,dauci cretici feminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci, opij, singulorum drachmæ tres, apij feminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci feminis drachmæ sex:ex aqua deteruntur.

Pastillus diarhodon.

ACACIÆ,gummi,rosarum floris, balauſiorum, hypocistidis succi,gallarum, singulorum drachmæ tres,rosarum viridium succi, plantaginis feminis singulorum drachma, lycij Indici tantundem.

Pastillus dia coralliu.

ALTERCI feminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samia, corallij, miniij Sinopici, opij, singulorum drachmæ quatuor, amyli, balauſiorum, singulorum drachmæ duæ:succo polygوني excipiuntur.

Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.

HERBAE pulicaris vnciæ quinque, mastiches vnciæ quatuor, succini scobis, iridis, croci, singulorum vnciæ quatuor, opij vnciæ duæ.

Pastillus ex spina Aegyptia.

SPINAE Aegyptia, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, hypocistidis, succi, gallæ, lemnia cretæ, corallij, symphyti, terræ samia, aloës, ladani, pares portiones: vino subiguntur.

Alius pastillus, quem Galenus aphrodisiasticon clidion scribit.

SATI VAE punicæ floris, spinæ Aegyptia, balauſiorum hypocistidis succi, acaciæ, singulorum drachmæ sex, lycij, rhēu pontici, opij singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, excipiuntur vino myrteo, vel rosarum baccarūve myrti decocto.

Clidion Oribasi, ad dysentericos & celiacos.

GALLAE omphacitidis drachmæ octo, opij drachmæ quatuor. ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

Pastillus ex cornu ceruino dysentericis et sanguine excreantibus salutaris.

COCHLEARVM drachmæ duodecim, cornus ceruini cōbusti gallæ torrefactæ, acaciæ inarefactæ singulorū drachmæ quinq; oboli duodecim, baccarū myrti nigra drachmæ

æ quindecim, opij siccati, hypocistidis succi singulorū drachmæ quinq; labruscæ floris drachmæ sex, mādregoræ radicis succi, terræ samiæ quæ aster dicitur, singulorum drachmæ duodecim, rhu obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorij torridi drachmæ septē, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exarefacti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decē, rhus coriarij sextarij duo, vini nigri quātū rhu incoquēdo vt vinū fiat crassissimum, satis est, itq; hoc percolato reliqua excepta in pastillos coguntur.

Pastillus amaronum.

A P I I seminis, anisi singulorū drachmæ sex, absinthij comæ drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opij, castorei, singulorum drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex aqua subiunguntur.

Pastillus ex amygdalis amaris.

A N I S I, apij seminis, alari, amygdalarum amararum, absinthij comæ, paria pondera: ex aqua finguntur pastilli, quī drachmam pendeant. dantur febrī carentibus ex mulso: febricitantibus cum hydromelite.

Pastillus ex erica, leni dicatus.

E R I C A E fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syriacæ, suffiminis, ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum aceto soluitur, aridiſque admiscetur. finguntur pastilli qui singuli drachmam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyathō.

Pastillus ex vesicarijs, diaphysalidon vocant.

C V C V M B E R I S satiui excorticati seminis vnciæ quatuor, alterci seminis, cicutæ, singulorum vnciæ duæ, fœniculi, rumicis seminis, croci, nucleorum pini, amygdalorū amarorū, opij, singulæ vnciæ, vesicariæ sextarij tres, vini quod sufficit.

Pastillus Philippi, ad dysentericos.

B A L A V S T I O R V M, acaciæ, hypocistidis succi, opij, rhu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloës, rhēu pontici, malicorij, baccarum myrti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur vino austero, formanturq; pastilli triobolares. dantur si febris abest, cum vino: febricitantibus, cum hydromelite.

Pastillus muse.

A L V M I N I S, aloës, myrrhæ, atramenti sutorij, singulorum sescuncia, mali corij, croci, crocomagmatis, singulorū drachmæ sex. excipiuntur vino.

Quo

Quomodo crocomagma paratur.

CROCI vnciae duae, rosarum, amyli, myrrhae, aloës, thuris, gummi, singulorum vncia, costi, spicae nardi, singulorum drachma: vino subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagmatis confectura dicitur.

Pastillus nerae ex Herae commentarijs.

MYRRHAE, aloës, crocci, singulorum drachmae octo, aluminis scissi drachmae centum: aqua excipiuntur.

Polyide sphragis.

ALUMINIS scissi drachmae tres, thuris drachmae quatuor, myrrhae drachmae octo, atramenti sutorij drachmae duae, floris sativae punicae drach. duodecim, fellis taurini drach. sex alias drachmae sedecim, aloës vncia: vino austero excipiuntur.

Pastionis pastillus.

SYAMAE aris drachmae duodecim, aris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rase, thuris, singulorum drachmae octo, vini quod sufficit.

Pastillus Andronius.

SATIVAE punicae floris drachmae decem, gallae drachmae octo, myrrhae drachmae quatuor, aristolochiae rotundae drachmae quatuor, atramenti sutorij, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmae duae: laui gantur in vino astringenti, vel aceto.

Pastillus Faustini.

AVRIPIGMENTI drachmae duodecim, sandarachae drachmae sex, calcis viuae drachmae octo, chartae combustae drachma: myrti baccarum succo vel decocto excepta, in pastillos redigito, & cum myrti baccarum, lenticulae, & rubi radicum decocto immittito.

Pastillus ex charta, diachartiu appellatus.

CHARTAE combustae triginta duae, calcis, auripigmenti, sandarachae, singulae vnciae: succo plantaginis excipiuntur.

Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.

CHARTAE combustae drachmae decem, sandarachae, auripigmenti, squamæ aris, aluminis scissi, singulorum drachmae quatuor, balaustij drachmae tres, opij drachmae duae, calcis non restinctae drachmae tres, omphacij drachma, hypocistidis succi drachmae tres: vino myrreo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: vbi decoxeris

in

vino malicorium, myrti baccas, & rosas vsque ad ter-
as, dato pastillum vnum aut in totum quatuor, ex sex vini
yathis.

Pastillus à subere, dia phellon dictus.

GALLAE, chartæ, fæculæ vini, panis, singulorum concre-
tatorum drachmæ quindecim, in alio habetur etiam cornu
eruini combusti drachmæ quindecim, auripigmenti drach-
mæ duæ, sandarachæ, calcis, vtriusq; drachmæ quindecim,
caciæ, cerusæ, singulorum drachmæ quinque, argenti spu-
mæ drachmæ tres: vino læuigantur.

Bithynus.

MALICORII drachmæ decem, cadmiæ vnciæ tres, ari-
tolochiæ, gallæ, panacis radicis, iridis, atramenti sutorij, a-
luminis scissi, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ thu-
ris (nonnulli etiam costi) singulorum sescuncia: aceto subi-
guntur.

*Pastillus dia castorin, ad vlcera, nomas &
defluxiones.*

CROCI, aloës, thuris, singulorum vncia, florum mali-
punicæ, aluminis scissi, castorij, mannæ thuris, æruginis ra-
sæ, singulorum vncia, minij sinopici libra: excipiuntur vino
veteri.

Pastillus dia castorin, colicis efficax.

MYRRHAE, castorij, singulorum scrupula sex, croci, o-
pij, singulorum scrupula nouem, anisi, apij seminis, dauci
seminis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula o-
ctodecim.

*Pastillus dia ænelau, hoc est, ex vino & oleo mixtis, sedis &
naturalium vitij vtilis.*

CERVSAE vnciæ decem, argenti spumæ vnciæ quinque,
thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum vnciæ
duæ: vino marinæ experte læuigantur. in vsu vino & rosa-
ceo aut vino & myrteo soluuntur.

*Pastillus ex lapide phrygio, naturalium vitij
accommodatus.*

LAPIDIS phrygij combusti restinctiq; ter, primùm bu-
tyro vel rosaceo, deinde vino, postea melle, vnciæ duæ. rosa-
rum floris vnciæ quatuor, malicorij vncia.

*Pastillus dia lotarion, quod est ex loto syluestri, ad sedis
& naturalium vitia.*

CERV

CERVS AE, amyli, glaucij, croci, aluminis, æquales por-
tiones: teruntur succo loti syluestris, aut vino.

Pastillus leucus.

TERRAE famiæ triens, pompholygis, cerusæ, amyli, sin-
guli sextantes, opij scrupula quatuor: aqua subiguntur.

Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex vesicaria.

Spumæ argenti drachmæ vigintiquatuor, cerusæ drach-
mæ duodecim, aut vna & viginti, vesicariæ drachmæ octo,
atramenti sutorij drachmæ quatuor, aluminis scissi tantun-
dem, minij quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

*Pastillus ex duplici veratro, idem verò ex dua-
bus acacijs.*

ACACIÆ nigrae & fulvae, glutini fabrilis (in alio pisciū
glutinis) singulorū vnciæ quatuor, guttæ ammoniaci, glau-
cij, aloës, singulorum vnciæ duæ, thuris masculi, veratri ni-
gri & albi, singulorum vncia: aceto scillino excipiuntur.
quum vsus incidit eodem vel communi soluta, ante balneū,
& rursus post id inunguntur.

Pastillus Criogenes.

MYRRHAE, aris combusti, aristolochiæ rotundæ, æru-
ginis rasæ, squamæ stomomatis, verbenacæ rectæ, aluminis
rotundi, singulorum vncia, aceti quantum satis est. decerpi
autem debet verbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiā em-
plastrum in hunc modū: pastilli, ceræ, colophonix, olei, par
mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

*Pastillus à nigro viridique colore dictus me-
lanchlorus.*

MYRRHAE, aloës, squamæ aris combusti, auripigmen-
ti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, mityos, sa-
lis fossitij, atramenti sutorij, cerusæ, nitri, argenti spumæ,
panacis radicis, cadmiæ, malcorij, gallæ, aristolochiæ rotun-
dæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorum vncia,
aceti quod satis est. Fit etiam hoc modo emplastrum: pastil-
li vnciæ duæ, colophonix, ceræ, olei, singulorum vnciæ sex,
aceti quod pastillo subigendo satis est.

*Pantolmius ad chironia malignaque vlcera, &
defluxiones.*

CASSIÆ, aris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis
rasæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritij quod plin-
thitis dicitur, panacis radicis, aristolochiæ longæ & rotun-
dæ,

malicorij, atramenti sutorij, portulacæ, iridis astragaliti
s, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci,
æ ruginis ferri, squamæ æris, aloës, diphrygis, thuris
allæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, so-
s, myrrhæ, cretæ sutoriæ liquidæ, balaustrorum, spinæ
egyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu
riaci, chrysocolle, rhus coriarij, acaciæ, salis spumæ, om-
naci, auripigmenti, singulorū pares modi: cum aceto die-
bus triginta, sub caniculæ sidere læuigantur,

Pastillus Nymphodoti.

A P H R O N I T R I vncia, nitri Alexandrini, saponis gal-
ci, singulæ vnciæ, salis cappadocij, mastiches, gallæ, singu-
rum drachmæ quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, sin-
gulorum vncia, phylli drachma, aluminis scissilis, costi, sin-
gulorum drachmæ duæ, vini myrtei quod satis est,

Pastillus ex thapsia, hemicranico doloriefficax.

S V C C I thapsiæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ o-
cto, opopanacis, euphorbij, singulorum drachmæ sex, nitri,
quoris parthenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis,
agapeni, singulorum drachmæ duæ, aceti quantum sufficit.
ubi vtendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at
volēs remissiore vti, cerato pari exceptum illinito no-
temq; finito.

*Pastillus qui ano subiicitur, hypotheton dictus, ad dysente-
riam, & ani dolores.*

T E R R A E samia, amyli, singulorum quadrans, croci sex-
ans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ vnciæ, castorij, thuris, ly-
ij, singulæ semuncia: in calidioribus, etiam opij semuncia
adiicitur: herba pulicaris succo excipiuntur, singunturque
pastilli.

De medicamentis quibus aridis vtimur, & smegmatis.

C A P. X I I I.

A Ridorum medicamentorum quæ sanè & cataplasmata
ab inspergendo, vocantur, alia vlceribus congruunt,
alia cuti applicantur: ex iis quæ vlceribus faciunt, quædam
cauis carnem inducunt, quædam excrefcencia reprimunt,
quædam cicatricem generant, quædam vrunt exeduntque,
nonnulla sanguinem coërcent. Quæ igitur carni genera-
dæ sunt, vel repurgando sordida, carnem creant, vt quæ
constant ex cruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, thure,
aloë:

aloë: vel humiditatem circumfluam desiccando, veluti quæ
 fiunt ex ære, diphryge, squama, charta combusta, piceæ cor-
 tice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: vel acrimo-
 niam resolutionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge,
 amylo, cerusa, fæce combusta, ostreis crematis, terra samia,
 & consimilibus, & quæ compositorum ex his vireis habent.
 Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama
 æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: valentiora
 sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide, igne
 non expertis. Vrentia verò ex edentiaq; fiunt ex calce, auri-
 pigmento, sandaracha, & fæce vini combusta, quam vocant
 spheclen, hoc est fæculam: atq; hæc omnia componuntur,
 cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si vlceribus in-
 spersantur minus rodunt: si spissiora, magis, idq; vrendo fa-
 ciendoq; crustam. Sanguinem reprimentia aut astringendo,
 aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo illum coër-
 cent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequiri.
 At eorum quæ cuti admoventur, alia abstergunt exterunt-
 que, vt ex cimolia, pumice, lomëto, fermëto hordei, peponū
 carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt,
 qualia fiunt ex veratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari,
 sinapi, pyrethro, semine rorismarini, terra lemnia, sepia te-
 sta: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore
 aliquo, pilis abolendis idonea, & smegmata fiunt. Quædam
 capiti admoventur, vt fluxum ex eo ruentem desiccant, cu-
 iusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis
 præparata. omnia verò smegmata cuti non inunctæ accom-
 modari debent.

Cephalicus pulvis, capiti conueniens.

ERVORVM quincunx, iridis fescuncia, mānæ thuris fescuncia, aristolochiæ, squamæ æris, singulorum fescuncia.

Alius.

PICEAE corticis drachmæ sex, thuris drachmæ quatuor, pumicis tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccæ drachmæ sex, aristolochiæ drachmæ duæ.

Ex aloë, dia aloës, dicitur.

ALOES drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ thuris drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ duæ.

Dia

Diasphecles, hoc est, ex face vini combusta, Manethonis.

CADMIÆ combustæ & illotæ vncia, terræ samia vncia, facis vini combustæ vnciæ quatuor, lapidis specularis vnciæ quatuor, thuris vnciæ quatuor. quidam & amyli vncias quatuor addunt.

Melitera Oribasij.

CHALCITIDIS, squamæ æris, gallæ, balaustiorum, aristolochiæ longæ singulorum vncia, malicorij, aluminis scissi singulorum semuncia.

Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.

CADMIÆ, thuris, singulæ vnciæ, ostreorum combustorum vnciæ tres.

Medicamentum ex thure, dia Libani.

ARGENTI spumæ, thuris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, pares modi.

Aphroditarium.

THVRI S, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, paria pondera.

Rhodia, ad supprimendum sanguinem, vlcera depascentia, & excrescentia.

GALLÆ crudæ drachmæ sex, gallæ combustæ restinctæque vino aridæ drachmæ duodecim, squamæ æris nigri, si nō sit, rubri, drachmæ octo, atramenti sutorij, drachmæ vigintriquatuor, aluminis scissi drachmæ vigintiseptem: teruntur diebus sat multis.

Medicamentum xanthon, hoc est flauum.

CHALCITIDIS combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorij vsti drachmæ viginti, misyos cremati drachmæ decem, æris vsti drachmæ quinque.

Medicamentum à murino calore psaron dictum.

MISYOS quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, squamæ æris tantundem, atramenti sutorij vncia, æruginis rasæ sextans.

Medicamentum heliocæ, adurens.

AVRIPIGMENTI libra, calcis viuæ libræ duæ: aqua læuigato per dies caniculæ, deinde siccatis vtitor.

Antheron.

CYPERI drachmæ octo, myrrhæ drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ tres, rosarū floris drachmæ duæ, croci drachma, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum drachmæ duæ.

*Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia charta, ad
nomus oris potissimum & naturalium vlcera.*

AERIS squamæ, chartæ combustæ, singulorum drachmæ
octo, auripigmenti, sulfuris viui, singulorum drachmæ duo-
decim, plumbi cremati drachmæ sex. Ad humidiores quidē
sepedonas, sicco vtitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnū-
quam & melle cum rosaceo.

*Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyr sine
appellatum, ad eadem.*

RHVS coriarij vnciæ duodecim, myrti syluestris foliorū,
sandaraches, singulorū drachmæ octo, salicis foliorum sic-
corum, malicorij, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi,
chrysocollæ, aloës, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmen-
ti, salis communis, singulorum drachmæ quatuor.

Medicamentum Massalioti.

NITRI, opij, chrysocollæ, lapidis asij, sandarachæ, mi-
syos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera:
sicco vtitor.

Smegma aridum, quod asclepios dicitur.

BACCARVM lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, sa-
lis cappadocici, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, sin-
gulorū libra, veratri nigri, herbæ lanariæ, pyrethri, fæculæ
quæ est vini fæx combusta, herbæ pediculariæ, sinapi, iunci
rotundi, aluminis scissi, iunci quadrati floris, iridis, gallæ,
singulorum vnciæ sex, sampsuchi libra, viticis seminis, pule-
gij, farinæ fabarum, & lupini, singulorū vnciæ sex, chamæ-
leontis nigri, sulfuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syl-
uestris radicis, marrubij, cimoliæ, pæoniæ, sepiæ testæ, fœnu-
græci, phylli, costi, cumini, euphorbij, spicæ nardi, singu-
lorum vnciæ tres. Alexander autem præter hæc adiicit sa-
lis ex nitri fontibus, salis Tragasei, singulorū libram, adar-
ces vnciam, aluminis liquidū, nardi gallici, cnici, cocci gni-
dij, graminis aridi, brioniæ siccæ, singulorum treis vncias.

Smegma peponatum.

THVRS, mastiches, stillæ ammoniacæ, singulæ vnciæ,
tragacanthi sescuncia, succi vux acerbæ dodrans, peponis
seminis recentis quadrans, similæ sextarij quinq; ouorum
vnius & viginti albumina, iridis triens. quidam & veratri ni-
gri sextantem miscent.

Aliter

Aliter Critonis.

L O M E N T I modius, similæ sextarij quatuor, trifolij, glādis vnguentariæ, iridis illyricæ, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniaci, costi, singulorum libra, ouorum tenuia aquata, peponum carnis sextarij duo, vix acerbæ succi tantundem: macerantur, redactaq; in pastillos siccantur, deinde contusa incretaq; in vsum adhibentur. **A L I T E R.** Tragacanthæ, thuris, mastichæ, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ decem omphacij drachmæ quinq;, similaginis sextarij quinque, candidi ouorum liquoris vncia, peponum carnis vnciæ decem: præparatur vt suprà dictum est.

Smegma quod capitis defluxiones exiccet.

N I T R I Alexandrini rufi vnciæ quinq;, salis communis torrefacti fescuncia, salis cappadocij vncia: hæc aceto quàm acerrimo macerata in patinam fictilem coniiciuntur, atque in furno vruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis læuigatisq; ad abstergendum vtitor, vinum in balneo instillans.

Sapo Constantini.

R O S A R V M siccarum, aloës, gallæ, malicorij, malabathri, sarcocollæ, singulorum tres vnciæ, balaustiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum vnciæ duæ, costi vncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

Puluis pilos abolens, vnde psilotrum dicitur, ad podagram.

M A S T I C H E S, thuris masculi, herbæ pediculariæ, veratri albi spumæ argenti, singulorū vnciæ tres, phylli, amyli, veratri nigri, lapidis asij floris, singulorum vncia, alcyonij, pumicis tosti, cimoliæ, sampsuchi, singulorum vnciæ tres, spicæ nardi vncia. Nonnulli etiam aloës vnciam addunt. contusum in vase puluerem reseruato: vbi necessitas incidet, oryzæ cremor & ptisanæ in ollam conicitur: postquàm inferbuerit, pulueris, saponis, gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum fescuncia additur, calcis viuæ recentis libra. Vtitor vnguento mense ter. nono videlicet lunæ die, decimonono, & vigesimonono, idque vsque ad annum: post hunc, semel mense, quum vigesimumnonum luna diem agit.

De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris vitia vnde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis.

Quanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totum obtegit, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum vsus euariat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphaciũ, galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex piceæ, & thuris, balauſtia, & generatim omnia quæ astringunt, ita vt inſuauem ingratamq; & lethalem vim non præſentent: liquida verò, succus mororum tum quæ batina, tum quæ ſycamina dicuntur, item nucum viridium corticis, & mali punici, præſertim acidi, & malorum cotoneorũ, muſtum, aminũq; mel autem per initia ſolum vt medicamenta adhereant temperatur. at quum humor ſubſtiterit, miſceri debet quæ concoquant & mediocriter diſſipent, cuius generis eſt crocus, myrrha, & dulcis radicula: ſuccus at per totum id temporis quod ſtatum & declinationem intercedit, rectè uſurpatur mixtum aliquod ambobus, repellente puta, & diſcuſſorio: & per initia quidem ſuperabunt repellentia, deinde diſcutientia: in morbi declinatione ſolis vti diſcutiẽtibz abſque aſtrictione oportet, qualia ſunt nitrum, aphronitrũ, origanum, hyſſopum, thymus, nepita, iris, beſaſa, conſimiliaq; liquor tunc ſapa eſto, tum quæ ex mulſo decocto, tum quæ ex caricis & palmulis conficitur, ipſumq; dulce muſtum cum melle: vbi verò veluti reliquię quædam inflammationis remanſerint, etiam ſulſur ignem non expertum miſcebimus: ſuccum autem primum cũ melle incoquemus, dũ liquidioris mellis ſpiſſitudo fiat, inde ſic arida in tenuiſſimũ pollinem pertrita inſpergemus, poſtea modicè coquemus, quoad omnia ex actè in vnitatem cogantur, quo facto in vitreum vas medicamentum transfundemus.

Dia moron ſimplex.

MORORVM ſucci ſextarij tres, prius excoquuntur dum tertia portio fuerit abſumpta, adiectoq; mellis ſextario, rurſus incoquuntur ad melleam ſpiſſitudinem.

Dia moron compoſitum.

MORORVM ſucci hemine ſex, vſq; ad ſtrigmenti craſſitudinẽ coquũtur, deinde admixto leuis croci drachma, myrrhæ duabus, ſucci vñe acerbe vna, aluminis ſciſſi ternis obolis, mellis hemina, quouſq; ſpiſſeſcant incoquuntur.

De

De moris batinis, quæ rubi fructus sunt.

ITEM quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiore vi astrictoria præditum.

Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.

VIRIDIVM nucum corticis contusi succi hemine quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

Dia caryon compositum.

PER initia quidem & in vigore oris inflammationū, misceri debet croci, & aluminis, singule drachme, myrrhe duo, in declinatione verò ad discutiendum, nitri drachma, sulfuris tantundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

Medicamentum ex succo mali punici.

MALI punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarij quatuor, mali punici acidi succi sextarij duo, mellis sextarius, myrrhæ amineæ drachme octo, crocomagmatis, gallæ singulorū drachme octo, aluminis scissilis drachme quatuor, iridis illyricæ drachme octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

Aliter idem.

MALI punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarij sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi vncia, myrrhæ semuncia.

Medicamentum è musto, dia gleucous dicunt.

MVSTI sextarij sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorum drachmæ duæ, croci, myrrhæ, singulæ drachme. Si lenire voles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc vim obtinet.

Aegyptia stomatica.

MELLIS pondo, olei bes, resinæ terebinthine sextas, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

Medicamentum dia besafa, ex ruta sylvestri.

ANISI seminis, apij seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa, quod nonnulli harmala vocant (est autem ruta sylvestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorum vncia, aristolochiæ longæ, cassis, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum vncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum vnciæ tres, nardi Indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

Dulces vtilesq; potiones.

DUlcium simul & vtilium potionum alia ex vino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisq; compluribus, vnde etiam appellationem nonnunquam sortiuntur, aliquando melle admixto, interim non: alia ex aqua in qua decoquantur mala, vel rosa, vel similia quadam, nempe vva acerba, mala punica, myrti bacca, eoq; mel optimum despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam vtile: si illud excipias quod à cibyra in parvis vasculis asportatur, asterum: item hydromalum vinosum, quod etiā sine melle fieri nouimus, quemadmodum apomeli ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdam substantiae misturam. Imò etiam ex vino confectae potiones, quas & propomata Graeci nominant, mellis despumati sextariū vnum, ad vini quaternos recipiunt, componunturque citra coctionem. At quae ex aqua & liquore fiunt, si quidem coquantur, vnum mellis ad treis liquoris, cuius duae ferè partes inter coquendum sint absumptae, sextarios assumant: sin minus, vnum mellis ad binos liquoris. ceterum quae non coquantur, diu satis insolare prorsus oportet, & praesertim omphacomeli. Ex aqua verò temperatas potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitatem facillimè mutetur. omnes autem in fictilia vasa exigua oblita transfundendae sunt, iisq; tutò operculatis in apricis locis vsquedum excoquantur reponendae. attenuantibus autē & probè aqua temperatis vti conuenit. Omphacomeli postquam musti modo inferbuerit crassumq; euaserit, tunc operiri vas debet. his igitur quae vino constāt, quū febris abest, potissimum vtimur, vel solius voluptatis gratia, praeter eas quae scammonia aut grano gnidio aut eiusmodi purgantibus medicamentis componuntur, vel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas cōiectis, per os vti licet. Ex aqua autem aut succo aliquorum confecturae febricitantibus conueniunt, interdū ceu hedysmata hoc est dulciaria, quū morbus vino vti non permittit: interdum ceu affectui commodae, quemadmodum apomeli ad saluam educendam, aut vrinas citandas, aut aluum emolliendam, aut extenuandum humorem: hydromalum autem & hydrorosatum siticulosi, febre ardenti pressis, resolutis, & stomacho vitiosis. Omphacomeli,
myr

myrtites,, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhœtes, cœliaco affectui, dysenterii, vomitionibus, aliisque fluidis vitiis congruunt. Iam verò his collutionibus subinde in stomaticis affectibus utimur.

Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.

MALORVM cotoneorum nucleis exemptis contusorum succi sextarii duo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii sex, incoquantur despumando ad tertias. **ALIVD.** Malorum cotoneorum frustulatim concisorum nucleis ablatis pondo quinq; in aquæ fontanæ sextariis decem incoquuntur dum intabescant. ablata ab igne, refrigerataq; eximuntur, expressq; succo proiciuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumque incoquitur despumando, quoad octava portio absumpta fuerit. Nonnulli verò ex dulcibus etiam malis similiter hydromalum componunt.

Hydrorosatium.

ROSARVM vnguibus exemptis libræ quatuor, aquæ sextarii quinque, mellis sextarii duo.

Rhodomalum.

SVCCEI malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinq;. Verum quoniam rosæ non eodem tempore cum malis inveniuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

Omphacamelitis preparatio.

VVAE acerbæ succi sextarii tres, mellis sextarius: mixta diebus quadraginta insolantur, vel discoquantur.

Quomodo myrtites fiat.

MYRTI baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad tertias decoquantur.

Apomeli ex commentarijs Philagrii.

FAVORVM melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. confractis fauis vnitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod veluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

Rhodostacti compositio.

ROSARVM quibus vngues sint exempti succi sextarios duos, mellis sextarium incoquito despumans quoad quarta pars fuerit absumpta.

M A L I punici succi sextarij tres, mellis vnus, ad tertias decoquuntur.

Decollyrijs & adglutinantis

C A P. X V I.

Varia ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particula stirpium, & metallica his inseruntur. ex quibus alia acrimoniā leniunt, & veluti opplent ostruuntq; vtpote pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita vtendum est, vt caput prius vacuationem experiat: nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunica humoribus distenta perrumpantur. Alia contrariam his naturā obtinent, nempe acrem, recludendis vacuandisq; iis quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenaicus, Medicus, sagapenus, euphorbium, & consimilia. Nonnulla sordidis vlceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama aris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos aris, stimmi, cōcremata omnia. Quædā his vicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmentum, sandaracha, & lapidis asij flos. Sunt & astringentia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt vehementer lippitudini, vlceribus, & defluxionibus conducunt, nempe rosarū folia, flores, fructus, spicæ nardi phyllū, crocus, glaucium, & hypocistis. Quæ vehementiorem astringendi vim repræsentant, oculorū claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphaciū, acacia, balauustum, satiuæ punicæ flos & galla. Alia concoquūt discutiūtq; vt myrrha, crocus, castorium, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porrò ex compositis oculorum remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria vocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem comprehensam materiam recipiunt, omnibusq; conférunt affectibus: cæterum vere præsertim præparari debent, æstate siquidem virtus ipsorum perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigidæ temperari nequeūt. Conterere autem ea oportet liquore non copiosè affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, verum modicè, vt sordium modo conterantur. Aqua vero pluuialis erit, tum quòd tenuis sit, tum quòd modicè astringat. Si quidem

viii

vino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsa quoque terenda sunt, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo. demum vbi satis læuia euaserint, gummi adicietur: in formam redacta, vasis maximè areis aut vitreis reponentur. Cæterum iis quæ succo conficiuntur, protinus vtilicet: metallica vetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exteruntq; callos, ficos, vngueis, scabiosaq; vitia, è chalcitide, ærugine & misy composita: quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent, tueanturque oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob vetustatē tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, aliisq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusionique incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentq;. Utendum his est, & omnibus acribus, vbi caput repletionē caret, sub dio, aëre, puro, austrino, non nimis frigido, neq; item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græcè dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccantve, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochlea, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

Collyrium quod protinus dolorem sedet monohemerum appellatum, ad incipientem vetustamq; lippitudinem.

A C A C I A E drachmæ triginta sex, gummi drachmæ trigintaduæ, cadmiæ drachmæ vigintiquatuor, æris cremati & eloti drachmæ octo, opij, drachma: vino austero læuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

Chiacum collyrium.

M I N I I sinopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium vnguibus exemptis floris quem thylaca vocamus, gummi, singulorum vnciæ quatuor, opij vncia: vino aminæo, aut falerno, aut chio austero teruntur. Sit autem vinum marinæ expers.

Cygnarium.

C A D M I A E vsta elotaque vncia sex, cerusae lotae vncia quatuor, pompholygis tantundem, amyli vncia duae, tragacanthae, opij torrefacti, gummi, singulorum vncia duae: aqua pluuiali laeuigantur.

Rubens cygnus.

C A D M I A E crematae elote sextans, terrae samiae quae aster dicitur tantundem, cerusae triens, pompholygis bes, amyli sextans, opij sextans, acaciae, tragacanthae, singulae vnciae, gummi triens: aqua caelesti subiguntur.

Albus cygnus.

C A D M I A E vncia quindecim, cerusae vncia septemdecim, opij drachma octo, thuris drachmae septem, amyli vncia septem, gummi drachmae tredecim: aqua caelesti teruntur.

Pelargon ad vlcera.

C A D M I A E, cerusae, singulorum drachmae vngintiquatuor, acaciae, opij, singulorum drachmae octodecim, gummi, tragacanthae, amyli, singulorum drachmae nouem, myrrhae drachmae tres, eris, croci singulorum sesquidenarius: aqua conteruntur.

Phaeon ad oculos sanguine suffusos, & magnos affectus.

C A D M I A E tenerae drachmae vngintiquatuor, cerusae drachmae sedecim, æruginis rasae drachmae duodecim, stimmi drachmae octo, aluminis scissi drachmae tres, chalcitidis vsta drachmae tres, nardi Indici drachmae quatuor, omphacij drachmae duae, æris drachma, squamae æris drachmae octo, ericae fructus drachmae tredecim, lachrymae papaueris drachmae vngintiquatuor, croci drachmae quatuor, castorij drachmae tres, myrrhae drachmae sex, lycij Indici, acaciae, gummi, singulorum drachmae quatuor, rosarum recentium drachmae duae & semissis: vino falerno aut surrentino, aut aminaeo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquae instar dilutum ex fœnugraci succo instillatum, deinde ex ovo aut lacte, postremo aqua crassius.

Collyrium ex decoctis, diazematō dicitur.

C A D M I A E vncia sedecim, cerusae vncia octo, amyli, opij, tragacanthae, acaciae, singulorum vncia duae, gummi vncia sex: laeuigantur decocto rosarum siccarum, meliloti, capiti papaueris, dulcis radicle, pari singulorum modo.

Col

Collyrium dia hydrias, repellens.

L I Q V O R I S qui in vasis cerealibus tophi modo concretus reperitur, libræ tres, cadmiæ vstæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotorum vnciæ sex, thuris vncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugraci, singulorū libra, tragacanthæ vnciæ sex, gummi libra.

Collyrium Ilambonis.

C A D M I A E vnciæ octo, pompholygis vnciæ quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opij, singulorum vnciæ quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

Cinereum, quod spodiakon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

T H V R I S, stimmi, singulorum drachmæ centum, cadmiæ, cerusæ, vtriusq; drachmæ vigintiquatuor, terræ samiæ, papaueris lachrymæ, singulorum drachmæ tres, gummi drachmæ quindecim: lœuigantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias vocatur.

T H V R I S drachmæ quatuor, stimmi drachmæ quindecim, cadmiæ drachmæ vigintiocto, cerusæ drachmæ quadragintanovem, terræ samiæ drachmæ octodecim, opij drachmæ sex, gūmi drachma, plumbi vsti eloti; drachmæ octo: excipiuntur oleæ turionum succo.

Dia thalias, ruffum.

A E R I S cremati drachmæ duodecim, sandycis vnciæ vigintiquatuor, foliorum oleæ vnciæ duæ, opij tantundē, gummi vnciæ decem, vino spathite vel aminæo excipiuntur.

Dia smyrnon claudiacum.

G L A V C I I, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadraginta octo, croci drachmæ vigintiquatuor, opij, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drachmæ sex, tragacanthæ drachmæ quadraginta octo, gummi drachmæ sedecim: vino Italico subiguntur. vsus est ex ovo.

Aliud dia smyrnon ad rhyadas & ægyloas.

C A D M I A E lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorū drachmæ vigintiocto, myrrhæ, spodij Cypriæ, singulorū denarij
vigin

viginti quatuor, opij drachmæ octo, croci drachmæ quatuor (alij octo) piperis albi grana triginta: gummi drachmæ sedecim: vino Italico teruntur, ex ovo adhibetur collyrium: si vitium sit recens, aquatum.

Stathicum Prosechij.

CADMIÆ, gummi, singulorum drachmæ viginti, stimmi, atramenti sutorij, singulorum drachmæ octo, opij drachmæ quatuordecim, æruginis rasæ drachmæ decem, piperis albi drachmæ sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drachmæ quatuor: aqua conteruntur.

Hygidion Ammonij.

CADMIÆ, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorij, aloës, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi vsti, singulorum drachmæ octo, lycij drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opij drachmæ decem, acaciæ drachmæ quadraginta, gummi drachmæ quadraginta octo: aqua excipiuntur.

Olympos seu olympiacum.

ACACIÆ, spicæ nardi, thuris, singulorum drachmæ octo, æris cremati elotiq;, stimmeos vsti & loti, cerusæ concremata lotæq;, cadmiæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, opij arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinque, æruginis rasæ drachmæ tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycij Indici, omphacij, singulorum drachma, castorij, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phœnicobalanorum drachmæ quatuor, similiter ossæ palmarum vstarum ligna numero quinque, gummi vnciæ quinque aqua pluuiali superfunduntur, in qua commadescent tres dies totidemq; noctes, calami odorati, alterci seminis, rosarum ficcarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

Nardinum.

CADMIÆ, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris vsti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi syriacæ drachmæ duodecim, opij, singulorum drachmæ sedecim: aqua subiguntur.

Theodotium minus.

STIMMI, acaciæ, singulorum drachmæ viginti, æris vsti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, ærug

æ ruginis drachmæ duæ, aloës, succi papaueris, lycij, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

Rhinarium.

LAPIDIS hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drachmæ decim, æris combusti, cadmiæ, æ ruginis, singulorum drachmæ octo, opij drachmæ quinque, chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo: vino excipiuntur.

Xyster.

PVMICIS, misyos, ostreorum, singulorum crematorum vnciæ sex, cadmiæ, opij, chalcitidis vstæ, croci, aloës hepaticæ, castorij, phylli, singulorum drachmæ duæ, stimmios, acaciæ, singulæ vnciæ, æris combusti vnciæ quatuor, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor: aqua cælesti superfunduntur. Nonnulli etiam vinum miscent.

Hecatombe, ad cicatrices crassas.

CADMIÆ vstæ lotæq; , æris cremati & eloti, vniuscuiusque drachmæ octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drachmæ quindecim, aloës, gallæ, æ ruginis vermicularis, castorij, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarum drachmæ sexaginta: aqua pluuiali teruntur.

Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.

PLUMBI combusti, cornus ceruini cremati, singulorum vnciæ duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ combustiæ, æ ruginis, myrrhæ, gummi, singulorum vncia: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium è thure, dia Libanu nuncupatur.

THVRIS vnciæ sex, cadmiæ, pompholygis, terræ samia quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum vnciæ tres, cerusæ vnciæ sex, squamæ æris vnciæ quatuor, tragacanthæ vnciæ tres, opij vnciæ sex: aqua cælestis adiicitur.

Libanium.

CADMIÆ elotæ, amyli, singulorum denarij duodecim, cerusæ tantundem, spodij, pompholygis, terræ samia quæ aster dicitur, plumbi vsti & loti, tragacanthæ, singulorum denarij octo, opij denarij duodecim, gummi denarij quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorum viginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios quatuor addant.

Aster

Aster magni.

POMPHOLYGIS, cadmiæ, cerusæ, singulorū drachmæ sedecim, plumbi drachmæ octo, amyli drachmæ octodecim, thuris drachmæ decem, terræ samia quæ aster dicitur drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ duæ, tragacanthæ gummi, singulorum drachmæ octo: aqua additur.

Vranium.

TERRÆ samia, piperis, singulorum vnciæ tres, spodij eloti vncia, gummi vnciæ quatuor, stimmios cremati eloti quæ vnciæ duæ, squamæ lotæ vncia, opij drachmæ sex, cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellit quæ.

Collyrium ex succo fœnugraci.

CADMIÆ, tragacanthæ, singulorum vnciæ octo, cerusæ vnciæ triginta, amyli tantundem, opij vncia: læuigantur succo fœnugraci.

Collyrium Cleonis.

POMPHOLYGIS, plumbi, singulorum vnciæ quinque, croci sescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur vncia, gummi vnciæ duæ: aqua pluuiatilis additur, aquatū illinitur.

Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta duas vncias pendunt.

ROSARVM viridium vnciæ septuagintaduæ, cadmiæ vsta & elotæ drachmæ vigintiquatuor, æruginis rasæ drachmæ duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drachmæ duæ, stimmios combusti eloti quæ, opij, myrrhæ, singulorum drachmæ tres, croci drachmæ octo, amyli drachmæ duæ, gummi drachmæ vigintiquatuor: aqua pluuiatilis admiscetur.

Album dia Rhodon.

CADMIÆ crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum libra, amyli, opij, tragacanthæ, singulorum vnciæ tres, aloës sescuncia, gummi vnciæ tres, croci sescuncia, rosarū vnguibz detractis vnciæ sex: aqua miscetur.

Collyrium ex aloë, dia aloës nuncupatur.

CADMIÆ, cerusæ, aloës, singulorum vnciæ decem, rosarum viridiū vnciæ sex, amyli vnciæ tres, opij vncia, tragacanthæ vnciæ duæ, gummi vnciæ tres: aqua pluuiatilis admiscitur.

Crocinum dia rhodon.

SPICAE nardi, rosarum siccarum, aloës, singulorum drachmæ duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drachmæ quatuor & semissis, glaucij sex, sarcocollæ tantundem, opij drachmæ duæ, tragacanthæ vncia: aqua pluuiialis additur.

Nili dia Rhodon.

ROSARVM tenerarum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua celesti excipiuntur.

Lynceus ad claritatem oculorum.

CADMIÆ, aris combusti, guttæ ammoniacæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opij thebani, singulorum drachmæ sex, aloës hepaticæ, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, æruginis rasæ, opopanacis, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drachmæ sex: aqua pluuiali teruntur.

Proteus ad idem, cicatricesq; extenuat.

CADMIÆ, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarij quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenæici drachmæ octo, croci denarij duodecim, opij thebani denarij sex, sagapeni denarij duodecim, oliuæ æthiopice denarij duodecim, auripigmēti, aluminis scissilis, singulorum denarij octo, myrrhæ denarij duodecim, suffiminis ammoniaci denarij xx. opopanacis denarij sedecim, opobalsami denarij decem, gummi denarij viginti: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium ex succo fœniculi.

CADMIÆ drachmæ septedecim, atramenti Indici drachmæ sedecim, piperis lōgi drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenæici drachmæ octo, opobalsami drachmæ sex, spicæ nardi drachmæ sex, sagapeni, opopanacis, singulorum drachmæ quinque, opij drachmæ quatuor, euphorbij drachma, gummi drachma: succo fœniculi læuigantur.

Collyrium ex opobalsamo.

CADMIÆ, cerusæ, singulorum drachmæ octo, omphacij drachmæ quatuor, piperis albi vnciæ sedecim, opij drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

Thalasseros.

CADMIÆ vnciæ octo, æruginis vnciæ duæ, atramēti Indici vnciæ octo, piperis albi vnciæ quatuor, liquoris medici vncia, opobalsami vnciæ ij. gūmi vnciæ sex: aqua adiicitur.

Har

Harmation.

G V T T A E ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorum drachmæ quatuor, æruginis drachma, gummi drachmæ quatuor: aqua cælesti excipiuntur.

Collyrium malabathrinum, quod & Isotheon dicitur.

C A D M I A E drachmæ sedecim, æris vsti & eloti drachmæ quatuordecim, opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloës, singulorum drachmæ duæ, cerusæ drachmæ octo, castorij drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor, acaciæ, summi, singulorum drachmæ quadraginta: aqua teruntur. vsus ex ouo.

Crassus ex vino.

C A D M I A E, lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, æris vsti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ trigintaduæ, papaueris seminis drachmæ tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adicitur, quæ leuigantur vino spathite vel aminæo.

Aliud ex vino.

A E R I S combusti, cadmiæ placitidis, singulorum vnciæ nouæ, lapidis hæmatitis eloti vnciæ sex, croci, myrrhæ, aloës, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ tres, lycij Indici, spicæ nardi, singulorum sescuncia, piperis albi grana cētum quinquaginta, acaciæ rubentis vnciæ nouem, gummi vnciæ tres: vino falerno aut aminæo teruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.

L A P I D I S hæmatitis, schistiq; cassiæ, singulorum drachmæ octodecim, æris, cadmiæ, opij, æruginis rasæ, singulorum drachmæ nouem, gummi tantundem, chalcitidis vsti drachmæ sex: aqua teruntur.

Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.

L A P I D I S phrygij minutim contusi vsti q; in ollula quousque incandescat, & restincti butyro non veteri, deinde iterum similiter cremari, extincti q; vino falerno, ac tertium vsti & extincti melle siccati q; libra, æris cremati, piperis albi, phylli, singulæ vnciæ, summi sescuncia: omnibus in lauo rem detritis quum medicamentum ab igne auferetur, liquoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum prohibet) sed lucidissimi vnciam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic vt specillo illato tunica non
attin

tingantur, sed vt solum medicamentum palpebris apertis
 llinatur. Inungi autem debet non semel, verum sepius, tum
 ante cibum, tum secundum ipsum, magisq; vbi iam lippitu-
 lo sentitur. Mirum enim est, quàm omni alio medicamen-
 o securius ab iniuria vindicet.

Aridum diacrocū.

SARCOCOLLAE drachmæ octo, croci drachmæ qua-
 tuor, glaucij tantundem: inungitur frequenter die. Nōnul-
 i vero aloē quoq; miscent.

*Aliud aridum ad siccam lippitudinem quæ xerophthalmia
 dicitur, sycosin, sepedonas, carnis excrecentias.*

CADMIÆ drachmæ decem, chalcitidis drachmæ vigin-
 ti, piperis grana quindecim, nardi gallicæ drachma: teritur
 admia & chalcitis cū vino: vbi inaruerint, reliqua adiciun-
 tur, cogunturq; in tenuissimum puluerem.

Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.

CAVCALIDIS succi, chamædryos, coronopodis, inter-
 dum & othonnæ succi par mensura. Est autem othonna ma-
 gnum chelidonium.

*Aliud ad sycosin, quæ est veterrima palpebrarum asperitudo,
 encanthidas, & excrecentiam carnis.*

MISYOSTOSI drachmæ sex, atramenti sutorij drachmæ
 quatuor, mellis attici sextarius.

*Erasistrati panchrestos hygra, mirifica est in ocularijs vitijs,
 tonsillis, pudendis & auribus suppurantibus.*

AERIS drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorum
 drachmæ tres, croci sesquidrachma, piperis drachma, vini
 chij & passij cretici, vtriusq; sesquihemina: omnibus in vino
 læuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & vsq; ad
 melleam spissitudinem incoquantur.

*Agglutinamenta oculorum qui defluxioni-
 bus infestantur.*

TERRÆ samiæ, mannæ thuris, myrrhæ, pares modi,
 oui aquato excepti, in lintheūmq; illiti fronti imponuntur.

ALIUD. Alterci seminis drachma, opij tantundem, myrrhæ
 drachmæ duæ, croci drachma, farinæ pollinis drachmæ qua-
 tuor, ouorum tostorū lutea duo, albumine oui excipiuntur.

*De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittuntur
 coctione, tum qui cera medus cum oleo esse debeat,
 ex commentarijs Antylli.*

Q

Medicamentorū quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt terrestria, utpote metallica, lapidūque & terræ species, floeces, cinis, & conchylia, alia sunt oleamenta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi sunt: semina verò, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterū ex ipsis emplastris nonnulla sunt vulneraria, quæ enagma græcis quòd cruentis iniiciantur: colletica, quòd glutinent: & catagmatica, quòd fracturis accommodentur, appellamus. Constare autem ex siccantibus nō summè, verū secundi ordinis absoluti, & tertij incipientis, oportet cuiusmodi sunt salix, quercus, cupressus, piceæ & pini cortices, myrrha, thuris lachryma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmen-taceus, cerusa, spuma argenti, & pleraq; ex metallicis. Coqui debent quousq; manus non amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, verum efficacioribus quàm glutinatoria, quod genus est, æs combustum, squama tum æris tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumē, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia verò & calefacientibus & siccantibus modicè fiūt, nempe aristolochia, thapsia, oleo veteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo veteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, vel radice althææ & cucumeris sylvestris, preparantur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, æruginè, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, vua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, æsypo, adipe, æruginè. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe suillo & vitulino, thure, pice, resina. Quæ verò leniunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, chamemelo, amylo, cera alba. Iam verò enagma dicta, recentibus adhuc vulneribus & fracturis iniici debent, adiutariq; è summa spleniorum parte spōgiis posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoq; die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutunt, concoquunt, & pus præter

præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumq; vsum adhibentur. Quæ leniunt etiã per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Caterũ quomodo coquantur, deinceps exequemur.

Basilicum tetrapharmacum.

CERÆ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, pares portiones. *Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergensq;.*

OLEI veteris dupondo, ceræ vnciæ viginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorũ pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ vnciæ sex, succi lini seminis tantundẽ, farinæ pollinis vncia, thuris vnciæ quatuor.

Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.

ARGENTI spumæ, ceræ, olei, singulorum libræ quatuor, terebinthinæ resinæ libræ duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libræ. ALIUD. Argentæ spumæ libræ sex, olei libræ quinq; & semissis, resinæ colophonix libræ septem & semissis, ceræ libræ tres & semissis, mellis libræ tres.

Emplastrum à succo dia chylon dictum.

ARGENTEÆ spumæ pondo sex, olei, æstate quidẽ pondo septem, hyeme verò pondo nouem, sænugræci semisextarius, lini seminis tantundem, althææ trepondo: althæa, seminaq; in viginti aquæ sextariis discoquuntur, quousq; paululum ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquuntur dum ebullire defierint, post hæc argenti spuma in tenuissimũ pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne nõ acri excoquuntur vsq; dum digitos intinctos non inquinent.

Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatum.

FARINACEI pollinis, guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resinæ è picea derafa, ceræ, adipis suilli, singulorum libræ duæ, succi lini seminis quod satis est.

Emplastrum ab herbis botanicum dictum.

LAPATHI thepelæi, anchusæ chærospelethi, hoc est, onocleæ, heptaneuri, plantaginis, singulorum vnciæ tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excocta proiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

Emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur.

HASTVLÆ regix radice succi libra, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum vnciæ duæ, adipis suilli vnciæ tres, ceræ vnciæ quatuor.

Emplastrum è fermento, abscessus rumpens.

FERMENTI, axungia, singulorum vncia sex, salis vncia quatuor, piceæ resina vncia tres, cera vncia quatuor, aphronitri vncia, gutta ammoniaci vncia duæ, mellis vncia sex, saponis vncia duæ.

Emplastrum dothiene.

SUFFIMINI ammoniaci pondo, nitri Alexandrini vncia sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, cera totidem, resina terebinthina pondo, olei veteris vncia, aceti quod satis est.

Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur, strumas discutiens.

ARGENTI spuma, radice lanaria, aristolochia singulorum triens, galbani, squama æris, aloës, singula vncie, manna thuris sextans, stilla ammoniacæ scilicet libra, resina è picea vncia sedecim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorum laungationem.

Smilion ad abscessus.

OLEI veteris sesquilibra, argenti spuma, nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij è ficu cui calx sit admista: protofactos dicitur, resina, singulorum libra, galbani, gutta ammoniaci, singulorum vncia tres, atramenti sutorij vncia quatuor, cere vncia sex, æruginis, opopanax, singulorum vncia, aceti quod satis est: argenti spuma & ærugo in oleo coquuntur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

Emplastrum dia scorodon, hoc est, ex allijs, ad rumpendum.

CERAE vncia sex, resina colophonie vncia quatuor, resine pityna hoc est ex picea arbore vncie tres, seu taurini vncie quatuor, nitri rufi fescuncia, allia pura viginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscentur.

Emplastrum dia apyranu ad discutendum.

ADIPIS anserini, & fasianorum, singulorum vncia tres, olei veteris vncia vigintisex, herba pulicaris vncia tres, vrtice seminis, radice apyrani viridis, singulorum libra, cera alba vncia decem, emplastri quod dia chylon inscribitur vncia duæ, resina terebinthina vncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, seménque vrtice per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluntur.

Empla

Emplastrum pyrine, ad duritias & scirrhus.

ALTHAEAE, palmularū, aut daſtylorū qui nicolai dicū-
tur, ſingulorū libræ duæ, fœnugræci, lini ſeminis, ſingulorū
ſextarij dimidiū, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis
ſingulorū vnciæ ſex, vini aminai ſextarij dimidium, ſpumæ
argenti libra, ceruſa, reſinæ colophonix, ſingulorum libræ
duæ, ceræ reſinæ, terebinthinæ, ſingulorum libra, olei vete-
ris libræ quinq; aque libræ duæ, panis aridi contuſi cribra-
tiq; libræ quinq; herba in vino decoctæ exprimuntur, ſucco
panis immadeſcit, ſequenti die læuigatur, argenti ſpuma,
ceruſaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquantur, dum me-
dicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua addun-
tur, ſublatis ab igne panis inditur, valideq; rudicula agita-
tur. adiunguntur etiam æruginis ruſa, & ſalis floris, ſingu-
lorum vnciæ ſex, iridis, ariſtolochiæ, ſingulorum vnciæ ſex,
terebinthinæ reſinæ libra.

Pelargon ex ſcoria argenti, dia electrolyſatos dicitur, ad ſimilia abraſis.

CERAE, ſcui taurini, ſingulorum vnciæ quinq; ſcoriæ ar-
gēti vnciæ ſex, reſinæ colophonix vnciæ quatuor, picis, olei,
ſingulorum vnciæ duæ: ſcoria argenti arida læuigatur vino
vel ſucco fœnugræci: quod ſi ſcoria deſideretur, plumbagi-
ne vtimur.

Emplaſtrum ex althæa, podagricis alijsq; duritijs accommodatum.

SVCCI fœnugræci, & lini ſeminis, & althææ, ſingulorū
trepondo, olei dupondo: incoctis vſq; dum ſuccus abſuma-
tur, colophonix reſinæ pondo adiicitur, item terebinthinæ
reſinæ pondo, hedera lachrymæ quadrans: vbi ſoluta fue-
rint, & ab igne ſublata, ceræ pondo iniicitur, galbani triens:
vtraq; ſimul contuſa ſolutaq; rudicula agitantur.

Cyſinum ad neruorum vulnera, punctus, & maxime diuturna.

QVAMAE rubræ vnciæ quatuor & ſemiſis, thuris vn-
cia, miſyos ſeſcūcia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti ſex:
læuigantur eſtuo ſole vſq; dum acetum fuerit conſumptū,
deinde ſolutis ceræ vncias octo, olei octodecim miſceto. Si
autem diuiſus fuerit neruus & nudus ſit, in vicem galbani,
reſinæ terebinthinæ vnciæ duæ induntur.

Melanchloron ad eadem, & cruentis aptum.

MALICORII, aris combuſti, gallæ, ariſtolochiæ rotun-
dæ, ſalis ammoniaci, ſquamæ aris, aluminis ſciſſi & liquidi,
(ali) vice liquidi rotundum ponunt iridis, miſyos, attramē-

ti sutorij, chalcitidis, eruginis rase, cadmia, aloës, myrrhae, thuris, panacis radices, argenti spuma, cerusa, pares omnium portiones, teruntur in sole aestiuo cum aceto diebus pluribus, fingunturq; pastilli. Emplastrum verò fit hunc in modum: medicamenti vnciae duae, cerae vnciae sex, olei vnciae octo, in nervorum vulneribus veteris, in aliis communis, temperantur.

Emplastrum ex senetione, quod dia erigerontos dicitur.

SENETIONI succi librae duae, olei veteris sesquilibra, cyprini olei vnciae quatuor, axungiae veteris libra, resinae terebinthinae vncia, galbani semuncia, resinae piceae sex, aruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum vncia, squamæ aris scrupula octo, cerae vnciae decem, apochymatis vnciae quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino leuigantur, galbanum cum cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, laue in cretum ponderato inspergiturq;: quod si in lauorem deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atq; tunc omnia misceantur.

Emplastrum Mnasei discutiens.

CERAE, axungiae porcinae, singulorum libra, resinae colophonae vnciae sex, argenti spuma librae duae: vini generosi librae quatuor adiciuntur.

Ariobarzanion, ad eosdem affectus.

ARGENTI spuma sescuncia, cerusae libra quincunx, aquae marinae vnciae viginti quinque, olei veteris sesquilibra, buccinorum concrematorum vnciae septem & semis, cerae rufae vnciae nouem, resinae terebinthinae vnciae sex, thuris vnciae tres, scrupula tria & dimidium.

Emplastrum ex dracunculo.

CERAE, resinae colophonae, picis aridae, axungiae, resinae, singulorum librae quatuor, guttae ammoniacae librae duae, dracunculi radices librae quinque: radix arida laevis aliis solutis inspergitur.

Psitacium.

CERAE, resinae colophonae, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, vel succi eorum, aequalis modus. In Alexandria autem cerae librae duae semis, alterci librae duae, axungiae librae duae semis, colophonae resinae librae decem miscentur, magisque discutit medicamentum.

Myr

Myrsinatum.

ARGENTI spumæ, cerusæ, sandicis, plumbi combusti & eloti, singulæ vnciæ, ceræ vnciæ sex, olei myrtei libra, vini quod satis est.

Emplastrum ex cerusa, vel cui.

CERAE tractæ vnciæ sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ vnciæ duæ, cerusæ tantundem, amyli vnciæ, tres, ouorum quinque aquata.

Emplastrum, quod liquidum sit parygrum vocatum, Oribasij.

ARGENTAE spumæ sescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triens, pinguis suilli septunx, resinæ colophonie dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirificè facit ad calcanei rimas. in vlceribus autem (inquit) vitant, nam eâ retri odoris reddit.

Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducens.

CHALCITIDIS vltæ vnciæ duæ, cadmiæ, manne thutis, singulorum vncia, ceræ, resinæ colophonie, olei myrtei, singulorum libra, vini quod satis est.

Palmulatum, phœnicine dicitur.

AXVNGIÆ veteris libræ duæ, olei veteris libræ tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ vnciæ sex: primum chalcitis cum oleo in pila commodiore læuigatur, vel in sole: vbi sordium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detrita superiniucitur, postea adeps: postquam probe in pollinem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicula agitans.

Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.

CERAE albæ vnciæ nouem, rosacei vnciæ octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccæ læuissimæ vncias quatuor inspergito. ALIVD. Anchusæ radicis viridis, marrubij, gummi, singulorum vnciæ tres, decoctæ in olei vnciis nouem proiciuntur, oleo ceræ albæ vnciæ quindecim superiniiciuntur, omniaq; soluuntur.

Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatum.

POMPHOLYGEIS vnciæ duæ, argenti spumæ vnciæ tres, læuigantur cum lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæq; ceræ vnciæ sex, adipis anserini vel gallinacei vnciæ duæ, chamæmelini vnciæ sex.

Philocotythe, dolorem leniens, ad sedem utilis.

THVRIIS vnciæ septemdecim, myrrhæ vnciæ septē, opij

drachma quatuor, aluminis scissilis drachmae duae, butyri drachma quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiae crematae & elotae drachmae quatuor, pompholygis drachmae sex, cerae tyrrhenicae drachmae octo, adipis anserini drachmae sedecim, medullae ceruiniae drachmae undecim, plumbi cremati elotique drachmae nouem, lapidis haematitis drachma, hyssopi liquidi drachmae quatuor: arida laeuigantur cum vino Italico. quae liquari possunt, admiscuntur.

Emplastrum Amthaonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, conuulsosque: est etiam ad extrahendum efficax.

AMMONIACI, cerae, bdellij, singulorum drachmae octo, resinae terebinthinae, iridis illyricae, galbani, singulorum drachmae viginti.

Emplastrum Aristophanium emolliens.

PICIS librae quatuor, apochymatis librae duae, cerae libra, opopanacis vncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.

PLUMBAGINIS vnciae quatuor, spumae argenti vnciae duae, cerusae tantundem, cerae vnciae octo, myrtei librae duae, vino laeuigantur arida.

Coracon ex oxymelite, ad naturalium vitia & nomas accommodatum.

GALLAE vnciae duae, squamae fescuncia, chalcitidis, thuris, singulorum vncia: teruntur aceto diebus complurculis, deinde mellis vnciae quinque miscuntur, ubi vero seorsim ce ratum feceris, ex myrtei vel rosacei vnciis duabus, seui taurini vnciis octo, cerae vnciis quatuor: resinae terebinthinae vncia, mixta simul laeuigato & utitor, quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

Emplastrum ex oxaleo.

ARGENTI spumae pars vna, olei, aceti, singulorum partes duae, nonnulli treis ponunt.

Emplastrum ex achae, discutiens emolliensque.

LAPIDIS achatis semiuisti fescuncia, cerae vnciae quinque, resinae frictae vnciae tres, olei vncia.

Isis, cruentis accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.

SCYVAMAE aris, aris combusti, aristolochiae rotundae, singu

ſingulorum drachmæ octo, aluminis ſciſſi drachmæ ſex, ſalis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ ſingulorum drachmæ octo, myrrhæ, aloës galbani, ſingulorum drachmæ duodecim, dracunculi radicis ſucci drachmæ octo, ceræ libra, reſinæ colophonix libræ duæ, olei veteris vnciæ tres, aceti quod ſatis eſt.

Athena, ad vlcera ſordida, impaſta, neruorum vulnera.

MALICORII, æris cremati, gallæ, ariſtolochiæ rotundæ & longæ, ſalis ammoniaci, guttæ ammoniacæ ſquamæ æris, aluminis ſciſſilis, & rotundi, iridis, miſyos, atramenti ſutorij, chalcitidis, æruginis raſæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, propolis, galbani, ſingulorum vncia, ceræ drachmæ ducentæ, picis tantundem, reſinæ colophonix drachmæ centum, olei vnciæ ſex, aceti quod ſatis eſt.

Emplaſtrum dia dictamni, glutinans, ad canum morſus, & omnigena vlcera.

ARGENTI ſpumæ pondo duo, ſquamæ æris vncias ſex, æris cremati vncias octo, aloës vncias octo, galbani vncias duodecim, olei veteris ſextarij duo, diphrygis vnciæ tres, gentianæ ſeſcuncia, ariſtolochiæ, æruginis raſæ, ſingulorum vnciæ duæ & ſemis, dictamni tantundem, colophonix pondo, manna thuris vnciæ tres, guttæ ammoniaci vnciæ ſex, propolis vnciæ duæ, ceræ vnciæ ſex & ſemis, primum oleum cum argenti ſpuma incoqui debet dum increaſceſcat, nec digitos inquinet, deinde lebetæ depoſito æruginem & ſquamam iniicies, ruruſq; incoques, dum manum non inſiciant, iterumq; cacabum ab igne tollens, reſinam & ammoniacum incretum adicies mouens, donec feruere deſinant, mox in ignem repones, ac vbi modicè inferbuerint, æs & diphryges admiſcebis, ac ruruſ coques uſque dum firma ſpiffitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; diſcocta vt digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloën, mannam thuris, dictamnium, ariſt olochiam, gentianam, ſingula læuiſſima inſperges.

Barbara, emplaſtrum quod cruentis protinus vulneribus inijcitur, & fracturarum callos firmat.

BITUMINIS Iudaici, picis aridæ, ceræ, reſinæ, ſingulorum libra, terebinthinæ vnciæ duæ, argenti ſpumæ, vncia, ceruſæ ſeſcuncia, manna thuris vnciæ duæ, opopanacis vn-

Q 5

cix duæ, zingiberis vnciæ duæ, olei vnciæ tres, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex salicibus, dia iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax: thoraci impositum.

MISYOS, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum vnciæ sex, ceræ libræ duæ, resinæ piceæ libræ duæ, picis tantundem, malicorij vnciæ sex, bituminis libræ duæ, salicis foliorum totidem, olei rosacei vnciæ quatuor, atramenti sutorij vnciæ sex, aceti quod satis est. sunt qui terebinthinæ vncias nouem addant.

Emplastrum Nicolai ad recentia vulnera, & sinus glutinandos aptum.

SYMAE æris vnciæ quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum vncia, atramenti sutorij vncia, sulfuris viui vncia, gallæ omphacitidis vnciæ quatuor, sulis ammoniaci vncia, misyos vncia, origani vncia, chamæleontis vncia, cadmiæ botryitidis vncia, veratri albi vncia, peucedani vnciæ tres, apij seminis vnciæ duæ, symphyti radice fescuncia, cerusæ fescuncia, mandragoræ succi semuncia, chalcitidis fescuncia, terræ samiacæ, quæ aster dicitur vncia, thuris masculi vncia, aloës vncia, bdellij vnciæ duæ, opij thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ vncia, fœnugræci vnciæ sex, perdicij herbe succi vnciæ sex, ceræ flauæ vnciæ tres, resinæ colophoniacæ libræ duæ, resinæ pityniæ hoc est picea libra polentæ tantundem, mastiches vnciæ sex, picis nigre libræ duæ, olei veteris libra, styracis vncia, opopanacis fescuncia, aceti quod satis est.

Ictios ad strumas, abscessus, lienem, articulos: & coxendicum dolores.

ARGENTI spumæ denarij centum viginti, olei veteris sextarij duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, piceæ corticis denarij octo, chamæleontis radice, euphorbij, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, helenij, pyrethri, singulorum denarij sedecim, ceræ libræ tres.

Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemque particularum carnosarum dolorem.

Olei

OLEI veteris sesquilibra, argentæ spumæ libra, ceræ
 pinæ piceæ, singulorum vnciæ septem & semissis, guttæ
 ammoniaci vnciæ quatuor, cerusæ tantūdem, galbani, man-
 thuris, zingiberis, thuris, singulorum vncia.

Oxera, multiplicis vsus.

PERIS aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ
 cia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani vnciæ duæ, man-
 thuris vnciæ duæ, aceti sesquiseptarius.

*Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glutinat,
 concoquit, vlcera ad suppurationem perducit, ex ri-
 cinino aut veteri oleo, medicaminis in
 linteolos illiti modo, so-
 lutum.*

ARGENTI spumæ trepondo, olei ricinini, aut veteris
 ondo quatuor, aceti quā acerrimi dupondo, æris squamæ
 græ, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spu-
 a cū oleo incoquitur, dū strigmenti fiat spissitudo, deinde
 etallica compluribus diebus ex aceto leuigata adiciuntur.

Emplastrum ex metallicis.

CHALCITIDIS vncia, misyos vnciæ duæ, squamæ æ-
 ris vnciæ tres, thuris tantundem, colophonix vnciæ duæ, gal-
 bani fescūcia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

Armenia, fracturis accommodata.

CHALCITIDIS vnciæ quatuor, squamæ æris vnciæ
 duæ semis, æris cremati vncia, thuris vnciæ duæ, olei libra,
 ceti tantundem: coquantur metallica in oxelæo, dum ma-
 um non inquinent, inde thus adiicitur.

Melane Serapionis.

SPUMÆ argenti libra, ceræ vnciæ septem, guttæ ammo-
 iaci vnciæ tres & semis, galbani, æruginis, singulorum de-
 arii nouem, resinæ colophonix vnciæ septem, myrrhæ dra-
 hma, olei sesquihemina: argenti spuma cum oleo incoqui-
 ur quousq; digiti intincti non inquinentur, deinde adii-
 untur reliqua.

*Anicetos, ab insuperabili vi appellatum emplastrum, glu-
 tinat, discutit, squamas separat, et ad arti-
 culos recenti cicatrice contractos
 valet.*

BACCARVM lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū drach.
 exaginta, æris combusti drachmæ viginti, nitri, salis, am-
 monia

moniaci, singulorum drachmæ viginti, pyrethri, herbæ pediculariæ, seminis roris marini, granignidij, sinapis, columbari, stercoris, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorum drachmæ octo, aceti hemina duodecim: læuigantur sub æstu caniculæ, quousq; acetum consumatur, deinde decocti caricarum crassissimi vnciæ nouem adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccanturque, ubi vtendum est, pastillorum ipsorum vnciæ duæ læuigantur aceto miscentur, resinæ vnciæ tres, ceræ tyrrhenicæ vnciæ duæ, olei tantundem.

Emplastrum ex lolio, dia aron dicitur.

P I C I S libræ duæ, resinæ picæ vnciæ nouem, ceræ tyrrhenicæ vnciæ quinque, olei vnciæ tres, bituminis inceni vnciæ duæ, lolij farinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex liquore sycamini.

A R G E N T I spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum vnciæ octo, terebinthinæ vnciæ tres, ceræ vnciæ quinque, æruginis rasæ, opopanacis, galbani, singulorum vncia, olei ricinini, aut sulini, aut admodum veteris hemina, picis liquida tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

Emplastrum à duplici colore dichromon appellatum.

A E R I S combusti, aluminis scissilis, guttæ ammoniacæ, singulorum vncia, ceræ libra, resinæ colophonix libra, seu suilli libra, aceti, quod satis est.

*Inde conglutinans ad vlcera quæ serpendo depascunt,
& sanguinis spurium.*

C E R A E, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerusæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis, singulorum vnciæ sex, aceti quod satis est.

*Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumas
& podagras.*

R E S I N A E terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis iudaici, singulorum drachmæ trecentæ sexaginta, ceræ, baccharum lauri, guttæ ammoniacæ, aphronitri, seu vitulini, singulorum drachmæ trecentæ quadraginta, lapidis pyritis, calcis viuæ, singulorum drachmæ centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei veteris hemina duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. sit etiam sine cinere, quod

ad nonnulli eum auerfentur, & nihilominus etiam efficit.

Leana, siccatur, discutiturque.

UT FIMINIS ammoniaci, plumbaginis, singulorum
chmæ centum, sinapis drachmæ octo, chamæleontis ra-
is drachmæ sedecim, resinæ colophonix drachmæ cen-
n, squamæ aris, lanariæ radicis, singulorum drachmæ
nque, euphorbij, aruginis, singulorum drachmæ octo,
stolochix drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ octo, o-
veteris hemina, raphanini quantum sufficit.

*Aliter leana, noxia educit in superficiem, humo-
resq; euacuat.*

ATRAMENTI sutorij vnciæ duæ, auripigmenti vncia,
atri nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesqui-
achma, sandarachæ vnciæ tres, ceræ sesquilibra, resinæ
ctæ libra, olei heminæ duæ.

Macedonicum.

CERÆ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, lachrymæ
uris, pares portiones: eliquatis, ac sublatis ab igne lachry-
a thuris inspergitur.

Sphæron ad ardores.

CERVSÆ, argenti spumæ, calcis viuæ, singulorum vn-
æ tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarij, rosacei, singu-
orum vncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi
ormantur, quum vsus incidit, olei vncias sex liquato cum
uabus ceræ, adiicitoq; medicamenti vnciam & agitato: re-
rigeratum ex aquæ vncis nouem contundito, ego etiam
ernas rosacei vncias addo.

*Emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum sponte, tum
in iudicio tortis uloneum.*

OCHRÆ atticæ libræ duæ, cretæ libra, argenti spumæ
vnciæ octo, vino lauigatæ ceræ, resinæ colophonix, picis,
resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebinthinæ vnciæ
octo, olei libræ duæ, hunc in modum soluuntur: ceræ li-
bra, olei veteris libræ tres, medicamenti libra vino con-
tunduntur.

Emplastrum ex cedria, glutinat, discutit, abstergitq;.

CERÆ, picis aridæ, singulorum libra, resinæ colopho-
nix vnciæ octo, cedrini liquoris vnciæ sex: liquata simul in-
coquuntur, dum digitos non coinquinent.

Aliud emolliens.

CERÆ

CERAE, picis, singulorum vnciae octo, resinae colophoniae drachmae viginti quinque, propoleos drachmae septemdecim, cedrini liquoris drachmae viginti.

Emplastrum ex pumice, ad cicatricem ducendam.

MYRTEI librae duae, cerae libra, pumicis cremati vinoque; restincti drachmae sex, squamae ferri quod stomoma dicitur drachmae sex, aris vsti, cimoliae, singulorum drachmae quinque: super linamentum spongiamque; ex aqua accommodato.

Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.

CERAE, resinae colophoniae, nitri, singulorum libra.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.

NITRI costi vnciae tres, cerae, olei, resinae colophoniae, singulorum sesquidrachma, liquoris cyrenaeici aut medici drachmae decem: imponitur in linteolis, solutum.

Emplastrum ex anemone.

ANEMONAE vnguibus detractis vnciae duae, cerae vnciae quinque, olei vnciae quatuor, resinae vnciae quinque & semis, colophoniae resinae librae duae & semis.

Emplastrum Macherionis viride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus.

OPOPANACIS, galbani, aruginis, myrrhae, iridis, guttae ammoniaci, aristolochiae, singulorum vncia, resinae terebinthinae, cerae, olei omphacini, singulorum vnciae septem.

Viride aliud simplex.

RESINAE librae tres, cerae libra, aruginis rasae selibra, thuris drachmae viginti quinque, aceti quod satis est.

Aliud viride, ad humida vitia, & carnis excrescentias.

RESINAE colophoniae vnciae sex, aruginis rasae fescuncia, cerae vnciae duae, salis cappadocij vncia, rosacei vnciae duae, aceti quantum sufficit.

Pegana ad pleuriticos.

RVTAE viridis pondo, butyri sesquipondo, resinae terebinthinae pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanax quadrans, galbani tantundem, anethi podo.

Emplastrum dia stacles, hoc est, ex lixiuio, coxendicum doloribus, articularijs, & tumoribus aedema referentibus utile.

CERAE, olei veteris, lixiuij quod habet calcem admixtam, singulorum libra, resinae frictae, nitri alexandrini, nitri albi, resini

resinæ terebinthinæ, singulorum vnciæ sex: vtrunq; nitrum lixiuio teritur.

Emplastrum è nitro ad abscessus, scyrrhos, & tumores.

OLEI veteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuij, singulorum libra, resinæ terebinthinæ vnciæ sex, galbani, propolis, guttæ ammoniaci, singulorum vnciæ: præparatur quemadmodum superius.

Emplastrum ex sale, diahalon dicitur.

CERÆ vnciæ quatuor, olei libra, salis communis vnciæ quatuor, aphronitri tantundem, cerusæ vnciæ octo, aceti vnciæ duæ, ad arida conterenda. ALITER. Salis communis, nitri, singulorum vnciæ quatuor, ceræ, olei veteris, singulorum vnciæ sex, aquæ marinæ quod satis est.

Emplastrum diapternes, ex perna, tophos soluit.

PERNÆ suillæ veteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei veteris vaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est nauiis rasura, singulorum libra, medullæ ceruinæ vnciæ octo, hyssopicerati vnciæ tres, cyprini olei vnciæ sex, vini Aegyptij quod satis est.

Emplastrum diacinnabareos, hoc est, ex cinnabari ad tophos aliósque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.

ARGENTI spumæ libra, olei veteris sextarius, squamæ æris vncia, æris vsti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis viui vncia, lapidis phrygij drachmæ sex, lapidis pyritis, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum vncia, diphyrgis vnciæ duæ, aloës fescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis vncia, propolis libra scrupula vigintiocto, ceræ vnciæ septendecim, lapidis perdicitis vncia, (in alio perdicati habet) betonicæ vncia scrupula octo, gentianæ vncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drachmæ quatuor, chamæleontis nigri vncia, dictamni scrupula quadragintaduo, resinæ aridæ libra, seui struthiocameli libra: lapides cū spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec totum absumatur.

Emplastrum ex auellanis, dialeptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.

LIXIUII quod calcē habet adiectam vnciæ sex, auellannarum

narum partis interioris vnciae duae, aphronitri vnciae sex, olei veteris libra, saponis gallici vnciae quatuor, mellis vnciae octo, ouorum sex aquata, ceræ vnciae decem, resinae terebinthinæ vnciae duae: laeuigantur ex lixiuio.

Dia turpanes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

QUINTO Martij mensis die, olei communis sextarios duos leberi in domo subterranea infundito, coquitoq; lignis è vite: vbi inferbuerit, turpanæ marini piscis libram adicito, asphalacis animantis, quod nonnulli madamudam vocant, sanguinis vncias quatuor, incoquitoq; dum carnes piscis dissoluantur aut torrescant, deinde exemptis illis, olei & ceræ momentum adicito in spissitudinem, vt mollissimū fiat ceratum, quod linteolo illitum impones.

Emplastrum ex vrina muli, podagricis vtile.

VRINAE muli sextarij quatuor, argenti spumæ librae duae, olei veteris mystrum, trita diu omnia vt strigmenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

Emplastrum ex lapulis asij flore philagrij ad scyrrhos.

PEVCEDANI radices, asij lapidis floris, si non adsit, salis, guttae ammoniacæ, lanarum succidarum crematarum, singulorum vncia, aristolochiae rotundæ, pumicis, canini stercoris, æruginis rasæ, squamæ aris, misyos, singulorum scrupula octodecim, castorij tantūdem, myrrhae vnciae tres, aceti quādam acerrimi tantūdem, ceræ vnciae duodecim, & semis, resinae è picea, picis brutiæ, singulorum vnciae octodecim, semis scrupula sex, olei veteris quod sufficit.

Ex eodem Galeni.

CERAE, resinae terebinthinæ, singulorum libra, lapidis asij, mannae thuris, singulorum tres vnciae, cyprini vnciae duae, aqua lixiuæ quantum satis est.

Emplastrum ex salis flore, articularijs in declinatione accommodatum.

RESINAE terebinthinæ, resinae frictæ, resinae è picea, ceræ, singulorum libra, picis aridæ, aluminis scissilis, salis floris, singulorum selibra: coquuntur in lebetes.

Emplastrum quod nutriendæ vlcera carni est.

ROSACEI, resinae terebinthinæ, mellis, singulorum vnciae duae, cerusæ, butyri, singulorum vncia, alij etiam thuris vnciam addunt.

Empla

Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducendumque carnem.

ERINAEI (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem oleo excoctū proicito, cerę rufę quantum satis est in oleo liquefacito, in linamenta illito vtor.

Entaticon, quasi dicas intensorium.

SATYRII, pudendi ceruini, scinci caudę, singulorū drachmę duę, cruce seminis, pyrethri, seminis rorismarini, cerę, singulorū drachmę quatuor, resinę terebinthinę drachma, oua passerum troglodytarū tria, stelliones transmarini tres, olei laurini vel irini quod satis est: macerantur viui in aceto stelliones addies triginta, vase cui insunt in fimo defosso.

Chryse, cruentis vulneribus accommodata.

THVRIs, aluminis scissilis singuli sextantes, colophonię resinę libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, aceti cum oleo mixti, quod satis est.

Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamentum, Oribasij.

PICIs brutię libra, vncię quatuor, argenti spumę tantundem, thuris vncię octo, resinę terebinthinę vncię quinque, seui taurini libra, vncię quatuor, galbani, opopanacis, singulorum vncia, cerę vncię quatuor, olei veteris libra, aceti vncię quinque.

Catagmatice ad fracturas cum vulnere citraq; id factas, ex commentarijs Heracleti.

PICIs aridę mina, argenti spumę tantundem, mannę thuris minę dimidium, seui vitulini mina, cerę tyrrenicę vigintisex, opopanacis vncię octo, æruginis rasę, æris cyprij, singulorum minę quinque & decima eius portio, resinę terebinthinę sesquimina & quinta portio, æris vncia, ricinini, aut olei veteris hemina, aceti hemina semissis.

Liquidi hyssopi medicamenti preparatio.

SERTVLAE campanę vncię quatuor, cardamomi vncię duę, lanarum bene sordidarum vncię sex: macerata in vinū duobus sextarijs ad triduum incoquit o, dum paululum fuerit reliquum. his ablatis miscentur vino olei vncię tres, coquanturq; dum exiguum super sit, atq; vino etiā tunc adiunguntur resinę colophonię vncię decem, terebinthinę tantundem: nonnulli verò & cerę dextantem miscent, hyssopi herbę vnciam, alijsq; incoquant: alij lanas vino eluunt: vbi

R

desiccarint, vinum cum sordibus lanarum addunt, quas pi.
non etiam appellant quum vsus incidit, treis ex eo vncias
mittunt, tum reliqua vt comprehensum est.

De Malagmatis & epithematis.

CAP. XVIII.

INter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis corporis par-
tibus iniiciuntur, longa inflammatione cōstāntibus, aut
induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfrictionem fluxio-
nemve expertis: alia articulis quibus humores sint impa-
cti vel neruis refrigeratis, vel etiā aliis particulis scirrho ob-
sessis cōgruunt. de his igitur tum in capite de emplastris tra-
ctatum est, tum vbi ad acopa ventum erit differetur. Porro
inter malagmata mediis corporis regionibus accōmodata,
(epithemata propriè nuncupantur) quæ quidem stomacho,
& iocinori admoventur, qualiacunq; illa fuerint roboran-
tem ex astringentibus vim postulant. Sine his etenim vitæ
aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomachus &
iecur communes aliarum partium alimenti, sint officinæ.
Quamobrem eiusmodi medicamenta ex aromatis potissi-
mum conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si nō con-
coquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata
ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsocho, nardo, &
mastiche. Iecori autem ex myrobalano confecta, ammoniaco,
pinguibus, & chamæmelino. At lieni applicantur, quæ cō-
stant calce viuæ, auripigmento, cappari, salicibus, cardamo-
mo, erugine, ammoniaco, & aceto: iis autem qui alui fluo-
re laborant, ex cenanthe, alumine, melino, & aliis astringē-
tibus preparata. atq; hæc etiam per abusionem communiter
malagmata nominant, & si diuersam à molliendo vim re-
præsentent. Si verò ardor viscera vrgeat, in febribus arden-
tibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini
seminis, aut intybi, aut herbæ seminalis, adipe suillo, & spu-
ma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum,
casamum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur,
profunt astringentia siccantiq; ex alumine, salice, & bitu-
mine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lau-
ri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

Malagma ex fertula campana, dia meliloton dicitur.

C R O C I, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis,
myrrhæ, singulorum vnciæ duæ, fertulæ campanæ libra, stil-
læ ammoniacæ tantundem, ceræ libræ tres, resinæ terebin-
thinæ libra, olei cyprini libræ tres, gleucini, libræ duæ, bdellij
vncia

¶ vncie sex, nonnulli etiā cyphi vncias duas addunt, vini quod satis est.

Polyarchion ex commentario Galeni de compositione medicamentorum secundum locos.

CERAE, resinæ terebinthinæ, bdellij suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, fertulæ campanæ, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drachmæ vigintiquinque. olei cyprini hemina, vini Italici quod satis est: præparato ac vtitor, interim meraco, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

Aliter polyarchion.

XYLOBALSAMI, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellij, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum vncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres vnciæ, resinæ terebinthinæ libra, medullæ ceruinæ vnciæ duæ, ceræ libræ duæ, opobalsami vnciæ sex, vini vnciæ octo.

Philagrianum.

CROCIFESCUNCIA, aloës, ammoniaci thymiamatis, bdellij, styracis, singulæ vnciæ, adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini vnciæ sex, vini quod sufficit ad sicca lauiganda: per triduum macerantur mouenturq; rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, vino. Nonnulli cū croco etiam alias quinque myrrhæ vncias adiiciūt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni vero specierum facce in pastillos coacta siccataq; id habent quod crocomagma dicitur.

Mendesium.

DICTVM est Mendesium quod in Aegypto reperitur, vbi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balanini libram, aliàs sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorū vncias treis, resinæ terebinthinæ libram, in alio, sextarios decem, cinnamomi vncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitatur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus alijs septem mouetur, atque sic reconditur.

R 2

Marciatum.

MASTICHES, ceræ, styracis, singulorum vnciæ tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini, singulorū vnciæ tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ vncia.

Iniectio prima dia omphacos.

ASPALATHI, rudiculæ palmarum, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum vnciæ tres, olei omphacini libræ decem, vux immaturæ succi tantundem.

Iniectio secunda, ex caryophyllo.

AMMONIACI, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassami, singulorum vnciæ tres, in alio etiam habetur arnabo vnciæ tres, vini quod sufficit.

Iniectio tertia.

THVRISS, guttæ ammoniaci, styracis, bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorum vnciæ tres, vini quod satis est, ceræ albæ vnciæ quinq; opobalsami vnciæ sex, nonnulli vncias octo. Primæ iniectionis medicamenta, pridie in vux acerbæ succo oléoq; macerantur, secundæ seorsim in vino aminæo aut alio vereri ac odorato, mouenturq; quotidie rudicula palmea: tertiæ ad triduum, post quod in cacabo nitente primæ iniectionis primæ medicamenta incoquantur, quousq; paulillum succi vux acerbæ relictū fuerit: mox secundæ iniectionis species cū vino immittuntur, rectius autē fiet si prius aliis exemptis, puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturq; donec paululum vini super sit, ne aduratur oleū: sublata ab igne eximito, superq; adicito rursus oleo puro tertiæ iniectionis medicamenta, prius ex vino in pila soluta præter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum aliis inditus promptè soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi videantur: sublata ab igne refrigerari finito, insequenti die exceptis diligenter ex oleo calfactisque abundè super ignē ceram adicito, inde sublata rudicula agitato, vbi refrixerint, opobalsamum admisceto, & vitreis vasis reponito.

Gleucinum, iniectionis prima.

OLEI sextarij decē, musti aminæi sextarij sex, aspalathi vnciæ quatuor, palmæ fructus operimenti quod spathe dicitur vnciæ sex, iunci rotundi floris tantundem, fertulæ campanæ

panæ vnciæ quatuor, rosarum vncia, myrrhæ vnciæ tres, foliorum lauri vnciæ duæ, arboris thuris vnciæ sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ vnciæ sex, aristolochiæ longæ vnciæ tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto.

Altera iniectio.

NARDI gallicæ vnciæ quatuor, casami, qui est balsami fructus vnciæ duæ, cyperi, casia, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum vnciæ tres, calami aromatici, caryophylli, phylli, singulorum vncia, cardamomi vnciæ quatuor, balsamum vino odorato madescit.

Iniectio tertia.

MASTICHES triens, myrrhæ troglodytica, bdellij, singuli sextantes, ladani quadrans styracis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantē addunt, præparatur quemadmodum medicamentum ex vna acerba, nisi quod cerā nō recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionū macerari.

Nardus cizicine, iniectio prima.

OLEI primi meriti sextarij decem, aspalathi, cypiarum, inulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum vnciæ sex, sampsuchi vnciæ quatuor, herbæ sabinae vnciæ duæ, nonnulli & calami odorati vncias duas immittunt: hæc in vini odorati sextariis quaternis commadescunt.

Altera iniectio.

CASSIÆ, casami, arnabo, singulorum vnciæ duæ, spicæ nardi vnciæ tres, caryophylli vncia, costi, amomi, singulorum vnciæ duæ, nonnulli etiam nardi gallicæ vncias duas addunt, atque hæc in vino macerantur.

Tertia iniectio.

MYRRHÆ troglodytica, aloës, thuris, singulorum vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastiches vnciæ quatuor, opobalsami vnciæ sex, quidam & croci vino læuigati vnciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

Decamyron.

SPICÆ nardi, phylli, euphorhij, piperis, costi, adarces, singulorum vncia, mastiches fescuncia, opobalsami vnciæ sex, nardini libra, ceræ libræ tres.

Pentamyron.

STIRACIS vncia, mastishes vnciæ duæ, ceræ albæ vn-

ciatres, opopanacis vncie quatuor, nardini vncie quinque.

Euodes, à grato odore dictum.

CROCI, aloës, mastiches, absinthij, styracis, ænanthæ, casami, caryophylli, singulorum vncie tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini vncie sex, palmulæ duodecim, vini quod satis est.

Baion.

CARDAMOMI, cassiæ, ænanthæ, nardi gallicæ, balau-
stiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabine,
casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi flo-
ris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli
sesquiscrupulum, suffiminis Crinati vncie duæ, thuris, myr-
rhæ, singulorum vncia, ladani vncie sex, bdellij, mastiches,
aloës, nardi, olei lentiscini, singulorū semuncia, resinæ acer-
næ quæ zygia dicitur, resinæ piceæ, resinæ terebinthinæ, sin-
gulorum vncie tres, opobalsami vncia, guttæ ammoniaci
scrupula sex, ceræ vncie sex: ænanthino liquida læuigatur,
aridaq; contusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula
octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum vnum
addunt.

Galenium.

CROCI semuncia, aloës vncia, mastiches tres vncie,
absinthij seminis scrupula octo, ænanthes tantundem, pal-
mulæ maiores tres, ceræ vncie tres, olei melini vncie sex.

Erythrium.

STYRACIS vncie quinque, malorum cotoneorum
vncie viginti, masuchæ vel masuaphij, croci, singulorum
drachmæ decem, psichæ, cyphios, singulorum drachmæ quin-
que, ænanthæ vncie duæ semis, casami, absinthij, singulorum
drachmæ decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ
ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & se-
mis, nardi vncie quinque, resinæ colophonæ, gleucini, me-
lini, singulorum vncie decem, rosacei drachmæ decem, pro-
polis vncie quinque, resinæ terebinthinæ vncie decem, mel-
lis cochlearia decem, phylli drachmæ decem, spicæ nardi tan-
tundem, ceræ vncie septem & semis: vino falerno aut ami-
næo conteruntur.

Malagma Nili ad lienem, omnemq; duritiem.

CERÆ pōdo, guttæ ammoniaci pōdo, olei cyprini pon-
do, croci semuncia, secundū alios vncia, aceti quātū satis est.

Citr

Cūrium.

CERAE resinæ, colophonæ, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, lauigantur arida in aceto.

Malagma quod ad Cūrium autorem refertur.

PICIS aridæ libra, ceræ, resinæ piceæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seu taurini, singulorum libræ duæ, farinæ fœnugræci sextarius, pollinis frumentacci tantundem, chamæleotis nigri radicis siccæ libra.

Malagma ex stercore caprillo Oribasij, ad lienosos, hydropicos, & iecur induratum.

CYPRINI, aut vetustissimi olei libræ tres, ceræ libræ duæ semis, simi caprarū, baccarū lauri cortice detracto, iris illyricæ, singulorum sextarij decem, resinæ terebinthinæ libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radicis corticis, singulorum vnciæ tres, cucurbitæ sylvestris carnis vnciæ duæ, fœnugræci vncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si alius profluat, cucurbita iniici non debet.

Ex simo caprillo sphongion, hydropicis efficax.

PICIS brutæ libræ duæ semis, nitri libra vna, cucurbitæ sylvestris carnis, pyrethri, opopanacis, cocci gnidij, singulorum vnciæ tres, capparis radicis corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterij, squamæ aris, apij seminis, lathyridum, singulorum vnciæ sex, baccarum lauri sextarij dimidium, fœnugræci farinæ semūncia, fellis taurini vnciæ duæ, olei cyprini sextarij dimidium, ceræ libra, resinæ frictæ libræ tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyper, cardamomi, singulorum vnciæ sex.

Ex baccis lauri.

CERAE, resinæ, picis, baccarum lauri, seu taurini, singulorum libra, nitri, guttæ ammoniacæ singulorum vnciæ sex, aceti quantum sufficit.

Medicamentum dia spermaton, hoc est, ex seminibus.

CARDAMOMI, cyperi, herbæ sabine, nitri, baccarum lauri, cassiæ, fertulæ campanæ, fœnugræci, nardi gallicæ, apij seminis, sampsuchi, anisi, panacis radicis, thuris, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum vnciæ tres, mellis, ceræ, nardi, singulorum libra, seu taurini tantundem.

R 4

Malagma à fædo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.

RESINAE piceae libra ceræ, rutæ viridis, cyprini, singulorum vnciæ sex, sulfuris viui, opopanacis, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

Malagma dia sampsychu.

CERAE pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsichi, bacarum lauri, fœnugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

Malagma apollophanis ad iecorosos.

CERAE drachmæ octoginta, resinæ terebinthinæ, mannae thuris, singulorum drachmæ quadraginta, mortario irini sedimento vincto contunduntur.

Copton ad duritiem stomachi & iecinoris.

PROPOLIS vnciæ sex, styracis vnciæ duæ, mastiches vnciæ, resinæ terebinthinæ semuncia, facis nardini quantum satis est.

Malagma ex ænanthe.

OENANTHAE, aloës, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthij succi, gallæ, omphacij, rhus syriaci, mannae thuris, singulorum drachma, olei myrtei, ceræ, vtriusq; libra, palmulæ magnæ quinque, vini quod sufficit.

Antylium.

ALUMINIS scissilis semuncia, aloës vnciæ, mastiches scrupulum, ænanthes scrupula sex, omphacij scrupula octo rosarum siccarum tantundem, rhus syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ totidem, balaustiorum scrupula viginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ vnciæ quinque, olei melini quod sufficit.

Malagma ex vinaceis, dia zigarton dicitur.

CROCI, sandycis, labruscæ, singulorum vnciæ, aluminis sicci vnciæ quatuor, balaustiorum, omphacij, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum vnciæ duæ, ceræ albæ libra, olei melini libræ duæ, malorum cotoneorum vnciæ quatuor, dactyli qui nycolai dicuntur decem, vini aminæ quod satis est, vinaceorum aridorum vnciæ octo. in vsu, medicamenti vnciis tribus, ceræ vnam misces.

Anethine.

ANETHI viridis vnciæ sex, fertulæ campanæ vnciæ duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris viridum decem excoctorum iuris libræ tres, & olei quod sufficit: vbi verò consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis libræ duæ addun

duntur, tritisq; priuatim scillæ tostæ interioris vnciis duabus & medullæ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

Ambrosia ad febreis arcendas apta.

ARGENTI spumæ libra, adipis suilli recentis vnciæ sex, lini seminis succi tantundem, ceræ albæ vnciæ nouem, rosacei libra, mellis vnciæ tres, croci vncia, nonnulli etiam ouorum decem lutea cruda addunt.

De acopis, inunctionibus, dropacibus, & sinapismis.

CAP. XIX.

ACopa inde nomen sortiuntur, quod præcipuè ad lassitudinis, quæ copos græcè dicitur, nempe tensuæ vlcerosæ & eius quæ ossa defatigat, sensum conueniant, quam aliis quoq; morbis compluribus sint ex usu. †Alia siquidem ipsorum calefaciendi vim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & consimilibus constant neruorum vitiis, perfrictionibus validis & quæ vix vlllo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliunt, durities, scirrhus, & infarctos articulorum sinus discutiunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, semine rorismarini, euphorbio, cocco gnidio, & id genus aliis cõponuntur, in diuturnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, quibus etiã sinapismus cõgruit, vtimur. Porro spissitudinem vniuersa acopa inter cerata & emplastra mediam habere conuenit. Vngui- na vero acopis similia, liquidiorum propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt: materiam verò acopis & emplastris cõfinè. Caterum vsum cataplasmatum exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, vt affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem variam non habet, verum diuturnis potissimum affectibus post deprehensam probatamque aliorum præsidiorum vim, efficacissimus est, utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur. Græci heterocraniam vocant, in morbo comitiali, vertiginibus, & infania: pectori autem in suspirio, orthopnœa, hoc est, quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in

R 5

diuturna humorum ē capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & venter in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est praesidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omniq; parti resoluta, aut alio quodam modo perfrictione experta, vt difficulter exalheri possit. At tunc profecisse satis id putato, vbi dolor subsequutus fuerit validus & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulae eruperint. Quod si etia sensus perierit, animu adhibere negotio conuenit, parte qua obliueris scipius detecta: na si vel immodice aduratur ita affecti non persentiscunt. Preterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catotocho, sinapi inducitur, per initia quide, cruribus, vbi vero materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt vt vix villo modo queant incalescere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua febre laborant, vlcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, vtari debet sinapisimus: nam partes carnis vacuae si obducantur sinapi, vruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hae verba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ δριμύτην τὰ δὲ μέλαινα τὰ δὲ ἀμύτην. Orosius tamen legendum putat ἀμύτην.

Bromion acopon.

C E R A E, resinae colophonae, singulorum libra, adipis suilli vncia quatuor, butyri vncia sex, althaeae, foenugraeci, seminis lini, singulorum librae duae, olei libra, galbani vnciae duae & semissis, excocto succo cum oleo quousque magna illius pars fuerit absumpsa, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

Acopon à varietate pæcilon dictum.

S V C C I althaeae, foenugraeci, seminis lini, rutae, cumini, singulorum librae duae, medullae ceruinæ, olei veteris, adipis anserini, opobalsami, nardi, singulorum libra, cerae, colophonae & resinae, singulorum sesquilibra, euphorbij, resina terebinthinae, opopanax, singulorum vnciae sex, castorij vnciae tres, herbarum vnde succus exprimitur, singularum libra iniicietur: coques vt superius

Acopon A Zanite.

A D I P I S suilli librae duae, seui taurini, resinae colophonae,

nia, hyssopi medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani vnciæ tres.

Acopon Basilij.

ALTHAEAE, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis fœnugræci, singulorum sescuncia, amomi vnciæ tres: hæc macerantur in vini Ascalonij aut Cilicij sextariis octo, per triduum, coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi libræ quinq; cū olei veteris libris quatuor & semisse decoquuntur, quousq; modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri vnciæ sex, resinæ terebinthinæ vnciæ quatuor, adipis anserini vnciæ quindecim, medullæ ceruinæ cum momento olei lauigatæ vnciæ quinq; ceræ albæ libræ tres.

Lysiponium.

PIPERIS, castorij, styracis, mastiches, aloës, inulæ campanæ, iridis, singulorum vnciæ quatuor, euphorbij, costi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, casisæ fistulæ, semen rorismarini, singulorum vnciæ tres, adarcæ, amomi, bdellij, xylobalsami, singulorum vnciæ duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum vncia, opobalsami, libra, nardini, cyprini, gleucini, singulorum libræ duæ, ceræ libra.

Acopon à sædo odore dysodes appellatum, ex opere de compositione medicamentorum secundum genera.

CERAE, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ vigintiquatuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorū drachmæ sex, olei veteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drachmæ octo: vitior mero & diluto.

Aliud dysodes.

RESINAE terebinthinæ drachmæ sedecim, ceræ drachmæ viginti octo, æsypi, mellis, singulorū drachmæ sex, medullæ ceruinæ vnciæ sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphro-nitri, baccarum lauri, singulorum vnciæ sex, olei veteris sextarius, vini cyathi duo, quidam etiam castorij drachmas treis admiscunt.

Barbaricum, dia euphorbiæ, ad coxendicum dolores, & alia pleraq;.

OPOFANACIS vncia, ceræ tyrrhenicæ libra, resinæ terebinthinæ libræ duæ & semis, galbani vncia, stillæ ammoniacæ vnciæ duæ, euphorbij, castorij, piperis albi, singulorū vnciæ duæ, medullæ ceruinæ vnciæ quatuor, æsypi rātundem, lemnestidis (est autem adarcæ) semuncia, olei styracini, laurini, irini, amaricini, singulorum vnciæ sex, olei veteris libræ duæ, hedychroi vnciæ sex.

Acopon

Acopon cui nomen est pyxis.

R E S I N A E colophonix sesquilibra, resina terebinthinae vncia octo, gutta ammoniaci vncia tres, thuris vncia novem, olei veteris librae duae, succi lini seminis libra, lactis vaccini tantundem, adipis anserini vnciae sex, butyri vnciae octo, ouorum vigintiquatuor albumina, praeparatum buxco vase reponitur.

Acopon ex abiete Galeni.

A B I E T I S seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarij duodecim, olei librae quindecim, cerae librae quatuor, resinae strobilinae aut terebinthinae vnciae quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo fueris, expressum proiicito, mixtis reliquis vtor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas urgeat coquere oportet semen abietis cum oleo mixtum, ne nimium aduratur, & aquae sextariis quatuor, idque in podagricis & articularis affectibus.

Aliud ad idem.

O L E I heminae vigintiquinque, id est, sextarij duodecim & semis. fructus abietis modius, hoc est, libra semis, resinae abiegnae librae tres, strobilinae vel terebinthinae librae tres, cerae libra.

Acopon ex nigra populo, dia aegyros dicitur, ad eadem.

L O C O fructus abietis, nigrae populi fructus aqua portio additur, & reliqua similiter illi praeparantur.

Vnguentum Rosini ad tremulos celebratum.

R E S I N A E piceae vnciae sedecim, cerae vnciae quatuor, olei veteris libra, opopanax vnciae duae, adarcae vncia, euphorbij tantundem, nitri vnciae quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarce cum vino laevigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in laeuorem teritur, seorsim autem quae liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

Dropae Gallus, Onbasij.

R E S I N A E colophonix quae thus redolet, piceae & ligno sae dictae quae sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridae, cerae, singulorum librae quatuor, resinae frictae vnciae quindecim, picis brutiae librae duae, nitri libra, bituminis, galbani, adarcae, pyrethri, singulorum vnciae sex, opopanax, euphorbij, veratri albi, piperis, singulorum vnciae quatuor, sulfu

sulfuris viui vnciæ tres, castorij, ammoniaci, vna passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorum vnciæ duæ, olei sicyonij libra, opobalsami vnciæ sex.

Aliter simplex.

CERAE pondo, picis siccae pondo, picis brutiæ pondo, resinæ piceæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

Quomodo sinapismus fiat.

FICUS siccatae pridie in aqua tepida macerari debent, die insequentiprobe expressæ valenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & siquidem vehementem sinapismum voluerimus inducere, parteis duas sinapis cum vna ficuum temperabimus: sin imbecillem, econtrario: si mediocrem, æqualeis. Caterum sinapi antequam deteratur, aceto commadescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor vehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut fœnugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibebitur, ut sepius partem retegamus, inspiciamusque. Quum enim admota non percipiant, sæpe immodicè exusti sunt. Item caprarum simus cum aceto illitus sinapi est efficacior, & præsertim in coxendicum doloribus.

Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens, idq; potissimum in ijs, quibus altera capitis pars dolet, ex commentarijs Alexandri.

EUPHORBII, atramenti librarij, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorum vnciæ tres, croci drachmæ duæ, aceti quod satis est ad hæc probè læuiganda, utq; spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorum parte incipiens, ad usque tempora tota, præsertim si ager pilis careat: vbi refrigerata fuerint, rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

Quomodo diuersa olei & vnguentorum genera conficiantur.

C A P. X X.

INunctionum vnguentorumq; vel olei generum quæ vnguenta representent, alia sunt simplicia, vna olei specie inieci

inietta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, verbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinum. Quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædam ex surculis quibusdā nempe rutæ, qui etiam simul cum oleo coquuntur. At cum nullus florum coctionem recipiat, insolantur potius. verum si validam odoris gratiam repræsentent, & pluribus diebus constantē, ex insolatu tenuius ipsorum oleum magisque utile redditur, quemadmodum rosaceum & chamæmelinū. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffari possunt, minus insolatū tolerant, ut quorum virtus promptē evanescat, utpote liliū & viola. Ex iis quæ fructibus & seminibus constant nonnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, veluti melinum, nonnulla contusis vel læuigatis, oleamine ipsorum sequestrato, vel expressis ipsis in conchulas: vel ex aqua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryinon, sesaminum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ricininum, raphaninum, atq; eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis oleo incoctis cum vino vel misto, vel aqua, atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus autem quibusdam oleo contemperatis, interim & adipibus vel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinem sortita, simplici sermone vnguenta vel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium & cyprinum. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiā recipientia, vocanturq; myracopa, veluti decamyron, amara cinum, atq; his similia. Iam vero aliqua vna vice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastychinum, sicyonium: aliqua duabus tribusve, & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autem eueniat, cera quoque & resinis inditis. At balsami liquor neutiquam coquitur, sed post absolutam coctionem vnguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis vnguentis sunt quæ nullam coctionē recipiant, sed tantum misceantur, quale est mendesium. Nonnulli verò viride vnguentū reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerint, in olei sextariū intingunt, æruginis rasæ in extuma

tum detritæ lauorem fescunciam, immiscentes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Ceterum simplicia quidem vnguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam vel eorum ex quibus contulis facta sunt, obtinent, ut oleum veluti materię rationem obtineat. At quæ variam magis compositionem sortita sunt, tota eorū natura ad calidum inclinata est, sed quædam valide calefaciunt emolliuntq; , ut etiam articulis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis conueniant, veluti metopium, mendesium, marcium: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodū decamyron valentius ut etiam summa rodat: mediocriter autem calida tenuiaq; dico. At verò modicè calida extenuant leniunt & concoquunt, quale est fusinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatinum. Alia præterquàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq; , veluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidè insigniter, sed vires magis confirmant, vnde stomacho potissimum & visceribus resolutis competunt, qualia habentur mastychinum, nardinum, & gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex vua acerba conficitur. Iam nonnullis vnguentis ob gratū duntaxat odorē vtuntur, ut foliato, spicato, commogeno & quæ moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nuncupantur.

Rosacei confectio.

ROSARVM rubrarum detractis vnguibus marcescentium die nocteq; vna, vnciæ tres, olei omphacini sextarius, vna diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub dio diebus quadraginta, atq; sic repones non in pauimento, sed assere. Aliqui vero vice insolatus in puteum vnam diebus quadraginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conseruetur. Alij vero ipsam sub terra defodiunt.

Chamæmelinon.

CHAMÆMELI floris sine albis foliis marcescentis, per diem noctemq; vnā olei sextarius Italicus. vase lintheo simplici contecto ut perspiret, insolatur, idq; diebus quadraginta, inde securè hoc percolatum repones.

Anethinum.

ANETHI viridis comæ arefactæ vncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur, ficci enim anethi comam decoquentes cum oleo in cacabo vtuntur,

tur, & chamæmelino similiter: verum hæc imbecilliora sunt
iis quæ ex viridibus fiunt & præsertim insolatis.

Liliaceum alijs susinum dicunt, quod in Susis forsan reperitur.

FOLIORVM alborum liliorum similiter marcescētium
vnciæ duæ in olei sextarium Italicum, coniectæ exactè cir-
cumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur,
inde primis exemptis proiectisq; , aliæ duæ vnciæ iniciun-
tur per triduum subsequens, atq; sic reponuntur.

Susinum compositum.

O L E I sextarij tres, calami odorati libræ quinque, myr-
rhæ vnciæ quinque, cardamomi libræ tres, lilij foliorū vn-
guibus ablatis arefactorū libra, cinnamomi vnciæ tres, cro-
ci cilicij vnciæ quinque: tota confectio tribus injectionibus
distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, vino
ad dies quinque macerata ter die mouentur, inde oleo mo-
dicè incoquuntur, deinde cardamomū aqua maceratum tri-
duo mouetur, similiterq; rursus cum oleo ad horam vnā
incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem o-
leo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis
reliqua liliorum tertia portio immittetur, iterumq; post tri-
duum exemptis proiectisq; primis, postremo tertia pars cū
croco læuigata inicietur. Secundum alios tres dies ablato
oleo cinnamomum contusum indetur. Huius in vicem, Ar-
nabo, aut carpesium, aut cassiæ duplicatum, atq; reponetur.

Violaceum.

V I O L A C E V M præparant, modò purpurearum, modò
crocearum, modò candidarum violarum foliis vngue dese-
cto, trium vnciarum pondere coniectis in olei omphacini
sextarios quinque Italicos: circumstricta exactè, ne perspi-
rent, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad
triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pau-
ca iniciunt exactè arida.

Melinum.

H O C efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo
inuolutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde
vnciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Ita-
licos coniectis, atq; quadraginta dies insolatis.

Sesaminum.

S E S A M I N V M oleum fit, contusis vel læuigatis sesamis,
expressisq; per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua ca-
lida

lida segregato, vasisq; vitreis reposito.

Raphaninum.

EODEM modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoq;.

Ricinum, siue cicinum.

HOC quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut laeuigato.

Aegirinum.

VERNO tempore oleum fit Aegirinum, hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etenim grana populi contusa vncijs quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, vel horis tribus in lebetes decoquunt, atque sic exempta reponunt.

Amygdalinum.

CONFICITVR hoc quoque sicut praedictum, amygdalis amaris ijsq; puris, cotusis, aqua modica irroratis separatisq; vt comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala vncijs duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquunt.

Amygdalinum, quod & metopion dicitur.

AEgypti huius olei inuectores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem vnde galbanum nascitur, metopion appellatur. Haec recipit, olei omphacini sextarios viginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhae, galbani, singulorum vncias sex, resinae terebinthinae, libras duas, vini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: refinam & galbanum in lauorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adijciemus, necnon ipsum mel: Mixta vero accuratè omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

Balaninum.

BALANINVM oleū perinde vt simplex amygdalinum praeparatur, ex querneis glandibus.

Caryinum.

HOC quoque vt supra dictū ex vetustis nucibus conficitur.

Laurinum.

PVRVM quidem laurinum simili ratione & lauri fructu confit, mixtum vero haec recipiet: maturarum oliuarū sexta

rium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimunturq; . Nonnulli æqualem amborum portionem miscent.

Lentiscinum.

LENTISCINVM oleum laurini modo ex lētisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

Mastichinum.

MASTICHINVM simplicissimum quidem fit, chix mastiches vncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta; in cacabo. Nonnulli verò absinthij & styracis, singulorum vnciam adiungunt.

Mastichinum magis varium.

OLEI sextarij quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinque, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthij comæ libra, vini odorati sextarij quinque, aquæ sextarii decem, arida vino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquuntur, ac mastiche & terebinthina iniicitur: accuratè mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

Sicyonium simplex.

RADIX cucumeris sylvestris marcida duarū vnciarum pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atq; in lebece coquitur, fitq; sicyonium.

Sicyonium compositum.

OLEI sextarij decem, cucumis sylvestris radicis derafæ pondo, serpylli, fertulæ campanæ singulorum vnciæ sex, tedarum piceæ pinguium, althææ singulorum vnciæ quinque, scolopendriæ vnciæ sex, fœnugræi sextarij duo. Fœnugræcum aqua primum die vno prius commadesceat, deinde exemptum inditur commemoratis vnâ cum oleo, & vini sextariis duobus, omnibusq; incoctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ vnciæ quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud vas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

Aliud sicyonium efficacius.

ELATERII succi sextarij tres, aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ sylvestris,

nestris, pulegij, origani, cyperi, thuris arboris, centaurij, foliorum lauri, singulorum vnciæ duæ, olei sextarij quinque. Mistâ incoquito dum parum succi relictum fuerit.

Cyprinum ex commentarijs Posidonij.

OLEI sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, viticis seminis, eleliphaci, singulorum vnciæ tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in vino macerata coquuntur cum oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus inijcitur. Siquidem adsit viridis cum teneris virgultis non concisis, sin minus, certè aridus contusus cum aquæ momento coquetur sesquihora. At si voles ipsum tingere postquam ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sesquilibrâ. Posidonius autem acrimoniam æruginis vitans, à coctione (inquit) triduum dimittes oleum in cacabo bene humido, & tingetur ita ut virtus ipsius non offendatur.

Alia scriptura cyprini.

CYPERI foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, eleliphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ lōgæ, viticis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ, aspalathi, singulorum vnciæ sex, rutæ vnciæ duæ, cupressi vnciæ duæ, olei sextarij decē. Hęc prius vino madefacta, incoques oleo. vbi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocassii singulorum vncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum vncias tres, opopanacis vncias duas, iunci quadrati floris vncias sex, æruginis vnciam.

Amaracinum.

INVLÆ campanæ pondo, xylobalsami libræ viginti, cyperi libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sabinae singulorum libræ octo, opopanacis, amaraci seminis singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarij duo, vini odorati sextarij quinque. Alia omnia superius dicta primâ iniectionem habent vino prius macerata, secundâ herba sabina, atque illa quidem horis sex incoquuntur. hoc autem tribus. nonnulli etiam hoc tingentes æruginis vncias tres inijciunt.

Irinum.

IRIDIS, aspalathi, cyperi singulorum libræ quinque, opopanacis vnciæ tres, anchusæ vnciæ duæ, olei sextarij triginta, aquæ sextarij quindecim. Sūt qui adijciāt iunci rotundi floris vncias sex, cassiæ vncias tres, xylobalsami vncias sex,

nardi gallicæ, tantundem, omnia contusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebere ad sex horas: reponiturq; vnguentum.

Crocinum, in quo et alterius crocomagmatis confectura explicatur.

OLEI omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorum vnciæ quinque, cardamomi vnciæ septem, croci cilicij vnciæ sex. primum iniiciatur calamus & myrrha vino lauigata, & ante vnciæ modo reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cribrataq; teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. vt autem medicamentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos detritosq; in mortario adiecito: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

De œnantharijs.

CAP. XXI.

NON quodd ænanthen, hoc est, labruscam habeant hæc, (nonnulli enim ne ænanthen quidem recipiunt) sed ex vino & flore liliorum nomē hoc sortita sunt. Vfus ænanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, sic vt qui eis vtuntur, à lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui rectè vtuntur, etiam fiunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatis admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili recolligunt, vbi lauacro egrediantur per totum corpus diffundentur: naribusq; admouebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur enim in altum, & spiritum animale, vitalemq; confirmat. Adhæc vtilia sunt ad morbum pestiferum vitandum, cum eiusmodi mutationem aer sustinet. Refertur autem huiusmodi vnguētum ad Posidonium authorem, à quo vocatur mesopotamenon.

Oenanthini confectio.

CASSIÆ, myrrhæ, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singulorum vnciæ tres, styraeis pinguis vnciæ quatuor, vini odorati aminæ, Italici sextarij decem, contusa omnia, cribrataq; styracem vero minutim concisum composito in vrnâ oris ampli, cum foliis liliorum pridie refrigeratorum, è domo vna in alteram & vnguibus detractis, sint autē lilia numero trecenta. deinde vinum adiicitur, & opobalsamū, mista, commotaq; ante iniectionem,

tionem, & constrictio vrnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei vsus est in virium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur vnguento, vasaq;, & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

Alia confectio, nostra.

COSTI vnciæ tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorum vncia, amomi vnciæ tres, cassiæ, cænāthes, calami, singulorum vnciæ nouem, styracis, opobalsami, singulorum vnciæ quatuor, lilia trecenta, vini falerni sextarij decem. Simili modo præparatur.

De suffimentis & cyphi.

CAP. XXII.

CYPHIS materia inter medicamenta quæ potuit dantur & antidota existit. vsus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admoventur, vt destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq;, & obstructione liberet, purgetq; cerebri ventriculos, item pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoque assumitur, tum ad hæc, tum ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda: nec non ad frigidiores iecoris affectus, vnde & Cyphoide appellata Antidota veteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipuè epithematis & antidotis.

Rosatum suffimen.

COSTI, amomi, myrrhæ, cassiæ, singulorum vncia, styracis, chiæ, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drachmæ duæ, rosarum purarum vnciæ vigintinouem, opobalsami modicum, vini quod sufficit.

Suffimen lirinum: quod crinatorum dicunt.

LILIORVM vngue defecto libra, styracis primæ notæ, vnciæ nouem, spicæ nardi, vnciæ tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchulæ Indicæ combustæ, mellis, singulorum fescuncia, opobalsami vnciæ quinque, vini quantum satis est, læuigata coguntur in pastillos.

Cyphi magnum quod vocant solare, ex rebus triginta sex confectum.

STYRACIS, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulorum vnciæ sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ ammoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum Indicarum maiorum, carpobalsami, singulorum vnciæ tres, cassiæ, iridis, fescelis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorum vnciæ quinque, rosarum sicca-

rum, croci, spicae nardi, herbae sabinae, hastulae regiae radices (alii succi) singulorum vnciae quatuor, lacapthi, hoc est, piceae corticis vel alterius cuiusdam arboris vnciae nouem, costi, iunci rotundi floris, singulorum vnciae duae, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta, amomi, resinae terebinthinae, palmularum purarum, singulorum libra, ficuum siccatarum granis exemptis, vuarum passerarum acinis ablatis, singulorum librae duae, mellis despumati librae quinque. Posidonius etiam vini odorati sextarios treis adicit.

Aliud cyphi, quod rebus viginti octo constat lunare appellatum.

BDELLII, inulae campanae, singulorum vnciae septem, iunci rotundi vnciae duae, sphagni vnciae quinque, iuniperi minores quinquaginta, cardamomi vnciae quinque, aspalathi vnciae septem, casiae fistulae vnciae quinque, spicae nardi vnciae duae, cyperi vnciae quinque, hastulae regiae radices, herbae sabinae, singulorum vnciae quatuor, cupressi seminis, nardi gallica, malabathricum foliis, rosarum siccatarum singulorum vnciae tres, costi, croci, singulorum vnciae duae, ladani, myrrhae, singulorum vnciae septem, caricarum pinguium, vuarum passerarum, acinis exemptis, singulorum librae duae, strobilorum vnciae octo, resinae terebinthinae libra, styracis vnciae septem, palmularum pinguium libra, mellis librae quinque, vini odorati quantum satis est.

Confectio masucha, quod nonnullis masuaphion vocatur.

CAP. XXIII.

Meliloti sextans, xylobal sami, aspalathi, herbae sabinae, myrrhae, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri, myrrhae stillatitiae, styracis, calami odorati, sampsuchi, singulorum vnciae duae, iridis vnciae quinque, phylli, croci, singulorum vncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccatarum vnciae sex, vini quantum sufficit.

Ex commentarijs Antylli, de peſſis. CAP. XXIIII.

Pessis mulierum locis admouentur, caeterum generales pipiforum differentiae tres existunt, alij siquidem emolliunt, alij astringunt, alij aperiunt. Emollientes inflammationibus vteri, exulcerationi, perfriktioni, strangulatu, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, fusino, pinguedine anseris aut gallinae, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, foenugraeco

&

& quæ sunt eius generis. Aperientibus vtimur, quum purgationem suppressam irritare statuimus, aut vuluam conuenientem compressamve emendare. Præparantur hi ex melle, artemisia, dictamno, brassica, succo dulcis radiculae, porro, succo rutæ, scammonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus vsum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & adaperitum contrahunt vterum, prolapsumq; reprimunt. Materia verò astringentium prius in capite de collyriorum etiam modo comprehensa est. Caterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulò spissiore facere, deinde lanam linamento tortili similem, duplicatam in medicamentum tinctam ori vuluæ condere, sic vt stuppam prælongam habeat alligatam, quo pessus facile possit extrahi, quando visum fuerit.

*Pessus crocodes, ad inflammationes, auersiones, duritias
& inflationes*

CERAE albæ, medullæ vitulinae, singulorum drachmæ sedecim, medullæ ceruinæ drachmæ vndecim, adipis anserini drachmæ octo, adipis gallinæ drachmæ octo, mastiches drachmæ quatuor, hyssopi medicamenti drachmæ tres, mellis drachmæ duæ, croci drachmæ octo, rosacei quod satis est: crocus lacte muliebri læuigatur.

*Pessus ab aureo colore dictus chrysos emolliens
laudatissimus.*

CROCI drachma, cœsypi tantundem, medullæ ceruinæ drachmæ duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorum drachmæ tres, ouorum tostorum lutea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

Pessus libanius, menses euocans & vuluæ vitij singulariter accommodus.

NARDINI vnguenti vnciæ sex, ceræ tyrrhenicæ vnciæ quinq; susini vnguenti vnciæ quatuor, adipis suilli recentis vnciæ tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini vnguenti, singulorum vnciæ duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, cœsypi, singulorum vncia: lebere eliquantur, omnesq; reliqui pessi.

Enneapharmacus.

ROSACEI vnguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.

Titianus emolliens.

CERAE vnciae sex, resinae colophoniae vnciae quatuor & semis, seui taurini vnciae quatuor, guttae ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

Pessus Aegyptia.

MELLIS, resinae terebinthinae, butyri, rosacei vel susini, croci, singulae partes: in quibus autem inflammatio abest, & sordidis, æruginis dimidiam addunt.

Gone ad concipiendum.

BUTYRI vnciae sex, hyssopi mecadimenti, medullae ceruinæ, adieis anseris & gallinae, resinae terebinthinae, aloës singulorum vnciae tres, ceræ tyrrhenicae vnciae sex, rosacei librae duae, myrrhae, casiae, singulorum vnciae duae, spicae nardi vncia, mellis quod satis est.

Quomodo medicamenta quae emplastra ingrediuntur coqui debeant.

Argenti spuma.

In medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. Conuenit autem leuigatam rursus ex oleo cōterere, ut sordium fiat spissitudo, inde leni igne cōtinenter excoquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attollitur: ubi vero iam ferè satis incocta fuerit, colorem facci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subidet, & manus non inquinat.

Plumbago.

PLUMBAGO similiter argenti spumae excoquitur, sed eo vsq; dum non modò digitos nō inquinat, verū etiā ex igneo colore in rufum & vehementer floridum elanguescat.

Aes crematum.

AES crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

Sori & diphryges.

SORI & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua vincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinat.

Chalcitis.

CHALCITIS incoquitur eisdem modo, coctionemq; ipsius

metimur inde, si emplastrum fuluū magis & phœniceū cūa
serit.

Flos æris.

ÆRIS flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui com-
munis esse coctioni solet.

Atramentum sutorium

ATRAMENTVM sutorium in media coctione empla-
stro inditur, coctum verò vehementiorem eius colorem ef-
ficat, & si alia ei non resistent, nigrum.

Misy.

MISY postremò adiicitur, quamdiu autem coqui de-
beat, propriè definitum non est.

Auripigmentum & sandaracha.

AURIPIGMENTVM & sandaracha in coctionis fine
iniiciuntur.

Plumbum vstum.

PLUMBVM vstum in media coctione adiungitur.

Cerusa.

CERUSA in alba emplastra postremò mittitur, sic enim
colorem conseruat, magisque albescit: in nigra autem, prin-
cipio: cocta enim largius, nigrescit.

Aerugo.

ÆR VGO viridibus emplastris post coctionem iniicitur.
In quibus neutiquam ollæ inditur, sed cum aceto detritæ
ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis
emplastris, quum semicocta est confectio immittitur: nam
moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali co-
tonei colorem efficit. at in his quæ diprosopa, & dichroma
dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibus
dam enim per coctionem primum melinum colorem indu-
cit, qui duplicem repræsentat, postremò fuluum.

Alumen.

ALUMEN plerunq; secundum coctionem additur, pecu-
liarem verò coctionis modum nullum habet.

Minium, cadmia & pompholyx.

MINIUM in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per
initia immittuntur.

Sal nitrum, sulfur.

SAL & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adii-
citur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

Terra & lapides, pumex, conchyliæ.

TERRAM omnem & lapides plerunq; ad coctionis fi-

nem inlicimus, item pumicem & conchyliis combusta.

Oleum & reliqua pingua.

O L E V M si quidem per initia fuerit iniectum, resinae aut pici liquidae, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa eua ferint incocta, recte inderetur, reliqua vero pingua salis expertia, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

Vnguenta.

V N G V E N T V M irinum coctionem quidem fert, sed cyprium & rosaceum minus: reliqua neutiquam. quare ad finem coctionis immittenda sunt.

Cera.

C E R A priuatim sola non coquitur, ut quae aduratur, neque cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturque, verum superiniicitur, vel oleo puro, vel oleoso cum quodam metallico incocto, aut resinae, aut pici prius incoctae, ac prius quam reliqua quae possunt iniici spissescet.

Resina.

R E S I N A arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

Pix.

P I X ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidae, dum inspissatur: aridae, maxime dum amplius non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

Apochyma pix nauibus derafa.

A P O C H Y M A laeuigatum cribroque ab excrementis suis secretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi exactior est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

Bitumen.

B I T V M E N inter initia iniectum coquitur, non autem id in laeuorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliuarumque granis interioribus simileis, obtinet. Quapropter in crassiores particulas confringendum est, coquendumque in aceto, sic ut non agiteretur usque, dum ebullire desinat. Ego vero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, voti copos euasi.

Propolis.

P R O P O L I N emollire & discoquere oportet. si quidem a coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrum
reci

recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanum, contusam iniiciemus.

Ammoniacum.

AMMONIACVM circiter mediam coctionem iniicitur: detritum verò si potest fieri & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quodam lauigatum iniicere: si emplastrum cruentis vulneribus adaptabitur, cum aceto aut vino: si fistulis aut strumis omnino cum aceto: at si molle futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sordium spissitudinē coactum aliis refrigeratis infundere, ne efferuescat.

Opopanax.

OPOPANAX multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex vino, aceto ve prius lauigandus est.

Galbanum.

GALBANVM neutiquam coctionem tolerat, verum emplastro ab igne sublato, quò spissescat, sic vt digitos non inquinet, emollitum inditur.

Sagapenum.

SAGAPENVM tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro vbi ab igne sublato fuerit, emollitur.

Aloë.

ALOE secundum coctionem inspergitur.

Lachryma papaueris.

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila leuigatur, mox etiã emplastrũ ei superfunditur.

Thapsia.

THAPSIA inspergitur postrema, vel liquore quodam lauigatur.

Bdellium.

BDELLIUM in læuorem pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & lauigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastrĩ figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

Thuris lachryma, & manna.

LACHRYMA thuris & māna coctione iam absoluta insperguntur, in fordiũ spissitudinem coacta ex melle modico aut aceto, aut aqua aut vino, si emplastrũ liquorẽ recipiat.

Myrrh

*Myrrha.***MYRRHA** ubi iam coctio finita est, inditur.*Semina, radices, & herba.***SEMINA**, radices, & herba nullam coctionem sustinet: laugatis igitur & in pila etiamnum subsistentibus liquida superfunduntur.*Qui cera modus cum oleo esse debeat.*

Quod si vnguiua quæ Græci à leuanda lassitudine acompa appellant, conficere constitueris, oleū ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, vt in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera vetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulò copiosius quàm cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit, paulum autem hoc, medijs in vtrambet partem excessus duodecima erit portio, etenim vndecim & tredecim olei vncias, ceræ libræ admiscebis.

De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs Galeni.

C A P. X X V.

IN Alexādria (inquit) muliere quadam morbo periclitante, cum quæsissem lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus vice lichnidis vsus fuisset acanthij semine, periisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc succedentium inuicem medicaminum expositionem veni, secundum literarum seriem exorsus.

VICE Abrotani, origanum.

ferri.

Absinthij, abrotanum.

Aethiopicæ oliuæ, lachrymæ acariæ partes duæ.

Acanthæ, Cerasiorum acanthus.

Agarici, euphorbium.

Acanthij seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis syluestris.

Agriostaphidis, hoc est, syluestris vuæ passæ, dactyli Syriaci.

Acori, asari radix.

Actes, hoc est, sambuci, acanthæ.

Alicacabi, semen Solani.

Adianthi, aphroselinum.

Aloës. Galenus Agalochi, centaureum, & impressus

Adipis vulpini, adeps vrsina.

Pauli codex, aloës Indicæ,

Adipis ceruini, adeps anserina.

aloës viridis folia vel glaucium, vel lycium, vel

Adipis suilli, adeps vulpinus.

Aeruginis ferri, excrementum

centau

'centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniacy thymiamatis, propolis.

Ammoniacy salis, sal Cappadocum.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararū, absinthium.

Anacardij, pſyche herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est Cicerculæ, sesamum.

Aristolochiæ rotundæ, aristolochia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentum Indicum.

Asbesti, hoc est calcis viuæ, adarce.

Asij lapidis, Gagates lapis, vel sal ammoniacus crematus.

Aspalathi, hoc est bituminis, pix liquida brutia.

Aspalathi, ericæ semen.

Asphodeli radicy, betæ succus.

Auripigmenti sandaracha.

B

Balsamiliquoris, myrrha statte.

Bdellij, spagnum aromaticum.

Buccinorum, ostrea.

Buprestis, blattæ pedentes.

Butyri, lac bubulum concretum.

C

Cadmia, leucographis Aegyptia,

Calamintha, mēta syluestris.

Calami odorati, sphagnus.

Cantharidum, phalangia.

Capparis radicy, radix ericæ, vel myrica.

Cardamomi, cyperis ammoniaca.

Cassia, cinnamomum.

Castorei, blattarum pedetū intestina.

Cedri baccarum, ladanum.

Ceraunij, leucographis.

Ceræ lomentum cum propoli coquitur, & contunditur.

Ceruini cornu, caprillum cornu.

Cerussæ, recrementū plumbi.

Chamædryos, rumicis syluestris radix.

Chamæmeli, Anthemis.

Cicior, hoc est, ricini sordes palæstrarum.

Cicutæ, semen coriandri.

Cinnabaris, rhodocides.

Cinamomi, cassiæ duplum.

Clinopodij, heliotropium.

Cnidij seminis, semen viticis.

Colocynthidis, semen ricini quod est crotonis.

Colophonix, apochyma, seu pix deraſa nauibus.

Comareæ, ammoniacum thymia.

Corallij, moly.

Costi, cedrinæ baccæ. Galenus, costi, ammoniacum, baccarū cedri, baccæ lauri.

Cotyledonis, anacardium.

Crinanthemi, aphrodisium.

Croci,

Croci, crocomagma.
 Crocodyli adipis, adeps canis
 marini.
 Crocomagmatis, aloë Indica.
 Cymini, semen brassicae
 Cymini Aethyopici, melan-
 thium.
 Cynosbati, halicacabi semen.
 Cyperi, Iuniperus maior.
 Cypheos, carica cremata.
 Cyrenaici liquoris, syriacus
 liquor.
 Cucumeris, anchusa.

D

Dauci seminis, semen sij.
 Dictamni, salvia.
 Diphrygis, lapis phrygius.
 Dorycnij, semen alterci
 Dracunculi, apobrosimum.
 Galenus addit Damasonij,
 eryngium.

E

Ebeni, lotinum aridum.
 Ebisici radicis, folia mori.
 Elaterij succi, eiusdem herbae
 succus.
 Elelisphaci, hoc est, salvia,
 nepita.
 Hellebori nigri, radix papy-
 ri.
 Eneaphylli, potamogiton.
 Ericae seminis, galla ompha-
 citis.
 Erini foliorum fimus cico-
 niz.
 Erysimi foliorum herba lana-
 ria.
 Erucae seminis, erysimi se-
 men.

F

Feculae vini combustae, sanda-
 racha.
 Fellis cameli, fel ascalabotae.
 Fellis muris aranei, fel came-
 li.
 Fellis hyenae, fel perdicis.
 Fellis viperae, fel ichneumo-
 nis.
 Fici liquoris, liquor mo-
 ri.
 Fimi palumbini, fimus colum-
 bae.
 Fimi Aluri, fimus ichneumo-
 nis.

G

Galbani sagapenum.
 Gentianae radicis, apij odora-
 ti radix.
 Glycyrrhizae succi, fycamini
 succus.
 Gongilidis, hoc est rapae, he-
 liotropium.

H

Hederae succi, persici li-
 quor.
 Hippuris, chamaepytis.
 Hormini, lini semen.
 Humidae picis, succus pana-
 cis.
 Hyacinthi, flos Isateos.
 Hyenae adipis, vulpis adeps.
 Hyenae fellis, fel perdicis.
 Hyosciami, quod est alterci,
 rubi canini semen.
 Hyperici, anethi semen.
 Hypocystidis succi, acatiae spi-
 nae succus.

I

Iridis Illyricae, helenium odo-
 ratum.

Iunci

- Iunci odorati, cardamomum. Maluæ, fœnugræcum.
 Lachrymæ papaueris, succus Mandragoræ, oleæ lachry-
 mandragoræ. ma.
 Ladani, sampsuchum. Mandragoræ succi, doryce-
 nium.
 Lanariæ radices veratri nigri Mannæ thuris, cortex thu-
 radix. ris.
 Lopathi radices, pyrethri ra- Mastichæ, lentisci medulla
 dix. seu cor.
 Lapidis pyritæ, lapis pyrobo- Medullæ ceruinæ, adeps cer-
 lus. ui, vel medulla vituli.
 Lapidis phrygiæ, lapis argyri- Mellis sapa.
 tes. Mellis Attici crudi, mel aliud
 Lapidis magnetis, lapis phry- despumatum.
 gius. Mœu, myrobalanus.
 Lapidis asij, lapis gagates. Myrsinites vinum, succus mo-
 Lathyrinum, granum cni- ri.
 dium Misyos Cyprij, ochracigna.
 Lauri baccarum, serpillum a- Muscerdæ, muscæ tantun-
 ridum. dem.
 Lentisci, polygoni radix. Mororum succi, ruborum fo-
 Lepidij, erythrodanum. lia.
 Lepidi radices, folia capparis. Myrobalani, peucinum.
 Leporis marini, cancer fluuia- Myrrhæ trogloditidis, cala-
 tilis. mus odoratus.
 Leucini floris, struthion, seu Myrtei olei, lentiscinum.
 lanaria. Myrti, succus mori.
 Ligni balsami, radix violæ Misy torrefactum, diphry-
 candidæ. ges.
 Lini seminis, fabæ succus. N
 Loti seminis, Betæ semen. Nardi Syriacæ, iuncus odora-
 Lybistici, semen staphylini. tus.
 M Nepitæ, menta sylvestris.
 Malabathri, cassia vel nar- Napi, gongilidis semen.
 dus Indica. O
 Magnysinæ vitreæ, labrum Ocymij, sisymbrium.
 Italicum. Ocymoides, syluatica men-
 Malorum cotoneorum, me- ta.
 lilotum, Oenāthes succi, ampelini ar-
 boris succus.

Olei

- Olei ricinini, oleum laurinū. Recrementi plumbi, helcys-
 Olei veteris, duplum olei co- ma.
 quitur cum adipe suillo ve- Recrementi aris Cyprij, me-
 teri. linteria Aegyptia.
 Oleæ lachrymæ, hypocistidis Resinæ piceæ, resina terebin-
 succus. Galenus oleæ Ae- thina.
 thyopicæ lachrymæ. Resinæ colophonix, apochy-
 Opocarpasi, liquor myrti. ma.
 Opopanacis, lac sycamini. Rhodoïdis, sinopis.
 Orizæ, hordeacea farina. Rhododaphnæ liquoris, vi-
 Oenithogallorum, anthani. scus quercinus.
 P Rosarum ficcarum, Persææ
 Papaueris liquoris, mandra- folia sicca-
 goræ succus. Rhu, centaureum.
 Peristereonis, chameleuce. Rubi canini, vesicariæ semē.
 Peucedani liquoris, succus Rumicis, pyrethri radix.
 glycyrrhizæ. S
 Picis liquidæ, opopanax. Sabini olei, oleum recininū.
 Pityocampæ, vespæ, in Ce- Sagapeni, piceæ resina arida.
 driam. Salamandræ, lacerta viridis.
 Piperis, zingiber. Salis ammoniaci, sal Cappa-
 Polypodij, radix Chamelææ, docicum.
 vel chamæleontis. Salicis liquoris, nigræ hede-
 Polytrichi, absinthium. ræ liquor.
 Propolis, ladanum. Saluiæ, nepita.
 Populi nigræ surculorū, sam- Sampsuchi, rhus cùlinarius
 psuchus. ficcus.
 Psilij, lenticula palustris. Santonici, abrotanum.
 Prerei, cneori semen. Satyrij, semen erucæ.
 Pulegij, hyssopus. Scammonij, ricini.
 Pyrethri, zingiber. Scillæ, bulbos.
 Pumicis, terra Cretica. Scinci, satyrium.
 Phu, sphagnus. Scordij, albi papaueris ca-
 Phyci, anchusa. put.
 Q Semperuiui, lactuca serapia-
 Quercus, chamæleon. dis, radix præoniæ.
 R Semperuiui succi, lactucæ suc-
 Rapæ, heliotropium. cus, aut folia.
 Radicis rumicis, Cinira. Sepiæ testæ, pumex.
 Raphanini olei, rhicininum. Serpylli, potamogiton.

Sesa

Sesami, semen lini.	Thapsiæ, Elydrion.
Sesamoïdes, expressum amaracium.	Thapsiæ succi, chamaeleontis nigri succus.
Sinapis, cardamomum.	Thermuntiadis, lycopsolos.
Sisonis, anisi.	Troximi maiouniū, aut maioulium.
Sisymbrij, ocymum.	Thuris, ampelites.
Sphagni odorati, iuncus cultus.	V
Spheclæ, hoc est fœcis vini cōbustæ, sandaracha.	Vini Italici, vinum mendesiū.
Stymmeostuli, squama aris,	Vuæ acerbæ, galla omphacitis.
Styracis, castoreum.	Vuæ passæ fatiux, palmulæ.
Strobilorū, semē cucumeris.	Visci quercini, chamaeleō niger.
Sruthij radices, radix veratri nigri.	Vulpini adipis, vrsinus adeps.
Sulphuris viui, sandaracha.	Vulturis fimus, columbinus fimus.
Syrici, spuma argenti.	X
T	Xylobalsami, violarum albarum radix.
Terræ Samiæ, leucographis Aegyptia.	Z
Terræ erythriadis, calx Thebaïca. Galenus addit terræ teneræ, plumbago.	Zingiberis, pyrethrum.

De ponderibus & mensuris.

CAP. XXVI.

Pondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem vasis capacitate: vas autem, sicca quantitaris aut humidæ mensura est, vt tres quantitates quæ mensuratur, sint differentia, vna quidem ponderis, altera verò aridæ substantiæ qualis ea quæ in cumulum cogi potest, porro tertia humidæ est substantiæ. Cum autem multa propeq; infinita sint pondera & mensuræ, pro regionum diuersitate, & vtentiū consuetudine, de iis quæ omnibus in vsu communi sunt, nobis sermo erit præcipuus.

De notis ponderum & mensurarum.

QUONIAM verò nonnulli literis non integris sed notis, signisque pondera & mensuras demonstrant, satius fuerit, veteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum superscriptum habet α, chalcum hoc est arcolum signat, exempli gratia, χ α. Si ο habeat,

T

choa, quod est congiū, χ . Si ν , chœnicem, χ . Si π , chemam, χ . At π si ϵ habet suprapositū, & lineā rectā, quæ per obliquū inferius cornū ipsius secet, ceratium, hoc est siliquā notat, ut χ . Si ν superiectum est, cyathum χ . Si σ , cotylam, hoc est heminam, χ . At lineā circumflexa quam nihil aliud circumstat, & quæ per obliquū ponitur obolū notat, ω . Si duæ huiusmodi lineæ sint, quas nihil circumstat, duos signāt obolos, ω : qui obuli grammæ, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera ρ , quæ ρ literam habent annexam, recta quadam lineā diuisam, ρ . Duæ autem coniunctæ atq; altera parte in angulum coactæ, duobus π literæ cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachnam, quæ alio nomine vocatur olca, ω . propriè verò olca per λ scribitur, cui in medio litera σ sit addita, ω . Verum si λ adiectum ϵ habet, libram signat, ω . Nonnulli verò alteram λ literæ lineam obliquè secantes libram ostendunt, ω . At cum ρ litera, in ipso sui angulo σ habeat, vnciam denotat. ω . Quod si μ in summo vertice habeat oppositum ν , minam refert, ω . Si ν , notat mystrum. ω Si ϵ , medimnum, ω . Si σ , modium, ω . Porro τ post se habens ρ , & ν , signat trygliō, $\tau\nu$. At ξ cui iuxta sit positum ϵ , xesten, qui sextarius, ostendit, ξ . Si σ apponitur, oxybaphum id est acetabulum ξ . Aliqui verò sextarium lineā rectā ξ secantes conficiunt. ξ . Sed π adiectum literæ μ , heminam ω , π addito ρ , incumbente ipsis μ , ceramium valet. ω .

De ponderibus.

MINA Attica & Aegyptia habet vncias sedecim. Romana viginti. Libra vncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma habet scrupula tria. Scrupulū, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, areolos duos, & duas tertij partes.

De mensuris liquidis.

ITALICVM ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem quatuor. Nam magnum mystrū habet acetabulum. Acetabulū sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si voles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ liquidarum rerum secundum lancis momentum differentie habentur, ut in olei, vini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur vino pōder

derosius quarta parte, itémque decima est: quo fit vt ferè tertia ponderis pars melli accedat: capit enim integram huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet enim totum olei modum, & vltra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totū enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem. Quò autem res fiat dilucidior, omnium mensurarum pondus singillatim veluti in tabula depictum subiecimus. ex qua liquido cōstat, per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, vinum, & mel, ex ordine demonstrari.

	Olei	Vini	Mellis.
Ceramium Italicum habet	lib. 72.	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10.	lib. 13. S.
Sextarius	lib. 1. 3. 6	lib. 1. 3. 8	3. 13. & S.
Hemina	3. 9	3. 10	3. 13. & S.
Mystrum magnum	3. 3	3. 3. 8	3. 4. & S.
Acetabulum	3. 18	3. 2. 12	3. 27
Cyathus	3. 12	3. 12. 4	3. 2. 3. 2
Mystrum paruum	3. 16	3. 20	3. 9

ORIBASIVS secundum adamantium author est sextarium Italicum vini mensura quidem uncias viginti quatuor esse, pondere vero uncias viginti. sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.

De aridis.

ÆGYPTIA artaba habet modios quinq;. Modius ægyptius & Italicus Chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semisextarios duos quos & heminas vocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimnus habet semisextaria, quæ hemiecta vocant duodecim. Hemiectum chœnices quatuor. Ita medimnus habebit minas quadraginta nouem, sextarios nonaginta sex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quòd aridarum rerum infinita iuxta momenti lancis rationem differentie existant.

FINIS LIBRI SEPTIMI, IOAN-

NE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

T 2

LECTORI.

Antequàm te ad lectionem Pauli confere-
ras, scito aliquando verbum digerere po-
situm esse pro discutere. Item mannam
pro tenuiore parte thuris. Cachry pro
flore roris marini.



IOANNISAN- DERNACI IN LI-


BRVM PRIMVM PAULI

AEGINETAE COMMEN-

TARIVS.

*

CAPVT I.



VANDOQ VIDEM grauidis. Primum hoc caput Pauli ad verbum ex quinto Orisbasij sumptum est: in quo grauidis multa stupuerunt legimus: inter cetera stomachi re-
 dundationem, ut Pliniano more loquar, quam stomachi re-
 Paulus verbo τῷ περισσάειν significat. Id ^{perissarionis} dundatio.

si Hesychio & Suida credimus, à canibus can-
 dam mouentibus: aut potius, quod hic etiam magis congruit, à
 fluctuum agitatione tralatum est. In grauida enim sanguis men-
 struus, qui ante conceptum stato tempore, expurgari solebat, co-
 piofior in utero collectus quam profectu adhuc exiguo ad stomachum
 regurgitat, ibique exundans, nauseam excitat. In prima nostra
 versione erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles libr. 7. de historia
 animalium ponit. ἐτι δὲ ναυτία, inquit, καὶ ἐμὲτι λαμβάνουσι ναυτία
 τὰς πλείους. id est, praeterea nausea & vomitus plurimas infestant.
 Aetius πλάδ & σμάχον ait, quod est nimia humiditas stomachum
 debilitans, non ut Orosius putabat, sola imbecillitas. Nam Galenus
 Commentario secundo in primum de morbis vulgaribus, ait τὸν πε-
 ρισσὸν ὑγρὸν πλάδον ἐκ τῆς ὑπερβολῆς ὀνομάζειν, hoc est superfluum humi-
 ditatem, pladon appellare consuevit, de Hippocrate dicens. Idem Co-
 mentario secundo de ratione victus in morbis acutis, ἐφ' ᾧ καὶ πρὸς
 εἰρηνησιν, ὡς ἔμεν ὑδαρὸς δυν & πλάδ & ἐν τῇ ἀνω κοιλίᾳ τοῦ σώματος

ὕγρῳ τῇ α, καὶ ἀτονίαν ἐμποιοῦσι. hoc est, in quibus etiam adiecit, vinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecillitatem in superiore ventre excitaturum.

Sputa crebra. Quia stomachus ex humiditate languet, eoq; os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca dictio est πτυελίσιν: quam Galenus in priore prædictionum interpretatur, πτυεῖν πάλαν, hoc est spueri frequenter.

Stomachi erosio. Quando ab acrioribus humoribus irritatur, mordeturq; vomitus futuri signum non exiguum habetur, Græce dicitur καρδιωγμός, quasi dicas cordis morsus. Veteres autem olim os ventriculi cor appellauerunt, nimirum ex situs vicinitate: quia cor prope os ventriculi situm est, ut ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet. eundem affectum Galenus etiam καρδιαλγίαν vocat libro secundo de placitis Hippocratis & Platonis.

Cibi fastidium.

ἀσιτία.

ἀσιταί.

ἀποσιταί.

ἀνοσιτίαι.

ἀσιτία.

ἀποσιτία.

Fastidium abstinencia.

ἀσιτία.

Corrigitur locus Pauli impressi.

Cibi fastidium. Nimirum ex vitiosis humoribus stomachum infestantibus, si Galeno credimus, græca dictio est ἀσιτία, quæ signat cibo abstinere, & inedia uti, sicut Grammatici nobiles interpretantur. Galenus etiam libro primo πρὸς ἐπιδημίων differentiam inter ἀσιτίας & ἀποσιτίας ponit hisce verbis. ὅτι τὰς ἀνοσιτίας ἀσιτίους ἐνομάζειν ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς μὴ προσενεγκάμενης σιτίας, τοὺς δὲ ἀποσιτίους προσεῖναι, ἀποσιτίας λελεῖσιν. hoc est, quod Græci appetentia carentes vocant, Asitos, eos sane qui cibos non assumunt: illos autem, qui assumere oblatos auersantur, abhorrentq; appositos, omnibus est manifestum. Ibidem ἀποσιταί πάντες γυναικῶν διετέλω, quasi dicat, omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaque ἀσιτία abstinencia à cibo in totum: ἀποσιτία, fastidium quidem, sed ut aliquid tamen assumatur, quod Galenus ostendit libro primo de causis symptomatum, grauidarum accidentia enumerans in hac verba, βραχία σιτουμένης τ' ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est quod mulier pauca comederet ob fastidium. Hippocrates in Aphorismorum commentario quarto: ἀπύρετον ἐν τῇ ἀποσιτίᾳ. Galenus interpretatur ἢ μὴ ἀποσιτία τὸ αὐτὸ λελεῖσιν τῇ ἀνοσιτίᾳ. Rursus in libello de victu priuatorum: οὐδέσσι δὲ ὀδύναι γίνονται ἐν τῷ σπλάγχνῳ, ἢ ἐν γυναικείᾳ, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς ὀδονορίας τουτίσσι συμφέρει ἀναπαύεσθαι αὐτάς. Hoc est: quibus dolores viscerum oboriuntur, aut ab exercitio, aut alia quadam obambulatione, his conuenit in abstinentia conquiescere. His omnibus animaduersis, legendum videtur ἀποσιταί pro ἀσιταί, id quod ex sequenti oratione cuius mediocriter sagaci licet deprehendere. Nam Paulus singulorum accidentium remedia tradens, ἀποσιτίας δὲ, inquit, non ἀσιτίας: quam

quanquam non ignarus sim aliquando auctores, alterum pro altero usurpare: ut è capite 35. Verum cum utraque hic ponatur, à poetici, & à citi exacte intelligenda sunt. Miror hoc Orosium qui in alijs corrigendis nihil facit reliqui, non aduertisse: Castigatorem vero Basiliensem, qui Paulum Græcum germanicis typis excusum edidit: tum hoc, tum alia pleraque præterisse, notat in alioqui dignissima.

Orosius.
Calligator
Basilienſis.

Vina fulua. Nipote frigidioribus naturis accommodata: tum ad concoctionem, tum ad succi bonitatem procreandam, vt ex Galeno didicimus. Ant enim libro duodecimo Methodi οὗτοι τὰς ψυχρὰς καὶ οὖροι λυποῖ, καὶ ὁ ψυχρὸς οὐκ ἐν ὁδῷ εἰσὶ, καὶ τῇ συστάσει μὲν τὸ τε ὕδατος καὶ τῶν ψυχρῶν. Hoc est, omnia hac vina fulua, tum calida, tum odorata sunt, & substantiam habent inter aquosa & crassa mediam.

Vina fulva.

Color hic fulvus, qui Græcis *λυρρὸς* dicitur, proximus est flavo, quasi dicas in pellucido flavum; hinc etiam flavus color & fulvus eidem sæpe rei accommodantur. Id quod ex Galeno licet condiscere libro quinto de Sanitate tuenda, ubi habet, *κυόπων ἔχειν ὄνειμα λυρρὸν μὲν πλὴν οὐσάσιν, ἀλλὰ τὸν λευκίτατον αἶμα ῥᾶνθαι, λυρρὰ δὲ πλὴν χροῶν, ὃν ὁ ἱπποκράτης ἀποβιρρὸν ἑαλεῖν, δύναιτο δ' ἐν καὶ ξυρρὸν ἐνομάζειν αὐτόν.* Id fere sonat, huc consilium dirigens, ut vinum substantia quidem tenuissimum semper, colore autem, quem Hippocrates *λυρρὸν* id est, fulvum nominare consuevit, possis etiam eundem flavum appellare. Galenus alibi τὸ *λυρρὸν χροῶμα δύναιτο ἐν λεγῶν πυρρὸν ὡχρὸν.* Hoc est, fulvum colorem possis rufum palens dicere. Sunt qui hunc colorem latine *Giluum* nuncupent: ego malim ex Galeni interpretatione, fulvum convertere, Pliniam secutus, qui hunc colorem inter alios vino attribuit, non *giluum*. Sive autem dicas *gilua* flava, aut *fulva*, nihil interest, modò observes plerumque vina ex vetustate hunc colorem induere.

leppci.

Color ful-
uus,
luxuriosus.

Flavus.
πυρρὸς.
ὠχρὸς.

At medicamenti nomine, *Superius commemorata ad cibum*
referuntur sequentia cum medicamentis adhibentur, quæ stomachum
ex nimia humiditate imbecillum corroborent, exsiccent quæ φάρακον
ἄ. id est, vi medicamentum vero habet textus, ego nomine medica-
menti verti.

Radix Pontica. Hoc est rhapunticum, vim habet corroborandi
stomachum imbecilem: vide Dioscoridem.

Extrínsecus præcordia. Hoc est, quæ parte ventriculi os habetur. Abusus est Paulus dictione *ωγενάδιον*, quæ apud Ga-

περικάρδιον.
Περίκordia.

Præcordia
apud Plinium.

ὑποχένδριον.
Op.

Subcartilagineū. Medi-
camēta in af-
fectu ſtomachi
vbi applicanda.

Recentiores
quidā apud
Lugdunum
Medici.

Linacri ver-
ſio.

Galenī lo-
cus. 13. Me-
thodi.

lenum proprie ſignificat membranā, ſeu tuniculam, cor am-
bientem, aut ſi mauis, cordis inuolucrum. Quia vero os ven-
triculi olim cor appellabatur, excuſari poteſt, vt Pericardion
pro regione externa, ſub qua illud deliteſcit, accipiatur. Plinius
libro naturalis hiſtoriæ 1. membranas ſepti tranſuerſi, præcordia ap-
pellauit, quod cordi prætendatur. Galenus autem, & Hippocrates
ὑποχένδριον totam illam regionem appellant, quæ à mucronata car-
tilagine, vtraq; in parte ad vmbilicum vſq; porrigitur. Celfus au-
tem latine lingua in Medicina princeps, præcordia nominat. Cate-
rum ex hoc Pauli loco conſtat, vbi os ventriculi affectum eſt, ante
non ad dorſum applicanda remedia. Nonnulli autem Medici apud,
Lugdunum dorſo admoſueri præſidia, vt in inflammatione gulæ vo-
lunt, erroris occaſione ſumpta ex loco quodam Galeni in 13. Me-
thodi perperam à Linacro Anglo conuerſo. Habet autem in hunc
modum tralatio. Verum gulæ, quæ proprie vocatur ſtomachus, cata-
plaſmata ſuper ſpinam dorſi imponimus, non autem ad pectus: idē fa-
cimus, & cum phlegmone os ventris laborat. Multo melius ſonant
græca. ἀλλ' ἐπὶ τῷ λυγρῷ ὀνόμαζομεν τὸν ὀσφύος καὶ τὰ κατὰ
πλάγας καὶ τὰ ἐπὶ τῷ ὀσφύος, id eſt: Sed gulæ quæ proprie nominatur
ſtomachus, etiam cataplaſmata ſuper ſpinam dorſi applicamus, non
anteriori, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte, cum
os ventriculi inflammatur. Huic ſententiæ ipſa rei euidentia, quæ ex
Anatome apparet, adſtipulatur.

Præcordia contegere. Hoc loco vſus eſt dictione, ὑποχένδριον: cū
hic eundem locum quem ſuperius in vomitu voluerit, intelligat.

At eas quæ cibum faſtidiant. Græce eſt τὰς δὲ ἀποσίτῃς. Re-
medium faſtidientium ponit, quanquam ſuperius ἀσίτον ſcriptum
erat.

Oenanthe. Hoc eſt, vna ſylueſtris vitis, vt ait Dioſcorides: ad
verbum hæc ex Oribasij quinto transcripta ſunt. Auicennæ inter-
pretes eundem locum turpiter corruperunt.

Error Oro-
ſcij. λίτλα.
Malacia.

Citta. Oroſcius Cittam male interpretatur picam: non enim pi-
ca morbus eſt apud latinos, ſed malacia: à græco autem verbo λίτλα
poſſis dicere picam, ſed apud idoneos auctores vſurpatum non eſt.
Galenus originem huius mali trahit libro primo de Symptomatum
cauſis in iſtū modum. μοχθηρῶν δὲ ποικίλων ἀδιαιρέτων οἷς ἂν εἰς
τὸς τὸ λιγρὸς χιτῶνας ἀναπόητι πόρισμα μοχθηρῶν, εἰωθεὶς ἔτι
γίνεσθαι μάλα τὰς λιποχύμοις γυναικῶν, ἐπειδὴν λιποσσι,
καὶ καλῶς λίτλα τὸ παθός. Hoc eſt: Præuas autem qualitates ap-
petunt

Malacia sto-
machi.

Aduerte lo-
cos Pauli &
Galen.

ινύματα.

Conceptum.

Remedia

malaciæ sto-
machi.

ἐυσίτοι.

ἐνθεοί.

Γαλαιπωρία

Acria. Verum acria. *Ut piper, gingiber, nasturcium, aliisque id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.*

Oedemata. Tumore sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: varijs etiam morbis superueniunt. *Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.*

Lauantur. Græcus codex impressus κατὰ νύκτα pro κατὰ νύκτα habet. *Superfundere etiam significat.*

IN II. CAPUT.

Mulier adolescens.

A Erate nec nimium. Ex hac clausula Græca μῆτι δὲ νεώτερον, reddidi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso vigore ætatis: quo nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. Sin infra viginti quinque sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc increscit, & alimentum minus habet perfectum. Eoque νεώτερον verti adolescens. Nam ab anno quatuordecimo usque vigesimum quintum, ætas vocatur adolescentia. Ab anno trigesimo quinto, multis solent menses cessare, aut omnino pauci fluere, eoque alimento minus ad factum alendum abundant.

Nutrix non multo ante. Quia sanguis tunc vberim ad mammas confluit. unde lac copiosius etiam suppeditatur.

Masculum. Hippocraticum est. propterea quod laborato magis, proboque nutrimento ex sanguine pollat, & minus excremento.

ἄγρῳμαλα. ἄγρῳσαι. Condimenta.

Condimenta. Sic dicuntur qualiquoribus quibusdam ut aceto & sapæ, alijsque condiendis induntur aromata, siue semina odorata quod genus sunt cuminum, anisum, fœniculum, græcis dicuntur ἄγρῳσαι & ἄγρῳμαλα. Lege in textu τὰς ἐπιούσας ἐν ὠδὶ καὶ τὴν ἄγρῳσαι, pro τὰς ἐπιούσας.

Venere nutrix. Galeni præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia ex hac menses prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.

Manus humerosque. Exercitationem nutrici idoneam præscribit: qua videlicet partes superiores agitate sanguinem copiosum lacti generando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exercitatione moderata, cibis tum boni succi, tum iusto tempore, modoque assumptis. Præterea potione tempestiua modiceque sumpta. Græce est, ἀλείπω, id est, molat.

IN III. CAPUT.

L Audatissimum. Galenus libro primo de sanitate tuenda ad verbum omnia comprehendit. De ungui autem, ex Dioscoride

vide libro secundo sumptum est, quod autem ad lucem debeat inclinari, de suo Paulus adiecit: quemadmodum etiam de probatione.

IN IIII. CAPVT.

L Ac viciatum. Ex quinto Oribasij transcripta sunt remedia nimirum lactis viciati: quæ tum corporis totius purgatione, tum victus ratione constant.

Oxymelite. Hic vomitus facillimus est, aliquando additur Vomitus. radicia quæ raphanus dicitur, minutim concisa horis duabus in oxymelite madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radiculam esse oportet, deinde aquam tepidam bibere. Valentiores vomitus ciendi modi septimo libro traduntur.

Laboribus. Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, viscosumque humorem calefacit, extenuatque.

Cibum præcedentibus. Alioqui plus noxæ quàm commodi afferrent: imo plus pituitæ generarent, dum videlicet cibum prius quàm esset concoctus, in membra digereret.

Sassaamentum. Græce τάρυχον est, quod conditâ thynni carnem significat. Cuius generis & Cybia sunt: quo nomine Plinius Pelamidem concisam appellat. Pelamidem vero Thymum, qui nondum attigerit annum. Idem à recenti partu Cordyla dicitur. τάρυχον.

Carnibus suillis. Ad obtundendam nimirum humoris biliosi acrimoniam. Nam humida & crassi succi:is qui concoquere possunt, vtilissima. Habet autem viscosi aliquid, quo iecur & renes Esus porculorum prosummentis etate variatur. obstruat: cetera ex omnium animantium genere quæ pedibus fiunt, ut ait Galenus, saluberrima. Porro indistincte dixit Paulus carnibus suillis, cuius putat etatis esse velit omittens. Nam floride etatis hominibus ac sese exercitantibus iusta magnitudine adulti: inclinantibus, qui adhuc increscunt, porculi conueniunt. Minorum caro excrementis generandis est: vetulorum siccitate, & duritia displicet.

Sapaxque & vini dulcis. Galenus libro περι εὐχυμίας καὶ κραινολυχμίας, contrarium fere scribit, docens biliosis, quibus iac acrius tenuiusque esse solet vinum dulce nequaquam conuenire. His verbis: τοῖς χαλωδετέροις σώμασι, ἔτε δὲ αὐτοῖν δυσκρασίαι, ἔτε δὲ ἐπὶ πλείονι ὁπωσὺν γενομένη, ἔτε φαλάρην, ἔτε τιμωλίαν, ἔτε γλυκὺς, ἔτε ἄρουσι, ἔτε ὁ λίσβι, ὁ ἐν ὁδῷ τε καὶ λιπρὸς ἐμοῖς τοῖς

Collatio locorum Pauli & Galeni.

τοῖς προειρημένοις αὐτὸν ἐπιτέδωκε πίνεσθαι. ὁ δὲ μὴ γὰρ ἀπαύσει τοῖς
 τοῖς. Μὴ τ' οὖν χαλέδαι, μήτε τοῖς β' ἐγκαύσειας ἢ λαυμάτου πολλῶν
 ἢ ἐνδείας, ἢ λύπης, ἢ ὄψεως, ἢ χόλεως καὶ λαΐας τῶν δ' ἐμῶν. διδόναι τοῖς
 τοῖς οἶνον. ὅς τ' οὐρανὸν ἢ οὐρανὸν ἀγαθὸς ἀπασιν τοῖς δ' ἐμῶν πίνεσθαι δια-
 μένοις, φλεγματώδεσι, καὶ ψυχραῖς ὑπάρχει, καὶ χυμῶν πικρῶν
 ὡμῶν ἢ δριμύσι, ἀγῶς βίβω, ἐν χαρὶ ψυχρῶ, καὶ χυμῶν καὶ κα-
 ταστάσει ψυχρῶ ἢ ὑγρῶ. τοῖς τοῖς μὲν ἀπασιν ἀγαθὸς ὁ ὑπὲρ διου-
 καὶ γλυκύς. ἐν αὐτῶς δὲ τοῖς ἐν αὐτῶς ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpo-
 ri, siue ex temperamento naturali, siue qualicunq; ascititio, nec faler-
 num, nec dulce timolites fuluum, nec Aruissium, nec Lesbium odo-
 rum & fuluum prædictis simile potui est idoneum. Quippe omnia id
 genus vina calida sunt, eoq; nec biliosis natura, nec ex insolatu, aut
 alijs ardoribus, vel inedia, vel tristitia, vel anni tempore, vel regio-
 ne, & calido aëris statu huiusmodi vinum exhibendum est. E' con-
 trario salutare est omnibus qui calefieri desiderant, pituitosis, frigi-
 dis temperatura, ijs qui crudorum humorum copiam coaceruauerunt, in
 ocio uiuentibus: in loco frigido, hyeme, & statu aëris frigido, humi-
 doq;. Huiusmodi uniuersis fuluum ac dulce vinum saluti ferum est,
 contrarium ijs qui secus habent &c. Quid igitur hic dicemus? ratio-
 ne alimenti exhiberi. Nam antea dixerat ἢ ὅσον δ' ὅς ἀπ' αὐτῶν
 ὅσον αὐτῶν ἀνάλογον τῷ πλάσι. Hoc est: Alimentum vero ex o-
 mnibus ipsis crassitie respondet: puta qualem substantie crassitiem
 obtinent, tale etiam nutrimentum, nempe crassi succi producunt. Sic
 igitur ijs quibus lac tenue est, conuenit. Quamquam muliebris etiam
 sexus, respectu masculini, frigidior existat: deinde sanguis tenuis, &
 serosus esse potest, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam. Vt videlicet sanguinem ad partes eas ex
 alijs attrahat. Caute verò ad mamillas defigenda est. Caro enim mol-
 lis cum sit, facile intumescit, cucurbitulaq; repleta difficile auellitur.
 Quod si hoc acciderit, sponsia calida illi superponi debet: sic enim la-
 xatur. Sin minus, pertunditur.

Error Oro-
scij.

Textus Gra-
cus corrigi-
tur.
Melanthiū
quod gith di-
citur.

Melanthium. Dioscorides hoc docet lac extrahere: in qua re mi-
 nor castigatorem Oroscium, papauer nigrum vertere: quod contra o-
 mnem medicinam est, ne dicam piaculum, præbere ad lactis genera-
 tionem vehementer refrigerantia addeò ut soporem inducant, & qui-
 dem violenter, nec sine incommodo natura. In Græco exemplari le-
 gendum quidem ei assentior pro γλυκὺ, γλυκῆ, quod præterit Ge-
 museus. Melanthium vero apud nullos autores papauer nigrum si-
 gnat, etiam si conueniret instituto. Ita sunt quidam ad vituperan-
 dum alios proclives, ut sepe ipsi in multo grauiore errores incidant.
 Cali

Calida prius. Græce est $\theta\epsilon\mu\omega\pi\omega\sigma\alpha\iota\omega\nu\eta\sigma\alpha\upsilon\lambda\omega$ legendum: non $\pi\omega\sigma\alpha\iota\omega\nu\epsilon\alpha\rho$. $\pi\omega\sigma\epsilon\mu\eta\eta\sigma\alpha\upsilon\lambda\omega$, ut habent codices impressi, quod neuter Aristar- $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\omega\nu\epsilon\alpha\rho$.
bus, vel Orosius vel castigator Basiliensis aduertit. Dicitur etiam
 $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\omega\nu\eta\sigma\alpha\upsilon\lambda\omega$ à verbo $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\omega\nu\epsilon\alpha\rho$, quod significat $\lambda\alpha\tau\alpha\upsilon\lambda\epsilon\alpha\rho$, &
 $\lambda\alpha\tau\alpha\chi\epsilon\upsilon\epsilon\rho$. Galenus in primo ad Glauconem. $\tau\omega\nu\ \delta\epsilon\ \sigma\pi\lambda\alpha\gamma\chi\omega\nu$
 $\pi\omega\nu\omega\sigma\alpha\iota\delta\alpha\upsilon\ \lambda\alpha\tau\alpha\iota\omega\nu\epsilon\alpha\tau\epsilon\ \eta\gamma\epsilon\ \lambda\alpha\tau\epsilon\pi\lambda\acute{\alpha}\tau\eta\sigma\upsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\iota\varsigma\ \mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\tau\eta\varsigma\ \eta\upsilon$
 $\eta\gamma\epsilon\ \chi\alpha\lambda\acute{\alpha}\rho\ \delta\iota\omega\alpha\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\iota\varsigma$: hoc est visceribus autem prospicere oportet,
superfundendo, obducendoq; ea quæ emollire possunt, & laxare. Leo-
nicens rmgendo verterat.

Prius emulcto. $\omega\pi\omega\mu\epsilon\lambda\epsilon\alpha\sigma\alpha\nu$ passiuè positum est: cum medium
alioqui sit.

Ieiuno. Hic proprie positum est $\acute{\alpha}\sigma\iota\tau\omega$, ut facile intelligas in
initio primi capituli pro $\acute{\alpha}\sigma\iota\tau\omega$ legendum $\acute{\alpha}\pi\sigma\iota\tau\omega$.

Cibus solidior. Galenus primo de sanitate tuenda puerum vult
nutriri lacte, quoad primores dentes emiserint. Deinde cibo solidiore,
utpote pane, leguminibus, carne, simulibusq; sed omnibus prius com-
mansis. Græce tantum est $\sigma\iota\tau\omega$, quod per se cibum simpliciter signat, $\epsilon\iota\tau\iota\omega$.
verum lactis ratione solidior intelligendus venit.

Si autem imprudentibus. Græce est, $\epsilon\iota\ \delta\epsilon\ \lambda\alpha\theta\acute{\upsilon}\nu\eta\alpha\ \omega\lambda\eta\rho\omega\theta\epsilon\iota\eta$,
id est: Si autem latentes repleti fuerint. Sed verbum $\lambda\alpha\theta\acute{\upsilon}\nu\omega$ in eius
modi locutione vertitur, recte conuertitur, imprudentibus nobis, aut
nescijs, id quod etiam Budeus annotauit.

IN VI. CAPVT.

PVstulis quæ quod puero. Post educationem infantuli morbos
enumerat, quibus in ea ætate consiliari solet: vocatq; Græce
 $\beta\epsilon\upsilon\theta\eta\mu\epsilon\lambda\alpha$ à verbo $\beta\epsilon\upsilon\theta\epsilon\alpha\rho$, quod est efflorescere.

Exanthe-
mata.

Ad summa eruperint. $\epsilon\theta\epsilon\alpha\nu\ \delta\epsilon\ \epsilon\pi\alpha\nu\theta\acute{\iota}\sigma\eta\varsigma$, quod est in extrema
eruperint. Ut $\beta\epsilon\upsilon\theta\epsilon\alpha\rho$ sit simpliciter se in alium promere: $\epsilon\pi\alpha\nu\theta\epsilon\alpha\rho$ $\epsilon\pi\alpha\nu\theta\epsilon\alpha\rho$.
verò iusta magnitudine & figura per summa apparere.

IN VII. CAPVT.

GRauedo. Græce est $\lambda\acute{\omicron}\rho\upsilon\lambda\alpha$. Sic enim Celsus lib. 4. interpre- $\lambda\acute{\omicron}\rho\upsilon\lambda\alpha$.
tatur: quæ nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, vo-
cem obtundit, tußim mouet.

Melitismi. Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars obli- $\mu\epsilon\lambda\iota\sigma\iota\sigma\mu\acute{\omicron}\varsigma$.
nitur, melitismus, cum sinapi, sinapismi.

Copioso calido. In Græco deerat $\theta\epsilon\mu\omega$ quod est calido. Sic enim $\theta\epsilon\mu\omega$ $\theta\epsilon\mu\omega$.
magis aperit & discutit si quæ sunt superflua.

Textus Græ-
cus mutilus.

IN VIII. CAPVT.

Discocto. Hoc est, probe cocto: quod Græci dicunt $\acute{\alpha}\pi\epsilon\iota\phi\theta\epsilon\alpha\rho$. $\acute{\alpha}\pi\epsilon\iota\phi\theta\epsilon\alpha\rho$.
 $\phi\theta\epsilon\alpha\rho$.

IN

ἢ ἐν τῷ κοιλίῳ ἢ ἐν τοῖς ἐντέροις, hoc est: Non debet crudi, incoctūq; siue cibi, siue humoris copia aut in ventre, aut in intestinis contineri pro ἐν τοῖς ἐντέροις. Galenus habet ἐν τοῖς ἀργείοις, quod est in vasis: cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctioni proprie dicata non sunt: deinde ventris dictione etiam ipsa comprehenduntur. Verum et concoctio altera in ventre, altera in vasis administratur: ita distributio ex intestinis prima, altera ex vasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, & Basilienensis castigator. Omitto quod etiam ἐν τῷ γαστρὶ in eodem fere Galeni loco, Orosius ex stomacho distribuitur, reuerit, cum dicendum sit ex ventre. Nam inde fit distributio.

Erratum Orosij.

Vnde manifesto liquet. Galenus cum libro de sanitate tuenda, iam citato, tum maxime in commentario: τὸ πρὶν χυμῶν, καὶ τὰ ἀσχυμῶν simillimam habet sententiam: ὡς πρὶν γὰρ ἀγαθὸν μᾶλλον ἔστιν εἰς ὑγίαν τὸ πρὶν τῶν σιτίων γυμνάσιον, ἐν τῷ βλαβερῷ τῷ ἀπαστῶ λίνασι ἐπὶ σιτίοις, ἀνακίδον γὰρ ἐν τῷ κοιλίῳ ἢ γαστρὶ, πρὶν περὶ τῶν χυμῶν ἀπορροιστῶν καὶ τὰς φλέβας, ἐξ ὧν ἐκτὸς τοῦ σώματος πρὸς τὸν γυναικα μὴ φθασάντων αὐτῶν ἡτοι ἀεφορροῦναι τῶν τοῖς πλεονεξίᾳ περὶ τῶν, ἢ περὶ τῶν αἱμα τῶν ἐν τῷ σώματι καὶ πρὶν καὶ φλέβας ἀνακίδον. Hoc est, ut Græce

Exercitatio.

lingua ignari intelligant: Sicut enim exercitatio cibū precedens plurimum conservande sanitati conducit: sic quælibet à cibo commotio, nocentissima est. Nam alimentum antequam sit cōcoctum, ex ventre distribuitur. Vnde crudorum humorum copia in venis collecta, omnigenas morborum species procreare solet, nisi protinus labore multo fuerint discussi, vel cōcocti, ac in sanguinem siccitatis beneficio quæ iocunori, renūq; insita est, transferint.

Modo factam. Galenus addit, secundam, ut sit mediocriter pallida concoctionem secundam (nempe quæ in venis fit) modo factam significat. Omisit Paulus secundam, quia ex urina iudicium non nisi de secunda concoctione sumitur.

Compendiū Pauli.

Acclivis deambulatio. Codex impressus viciatus est, habet enim καὶ τῶν ἀντὶς ἀντατο pro καὶ ἐν ἀντατῶ πρὶν αὐτοῖς ex Galeno in lauratum, unde hæc omnia transcripsit. Est autem acclivis ambulatio, cum quis contra montem, aut loca editiora inambulat. Non aduertit Basilienensis castigator.

Castigatur Paulus.

Præterea per alias ex. Quippe itatio, cursusq; crurum exercitationes sunt: acrochirismi, & sciomachia, brachiorum, ac manuum propria. Lumborum autem, assidue se inclinare, & rursus reuocare. alteres, spine thoracis autem & pulmonis, maximæ respirationes propria

Exercitationes singulorum partium.

priae exercitationes sunt.

ivavθit. Donec rubescat. Hoc est dum sanguis in extimam cutem fuerit euocatus. Id signat *ιδεο ivavθit vav apxv.* Hoc est cum floridus, ruidusq; & ruber apparuerit.

Calligatur codex Græcus impressus. Concinnæ. Male in Græco *παθv μοι*, pro *ivavθv μοι* legitur. Vide Oribasium & Galenum. Non aduertit Gemuseus.

Viciatus codex. Calido vapore. In codice Græco impresso *δρμv* ad sudorem videtur referri. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda legit *δρμv*, ut reseratur ad vaporem, sicut nos conuertimus. Vterq; Aristarchus, & Oroscius. Oroscius, & Basiliensis hæc præterierunt.

Apothepia. Exercitationis omnis pars vltima est apothepia, seu dicas recreatoria: nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

IN XVIII. CAPVT.

ἀνὰ βίβλιν. Inter frictiones. Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro ad verbum mutuatus est. Galenus autem ex commentario Hippocratis, qui inscribitur *λαγ' iavθv*, in hunc modum: *ἀνὰ βίβλιν ἀνὰ τῆς κεφαλῆς, διὰ τῆς κεφαλῆς μινιδῆσαι. ἢ ἀνὰ τῆς κεφαλῆς, ἢ ἀνὰ τῆς κεφαλῆς μινιδῆσαι. ἢ ἀνὰ τῆς κεφαλῆς μινιδῆσαι. Hoc est, frictio potest soluere, ligare, replere, minuire. Dura ligare, mollis soluere, multa minuire.*

IN XIX. CAPVT.

ἀνὰ φωνῆς. Inter vocis exer. Hoc est ex quinto Oribasij transcriptum. Galenus huius exercitationis fere nō meminit. Est autem dictio Græca *ἀνὰ φωνῆς*: quæ signat exclamationem vociferationemq;: qualis in cantu editur, & lectione clara, orationeq;. Verbum *ἀνὰ φωνῆς* pro voce contendere interpretari potes.

IN XX. CAPVT.

Lassitudines. Vlcerosa. Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis superuenire solent, enumerat. Sunt itaq; lassitudinis tres numero differentia, vlcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu vt Græco dicam, *φλεγμονώδης*. in tertio Galeni de sanitate tuenda ad verbum explicat.

Negligentia Oroscij. Quo tendi videntur. Græce impressi codices, *τὴν ιδεα*, quod est liquari, consumi; habent, pro *τὴν ιδεα* non tamen hoc aduerterunt Oroscius & Gemuseus. In eodē capite *χαλᾶται ἢ σωφιστὰς μέλους*, pro *χαλᾶται ἢ σωφιστὰς μέλους*, quod est, sane laxatur, quod distentum est.

Olco dulci atque egelido. Hoc est: Ex maturis oliuis quarum baccæ iam nigrescere inceperint, druppas appellant, confecto. Egelido, hoc est tepido, vt soli expositum fieri solet. Id Græca dictio videtur innuer

innuere εἰληθῆρας si Grammaticus credimus, qui exponunt ὑπ' ἡλίου- εἰληθῆρας.
 θέρματι. id est à sole excalfacto. Quid si hyems, aut frigidum
 aliqui tempus sit: quo sol non solet, aut certe parum nos excalfacere, Egelidum.
 tunc ne etiam soli erit exponendum vt incalescat. Sane friuolum esse
 puto quod Orosius adfert, & pro tepido tantum poni, vt postea in Tepidum.
 lasitudinem inflammatoria legitur, εἰλαίου τε οὖν πολὺ χλιαρὸν, quod
 est: Oleum igitur copiosum tepidum adhibendum. Verum ideo me re-
 prehendere videtur Orosius, quod Egelido dixerim, putans hoc fri-
 gidum significari: male mehercules in authoribus latinis versatus.
 Celsus egelidum in eodem sensu quo ego multis in locis usurpat: vt
 lib. 4. cap. 11. Neq; ea ipsa frigida sed potius egelida danda est. Quo-
 modo etiam Linacer eundem locum in Galenum ante me vertit, qui
 antea corrigendus erat. Scio quidem apud veteres in vsu fuisse post
 lasitudinem vnctionem, vel in sole, vel ad ignem, si hoc pacto volet
 intelligere εἰληθῆρας, verum hoc omni tempore non est perpetuum.

Vnctio. Non est in græcis codicibus impressa: aliquot autem scri-
 pti manu habent, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hac di-
 ctio, continua, ad quietem. Multa quidem esse debet: non tamen per-
 petua, quod συνεχὴς significat. Iam Galenus ipse & Oribasius ha-
 bent, ἀλειβὴν συνεχὴς, hoc est, vnctio continua. Legendum itaque in
 Paulo pro μάστιχα συνεχὴς, quod est maxime continua, ἀλείμματ' α
 συνεχῇ, vnctiones assidue. Hoc omiserat Gemusæ, qui maius curia
 omnia & mutila aliquando in Paulo legi, quàm dictione vna, aut
 altera ex Galeno, unde hæc transcripsit, sententie autoris adiuncta:
 vtrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Apotheariæ exercitationem. Quæ tum in motu, tum in fri-
 ctione, & pauca, & mollis, & tarda sit: præterea solium similiter ca-
 lidum. Protinus autem in lauacra frigida exiliant, vt nimirum ipsis
 robur, in cute vnâ cum calore constet, quæadmodum ait Galenus li-
 bro 3. de sanitate tuenda. Lege in codice græco, ἐν τοῖς λουτροῖς ἐν
 τῇς &c.

Boni succi. In codicibus impressis perperam habetur ἐν τοῖς pro
 ἐν χυμῷ. Gemusæus omisit & hoc & superius. Corrigitur
 textus.

IN XXI. CAPVT.

Strictio. Galenus libr. 3. de sanitate tuenda inquit, Voco ita
 A meatuum cutis vicium, quo superuacua transmittere prohibe-
 tur. Στένωσις græcis appellatur.

Oleumque ex. Hoc Oribasius debet. Is enim lib. 5. ad verbum
 ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentiunt, Paulus
 habet ἀργεῖνον εἰλαίου, hoc est, oleum ex populo nigra confectum,
 V

Στένωσις.

quid.

Acropum ex
 populo ni-
 gra.

Oribasius ἀκοπον ἀγρίου. Galenus acopon ex abietis semine, τὸ ἀπὸ τοῦ σπέρματος. ἢ ἑλάτης ἀκοπον. Habes apud Paulum libr. 7. acopon ex abiete, acopon ex populo nigra. & oleum ex eadem populo, omnia eiusdem facultatis. Nam loco fructus abietis, nigrae populi fructus aqua portio, apud eundem autorem ponitur.

IN XXII. CAPVT.

Hoc capite de lassitudinibus agit, quæ citra exercitationem aut motum corporis sua sponte, nempe ex humorum superfluo- rum copia accedunt. Galenus eas lib. 4. de sanitate tuenda persequitur amplissime.

Corrigitur
textus.

Si his peractis. Hoc est: Si omnibus commemoratis præsi- dijs malum cesserit, ad consueta munia paulatim transeundum est. In Pau- lo deprauata est lectio græca, habetur enim πρὸς τὰ συνήθη λυτὰ λείπον pro πρὸς τὰ συνήθη λυτὰ ἐλείπον, quod corrector Basiliensis omisit. Linacer rursus, conuertit.

Quādo mit-
tendus san-
guis.

Si enim vires consent. Quod est, cum sanguinis plus, succi vero mali minus in corpore redundat. nā in sanguine vires naturales de- prehendiuntur. Si igitur paululum vel citra sanguinem restitutum vel ultra, processum est, audacter mittendus est. Si plurimum nequa- quam.

Galenus sen-
tentia.

At si crudi humores. Hi enim in iecore, & ventre manentes, temporis spacio paulatim concoquuntur, efficiunturq; benigni. eoque seruari debent, qui tales humores collegerunt, in omni quiete, præcor- dijs probe fomentorum præsidio munitis, non autem sanguis debet eis detrahi, quoniam virium robur his non adest ut Galenus ait in ὁρ- πωτικῷ πρὸς φλεβόμοιαν in hanc sententiam, ὅτι ὅπου πλεονάζει τὸ αἷμα καὶ χυμῶν ἡδυστασίαν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὡς λελεῖσθαι φλεβόμοιαν ὁ λείπος ἐλεῖν καὶ ῥῶμα γὰρ τοῦ τοῦ αἵματος ὁ αἰσθάνεται. Præterea purgatio his da- ri nō debet, quia concocta, non cruda medicamentis sollicitare oportet.

Crudis viriū
robur deest.

Oxymelitis
facultas.

Oxymel. Intellige simplex. Id enim cum ætatibus, tum naturis vniuersis, ut ait Galenus, & præcipue pituitosis ad sanitatis securi- tatem seruit vtilissime, dum omnes meatus artos aperit, ut nusquā crassus, vel glutinosus humor adhærescat.

Erratum
Orosij.

Apomeli. Fit hoc melle à fauis expresso, & aqua fontana. Verū non simpliciter ex melle & aqua, ut putat Orosius. vide Galenum li. 4. de sanitate tuenda, & Paulum lib. 7.

IN XXIII. CAPVT.

Senectus. Ex quinto Oribasij, quintoq; Galeni de sanitate tuē- da. In Paulo autem Græcus codex impressus deprauatus est, ha- bet enim ἐπαφρόδωτος δὲ ἀντὶ τῶν ὁρμαίνοντων τε καὶ ὑπε- ρόντων

πρότερον ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι, hoc est: Corrigitur autem ea calefacientibus, & humectantibus una cum calefacientibus. Superfluum est ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι. Orosius & Gemusæus non aduerterunt.

Erratum
Orosij.

Friccio. Cum oleo scilicet adhibita, quæ vitale robur excitat, & modice calefacit, unde & distributio nutrimenti faciliior, & nutritio promptior consequitur.

Imbecilliores. Ut qui decrepita potissimum ætate sunt: etsi alijs alijs celerius senectutis incōmoda experiantur. Quicunq; igitur vel crudi adhuc senes quos græci ὠμογέροντας appellant, vel decrepiti, imbecilliores viribus existunt naturalibus, ter die cibum assument, idq; hanc ob causam potissimum: nempe quod una vice multum assumere nequeunt. Deinde, etiam si sumant, concoquere nequeunt, quare melius est cibum parti in tres vices.

ὠμογέροντας
Viridis senectus.

Ac fici maturæ. Hæ paulo innocentiores, immaturis: mediocriter tamen in usum adhibite. Ante cibum alium assumi debent, eo quod si nō citò per alium descendant, corruptionem in ventriculo subeant, & alios secum cibos corrumpunt, id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum est.

Ficum.

Per hyemem vero caricæ. Hæ incidendi, extenuandique vim habent, quo nomine alium citant, renesq; expurgant. Cum nucibus verò simul commestæ ad omnia præstantiores existunt, atque hinc nonnulli qui medicamentorum aduersus lethalia confecturas perscripserunt, ficus aridas cum nucibus, & ruta præsumptas omnium illorum præsens esse remedium tradunt.

Si nullum in dextra. Galenus libello περὶ ἐνχυμάτων καὶ λιανόχυμους inquit: περὶ ἰσχάδων ἢ ῥόσσοις ἂν τις ἐνάντια λέγων ἀληθεύειν, εἰ λιανόχυμους γὰρ ἀμὰ καὶ ἐνχυμούς αὐτὰς εἶπεν νοσῶντες τε καὶ υγιεῖν ἐχούσας. ἔαν γὰρ αὐταὶ διεξίχοντο, λιὰ τὸ γαστήρα, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν ἀναδιδέσθαι φησὶ, διὰ τὸ εἶναι τὸν χυμὸν καὶ τὸν νεφρῶν υγιεῖν καὶ τὸ ἐν ἐνχυμοῖς διαδύνασαι δὲ λιανόχυμους τὰς πᾶσι γίνονται. Id est: De caricis autem, si quis contraria pronunciet, vere dicere censeri queat, nempe bono maloq; esse præditas: morbidæ cuiusdam & salubris participes. Si namque per alium descendant, ac alimentum quod ab eis provenit, in corpus distributū, iecur renesq; transierit, salubres sunt, & succi benignioris: sin remorentur prætoris quodammodo fiunt. In textu hoc Galeni habes διὰ τὸ διεξίχοντο, quod est, per cutem, male pro διὰ τὸ διατεῖν. Hoc in codice nuper impresso Gemusæus castigatior præterijt.

Textus
Galeni vitiosus.

Ante cibum. Alui subducendæ gratia: quæ etiam oliui, ut Galenus in cōmentario de alimentis docet, & damasceni sollicitantur.

Corrigitur
Pauli lectio.

Erratum
Orosij.
φίμυα.

QVandoquidem vero. Ex quinto Oribasij sumptum est. Græcus textus deprauatus in Paulo est pro ἐπειδὴ ἀδελφὰς legi debet ἐπειδὴ ἀδελφὰς τῶν ἐξ ἑ. quod annotauit Orosius. Verum in hoc grauissime peccat, dum alios reprehendit quod φίμυα verterit frictione, cum Galenus, Paulus & Oribasius semper dictionem φρίψιν & ἀνάτριψιν, pro frictione usurparint. φίμυα vero apud grammaticos Suidam, Hesichium, Budeumque nostrum pro detrimento accipitur, veluti cum lapides atteruntur, aliàs aliæ res minutissimæ deteruntur. Quid hic commodius erit quàm puluis? qui ex medicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in balneo.

Erratum
Orosij.

Addidi hic, aquæ indito, ad sensum explendū. Præterea errat Orosius, qui λουόμενος, id est, dum lauatur, verterit, post balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhiberi. Sed frictionem intelligit: quanquam ipse textus sequens eum admonet. Nam à balneo acopi usum præscribit: in balneo, aliorum erit. Reliquit textum viciosum corrector Basiliensis.

Propomata.

Summatque propoina. Usus sum dictione græca quod ferè nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit. Græci autem vocant ποτόματα quæ ex vino fiunt, & melle dissimato. Nam Paul. li. 7. inquit: ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἐξ οἴνου σιτισθῆναι, ἀπὸ καὶ ποτόματα λαλῶσι, το μὲν τὸ ἀπαφροδυνῆναι & λαμβάνει πρὸς τὴν ἀφροδυνίαν, καὶ σιτισθῆναι μὴ ἐξ οἴνου.

βίος ἐν προ-
φύσει.
προφύσει
βίος.
ἐλλειπόμε-
νος.

CORPUS decoloratum. Vita latior, citra curas, & melancholiam actiones naturales non habet impeditas, unde sanguis primum coqui, deinde toti corpori distribui potest. Græce est. βίος ἐν προφύσει, hoc est, vita lata, & iucunda: προφύσει βίος est προσφιλής, quod signat chara, grataq; comnestio.

Pastillos. Græca dictio est λήλαμας, à nullo fere grammatico exposita. Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est παχύνει, quod hic optime quadrat. Magni alioqui viri in hac voce decepti sunt, qui pro glutinantibus quibusdam rebus usurparint.

Corrigitur
codex.

MEL coctum. Exemplaria græca deprauata sunt, habet enim καὶ μὲν ἐφθέραι τὸ σκληρὸν ἄγαρ, pro τὸ σκληρὸν ἄγαρ εἶναι, hoc est, qd̄ durum nimis sit: causam addit, cur mel coctum dētibus noceat.

IN superiore ventre. Ex quinto Oribasij transcriptum est, ἀνα-
verti in superiore ventre, in quo fit concoctio. In eo si diutius im-
moret

morentur, peruicacia sunt & dura.

Ventos contrarios. Nihil oculis magis incommodat quàm ventus contrarius, eoque miror, cur Germanicus corrector mutauerit Germanica impressio
ἐναντίους, hoc est contrarios ἐναντίους, quasi dicas cause authores.

IN XXXII. CAPVT.

Purimum noxe ciborum. Similem habet sententiam Gdalenus in commentario Aphorismorum primo: *εταρ γὰρ ὡς πληρόν τὰ ἀεγὰ ποτῶν ἢ σιτίων τὸ διαρραγῆναι κινδυνὸν αὐτοῖς ἢ λιπῆσαι γίνεσθαι ἢ ἐβελῆναι τὸ ἐμψύον αὐτὸ δρῦν, καθὰ πρὸς ἡγεῖ ἀπώλλουσι τινες.* Hoc est: Cum enim vasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpantur, aut ipsi suffocentur aut etiam calidum natium ipsum extinguant.

Vomitu igitur. Post vomitum autem os colluendum, dentes oculosque & totam faciem postea precepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui vomunt, computrescere. Sollicitari autem vomitus debet aqua tepida statim assumpta.

At si neque descenderit. Signa repletionis venarum commemorat. At sanguinis redundantia proprie *πληθὺς* grecis dicitur. *πληθ* pro omnium humorum separatim plenitudine accipitur. *πλησμονή* pro repletionetum potus, tum cibi, & ventris & venarum rursus.

πληθὺς
πληθ
πλησμονή

IN XXXIII. CAPVT.

Cibis in ventre. Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitate tuenda. Fit autem saepe, ut cibi corrumpantur, aut nimia copia ingesti, aut qualitate praua donati, aut tempore in commodo assumpti, aut ipsius ventriculi affecti vicio. Quomodo autem corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cetera vomitum commendat ex vini dulci potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet enim *ἀνδρὶ πρὸς τὴν γλῶττιν*, pro *ἀνδρὶ πρὸς τὴν γλῶττιν*.

Corrigitur
textus Pauli

Quæ medio ceter purgāt. Sunt enim quædam medicamenta, quæ admodum grauitur, & magno cum naturæ detrimento purgāt. Itaque mediocria hic præcipit, quæ sæpius per intervalla sumi possint: qualis est picra dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

IN XXXV. CAPVT.

Veneris hæc sunt commoda. Ex Oribasij lib. i. hæc sunt transcripta. Ante commoda autem docet, quibus ventus noceat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaque ventus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & nervis: item siccis natibus.

ra, & frigidus. Caueri etiam debet post repletionem, cum cibi, tum vini, item post euacuationem ex vomitu factam: purgatione, & si venter sua sponte fuerit solutus. Præterea si cibus nondum sit concoctus, aut si ægritudo quædam infestat.

Eoq; melancholicis. Vide Aristotelem in problematum sectione 4. ad finem, nimirum quod flatu redundet. Semen autem decessio flatus existit. Sed quid de insipientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor venerem insipientibus conuenire, quod seminis qualitas quæ virilitatē & ut dicam græce θυμὸν homini conciliat, si in corporibus aliquo temperamento calido, copiosior impertiatur, ex θυμῷ solet μανία fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas immittitur. Galen. optime de veneris usu scribit in commentario qui inscribitur, ἡπειρὴ τέχνη, verba ipsius in hunc modum habent: ἀφοσιώσω δὲ λέγει μὴ ἐπίουρον εἰδέμεν χρῆσις ὕγιαν, κατὰ τὸ ἀληθὲς ἐν διαλεγματάων τῶν κούτων ὡς ἐπὶ ταῖς χρῆσιν, καὶ ἐν λύσει αἰσθάνεσθαι καὶ λυγρότερον αὐτὴν ἔχειν δοκῶν γιγνέσθαι, καὶ ἐν πλούτῳ ὅτι καὶ τοῦ χρῆσιν, καὶ τὰ ἀναβίως μέσων ἢ τῶν ἐξ ὧν περιττῶν ἀπαύων τὸ ὡς καὶ μὴ ὑπὲρ πληρώμενον, καὶ ἐνδεῶς, καὶ ὑπὲρ φυγέλιον, καὶ ὑπὲρ τῶν μακρόν, ἢ βραχέος μέσον ἢ ὑγρὰ μέσον ἀμείβεται. Rei venerea secundum Epicurum sane nullus ad sanitatem usus est. Sin autem verum fateri velimus, conducit, si tanto temporis intervallo exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quam fuit euasisse, perspirantiūq; videatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obinuerit neq; videlicet repletum nimis sit neq; inane neq; refrigeratum impendio, neq; exarsactum: neq; siccatum, neq; humectatum immodice.

Venus corpus integrū requirit.

ἐνδοίτοι.
ἄδοίτοι.

Cæterum alij etiam. Duae dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe ἐνδοίτοι, & ἄδοίτοι, quanquam improprie si Galeno credimus, ἄδοίτοι ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id ἀπόσιτοι significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut ἄσπλάγν & hoc est, sine visceribus, pro eo qui parua viscera habet, ἄφων & hoc est, voce carens, pro illo qui paruum vocē edit, ἐνδοίτοι cibi appetens. Superius nempe capite primo positum videtur pro ἐνδοίτοις ποσιῶν, hoc est, cibi cupidos faciens. Nam ἐνδοίτοι δὲ καὶ ἐνδοίτοι καὶ ἀμειγνόμενοι ἀποδύμια. Id est: Iam vero & labores, & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius ἐνδοίτοι legendum putat.

Celsus. At vehementes. Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his verbis. Concubitus vero, neq; nimis concupiscendus,

du, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione etatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur.

Antequam somnus inuadat. Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & videri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinem obseruat. Labor, cibus, potus, somnus, Venus, & hæc omnia mediocria. Paulus ante somnum venerem ineundam censet, redditiq; rationem non certe invalidam. Sed intelligendum est secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: nihil etiam refert, si somnus aliquis breuior præcesserit: sequatur autem prolixior: ex quo vires recolligentur.

Frigus superueniens. Bisariam legitur in græcis exemplaribus, Germanicum habet ἡ ψύξις αἰ ἐπερχομένη, hoc est, frigus irgens, aut valens. Alia habent ὑπὲρ τῆς ψύξεως, quasi dicas superueniens. Ita quoque Oribasius habet. Nescio cur Gemusæus mutauerit.

Contraria
sententia.

Varia le-
ctio.
Gemusæus.

IN XXXVIII. CAPVT

Capite grauantur & anxij fiunt. Hoc caput ex Oribasij libro primo transcriptum est. Vbi etiam græce habetur, ὡς ὁ δὲ δὲς γίνονται, quod est, & anxij fiunt, conflanturq;. Orosius alios reprehendens, ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia vertendum censet ὡς ὁ δὲς ex repletione cibum fastidientes. At Galenus in commentario libri secundi τοῦ ὁρίωνος Hippocratis hoc modo interpretatur. Αἱ τῶς γὰρ γίνονται ὡς ὁ δὲς τὴν ἡμῶν τῶν, ἢ αὐτὴν ὅτι ποτὶς, ὅταν ἡ δύναμις τῆς σωματικῆς βαρύνεται, ἢ καὶ αὐτὴν φέρει οὐκ ἔστιν ἡ δύναμις. ἔπειτα δὲ ὅταν τὸ σῶμα τὸ γαστρὸς τῆς κατὰ φύσιν ἀνέναντι χυμῶν. ἐν τῇ τῇ μὲν δὲ τῇ δὲς ἀνέναντι τῇ κατὰ φύσιν. Id est: Cum bisariam egrotantes fiant ὡς ὁ δὲς, uno quidem modo, quum virtus à corpore grauat, nullamq; eius figuram ex facili tolerat, altero autem cum os ventriculi à viciosis humoribus mordetur, priores quidem affecti sunt perniciose: alteri vero nauseabundi existunt &c. Hoc itaque Pauli contextu prior significatio accipienda est: non secunda quandoquidē virtus seminis copia multum grauat. Deductum autem ὡς ὁ δὲς est ab ἄσθῃ: quæ diælia frequens est apud Galenum & Hippocratem, primum ἀσθὴν, signās: deinde fastidium acerbis humoribus stomachum rodentibus excitatum, unde & vomitus ὡς ὁ δὲς dicitur. Nolo hic commemorare, quàm multi etiam celebres viri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est ὡς ὁ δὲς, non ὡς ὁ δὲς, quod etiam ὡς ὁ δὲς & dicitur.

ὡς ὁ δὲς.

Hippocrates.

Duplex si-
gnificatus
dictionis
ὡς ὁ δὲς.

ἄσθῃ quid.

ὡς ὁ δὲς &.

Leſtio caſti-
gata.

Aliorum. In codicibus graecis impreſſis habetur ἀλλῶν, hoc eſt, ſa-
le, pro ἀλλῶν, quod eſt, aliorum, quam lectionem & ſenſus, & Ga-
lenus in ſexto de ſanitate tuenda approbat. Nos antea quoque ad-
uertimus.

Leſtio de-
prauata
Erratum
Oroſcij &
Gemuſæi.

Semen viticis. Graecus codex habet ἡγοῖ σπέρμα τοῦ λίνου: hoc eſt
& ſemen lini, pro σπέρμα τοῦ ἄγρου, quod eſt ſemen viticis. Sic etiam
habet Oribasius. Item ſuperius iam fecerat Paulus mentionem ſe-
minis lini. Hoc non aduerterunt Oroſcius & Gemuſæus.

IN XXXIX. CAPVT.

Oroſcius fal-
ſo emēdat.

Piper myrrham cum dolci. Calida perſiſtionem expertis præ-
ſcribit: quæ nimirum habitum ipſorum reſtituant. Neſcio au-
tem cur Oroſcius legendum hîc cenſeat cum vino albo, cum nul-
lum eius generis calidum ſit, nec odorum, quale Paulus requirit. Me-
lior itaque leſtio cum vino dolci, quale eſt fuluum, frigidiſ aut tem-
peramento, aut ex accidenti accommodatiſſimum ſi Galeno credi-
mus, & ipſi euidentie.

IN XL. CAPVT.

Ἰγναῖσις.
quid.
Celfus.

SI qui vero. Græce eſt ἰγναῖσις, quod ad verbum ſonat aduſtio
vel exuſtio. Galenus lib. ſecundo λεῖψα τῶν περὶ proprie dici affir-
mat, de ijs qui exuruntur in ſole. Celfus: Si quis in ſole exuſtus eſt,
huic corpus & caput oleo perſundendam.

Leſtio emē-
data.
ἀδρῶς.

Paulatim. In impreſſo eſt λεῖψα λόρον, quod eſt ſecundum ratio-
nem, pro λεῖψα ὀλίγον, id eſt palatim, cuius contrarium ſequitur ἀ-
δρῶς, quod idem ſignificat quod vniuerſim, ſubito ac vna vice.

IN XLI. CAPVT.

Cibi valētis
materiæ.
βόφιμα.
Celfus.

Cibos valentis materiæ. Ex quinto Oribasij traducta ſunt:
voco autem cibos valentis materiæ, quæ probe & multum nu-
nutriunt: vt Celfus alia valentis, alia mediæ, alia imbecille mate-
riæ, libro ſecundo commemorat: vocat q̃ valentiſſimum, in quo pluri-
mum alimenti eſt. Græci vocant βόφιμα.

Inſtaurata
leſtio.

Et iis quidem obl. Graecus codex deprauatus eſt, habet enim
χαίροντι μὲν ἐπὶ τοῦτοις. Id eſt, oblectetur, neque ob hæc pro χαί-
ροντι δ' ἐπὶ τοῦτοις omiſſa negatione μὲν. Sic legit Oribasius, quod
etiam Oroſcius annotauit: ſed Gemuſæus omiſit.

IN XLII. CAPVT.

Vomitus
quot modis
excitetur.

QVoniam laborioſe vomentibus. Hoc caput ex primo Ori-
baſij ſumptum eſt. Vomitus primū victus ratione exci-
tatur: deinde medicamenti &c. Victus ratione excitato vtuntur
etiam in ſecunda quoque valetudine: præterea in acutis fere mor-
bis

quum bilis, aut pituita in stomacho superat. Medicamentis vomitum facientibus, neque sani, neque acuta aegritudine occupati tentur. Nam ea longis tantum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam veteres cum nihil in medicina spei deprehendissent, ad vomitum solebant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine ulla ratione facitantes, optimis quibusque medicis laudem præripiunt. Nam ea medicamenta propinant, quæ supra & infra valentissime purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati plurimum restituitur: si autem moritur, audacie suæ & temeritatis patrociniū habent, quod scilicet morbus fuerit desperatus, tot medicis antea curationem frustra molitis. Ceterum quando potissimum vomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de victu privatorum docet. Sex mensibus hybernis inquiens, vomitu, æstate clysterijs vtendum est. Quia enim per hyemem pituita in ventre generatur, vomitu eam euacuari precipit: æstate vero bilem supernatantem, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria in Aphorismis videri queat: vbi habet: Aestate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus ex sententia Galeni, totum corpus si purgare volueris, æstate per superiorem ventrem, hyeme per inferiorem medicandum est. Sicut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quod vergunt adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere volueris, per opposita reuellere conducit. Melancholicus autem humor quocunq; in loco fuerit, per inferiora educi debet. Ceterum alij singulis mensibus vomunt: alij per longiora intervalla: alij nullo tempore præscripto, sed quoties aut vino, aut cibo plenior se ingurgitarint. Qui autem vomere huius mense vult, inquit Polybus, & post eum Celsus, melius consulet, si biduo continuant, quam si post quintumdecimum diem vomuerit. Galenus autem nihil referre dicit, si ex intervallo non continuatis diebus vomas. Porro vomitus quomodo medicamentis excitetur, septimo libro est comprehensum.

Ferculum ex fabis. Græce hoc vocatur ἔτυθ. Galenus interpretatur libello de euchymia his verbis. ἔτυθ δὲ οὐκ ἄλλο τὸ ἐν τῷ ὀρεχθίῳ συμπίνῃ καὶ χερσίνων ἀνδραγαθίῳ &c. Verum quod sequitur in codice λαὶ τὰ πικρὰ τῶν λεγῶν, hoc est, & pinguiore carnes, vbi legendum censeo καὶ τὰ πικρὰ τῶν λεγῶν, quod est, & copiosiores carnes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, vt est suilla aliorumq; animalium vomitum posse excitare. Verum Orbasius nobiscum sentit & contextus requirit.

Empirici non
fratratatis.

polybus.

Quando vomitu vtendum.
Collatio sententiarum.
Quomodo totum corpus purgari debet, & quomodo pars corporis.

Humores ne crescant per opposita reuellendi.
Quando vomendum.

Neglexit
Orosius.

Chyli legu-
minum.

Verum non solum. Hoc quoque superiorem lectionem confir-
mat. Nam χύλοι hoc est, succi seu cremores non de carnibus animalium
dicitur, si quid iudico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de her-
bis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores, secutus Var-
ronem & Celsum, qui vocant cremorem ptisanæ, aliorumque grano-
rum, ac leguminum.

Irrites. Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis: intelli-
ge & in os demissis.

Instaurata
lectio.

Ne cesset vel intermittat. Manca videtur sententia græca:
ἐμεινὲν δὲ καὶ τὸ μὴ ἀνέβαιναι καὶ διαλείπειν ἐπὶ τοῖς ἐμείοις, quod
est: Eum qui vomere debet, non oportet cessare, nec intermittere. Quid
hoc est, nisi ponatur aliquid, quod terminum eius signet? Nā hoc pa-
cto perpetuus, vomitus, aut simile quippiā intelligi possit, quod quā-
sit absurdum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco
ἀχρεῖς ἄν ἀπαύσῃ λυπῶν καὶ ἐκβάλλῃ. id est, Donec omnia, quæ infestant,
eiecerit. Ut est in Oribasio, quod Orosius & Gemusæus prae-
rulerunt.

Orosius &
Gemusæus
nimium in
aliorum er-
ratis occu-
pati.

Epithymi
dosis: non ani-
maduersa ab
Orosio.

IN XLIII. CAPUT.
M Ane epithymi drachmam. Nusquam inuenio minus epi-
thymi pondus ad aluum ducendam. Alij drachmas tres pro-
pinant, alij quatuor, alij quinque. Nec opinor drachmam unam quip-
piam proficere, eoque mendum forte est. Item Paulus in septimo dra-
chmas quinque præbet. Auicenna usque ad quatuor.

Varietates
clysterum.

IN XLIII. CAPUT.
C Lysteribus utendum. Quemadmodum balneorum præfecti,
lapidum sordes, lutumque abluunt, ita clysteres ventriculi &
intestinorum pituitam & bilem detergent, qui pro humoris diuersi-
tate etiam variari solent: alij præterea lenes, alij acres habentur. Itē
triplici liquoris mensura constant. Summa est, tres heminae, media,
duæ, minima, una. Si Oribasio credimus, eoq; miror Paulum hic se-
mibeminam ponere, quod fere apud nos dimidia libra est: quæ pa-
rum adeo euacuabit.

Mensura.

ἀχρεῖς.
παράλυσιν
ἀπέρτοι.

IN XLV. CAPUT.
V Timur etiam gland. Et hoc & superius caput ex primo Ori-
basij transcriptum est. In calce habetur græce παρὰ τοῖς ἀχρεῖς
quasi remissionibus, aut relaxationibus, vel resolutionibus. Sed πα-
ρὰ τοῖς & παράλυσιν, ita differunt, quod illa partem aliquam corpo-
ris obsidet: hæc vero totum corpus. Dicuntur etiam ἀπέρτοι resoluti
in aliquo membro.

IN

H Vmores in capite. De medicamentis agit que materiam ex capite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi modum prescribit. Ac primum Græco vocabulo ἀποφλεγμῶσις *ἀποφλεγμῶσις* appellat. Scribonius compositione nona exponit his verbis: Si per os magis detrahere materiam visum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam. Celsus etiam lib. 4. cap. 1. explicat: Gargarizare his, quæ saliuam mouent, inquit: Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata adhibentur. Recte igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγμῶσις, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares caput purgat, ἐρρινον *ἐρρινον* vocatur. Solet enim hoc per cornu, quod ἱερὸν χύτρον dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam ex capite detrahunt. Tertium ab illis διαχειτόριον *διαχειτόριον* nuncupatur, quod palato, columellæ, & narium foraminibus applicatur. Verum hoc in vniuersum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse adhibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Sapa. Græci hoc vocant σίγαρον, & ἑψημα. Galenus libro 3. *ἀπὸ τῶν γυν.* cap. 11. ἀντὶ τοῦ ἐν τῶν φροχίονων ἢ λυκλίσκων, ἢ ὅπως ἐκ νομῶν ἐπιβόλοι τι, ὥν ἐστι: ὅτι καὶ ὁ πολυεὶς αὐτὸ ἐψημα, & σίγαρον. καὶ γὰρ τὸ καλῶν ὡς αὐτὸς βαλὼν βεβωσσι. Solutio igitur vno pastillorum aut orbiculorum, aut quomodocunque vocare libet, ex quorum numero etiam est qui Polydæ ascribitur, ex Sapa, quam Græci ἑψημα vel σίγαρον, vel quomodocunque hanc quoque velis appellant. Est autem seræum vel hepséma, vel sapa, ingenij non naturæ opus, musto ad tertiam usque partem mensuræ decocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutum vocamus. Hæc Plinius libro decimoquarto cap. nono. Idem libro vigesimo tertio, cap. secundo: Vino cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia pars supersit. His consentit Leontinus agriculturæ scriptor Græcus, in hunc modum inquit: τλεῦν δὲ καλλίστου ξίτους ἢ, ὅν καλλίστου ξίτους. Ἐπὶ ῥίτης ἑψῶν καὶ ἀπασίς, βεβωσσι τοῖς οἰκείοις. Hoc est: musti optimi sextarios octo, vini nobilissimi sextarios centum, ad tertiam coquens, despumansq; eximiam sapam conficies. Columella refert quosdam partem quartam eius musti quod in vasa plumbea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum sententia recenset. His accidit aliud sapa nomen Latinum, Calenum scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroënum, quod vir quidam non mediocriter in literis versatus putat ex Palla *dy sa*

ἀποφλεγμῶσις

Materiā per os detrahere. saliuam mouere.

ἐρρινον.

διαχειτόριον.

Sapa.

Defrutum.

Leontinus.

Calenum.

Voces con-
funduntur.

di seculo manasse, apud veteres tum Græcos, tum Latinos in usum non fuisse. Verum rem penitus introspectanti Calenum apud Strabonem urbs est Campanie, in cuius agro vinum optimum & dulce nascitur. Plinius libr. quartodecimo, cap. 16. ijs præponi solebant Calena. Legendum itaque censeo apud Palladium: Modus huius & virtutem mutabit, & nomina. Nam defrutum à deferuendo dictum, ubi ad spissitudinem valde despumauerit, effectum est: Calenum, cum tertia perdita, duæ partes remanserint: sapa, ubi ad tertias redacta descenderit &c. Quemadmodum igitur οἰσάριον ἐψήμα, & ἐψήριον apud Hippocratem inter se confunduntur, ita apud Latinos sapa, & defrutum. Cum ipse Columella lib. 12. scribat, mustum quando dulcissimi saporis decoquitur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, defrutum vocatur.

lectio corri-
gitur.

Hoc non ad-
uertit Oro-
scius.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo. Hoc sumptum est ex libr. 2. de Compositione medicamentorum secundum locos ad calcem: verba ita sonant: ἄλλο διαχυσίον σέμα] & ἄπεινα διὰς τὸ τῶν χυλῶ χρίσας, τὰ λεῖψα τὰ σπένοντα, καὶ τὸν λεῖψα τὸ σέμα] & τὸ δ' αὐτὸ τὸ τοῦ ἡρῖνον ἐστίν. Id est, aliud quod ori illinitur. Saponem betæ succo dilutum palati regionibus & columella illinito. Idem vero hoc etiā per nares infunditur &c. Deinde sequitur paulo post, ὑπορίσσω δὲ πολλὰ καὶ ἐχρησάμεν φαρμάκων ἐγχεόμενα τῇ ρινὴ μελανθίῳ, ὥστε μὴν ὁξὺν δειμῆ διαβρίχωμεν ὡς μετὰς ἡμέρας, ἅτα τῇ ὑσθράει ἐν ὁξὺν πάλιν λείψω, καὶ ἐγχεώμεν εἰς τὴν ρινὰ διὰ τῶν μυκτῆρων. Hoc est: facili autem paratu subinde rursus sum medicamento melanthio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerans, deinde postero die ex aceto rursus leuigans, infundensq; narium foraminibus &c. Ex priore igitur contextu Galeni, Pauli lectio corrigenda venit, legendumq; pro εἰνῆπι, quod est sinapi, εἰσπῶν, hoc est sapo. Cui lectioni astipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo gallorum inuentum rutilandus capillis, ex seuo & cinere, liquidus & spissus. Hoc non aduertit Orosius, tam seuerus aliorum castigat.

IN XLVII. CAPVT.

QUæcunque urinae ciendæ sunt. Omnia ex Oribasio pene descripta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi radices vstæ, aut cinis earum cum melle. Caterum quibus de causis menses retineantur interim, tertio libro abunde condisces.

Vulvæ subiiciuntur. Græci vocant medicamenta proprie, quæ lana excepta naturalibus conduntur, ὑπερδῆλα, quales sunt pessi disti, aut penicilla, colliriæq; ut apud Aristotelem in 2. de generatione

ione: τὰς δὲ γυναικας βαρυνέουσι τοῖς τε προδίοις, ἢ δὲ διὰ τῶν ὀστέων
 ἐν ὅσῃ καὶ πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ δύραθεν καὶ τῶν ἄνω: καὶ τοῖς ἐγκρίτοις.

Hoc est, mulieres autē q̄s quæ vuluæ insinuatur, explorant, nū odores
 ad spiritū qui foris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant:

tem q̄s quæ illinuntur &c. quod Hippocrates ex suffitu aromatum
 ad nares & os delato cognosci tradit. Ceterum προδία veniunt à προδιετα.

verbo προσίθεαι, quod priuatim signat, subijci naturalibus mu- προσίθεαι
 lierum. Dioscorides lib. 1. cap. 1. προσέθεαι ὅς ὡς κολλύριον μετὰ μέ-

λιτ & ἰμβρυα καὶ χροπῶσι. Hoc est: radices iridis collyrij modo cum
 melle naturalibus fœminarum subiecta fœtus excutiunt. Hinc etiam

προδία derivantur, idem quod πρόδιετα, significantia- Dio-
 scorides de cōsta loquens, Ἀνάμιν δὲ ἐκ τῶν ἀγῶν, καὶ τῶν

πρὶ πλὴν ὑστέρων παθῶν ἀγῶν, ἐν προδίαμοι, καὶ χροπῶσι
 καὶ πρὸς αἰσῶσι, quod Latine sonat: Menstrua vero educit, & vuluæ

affectibus medetur, in pēsis subiecta, supersufusionibus & fomentis.
 Quemadmodum igitur προσίθεαι apud Græcos usurpatur, ita

subijcere, apud idoneos Latine scripturæ scriptores. Id quod ex Celso
 licet deprehendere, lib. 5. cap. 21. ubi habet: Sed alia quoq; vtilia sunt,

ut ea quæ fœminis subijciunt: πείσους Græci vocant.
 Aut alliam Lege in codice Græco ἢ σκέρδον λέειν προσίθεαι, non ut habetur impressum ἢ σκέρδον λέειν προσίθεαι. Id nec O-

roscius, nec Gemusæus aduertit.

Subiicere.

Oroscius hos
 neglexit.

IN XLVIII. CAPVT.

Svdorem eliciunt. Quemadmodum aluus quotidie respondens,
 & vrina, aliaq; recrementa reddita sanitati faciunt, ita sudor

etiam cum opus est effusus, non mediocriter corpus conseruat. Ex ci-
 bo igitur dum concoquitur, duo recrementa generantur, alterum,

quod crassius est, crassioribus intestinis transmittitur, alterum quod
 tenuius, cum chylo adhuc fertur. In iocinore chylus in sanguinem con-

uersus, ad cauam venam transit. Quem ubi serosi illi humores, quod
 excrementum tenue appellauit, eò traduxerint, non conuenit, ut diu-

tius in corpore maneant, ideoq; renes cauæ venæ non procul à iocino-
 re adherent, qui illos recipiant, pauco sanè adhuc aquoso humore san-

guini permixto, vehiculi causa, qui & ipse purgari per cutis meatus
 debet, vocaturq; sudor. Si itaque copiosior successu temporis collectus

fuerit, ut iam onus venis exislat, artificio elici debet, natura videli-
 cet cessante, vel ob meatuum densitatem, vel ob aliam causam. Scri-

bit itaque remedia quedam Aegineta, quæ ex Oribasio omnia mu-
 tuatus est.

Recremeta.

Sudor quo
 modo gene-
 retur.

Simi

Orosius nō
aduertit.

Similiter inſperſa. Codex impreſſus vterque habet ἐμπλασμένην, quod eſt emplaſtri modo adhibita pro ἐμπλασμένην, id eſt, inſperſa. Non enim ſimplicia enumerata, materiam habent, quæ illi nō poſſit. Oroſius & Gemuſæus præterierunt, in aliorum erratis caſti-
gandis occupati.

IN XLIX. CAPVT.

Laudatiſſimus. Quemadmodum vino, eſcis exercitatione, vigi-
lijs, ſomno ac venere, alijs alijs vti pro ratione ætatis expedit,
ita de aëre quoque iudicandum, quem optimum in pulmones trahere,
omnibus iuxta ſalubre eſt. Transcriptum eſt hoc caput pene ad ver-
bum ex Gale. 1. de ſanitate tuenda, & Oribasio.

Galenus. Peſtilentem auram exhalante. In codice impreſſo habet ἀγλη-
τῆριον ἀνδρῶν ἀναπνεύοντων, hoc eſt exitialem perflatum ſurſum
mittente. Galenus vnde hæc mutuatus eſt, ἀποπνεύοντων habet, quod
eſt, reſpirante, exhalante: quanquam parum reſert, hoc, vel illo mo-
do legas.

Nota morbo-
rum publice
graſſantiū.

Hoc igitur modo. Hippocrates iudicium hoc maximū in mor-
borum cauſis cognoscendis tradit, nempe ſi omnes, cuiuſcunq; ætatis ac
temperaturæ fuerint, morbis conſiſtentiur, aërem autorem eſſe intelli-
gemus: vt poſtea in ſecundo volumine diſces.

IN I. CAPVT.

In lib. de eu-
chymia & ca-
chochymia.

Aquarum. Ex eodem Galeni loco hæc transcripta ſunt. Au-
tor autem hic noſter ad ſanitatem tuendam etiam aquæ bonæ
viri facere teſtatur. Si quidem ſit interim, vt alibi Galenus me-
moriam producit, vt totus exercitus præuæ aquæ uſu de vita periclitetur.

ἀτρίραμνα.

Aegræ concoctionis. In Græco ἀτρίραμνα male pro ἀτρίραμνα
legitur. Quæ dictio proprie de leguminibus dicitur: nempe concoctis
difficilibus ob duriciem. Galenus in libello, quomodo boni maliq; ſuc-
ci generantur, in hunc modum ait: ἐνία δὲ τῶν ἀμυγδαλῶν ὁπρὸς
τῶν, & ἵδως ὁγκώδαι πύφους ἐφ' ἑλκὸς καὶ κληῖται δ' ἀτρίραμνα
τὰ τοιαῦτα τῶν παλαιῶν ἑλλήνων τινές, id eſt: Nonnulla vero
cerealium ſemina nequaquam ſolent intumeſcere, cum coquuntur ro-
carunt autem eiſmodi ex veteribus Græcis nonnulli δυντρίραμνα,
quæſi dicas rebellia, perniciosaq;. Ariſtoteles ἀτρίραμνον ὕδωρ pro
cruda aqua dixit in quarto de generatione animalium διὸ καὶ ἀτρί-
ραμνα ὕδατα, καὶ ψυχρὰ, τὰ μὲν ἀτεκνία ποιεῖ, τὰ δὲ θνητογόνια.
Hoc eſt: Quare etiam cruda aqua, & frigida partim ſterilitatem,
partim ſœmellatum procreationem efficit. Cæterum ἀτρίραμνον habet
conu

ἀτρίραμνον
ὕδωρ.

ntarium, τέραμον. Theophrastus in octauo: τὸ δὲ τέραμον, καὶ τέραμον, τέραμον λέγεται ἐπὶ ἐπὶ μόνον. Quod est: Teramum & atera-
um de leguminibus tantum dicitur.

Aut terram colatur puram. Paulus non habet, puram, sed Galenus vnde hac transcripsit, integra sententia sic habet: ὡς ἐσὼν ἡ γῆ πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐρρώγασιν αἱ πηγαὶ, καὶ διὰ τὸς τινὲς γῆς διὰ τὴν ἑλκυστῆς. &c Hoc est: Et quarum ad Orientem solem
ms erumpit, & per meatum quendam aut terram puram colatur.

Instaurata

lectio.

Non aduer-
tit Oroscius.

IN LI. CAPVT.

Rigidam lauationem. Hoc est in aqua frigida lauationem, quam Græci ψυχρολουσίαν vocant. Celsus libro primo frigide
liam lauationis meminit. Aestate aptissima sunt & caro, & olus, uatio.
otioq; dilutissima, frigida lautio. Hac non omni conuenit atati,
ed ubi iam corpus iustam impleuerit magnitudinem. Nam in adu-
lescente, incrementum eius remoratur. Hoc quoq; ex Oribasij libro
citato transcriptum est.

Iis qui nullo victus. Qui enim cibus crassi succi, maliq; rsi sunt, q; statim ex frigida meatus occluduntur, per quos discuti, euocariq; debebant. Græce est πρὸς ὑχὲν quod signat, vt contigerit, nulla ra-
tione habita, quemadmodum faciunt, qui nec debito tempore, nec pro
nature modo, aut exercentur, aut cibum sumunt. Exacte autem vi-
uunt, qui exercitationes ante cibum moderatas subeunt, & quam-
diu libet, vt ait Galenus dormiunt, ad concoctionem scilicet obeun-
dam, nec balneis à cibo vtuntur, postremo qui cibos medij tenuium,
crassorumq; ordinis assumunt, quales sunt exquisitissimi, maximeq;
inculpati, tanquam in symmetria excessuum constituti. Huius ge-
neris sunt panes optime elaborati, carnes gallinarum, gallorum, a-
uium, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarū, turturum,
turdorum, merularum, omniumq; passerulorum, praterea piscium
saxatiliū. Quanquam qui plurimis exercitationibus vtuntur, vt
agricole, nautæ, alijq; id genus tam exacto victu opus non habent,
quippe caloris beneficio qui laboribus excitatur, etiam crassi succi ci-
bos tuto assumunt.

Exacte viuē-
tes qui.

Porro multis. Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut la-
boris quid subierunt, totum corpus stipule modo aridum habentes, q;
ubi in aquam frigidam se proiecerint, iuuantur: potissimum qui va-
lentibus sunt viribus, & frigido soli assueti.

IN LI. CAPVT.

Naturalium balneorum. Vocantur balnea naturalia, que Balineæ na-
sua sponte talia proueniunt: alia calida per se, alia calefiunt. turalia.

Galen

Differentia. Galenus libro primo de simplici medicina illorum mentionem facit. Plinius lib. 31. cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sulphurata nervis, aluminata paralyticis, aut simili morbo soluta. Bituminata, aut nitrosa utilis est bibendo atque purgationibus. Plerique in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum quod est inimicissimum: namque paulo diutius quam balneis uti oportet. **Ufus.** Plinius. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec a cibo potuque interim abstinent, corpore etiam nullam antea evacuationem per medicamenta experto, quod contra omnem rationem est, præterea vno balneo et paralytici, et sanguinem spurientes et lienosi, aliisque affectibus obnoxij utuntur.

Aquarum naturalium. Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Ceterarum nulla humectare potest, quod videlicet non sint exacte aqua, sed mixta et adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

IN LIII. CAPVT.

sic etiam Polybus de ratione priuationum.

Quæstio cur hyeme laborandum magis.

Non alienum est. Celsus ex Hippocrate eleganter transitulit eandem fere sententiam: Eo tempore anni inquit, calidis omnibus potius utendum est, vel calorem mouentibus.

Pluribus uti laboribus. Querere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quam alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait ventres hyeme et vere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quam alio utendum est. Si quidem calor naturalis per se copiosus, et efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quam in ipsa æstate, aut alia anni parte.

Solutio.

Huic quæstioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem ventres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particula autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac nonnullis ad ventris usque regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in ventriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt, sed aliquatenus ea frustrantur. Præterea totius corporis venæ ab aëre circumfluo refrigeratæ haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc vna cum pituitosioribus qualitatibus assumunt: unde etiam humor crudus colligitur, qui laboribus et exterioribus particulis recalescentibus concoqui, digerique debet.

Polybus.

Plus esse. Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: το

μᾶλλον

ὅτι χαμῶν & ἰδίον ὡς πλῆτα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάχιστα. εἶναι δὲ
 ἢ τὸ πῶμα ὀνυρ ὡς ἀνητέτατον. quod Celsus in hunc modum in- Celsus,
 rpretatur. Hyeme plus esse minus, sed meracius bibere conuenit.

Vere autem ineunte. Vide libellum Galeni, cui titulus est,
 uos & quando purgare oportet.

A laboribus conquiescendum. Intellige ὅς quibus per hyemem
 sus fueris. Semper enim exercitatio corporis necessaria, verum mi-
 nor nunc, & facior, ne calor naturalis, qui à sole tunc euocatur,
 tiam per hanc magis dissipetur.

At in autumnno. Celsus eadem fere habet: per autumnū, inquiens
 propter cibi varietatem, periculum maximum est. Itaq; neq; sine ve-
 ste, neq; sine calciamentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidi-
 bus, neq; sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma. Græce est ὀπώρας. Nam pomum generale vocabulum est, ὀπώρας.

& quicquid apud Græcos opora continet, complectitur. Discrimen ἀκρόδρυα.

ponit Democritus inter oporas & acrodrya. Quicquid herbaceo fru-
 ctu viret lignosi nihil exterius habens, vt duracina, pyra, mala dama-
 scena, pruna, opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya verò contra no-
 minantur, quæ putamen exterius, lignosumq; fructum continent, vt

malum punicum, castaneæ, pistacea, nuces, vtrunq; genus Salgami
 nomine complectuntur latini, à quo Salgamarius originem duxit.

Celsus eodem loco iam citato: poma inquit, nocere quidam putant: quæ
 immodice toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo

remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galen. opti- Galenus,

me vtriusq; vocis significatum exprimit Commentario περὶ ἐνχυ-
 μίας καὶ λιποχυμίας, in hunc modū: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῖται

καλοῦμενοι λιάρποι, λιπόχυμοι πάντες. ἰὰρ δὲ διαφθαλέων ἐν τῇ

γαστρὶ φαρμάκων ἀληθινῶν πλεονῶν ἢ καὶ ὥσπερ καὶ τὰ μῶρα. ἢ

δ' ὄνυμαί σιν ἰδίως οἱ ἑλλῶες ὀπώραν ἐκόνους καὶ σταφυλαῖς ὄνους,

ἀμείνων μὲν ὅτι τῶν εἰρημένων. & τὰ δ' ἄλλα τὰ ἀκρόδρυα ἔστι

λιπόχυμά ὅτι &c. Hoc est, aliarum vero arborum fructus fugaces,

omnes, maligni sunt. Sin autem in ventre computruerint, medicamē-
 ti venenosi naturā induunt, sicut & mora, &c. Quam autem Græ-
 ci proprie nominant oporam, ficubus & vuis comprehensam, prædictis

est potior. Plinius compositionem quandam Oporinen appellat ex

fructibus generatam, vt confundat differentiam quæ inter oporam

& acrodrya existit. Tu igitur si voles oporam fructus omnes appella-
 bis ὠρεῖταις λιάρποις, horarios fructus.

Post æquinoctium. Intellige autumnale, quod ad octauum ca-

lendas Octobres, vel ad sextum incipit, vt Florentinus Agricultu-
 X

Quando pur-
gandum.

ra scriptor memoriæ prodidit. Consultit itaq; Paulus, ut si forte humores vel melancholici, vel adusti in corpore redissent, ante hyemem in autumno purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum, sanguinis dimissione: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autumno, qui ex æstate reliqui retentionem sunt experti. Quare in duobus æquinoctiis fere, sani corporis euacuationem moliemur, ad futurorum accidentium præcautionem.

IN LIIII. CAP. VI.

Omnis mu-
tatio subita
noxia est.

Consuetis
aliquid tri-
buendum.

Densi.

Rari.

ἡδυάπνοσ-
τος.

Facili præditus. Hoc caput ex libro primo Oribasij sumptum est. Vult autem Paulus in omni vitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra consuetudinem est, nocet. Neque enim ex nimio labore, subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Qui igitur in laboribus vitam agunt, si facile ferunt, mutationem non consulit. Qui in otio degunt, sani neque hi ad labores sunt cogendi. Siquidem natura consuetis gaudet. Verum ut medio-
cris exercitatio summum corpori præsidium conciliat, ita ocium, ex-
tremum adfert malum, ut alibi Galenus ait, præsertim si corpus den-
sum, quod non ex facili diffletur, contigerit: sin autem natura est ra-
rum, perspiratu non impedito, aptisque nutritur humoribus, etiam si
non exercitetur, vix morbis est opportunum. Siquidem per meatus,
quicquid fuliginosum viscosumque fuerit, diffletur, expelliturque, ac qui
talem corporis constitutionem, fabricationemque habent, à græcis vo-
cantur ἡδυάπνοστοι. Exercitium hoc loco intelliges, ex præscripto
institutum, quod multi ante cibum, uti expedit, subire nequeunt ciui-
libus negotijs, aut alijs etiam districti-
us igitur si meatuum cutis ra-
ritas et amplitudo fauet, etiam sine exercitio, sanitate aliquandiu
fui licet.

Imo nec eos. Hippocrates hanc sententiam in aphorismorum
secundo confirmat: τὰ ἢ ἐν πολλῷ χρόνῳ συνήθεια, καὶ ἢ χεῖρον τὸ αὐ-
τῶν, ἢ αὐτῶν ἐνοχλεῖν αἰσθῆ. Hoc est: Quæ longo tempore consue-
ta sunt, etiam si insuetis sint deteriora, minus molestare solent. Nec ea de
exercitijs tantum, sed omnibus quæ ad corpus attinent, accipienda
veniunt.

Necessitas
purgationū
contra eos
qui nunquam
medicina utē-
dum docent.

In omnibus autem his. Galenus id libello περὶ ἐνχυρίων, ἢ
ἐκνοχυρίων probat in hunc modum: Multi eiusmodi vitæ institu-
tum sequuntur, ut ipsis non liceat, vel ante cibum probè exercitari,
vel satis opportune cibum sumere, vel alimenta feliciter concoquere:
qui sane à morbis immunes permanere non possunt, nisi ex intervallo
alii

si subductione sibi prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua ignis detractioe &c. Quamquam Paulus etiam intelligit ut cotidie alius bis, aut certe semel respondeat inculpate pro assumorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandam esse docuimus.

IN LVI. CAPVT.

Vomitionibus. Quandoquidem plerisque necessitas incidit, nauis gio per mare proficiscendi, Paulus etiam hic remedia malis obuenientibus enumerare voluit; Oribasium secutus libro quinto: facit ut vini mentionem, quod maxime stomacho vomitionibus turbatum conuenit. Vocat autem græce διδάριον quasi dicas villum, sicut etiam ξίλιον τὸ ἀπὸ μέλιτος & pro oxymelite.

Polentæ polline. Hoc est tenuiore parte farinae ordeaceæ τοῖτα. Pollen polentæ. Toco autem pollinem cuiuscunque partem subtiliorem, non tantum farinae triticæ, ut putat Orosius. Nam Celsus, Scriboniæque thuris pollinis meminit. Plinius præparationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Polentam quoque græci non aliunde præferunt. Pluribus fit hæc modis. Græci persusum aqua ordeum siccant nocte una, ac postero die figunt: deinde molis fiangunt. Galenus libro primo de alimentis, de nouello ordeo τοῖτο intelligit. Græci pollentam ἀλφιτον nominant: tenuiorem eius partem, ἀλφίτου παπᾶλη.

διδάριον.

ξίλιον.

Pollen polentæ.

Errat Orosius.

ἀλφιτον.

ἀλφίτου παπᾶλη.

παπᾶλη.

IN LVII. CAPVT.

QUum immodice corpus. Ex Oribasio quinto, methodi vero Galeni decimoquarto hæc fere transcripsit. Caterum medici officium est, ut intemperies corrigere, continui diuortium, committere, ita quoque amputare, & præscindere, quod magnitudine, vel numero redundat, reficere autem, & fingere quod desit. Verbi causa, cum corpus ex corpulentia eò deuenit, ut nec ingredi sine molestia, nec sedem propter ventris molem contingere, nec respirare libere possit, hanc liquare & tollere, æque nimirum, ut quando corpus ali desinit, huic quoque reficiendo prospicere. Paul. græce dixit ἐταρ εἰς πολυσαρ- λυσσῆναι ἀμείψον ἐκπαρῆν τὸ σῶμα. Hoc est: Cum corpus in corpulentiam immodicam deuenierit. Celsus plenum corpus dicit & obesum.

Calidior & siccior. Græcus codex non habet καὶ ξυρρίσσει, id est Lectio casti- est & siccior. Ex Galeno autem addendum venit, quod Gemuseus gata. præterit.

Citas exercitatiões. Græce dixit Paulus ὁρίει γυμνάσεια, quod ad ὁρίει.

verbum sonat, acuta exercitia. Galenus in commentario libelli de ratione victus privatorum interpretatur fere quod decimoquarto docuit: ἡ ταχέα λίγναις τὴν δρμασίαν ἐπιπλεῖν ἀνξάνουσα τῆς τοῦ σώματος. Quod est: Velox motus calorem amplius augens, corpus liquat. Idem igitur est ὀξία, & ταχέα. Celsus cursum, multam obambulationem, omnemq; vehementem exercitationem ponit.

ταχέα.

Iuuat itidem crassos insolatus. Crassos hic intelligo, quos graeci λιπαροί, πολυσάρκεις, παχέας nominant. His opponuntur λεπτοί, ισχυροί, λιγροί, στυφύεις, & λεπτοί, λεπτοί, στυφύεις. Celsus contrarios inter se vocat, plenum, & tenuem, gracilem & obesum. Insolatus autem, graece dicitur ἡλίωσις, quod Celsus interpretatus est sol inurens: & omnis calor, quatenus Oroscio id non placeat, homini in bonis authoribus parum versato.

λιπαροί.

πολυσάρκεις.

παχέας.

ἡλίωσις.

Fallitur
Oroscius

Præbire autem non debent. Hoc intelligendum est nimirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus deinde interpretatus est: sed non nihil euariat. Graece primum sic habetur: καὶ τοῖς σιτίοισιν ἀδικοῦσιν, προπαραπομπὰς δὲ τοῦ λειπομένου, καὶ μὴ πρὸ σφόδρα ψυχροῦ, hoc est: Et cibus agredi, vino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumptæ epulae, & vini non perfrigidi potio ieiuno in consuetudinem adducta. Galenus autem sententiam corrigens, dicit legendum μὴ ὅλως δόρυμόν, quod est, neq; omnino calidi.

μνοσιτέμ.

ὀλιγοσιτέμ.

Galenus non
semel modice.

Semel tantum die. Graeci hoc vocant μνοσιτέμ. Galenus autem in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigat, λέλλειν, inquit, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῷ πρὸς αὐτῷ μὴ μνοσιτέμ, ἀλλὰ ὀλιγοσιτέμ, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulas assumere, sed modicas. Quidam enim ex iis qui semel tantum cibum sumunt, multo plus ingerunt, quàm qui bis capiunt.

IN LVIII. CAPVT.

Q Vum extenuatos. Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem victus rationem

Vina crassa.

Linacri locus.

Crassi succi
cibus.

extenuatis accommodam, primum quidem vinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica vel Asiana, aut etiam Hispana. Linacer autem methodi interpretes vertit δὲ τοῦ παχέου, vinum pingue, qua ratione, vel quem secutus autorem nescio. Dicuntur autem vina crassa, quæ succum crassum habent, multumque alunt. Cibus autem crassi succi, qualis est, alica, porcina caro, panes furnacei, & textuacei, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crassi,

crassi, omnes ad nutriendū sunt valentissimi: & si probe in ventriculo ac iocinore concocti fuerint, sanguinem benignū generare solent.

Exercitatio modica. Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσιον ἡ βραδύτητα. Hoc est, exercitia autem lenta: & optime quadrat lectio superiori sententiae, quae de crassis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes. Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicā exercitationem. Rursus Galenus in commentario superius citato dicit extenuatis eadem fere ex usu esse: οὕτω γ', inquit, ἢ τὰ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάσια, ἢ βραδύτητα, ἢ μετὰ ῥοφήν. Quod est: Ita vero etiam exercitia, & pauca, & lenta, & post cibum habebit. Sume igitur vitramus lectionem. Ego secutus sum Galenum in methodo, unde haec sunt descripta.

Contratij
ci.

A pud Poly-
bum.

Deinde frictione dura. Haec sententia & mutila, & deprauata existit in Paulo. Quid enim per haec verba intelligis: λιπαί τε σκληραὶ μὴ πολλὰ πιδύσεις τὸ δέρμα &c. Corrigenda instaurandaq; est ex Galeni libro sexto de sanitate tuenda, in hunc modum: λιπαί τε ῥίψι σκληρὰ μὴ πολλὰ πιδύσεις τὸ δέρμα. Hoc est: Et postea frictione dura non multa cogentes cutem, quo densa, duraq; euadat. Haec Orosius & castigator Basiliensis non aduerterunt.

Lectio emen-
data.

Orosius:
Castigator
Basiliensis

Iis qui pallido. Iram, motusque animi praecipit decoloratis, ut videlicet inde sanguis in exteriores partes trahatur: sicut alij quibusdam medicamentis eo allicitunt.

IN LIX. CAPVT.

Extenuantur plerunq; vide Galenum in decimoquarto Methodi medendi, ubi etiam horū curationem plenius persequitur. Picationis mentionem facit, quae πίσις dicitur graecis, hoc est, pice membris oblita: hyeme his aestate semel, idq; frigidis & humidis, aut utroq; temperamento simul donatis. Nam siccis & calidis eiusmodi medicamenta adhiberi non debent.

πίσις

IN LXI. CAPVT.

Dentient, incrementq; Hoc & superius caput, ex commentario Galeni sumptum est, qui ars medicinalis inscribitur. Deest autem in codicibus Pauli impressis dictio ἡτοι, in capitis principio. Lege igitur τοῦτε ὀδόντας φύσει δύνανται, ἢ αὐξάνονται. Hoc est: Dentes citius producent, & augebuntur.

Instaurata
lectio.

Is ob consuetudinem. Puta liberaliorem cibum sumptum contine, ocii, totamq; deniq; victus rationē: quod apud Galenum ἡ ἑσθία συμβέβηκός, hoc est, secundum accidens, contrarium huic vocat ἡ ἁπλῆ

Consuetudo
acquisita na-
tura.

φύσει, ex natura. Veluti alij nati grandioribus venis, corpore ad gracilitatem idoneo ex ocio diuturno, cibiq; tum validis tum copiosis crasse scunt, alij exilibus venis præditi ex labore assiduo, curis, vigilijsq; & cibis extenuantibus vsi in obesitatem prolabuntur.

Instaurata
lectio.

Hoc etiam
aduertit
Orosius.

Nigri ipsis pili existunt. In codicibus Pauli impressis hæc tota sententia desideratur: planèque ut adsit, necessaria ad disputationem de temperaturis videtur. Nam altera diuisionis pars existit. Repone igitur ex Galeno in arte medicinali in hunc modum post ἐν τῷ ὀλίγῳ θερμότερον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἱ φίχες, καὶ ἡ σὰρξ ἀπίμελα. αἱ δ' ὀλίγω μὲν αἰὲν θερμότερα, παμπόλλῳ ἢ ὑγρότερα, μαλακὰ τούτοις ὅσον ἡ σὰρξ καὶ πολλὰ, καὶ τὸ χροῖμα συμμιγὲς δὲ ὀρυθρὸν καὶ λευκόν. καὶ ψαρόντων ὀλίγω θερμότερα.

Restitutus
locus.

Color autem & capilli. Hic quoque mutilus est codex græcus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν φίχων τὸ χροῖμα, pro τὰ ἢ τῶν τριχῶν, καὶ τὸ χροῖμα. Nec aduertit hoc Gemusæus. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit, si illud vehementer fuerit frigidum, capilli quoq; rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoque erunt intensa. Hoc itaque est pro proportione.

IN LXII. CAPVT.

EXiguum sane caput. Hæc quoq; ex arte medica Galeni transcripta sunt. Præuam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in temorijs præstant pali quos græci λιάμανας appellant, & in adibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cetera omnia in animante solent effingi, mutariq;: ut si caluaria sit rotunda, necessario cerebrum tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaq; paruum est caput, ea quæ ossibus adherent, exigua, aut mutila esse conijcimus.

Figura per-
fecta.

Figura. Nempe quæ ad oblongæ spheræ potissimum similitudinem structa est. Alia vero capitis figura vertice acuminato, qualem Thersites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaque, priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim vtraque: quare etiam suturas præter naturam habet.

Si optime sit disposita. Galenus dicit: Si validam habet ceruicem, alijsq; ossibus optime sit constituta.

Plerumq; igitur. Retuli ad eminentias. Nam figuram non potest. Vult itaque Paulus nonnunquam etiam fieri, ut capita etiam bona existant, quamuis eminentiæ à nature modo recefferint.

IN LXIII. CAPVT.

Min

Minimeque ab omnibus exteris. Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi vult ac si dicas, extrinsecus accideribus quæ calefaciunt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiã in libris de facultatibus naturalibus comprehensa à Galeno reperias.

Summatim circa. In fine capituli hæc clausula habetur. Sonat autem græce ταχύνοι τοῦ πρὸς τὸν κεφαλὴν ἀπὸ τοῦ εἰρη. Hoc est ad verbum: Cito senescunt in his omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimum, mature senium testantur.

IN LXIII. CAPVT.

Fluctuationes. Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδωνας κλύδωνες. Ventriculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehendens, concoquentisq; fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno græco nuper edito Basileæ, κλύδωνες pro κλύδωνας.

Calidis cibis. In impresso codice erat, πολλοῖς pro δυσμοῖς. Nec aduertit Gemusæus, tot manu scripta exemplaria iactans. Gale- Castigatus
locus
num vide in arte medicinali.

IN LXV. CAPVT.

Non modo ventriculus. Ex eodem Galeni libro, eodẽq; fere locum transcripta sunt. Post hæc autem verba: Cor, pulmo, et iecur, sententia Pauli manca videtur, quidquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid enim est, quinetiã bibentes, nõ cessant, vel ut græce dicã, ἢ μὴ δὴ καὶ πίνοντες οὐ πίνοντες, nisi alia præcesserint? Integra igitur sententia apud Galenũ sic habet: ὁ μόνον ἢ τοῖς ἀνθρώποις τὴν καὶ ἀδύνατον ὁρᾷ, καὶ ψυχρὸς καὶ θερμὸς πόματος ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὸ σώμα σπλάγχνα καρδιά, καὶ πνεύμων: ἀλλ' εἴγε διὰ τὸν τούτων θερμότητά καὶ ψυχρότητα, εἰσπνέουσι τε πλεονέκυστοι τε μακρὸν, αἰδάνοντες τε κατὰ τὸν πόμα τοῦ σώματος, ὅς ἐστι πρὸς διὰ τὸν γαστέρα καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ τὸν πνεύμονα, καὶ ἐν τούτοις ἢ συχάσσοι. Hoc est ut interpretatus sum, restitue igitur si videtur condicere: Prius tantũ erat: Nõ solũ, ventriculus sitim vel adfert, vel arcet, ac frigide calideq; potionis appetentiã facit, sed etiã quæ in thorace continetur viscera, cor, pulmo, & iecur. Quinetiã si biberint, nõ statim finire desinunt etc. Quã integra hæc sit oratio, doctis iudicandũ relinquo, meo certe iudicio apponenda videtur, quæ ego textui inserui ex Galeno. Miror Oroscium hunc locum præterisse: Gemusæum autem non castigasse ex veteribus exemplaribus quibus se abundare sæpius triumphat.

Recrementa ipsis interueniunt. Hoc est, crassæ humiditates & pituitosæ arteriam asperam, per quam vox editur, interceptiunt. Græcum verbum est ἐν τῇ αὐτοῖς. Aliis signat, insidet, Lectio in
staurata.
Præterit
Oroscius.
Gemusæus.
ἐν τῇ αὐτοῖς.

inherescunt, si Græcorum grammaticis fidem accommodamus

IN LXVI. CAPVT.

Omisit
Orosius.

Lectiones ca-
stigate.

AC præcordiorum regio. Hoc est qua præcordia incipiunt. Græcus codex habet: καὶ τῶν ἡαβ' παρὰ τὸν δὲ τούτοις πλῆσιον, quasi dicas ad verbum: Et præcordiorum quæ his propinqua sunt. Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus vicinæ hirsutæ sunt. Mox sequitur: Magna vero ex parte quod textus græcus in impresso tantum his verbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ὑδριτοπολὺ δὲ καὶ, atq; sic corrigito. Paulo post: Quinetiam, in græco impresso est καὶ μὲν γὰρ καὶ ὅτι &c, tu corrige ex Galeno καὶ μὲν τοι καὶ ὅτι, requirente id sensu. Rursus pusillanimes, negligentes, pectore glabro, codex græcus plane deprauatus est. Habet enim ἀτολμοι, καὶ μάστιγα εἰσιλοῦν αὐτοῖς τὸ σῆρνον, pro ἀτολμοι καὶ ἀμέλῃ, καὶ ψιλοῦ. Hæc Gemusæus castigator non aduertit, sic nec superiora Orosius.

IN LXVII. CAPVT.

Locus casti-
gatus.

Hoc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ de temperaturis agunt, quasi transcriptum est. Ceterum in clausula venæ duriores, græcus codex deprauatus est. Habet enim αἱ φλέβες ξυραὶ, quod est venæ sicca, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est venæ duriores.

IN LXVIII. CAPVT.

Lectio casti-
gata.

Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus, tales. Vtrunque exemplar impressum mutilum est, desideratur enim ἡ τῶν. Nam legendum est, συνελθούσης δὲ ὑγρότητι & τῇ θερμότητι, λάσιον μὲν ἡ τῶν εἰ τοῖστοι. Hoc Gemusæus præterijt.

IN LXX. CAPVT.

Motus cele-
res.

Quum itaque calida. Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanitate tuenda iuxta principium, & Oribasij quinto sumptum est: conuenit autem recte ut postquam temperaturarum notas descripserit, intemperierum remedia subiungat.

Sollicitudo & vigiliæ. Post hæc dictiones, καὶ λινθήσεων ἀπασῶν ὀξείων. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim verto ὀξύ, quod est acutum. Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant impensius.

Instaurata
lectio.

Humidæ & calidæ natura. In græcis codicibus impressis, tantum humidæ, habetur. Legendum autem ex Galeno, sensu id requirente: αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τῇ φύσει &c. Quod est: Humidæ vero & calidæ natura. Nam ubiq; apud Galenum habes, humidæ & calidæ

lida natura, putredini sunt obnoxia, quod lib. I. de febrium differen- Calida & hu-
tijs hisce verbis confirmat: τοιούτοις αὖ ούκ ἐστὶν ὅσα θέρμα, mida.
καὶ ὑγρὰ. Hoc est: Nam omnia quæ calida & humida sunt, facilli-
me computrescunt.

Rheumaticis, plethoricisque. *V*sus sum græcis dictionibus ope-
ra dedita, quod medicis admodum sint familiares. Poteram autem di-
xisse, fluxionum & redundantie morbis, quemadmodum Linacrus.
Sed nescio quid energia habent voces græcicæ.

Porro defluxionibus. Recte quadrat. Nam superius dixit, rheu ἀπὲρροια.
maticis patent morbis. Vocantur autem græcis ἀπὲρροια corporis de-
fluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri sepe so-
lent humidi temperamento & calidi.

Lauacris, multa exerc. Trifariam hæc lectio apud autores va-
riat: apud Paulum habetur: ἀπὲρροίων ἢ προνοῶν καὶ διὰ τε λου-
θῶν καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ φαφῆς. Hoc est: Defluxionibus
prospiciendum est, lauacris, exercitijs multis, & ante cibum &c. Ori-
basius legit καὶ τῶν ἀπὲρροίων ἢ προνοῶν καὶ διὰ τε λούθῶν καὶ
γυμνασίων πολλῶν &c. consentit fere cum Paulo. Galenus autē in
hunc modum ait: ὥς τε καὶ τὸν ἰδιότατον τῶ τοιούτῳ σώματι τὸ
ἀπὲρροίων προνοῶν καὶ διὰ τε γυμνασίων ὥς ἐφ' ἡμῶν, καὶ λούθῶν,
καὶ φρόνων πλεόντων, ἑκάστῳ ὥς τε τῶν δι' ἑρῶν, καὶ γὰρ πρὸς γυμνασίων
&c. Hoc est, Quare qui huiusmodi corpori tuendo præficitur, prospici-
cere ijs debet quæ ab ipso defluunt, tum exercitijs ut dixi, tum balneis
& cibis pluribus, tum vero ijs quæ per ventrem & urinas reddun-
tur, excernendis &c. In hac oratione mendū plane est: quid enim sibi
vult, cibis pluribus? cū corpus defluxionibus opportunum, sobriam po-
tius viuendi rationem requirat, quàm multorum ciborum ingestio-
nem qui ipsi sæpius fluxiones solent excitare. Legendum itaque exi-
stimo in codice græco λούθῶν πρὸ φαφῆν πλεόντων, quod est: Laua-
cris ante cibum pluribus. Nam ut exercitatio cibum precedens, ita
balneum quoq; superflua corporis discutit, subsequēs autem cibos, cru-
ditatem, eoq; prædicta symptomata procreat. Sed cui auctori assentie-
mur, alius habet pluribus balneis, alius pluribus, exercitijs. Superius
semel dixerat, multa exercitatione. eoq; hic etiā referendū puto dictio-
nē pluribus, ad exercitijs. Hæc nō aduertit Gemusæus nec Orosius.

Lectio nota
tu digna in-
staurata.

Omisit
Orosius.

IN LXXI. CAPVT.

INter frigidas. Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sani-
tate tuenda sumptum est: ex Oribasio autem quinto. Enumerat
autem tres frigide intemperiei differentias, frigidam & siccam, fri-
gidam & humidam, frigidam & mediocrem in siccitate & humi-

Locus resti-
tutus.

ditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter quæ Paulus recenset ἀλσσίατε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abstinentia, exercitia plura, & tenuiora. Vbi legendum existimo ex Galeno, sensu id exigente. ἀλσσίατε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διὰ τῶν λεπτότερον, hoc est: Balnei abstinentia, exercitia plura, et victus ratio tenuior. Hoc præterierunt Oros. & Gemusens.

IN LXXII. CAPUT.

Castigator
Basilienfis.

Intemperies sicca. Hoc autem caput ex septimo methodi ad verbum transcriptum est: vbi docet, quæ potissimum intemperies, seu alterationes facilius reparari queant. Enumerat autem siccitatis differentias tres: quas etiam alibi comprehendit. Verum Pauli codex græcus statim in principio capituli deprauatus est. Habet enim ἡ δὲ ἡ ὕποπαγῆς ἐν σίαις πρὸς ταύτας. Quod nihil fere significat. Corrigitur igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐν ἡ ὕποπαγῆς ἐν σίαις σιωπῶτων, καὶ ἀκνύων, καὶ ἡ τῆς πρὸς ταύτας. In textu latino sum interpretatus græca, quæ desiderabantur. Castigator Basilienfis hoc quoque præterit.

Ex humore concreto. Galenus addit, sicut caro & adeps, Paulus compendij causa omisit. Ceterum caro & adeps nihil aliud sunt, quàm humor concretus: caro quidem, sanguis, vi assimilatrice in carnem redactus: adeps autem humor extra vasa elapsus, ex frigidityte congelascit, concrevitq;.

Chondrum ptisanæ modo. Chondrus omnino fit ex χεα, ut in sequentibus docebitur.

Ptisana, à πτίσας duxit originem, quod ordeum unde præparatur, tundendo deglubatur, ac suo cortice castratum, vsui seruetur. Hordeum mundatū officinæ vocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

πίττωσις.
πίττωται.

Quo picatores vtuntur. Unguentum hoc alias dropax vocatur, quod picem recipit. Vide Paulum, in septimo ad calcem. Solet partibus emacrais adhiberi. Administratio græcis πίττωσις, quasi picatio: qui adhibent πίττωται dicuntur.

Codex Græ-
cus restitu-
tus.

Omisertunt
aristarchi.

Iam vero multæ. Græcus codex non habet ἀσφιδῆ, hoc est, multæ: verum sensus exigit, ut contraria opponantur sibi ἀσφιδῆς καὶ μέτριον. Sic etiam Galenus habet: μινύδω δὲ ἐφεξῆς ἀσφιδῆς ἐκ τῆς λιχάπης ὑποκείτης, καὶ πρὸς πολλὰν θερμότητα. Hoc est: Ab hinc vero iuncta sit multe siccitati ut dictum est, non admodum multa caliditas. In sequenti sententia, restitue græcum codicem, ac lege: ἐπὶ μὲν δὲ τοιαύτης ἀπαιδέξεως πλεονάζοντι ἀγρῶν φυλάξεων. Quæ Orosius, & castigatores Basilienfes omiserunt.

Tepid

Tepidos lactis modo. In Græco codice est, χλιαρά δὲ τὰ ἐλισ-
μαία καὶ γαλακτώδη. Hoc est, Tepidos autem cibos & lacteos offe-
remus. Galenus lib. 7 Methodi dictionem γαλακτώδη interpretatur,
χλιαρά δὲ, inquit, τὰ ἐλισμαία προσοίσομεν ἀ λιαλῶν ἐστὶ Quæ sint ga-
τῶς ἰατρῶς γαλακτώδη, quod est: Tepidos autē cibos offeremus, quos lactode.
medicis vocare lacteos consuetudo est. Idem libro vndecimo Aetij
τὰ ἀλβδα καὶ τῇ λιράσει γαλακτώδη. Hoc est albula, & tempera-
mento lactea balinea, quod est, tepide lactis iam emulsi modo. Cel-
sus tales cibos, lib. 4. cap. 11. in hunc modum inquit: Aqua neq; ea
ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Ibidem: Si vero tormina Egelida.
sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fouere: vel si
venter dolet, ὅσδε egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus
inuuetur.

Quod si ad vomitum sint idonei. In Græco codice mutilatus Restitutus
locus est, in hunc modum: ἐὰ δ' ἰδιότητος ἔχῃ. ἀλλ' ἔα φανιδῶν ἐμέ-
τω, adde post ἔχῃ dictiones duas πρὸς ἐμέτην, quod Gemusæus ca-
stigator non aduertit, volens in compendio eiusmodi intelligi.

IN LXXIII. CAPVT.

Quæ igitur attenuandi. Olim veteres maiore vim in victus
ratione ponebant, quàm in medicamentis: vbi vel humor vi-
ciosus emendandus, vel morbo venienti erat prospiciendum: alia ni-
mirum ratione, quàm huius seculi Medici facitantes: qui statim
cum quis de particula aliqua conqueritur, ad valentissima etiam
medicamenta confugiunt. Ceterum Paulus noster hac ex commenta-
rio Galeni cui titulus est, de ijs quæ bonum malumve humorem gi-
gnunt sumpsisse videtur. Habet ille in hunc modum: καὶ ἀλλὰ
τῶς τοῖς ἰατροῖς ἐνρίθῃ τὰ κληθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιανὰ φάρμακα
ἀ λειψωούσης ἀπαύλα διωάμεως ὄντα. τούτοις γὰρ ἔργον ἔστιν, ἐν-
φράττειν μὲν τὰς σπονὰς διεξίδας, ἀπορρύπτειν δὲ τὸ προπλατίζμε-
νον γλίσχρειν ἐν τῇ χυμῶν τοῖς ἀγνάοις, τιμνεῖν δὲ καὶ λειψύειν τὰ
παχέα τῶν ὑγρῶν, ἀλλ' ἔα πλεονάσει ἐν αὐτοῖς, ὁρρώδες, ἢ πι-
κρόχολον ἐν τῷ χρόνῳ, ἢ μελαγχολικὸν ὀργάζεται τὸ αἷμα. Hoc est:
Quamobrem medici salubria ab ipsis vocata medicamenta inuene-
runt, omnia facultatis attenuatorie: siquidem munus ipsorum est ar-
ctos transitus patientiores reddere, succorum lentorem vasis adhare-
scentem abstergere: humorum crassitiem incidere atq; extenuare. Sin
autē serosum quippiam in eis redundet, vel sanguinem biliosum tem-
poris interuallo, vel melancholicum efficiunt &c. Sunt autem medi-
camenta salubria, cibi loco medicamentorum sumpti, quibus per sani-
tatem vltimur.

Salubria me-
dicamenta
quæ.

Porro

Porro quæ incrassandi. Ex eodem commentario transcripta sunt, ubi in istum modum habet: τὰ ἢ τὸς παχὺς καὶ γλιόχρως γονυσιῶν τε χυμοὺς ἐκισμῶν τε βίσιμῶν τε πάντ' ἐστὶ, καὶ πικρὸν καὶ λῶς ἐστὶ τῇ γαστρὶ, καὶ τῷ ἥπατι, χρηστὸν αἶμα γονυῶν πικρὸν, ἀμιμνήστῶν δὲ τῶν ἐκισμῶν τῶν ἀρχῇ τὰ μεταξὺ τῶν ἀπὸ τῶν τῶν τε καὶ παχυμένῶν. Quod est: Cibi vero crassos, viscososq; humores generantes, omnes & valentissime sunt materia, & si probe in ventriculo, & hepate fuerint concocti, benignum generare sanguinem assolent: verum inculpatissimi inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq; medijs habentur.

Qui se se exercent, & quantum libet. Galenus hæc ita habet: ἔσται μὲν γὰρ ἀνθρώποις εἶναι ἔστι γυμνασίου τε πλεονεχίαν, καὶ λουαῖαν μέχρις ὅς ἂν ἐθέλωσι, καὶ βίον ἔξω τῶν πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἡρώων τούτοις ἐγχερεῖ, καὶ τὰ παχύχυμα καὶ γλιόχρῳ ἐκισμῶν ἐδίει. Hoc est: Quibus itaque exercitijs pluribus uti licet, & quam diu libet dormire: ad hæc qui vitam civilibus negotijs vacantem degunt, & cibos crassi succi, & viscosos tuto assument.

Porro quemadmodum. Ad verbum ex eodem loco transcripta sunt. Galenus autem addit rationem: neutiquam enim, inquit, aliquis agrotabit, si opportune prospiciat, ne concoctione nunquam frustretur, ne Exercitatio. ne à cibo validam quandam ambulationem subeat. Quippe sicut exercitatio cibos præcedens, plurimum conservanda sanitati cōducit: sic qualibet secundum cibos commotio, nocentissima est. Nam alimentum antequam sit concoctione elaboratum, ex ventriculo distribuitur. Unde crudorum humorum copia in venis collecta, omnigenas morborum species procreare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, vel concocti, ac in sanguinem commutati.

Varia ciborum genera. Plinius lib. II. c. 52. Homini cibus utilissimus simplex. Aceruatio saporum pestifera, et cōdimēta perniciosiora.

IN LXXIII. CAPUT.

L. Actuca. Ex libris de alimentorum facultatibus fere mutatus est omnia Paulus. Itaq; cum dicit, eoq; somnum accersit, intellige, vesperi commanducata, ut Galenus uti solebat. Valenter nutrit, græca dictio est βίσιμῳ, quasi dicas, nutriens valde, sic enim docti interpretantur vocem istam.

Ita boni succi. Galenus, cum alia omnia olera paucissimum sanguinem generent, sola lactuca non multum quidem nec riciosum gignit, non tamen absolute ἐνχυμῳ, hoc est boni succi, laudabilem & benignum.

Intybum. Alias græcis σείσις dicitur, in satium & agrestem diuiditur. Quamquam græci per cichoreum tam domesticum quam agre

agrestem intelligant. Sativus intybus duplex, vnus latioribus folijs, Intybus.
lactuca similia, quem nos endiuia, corrupto nimirum vocabulo ap-
pellamus. Alter, folijs strictioribus, multis capillamentis per radi-
cem transeuntibus. Hoc loco intybum, intellige potissimum, quã vul-
go Endiuia nominamus, in acetarijs vsitatam.

Endiuia.

Brasica marina. Forte ea est herba, quam officina soldanellam
vocant circa maritima nascentem, nisi Dioscorides folia longa bras-
sicæ huic attribuisse, quæ in Soldanella non sunt: aut longitudo de fo- Soldanella.
liorum ordine venit intelligenda.

Blitum & atriplex. Blitum olus rubrum quod in cultis se attol-
lit, cuius folia iuribus incocta sic ea insciant rubore, vt nigelli vini
dilutum colorem representet: à quo rubrum olus etiam ab olitoribus
vulgo vocari. Radice non vna nititur, sed contra ceterorum fere ole-
rum morem multiplici, proluxa, non in rectum tendente, betaceis fron-
dibus, sine acrimonia satius, semen corticeum profert racematim sin-
gulis ramis insidens. Atriplex flore aureo prodit, caule interdum
purpureo, interdum candicante, ramoso, folio bliti, cum pubescit her-
baceo, cum senescit, flammæo, nonnunquam in luteum languescente,
semine foliaceo, simplici radice in altum ascendente, ex quo multe se
promunt. Dicitur etiam Dioscoridi Chrysolacanthum.

Chrysolaca-
num.

Scolymos. Paulus & Aelius scolymon à cinara diremunt:
hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes. Idem etiam Gale-
nus, ex quo sua mutuati sunt illi, in 2. de alimentorum facultatibus
testatur. Alij tamen Greci nullum aliud inter hæc discrimen po-
nunt, quàm quod scolymos serus sit, & syluester: cinara vero, domi-
ta cultu, feritate exuta, mitior & altilis: cuius cibus, licet stomacho sit
grauis, non protinus à scolymis natura, viribusq; degenerauit. Ve-
rum ex coclura noxam, quam prius referebat, amolitur: ijs additis
quæ etiam Galenus enumerat.

Atractylis. Hæc duas habet species, vna mitior est cnico satius
similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaque pro colo antiquæ mu-
lieres utebantur, atque hanc proprie atractylida nominabant, semi-
ne candido, grandi amaro. Ab officinis dicitur hodie syluestris car-
tamus. Quibusdam sanguinea virga nominatur quod vulso ramu-
lo cruorem modicum profundat. Altera species hirsuta caulibus son-
chi, torosis, humi reptantibus, semine minuto, frequenti, amaro, &
pilis barbato, flore luteo, vt prior. Cruor etiam ex vulnere secti exit:
hæc officinis vocatur, cardus benedictus.

Syluestris
cartamus.Cardus be-
nedictus.

Apium hipposelinum, sion, smyrnion. Quum apium absolute
apud autores ponitur hortense venit intelligendum, quod vulgo Pe-
trose

roselinum dicitur. Semina quæ à pharmacopolis passim venduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apij. Hipposelinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis nomen sumpsit, ut quidam voluerunt, sed à magnitudine sua. Nam apud Græcos ἵππος in compositione solam magnitudinem signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet. Id quibusdam putatur apij, quod Galli, Ache, Germani eppich nominant, Ferrariæ vulgo appellant apium Macedonicum. Dissentiunt autores in Hipposelino & Smyrnio. Alij Hipposelinum, olus atrum nominant, alij smyrnion, quidam diuersa olea hæc iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait: Olus atrum hipposelinum Græci vocant, alij smyrnion. Theophrastus idem videtur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion olus atrum vocat, Romanorum secutus nomenclaturam. Dioscorides & Plinius de ijs priuatim ut genere diuersis egerunt. Forte ea herba est, quam Galli leuechram nominant. Sion, Latinis dicitur Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante, habitu subreClo, pinguiq; latius ac luxuriantibus folijs, olus atro similibus, minoribus tantum, odoratisq;. Officina berulam vocant.

Berula.

Eruca. Notissima herba est, in acetarijs utimur, ob gustus acrimoniam. Græci ἐρυσίου, Galli Raquetam appellant.

Ocymum. Recentiores Græci, qui de re herbaria scripserunt, basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud omnes fere nationes hodie usurpatum videmus.

Gingidium.
Chærefoliū.

Gingidium simile est scandici. Gingidium forte est herba eam quam vulgo Chærefolium appellant: non autem quam Plinius Chærephyllon nominat. Olus fuit Pauli & Gal. temporibus tritissimum in usu. Scandix syluestre olus est, ac vilissimum si Plauto credimus.

IN LXXV. CAPVT.

Asparagus.

Asparagus. Per hanc dictionem intelligi volo, quæ primum in lucem prodeunt olerum germina, priusq; in folia explicentur, recentissimosq; turiones qui edendo sunt. In summa, primos cauliculorum partus comprehendo.

IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi.

Bulbi. Bulborum facies, ut olim veteribus fuit cognita, ita nunc maxime cum officinis, tum medicis, pace eruditorum dixerim, incognita est. Sunt autem cepæ modo tunicati, & fronde cepicia, tere, angusta, in mucronem desinente, cauliculo dodranti, in cuius fastigio flos emicat purpureus, ut in scilla circumactus. Agri Gallici, appetitus appellationem indiderunt, quod merâ excitent cibi auaritatem. Verum genus hoc quod in hortis copiosiore coma viret, nucleus
graci

gracilioribus nunc porretam, nunc vnionetam à porri, vel vnionis, tum sapore, tum forma vocant. At non solum propriae cuidam plantae bulbi nomen inditum est, verum etiam rotundae radices suis membranis tunicatae Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmententur, vno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus distinctae separentur, quales sunt croci, liliorum, narcissi, scyllae, &c.

Pastinacæ vero, dauci & cari. Ad verbum ex Galeni libro citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ. Dauci vero & cari non item. Sunt porrò tres Dauci species à Dioscoride descriptæ: quam hodie in officinis habemus, syluestris pastinaca est, vt sapor, odor & tota delinatio ostendunt. Nulla autem dauci species apud Dioscoridem pastinaca syluestris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & radices in vsum medicum veniunt: aliarum specierum semina tantum. Quia vero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodum vires existunt, ea pro dauco vti licebit.

Officinarū
daucus.

Verus Dau-
cus.

Cari. Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosq; Barbariæ scriptores secutæ. Non tamen semen hoc carui quod Pharmacopola vendunt, respondet Serapionis descriptioni, quippe crassius hoc esse dicit quàm cyminum, officinarum autem multo minus cymino est. Caros igitur sorte vna ex nostratibus dauci speciebus erit, si semē etiam à Dioscoride exiguum descriptum, respiciamus.

Cari.

Ampeloprasum. Caule profilit bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Prouenit in vinetis, unde à natalibus ampeloprasum quasi vitigineum porrum Grecis nominatur. Nostrates officinæ vineale porrum appellant.

Porrum vi-
neæ.

IN LXXVII. CAPVT.

TVbera. Hæc ex terra sagina conglobantur, sine medulla, vena, cortice, solo vndiq; circumdata, nullis fibris, nullisq; capillamentis nixa, nec extuberante loco in quo gignuntur, aut rimā agente, nec ipsa terre coherent. Galli hæc trusla nominant. Itali Zuneſta tarenſola. Vere effodiuntur, nec vltra annum durant.

Fungi. Islorum origo prima è limo & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Initio spuma lentior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Cortice, medulla, neruo, vena carent.

IN LXXVIII. CAPVT.

CHondrus. Magna scriptorum recētorum dissensio est, & adhuc sub indice lis est. Num scilicet chondrus & halica diuersa inter se sint, cum apud Paulum distinctim scribantur, an idem, cum apud autores Grecos chondrus, pro halica Romana sæpius ponatur.

Chondrus.
Halica.

Apud

Apud recentiores autem Græcos ambæ dictiones coniungantur: *ἢ in Aetij sermone 9. cap. 10. in hunc modum: ῥοζῆν δὲ διδοῦναι χόνδρον ἄλιν & μετ' οὖν λευκόν.* Quibus verbis præcipit cibum dari chondrum alicæcum vino albo. Item disceptatur, an hæc semina sint naturalia per se, an potius res facticiæ. Certe quantum ad primam controuersiam attinet, collatis multorum autorum scriptis, chondrus videtur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de victus ratione in morbis acutis credimus, quanquam libr. 1. de alimentis nomen eius apud antiquos perrarum fuisse prodat, ut fere sibi ipse contrarius videatur. *Alica* vero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, nec pridem excogitata. Paulus noster ambo quasi consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut libr. 3. cap. 31. *ἔστω δὲ σοι ἄλιν & πλεονὲς ἐν ψυχρῷ, ἢ ἄλιν, ἢ χόνδρον.* Id est: Panis tibi esto lotus è frigida, vel alica, vel chondrus. Sic itaque colligo, ut secunda quoque discordia dirimatur, chondrum & alicam eisdem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Paulus autem dicit alicam chondro in omnibus respondere, nisi quod ventrem magis astringat. Nimirum propterea quod chondrus fiat ex Zea, quæ Italis & quibusdam Germanis spelta nominatur hodie. Frumenti genus inter triticum & hordeum medium. *Alica* vero ex tritico fiat, quicquid dicat Palladius de hordeo seminaturo. Ea hodie nobis puls frumentacea vocatur: pti sana cremori colatitio similis. Errant qui alicam ex Zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro consulant Dioscoridem & Constantinum libr. 3. de re rustica. Interim videas apud veteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit, chondro tribuant. Inueniuntque varias vel chondri, vel alicæ conficiendæ rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum, chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archigenis frumenti quedam sit preparatio, ex Zea nimirum & frumento. Plinius testatur populum Romanum farre tantum ex frumento tercentum annis usum fuisse.

Panes.

Inter panes firmissimus. Usus sum dictione Celsiana, firmissimus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quanquam in comparandi gradu ῥοζιμώτερον habeatur.

Syncomistus.

Syncomiston. Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat, quod ex omnibus suæ farine partibus citra ullam detractionem constet, inter furfuraceum & similageum medium, syncomistos quasi confusaneus dictus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul trilerit, furfures, vtriculos & similam.

Polenta. Vide Galenum libr. 1. de alimentis, ubi polentam quam Græci

Græci ἀλφίτα nominant, recenset, ex hordeo nouello mediocriter to-
sto fieri. eamq; veteres militibus panis loco dare solebant.

Maza. Cum polenta liquore conspergitur, atq; subigitur, maza Maza.
appellationem assumit: Hinc quidam eruditus offam appellat.

Oryza. Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; vulgus Oryza.
detrahta priore litera Rizon appellant.

IN LXXIX. CAPVT.

EX leguminibus. Legumina, inquit Galenus ea ex cerealibus Legumina.
seminibus appellant, quæ panificio non accommodantur, vtpu-
ta fabæ, pisa, cicera olentes lupinum, oryza, eruum &c. Galenus vocat
ὀσπεία & χεδρόπια.

IN LXXX. CAPVT.

DE temporariis. Sic interpretatus sum ὥραις: quasi dicas hora- ὥρα.
rios. Nam Galenus cateriq; græci id anni tempus, horā appel- ὥραι.
lant: in quo medio canicula sidus oritur, ad quadraginta vsque dies Fructus.
perdurans, quo tempore omnes temporarij fructus, aut tempestiui, vt
Plinius ait, proueniunt. At Galenus non solum horarios dici cen-
set, quod eo tempore nascantur, sed vt à conditaneis discernantur. Sic
etiam Plinius apposite dixit, de persico, quia nō aliud fugacius. Hoc Fructus fu-
est quod minus duret. gaces.

Omnia poma. Grace est ὅλη ὀπωρία. Sic antea interpretatus
sum quicquid herbaceo fructu viret, lignosi nihil exterius habens.
Proprie vero Galenus oporam nominat libello ὡς ἐν ὀχυμίας ἡγεῖ
λεῖνοχυμίας, ficus & ruas: vt Paulus sequenti capite etiam indicat.

IN LXXXI. CAPVT.

EX cerasiis. Galenus commentario iam citato in hunc modum
de tempestiuis illis fructibus præcepit. Sunt autem arborei pro-
pe dixerim vniuersi fructus, viciosis succis donati, præter quas vocant
castaneas. Hæ si quidem exactam in ventriculo concoctionem ade-
ptæ, nutriunt, verum succis crassioribus: malis nequaquam. Aliarum Aliquando
arborum fructus temporarij omnes maligni sunt, nam si in ventricu- viciosis uten-
lo computrescant, medicamenti deleteri naturam fere induunt, sicut dum.
& mora, licet ea persicis dictis & prunis moderatiora sunt. Tamen
corruptelam nihilominus illic prauam sustinent &c. De usu horum
paulo post ait: A viciosis semper abstinendum, nisi cum agroti æsta-
te totius corporis siccitatem caloremque emendare conantur. Conue-
niunt enim tunc poma, pira mora, cerasia adsumpta. Cucumer vero,
pepo, & melopepo, item præcocia dicta, vel persica modice tunc man-
ducari debent.

In vniuersum, astringentia. Vide Galenum lib. 2. de alimen-

tis: ubi rationem tradit, cur rethori cuidam astringentibus sumptis post alios cibos laxantes venter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

Primæ mensæ qui cibi conueniunt.

Eoque primum exhiberi debent. Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina.

Constantinus.

Duracina. Sunt qui lectionē hanc deprauatā putant, velint q; legi pro duracina, rhodacina nulla plane ratione valida nitentes. Galen. quidē & alij vetustiores hoc vocabuli non vsurpant, verū recentiores græci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, quod corpus ipsorum pertinacius ossi hereat, quā ut auelli queat. Græci Διρακινά, vel Διρακινά dicunt, latini nos fere imitati. Constantinus li. 10. de agricultura ἀπὸ τοῦ διρακινῶν τὰ χέως ὑπάρσκειν. Paulo post, ἀπὸ τοῦ διρακινῶν τὰ χέως ὑπάρσκειν. Paulo post, ἀπὸ τοῦ διρακινῶν τὰ χέως ὑπάρσκειν.

Druppa.

Druppa. Plinius lib. 13. ca. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & vite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppa, ita enim vocatur, priusquam cibo matura sit, iam tum colorem mutans &c. Græci Δρυπίτης appellant.

Pistacea.

Pistacea. Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda, præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim comantur densiore folio, angustio, maiore tamen quā lentisci, subraffo, surculis dependentibus pineæ nucis similitudine. Lutetie in quibusdā hortu est videre nunc. Officinæ pharmacopolarum vocant fistica aut fisticorum grana.

Phistica officinar.

Sirica. Vide an recentiores cum veteribus conueniant.

Sirica. Galenus ita vocat Ζιζιφθα à recentioribus græcis appellata: quæ officinæ sephisiariorum iniubas nuncupant. Recentiores maxime commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauo donatum reijciendum putat. illi præterea stomachum gratum, hic concoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducende conuenire, hic astringere aluum. Aetius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq; sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorū iussim & dissiliatatem spirandi lenit, pectori, renibus, vesicæ, prodest.

IN XCII. CAPVT.

Molles. Ad didi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici vocum interpretatione contraria inter sese posita videri possint. Sunt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autē carne, ut Galenus habet lib. tertio de alimentis. Nilul in capita præceden

dentia sum commentatus quòd & facilia, & ex Galeni libro iam citato sint omnia fere decerpta.

IN XCIII. CAPVT.

Cartilaginea. Hi pisces superioribus sunt contrarij, nam durā Selache
habent cutem: mollem autem carnem. Caterum Galenus sela-
che dictos affirmat, ἀπὲ τοῦ οὐλας ἔχειν, hoc est, quia splendorem ha-
beat eorum cutis. Pisces.

IN XCVII. CAPVT.

ITaque somnus. Galenus libro tertio de causis pulsuum in hunc
modum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὑπνὸς γίνεται ὅτε
ἐμφύτης θερμότητος ἢ τε διὰ λιανότητος τινος, καὶ ἐξ ἁπλῆς πλεονα-
πείας τῶν θερμῶν ἐπεσφείσας, ἢ διὰ ἀμελείαν ὑγρότητος ἀδυνατῆ-
σας ἐκ τῆς ἀποτέλειδος. ὅτε δ' ὁ μὲν πρότερος ὑγιανὸς τε καὶ λι-
τὰ φύσει, ὃ δὲ δεύτερος ῥυθμῶς, εἰς ὃν λιανώσι τε καὶ πυκνότητι.
Hoc est: Etenim somnus fit, cum naturalis caliditas, vel ob defatiga-
tionem quandam & maiorem siccitatem ad alimentum conuersa est,
vel ubi propter nimiam humiditatem foras nequit extendi. Prior
sane est salubris, & secundum naturam. Secundus autem dictus, qua-
lis in comate & lethargo &c. Paulo post: τῶν δ' ὑπνῶν τῶν κατὰ
φύσιν, ὧν ὁ πρῶτος καὶ τῶν ἐκ θερμότητος ἢ γένεσις διὰ πλεοναπείας,
διουμένης μὲν ἀμείαν, καὶ ἀποτέλειδος ὑγρότητος ἀμελείας τοῦ λιανῆ
φύσει ἐν τοῖς σώμασι θερμῶς, ἢ διὰ τὴν αἰσθητικὴν αἰσθάνειαν τὰ ἐπιδόχονα,
ἢ τῶν γαστρῶν τῶν ὑπνῶν γινόμενης. ἀντάγει δ' ἀπολύσειος
ταύτης ὥς ἡδη τῶν κατὰ φύσιν ποικίλων ἔχειν, τὴν γὰρ ἐκ θερμότητος ἀποτέ-
λειδος &c. Hoc est: Somnorum verò naturalium, sicuti etiam vi-
giliarum generatio existit qualis antea exposita est, nempe ut somni
fiant cum naturalis animantium calor indiget quidem simul & de-
stituatur copiosa humiditate, eoque ad viscera & ventrem commeat:
ut autem vigilia, cum idem calor hac humiditate potitus fuerit abun-
de, ut iam naturalem habeat qualitatem &c. Nam ex alimenti con-
fectione multa vaporesa humiditas in ipso calore, meatibus, omni-
busque particulis intermedijs suggeritur.

Vitium animalium requies. Hoc est, ipse quidem non agunt, Mutua viriū
sed naturalibus subsidium adferunt: eoque precipitur recte, ut dum fit subsidia.
concoctio, etiam in vigilantibus, abstinetur à lectione, disputatione,
aut cogitatione graui, ne vis naturalis alio distrahatur, nam mutuo
sibi ferunt auxilia, impedimentaque.

Tempus somni optimum à cibo. Intellige, non statim: nam Tempus so-
mni statim à cibo, caput replet, ut etiam plethorica dispositiones, si
Galenus in Aphorismis fidem accomodamus.

Terminus autem somni. Non sunt audiendi qui vnum omnibus terminum somni prescribunt. Nam alij celerius, alij tardius concoquunt: hi plus assument, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia & cacochymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, & quam diu libet dormire. & cibos crassi succi, & viscosos tuto assument. Quæ ita græce sonant ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις δοῦντ' ἐστὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσθαι, καὶ λιμᾶσαι μέγας πρὸ ἀπὸ θείωσι &c. ut supra dictum est.

IN XCIX. CAPUT.

Cataphora.
καταφίρε-
ται.

Cataphora. Dictio græca est, à verbo καταφέρειν, quod est obdormiscere vehementius. Unde etiā καταφορὸς ὕπνου & dicitur. Latine interpretari possumus, gravis aut vehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos videtur comprehendere, καταφορὰς inquiens, βαθείας ὀδύνηται. αἱς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας, καὶ λιάρους καὶ λιάρους. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, & caros, & catochos.

In epistola Dioclis habetur σωάχλω νύκτωρ. In qua vitium esse puto. Nam quid sibi velit νύκτωρ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaque mali erit, si legas προ νύκτωρ, νυκτῶρα.

FINIS LIBRI PRIMII

COMMENTA-

RIORVM.

*

COM




COMMEN- TARIORVM IN PAVLVM AEGIN E-

TAM LIBER SE-

CVNDVS.

*

CAPVT I.



LIBER hic secundus de febribus, & earum acci-
dentis facili tractat compendio, ex Galeni ope-
re de medendi ratione ad Glauconem magna ex
parte transcriptus. Nonnulla vero Paulus no-
ster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognosticis
Hippocraticis, quaedam ex alijs autoribus sum-
psisse videtur. Caterum à morbis similaribus auspicaturum se dicit,
qui quatuor constant intemperaturis. Quia vero calida omnium est
efficacissima, merito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos
nominans similares, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Com-
positos in tertio quartoq; volumine persequetur.

Oribasij compendio. Iulianus olim Imperator medicinam
suo tempore vagam amplamque intelligens, praestantissimos ex omni
regione medicos Romae colligendos magno studio curauit, delegitque
ex vniuerso illorum numero septuaginta duos, qui diuersis anti-
quorum autorum monumentis euolutis examinatisque, necessaria
magis in artem medicam compendiosa ratione comprehenderent. Hi
igitur omnes, sua prius ratione & via, singulatim explicata, vno
tandem consensu scribendi prouinciam Oribasio vt facile principi,
doctissimoq; tradiderunt. Is varia Galeni opera, aliorumque non-
nullorum perscrutatus in compendium quoddam septuaginta du-

bus libris comprehensum (tot enim fuerant conuocati medici) artificiose redegit. Paulus autem Aegineta opus hoc maius esse animaduertens, quam ut iter facturo circumscribi possit: aut ab homine tenuioris fortunæ comparari, in septem tantum libros constrinxit.

Castigatur
codex.

Ex Galeni sane. In græco male legitur ἐκ τῶν Γαλλῶν ὃ μὲν ὡς μάλιστ᾽. Hic igitur est superfluum: ac legi debet Γαλλῶν μὲν ὡς μάλιστ᾽. Hos et Orosius, et castigator Basiliensis praterijt.

IN II. CAPVT.

ἀθρόως.

Vna vice. In græco est ἀθρόως, quod cumulatim signat, ac vna vice. Celsus dixisset semel. Contrariū huic λέγει μίαν, et λέγει ἐλίγαν, quod est, particulatim, et paulatim, multisque vicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiunt pluribus diebus fit crisis.

IN III. CAPVT.

Græcus co-
dex vicius.

Neque enim capitis. Ex Galeni 1. de diebus decretorijs hæc tractata scripta sunt. Desideratur autem in Paulo vocula, ἃ, habet enim πρὸς τὸς ἐκ Γαλλῶν, pro πρὸς τὸς ἃ ἐκ Γαλλῶν, quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere. Galenus addit emphaseos gratia λέγει ἀναδύνατον εἶναι, hoc est, etiam si stupidissimus, et ab omni alienus sensus fuerit.

IN IIII. CAPVT.

νεκρῶδες.

Ethales notæ. Subsequentes scilicet, facies cadauerosæ, sanæ quàm dissimillima, ut quæ mortuū imitetur, unde græcis νεκρῶδες dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, similis sit sani præsertim ipsius, qui nunc agrotat, faciei, optime sperandum est. Porro notæ hæc sunt in morbis acutis, diuturnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defunctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, et vim obtineant maximam. Cadauerosæ, quoniam natura debilitata, non amplius sanguinem et spiritum in hanc suppeditat.

Laurentia-
nus.
Nares acutæ

Nares acutæ. Ita Celsus interpretatur. Nescio cur Laurentianus Nasus compressus verterit, quod græcis dicitur ὀφθαλμῶν. Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquā causam carnosæ animalium partes consumētem, corrumpentemque: aut ob debilitatem caloris nativi, qui non magis in extimas corporis partes extendi potest, sed in visceribus solis exiguis remanet. Quo fit, ut non amplius tantum sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autem in naso osseæ partes et humida carnosæque sint, inuicem commixtæ: deinde quum osseæ propter terrestrem ipsarum substantiam similes permaneant, humidiores autem consumi facile possint, et in se concidere ob inopiam tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracilescat.

Ocu

Oculi concaui. Ob easdem causas fiunt: sed quanto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiā spiritus animalis copiosi parti ipse existunt, & caloris nō pauci, quibus ipsi destituti merito contrahuntur. Cadauerosa igitur facies quæ sequētia apud Hippocratē obtinet, in diuturnis saepe morbis visitur: raro per initia, ob quod & periculosissimū est, & in acuto morbo prorsus lethale: inquam ne occasionem quidem habuerit à tempore. In morbis autem longis non adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris frigido, & senectute: quia morbus naturæ respondet.

Si hæc neq; . Aut tali aliqua manifesta causa, minus periculosum est, quā si ob morbi maliciā, etsi præstaret, neq; ab eiusmodi causis virtutē prorsus debilitari. Celsus optime hæc sententiā lib. 2. exprimit latine. Si hæc, inquit, ita sunt, ut neq; vigilia præcesserit, neq; ventris resolutio, neq; inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex vigilia: quia ex hac oculi, veluti chorda ex siccitate tenduntur.

Vacuatio. Intellige per alui profluuiū, & mordicationem, ut Vacuatio. Galenus apud Hippocratē interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ ῥινοειδῆς ἰσχυρομεύα ἢ σφοδρῆς, quod est: Alius vehementer humectata. Celsus dixit ventris resolutio. Paulus utitur dictione λυώσεως.

Aut inedia. Hippocrates dixit λιμὸς ὁ τῆς, quasi famelicum aliquid, aut fames quædam Paulus ex Galeno ἀστίξ, hoc est, inedia, Caterum & alui resolutio vehemens, & inedia corpus succant, adeo quandoque, ut per se emortuam hanc faciem inducant.

Si oculi lumen refugiunt. Hoc est, auersantur, ob visoriae facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectionem laborat, quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum præter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Illachrymant, non ex quadam. Hippocrates habet ἢ ὅτι τὸ αὐτὸν φεύγουσιν, ἢ δακρύουσι ἀνεπαύτως. Hoc est: Si enim lumen refugiunt aut illachrymant citra voluntatem: nimirum ob facultatis retioris imbecillitatem. In Hippocrate additur: ἀπεσπένουσι, quod est, peruertuntur. Celsus simpliciter dixit, si præter hac oculi quoque lumen refugiunt, & illachrymant. Paulus autem pulchre distinguit, causa tum exterior tum interior, quæ sane utraque lachrymas saepe in oculis mouet.

Ad hæc si alter ex his minor. Quæ nota facultatem ipsam dispensatē emori significat.

Albū oculi. Quæque in iis alba. Sicut in lippitudinibus quibusdam & e-
briosis nonnullis. Iudicium vero est plenitudinis in cerebro, eiusq;
membranis: interim & inflammationis. Vtroq; enim modo sanguis
ad oculorum venas exprimitur. Album oculi pars est pupillam am-
bientis, pericranij extremitas.

Aut nigracent. Refrigerata scilicet. Refrigerantur autem emor-
tua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

Pituita apud Celsum in oculis pro græcorum λήμυα. Crassior pituita. Græce λήμυα, quod Plinius libro vigesimotertio,
capite primo dixit, græco vsus vocabulo, vel, inquiens, si lemæ in ocu-
lis erunt. Nos Celsum imitati libro secundo, de indicijis mortis, quod
caput ex Hippocrate trāstulit, diximus, pituita. Habet ille, pituitaq;
in ijs innatans nouissime angulis inhaerescit. Caterum Galenus Le-
mas exponens, dicit semicocti alimenti esse recrementum. Nam facul-
tas oculum dispensans imbecilla allatum nutrimentū nequiuit con-
coquere. Iam fiunt etiam lemæ in lippitudinibus tum ob humidita-
tis præter naturam copiam, tum ob instrumentorum viciū.

Per somnum alba. Ex 14. cap. prognosticon Hippocratis sum-
pta videntur. Ita vero apparent, ob imbecillitatem facultatis palpe-
bras mouentis, cum citra causam exteriorem constituitur.

**Stridor ex quibus cau-
sis.** Stridere dentibus. Hippocrates adiicit, quibus à pueritia con-
suetum nō est. Fit autē ex cerebri offensione, & per se delirium signi-
ficat: cum delirio autem, mortem. Caterum fiunt stridores dentium,
cum temporales & masticatorij musculi modo conuulsorio mouen-
tur. Quibus si accidit, ipsis tantum musculis affectis, vel ab origine,
vel postea ex quadam causa. In nonnullis principio neruorum in eius-
modi affectionem deducto, vnde potissimum illorum quæ ab eo nata
sunt, conuulsiones fiunt, vt hic neruorum musculus infertorum.

legonvδίζω Aut in veste floccos legere. Hoc græce dixit Paulus vnico
verbo legonvδίζω, quod Hippocrates τὰς λεγονύδας ἀπὸ τῶν ἱμα-
τίων ἀποτίλλειν dixit capite vigesimo octauo. Celsus hoc interpreta-
tus libro secundo: ait: Si in veste floccos legit, fimbriasq; deducit. Id au-
tem fit corporis humoribus ad caput exhalantibus. Quorum vapore
purus ille pupillæ humor inscitur, vnde prædictæ oriuntur imagines,
vt in suffusis. Vbi enim niger aliquis, aut crassus antestat, lumen
visorium prohibens foras excedere, pro humoris subsistentis natura,
imagines generantur.

Si æger supinus. Hoc à decubitu iudicium sumptum est. Gale-
nus in prognostica Hippocratis capite septimo scribit, id neque ad sa-
lutem, neque ad mortem habere momentum, sed medium esse, aut
parum ad alterum declinare. At si consuetum agro est, ita cubare,
& me

¶ medicum ingredientē non reueretur, ex bonis signis est. Sin autem consuetum non est, & medicum reueretur, malum est.

Veluti resolutus. Græce est εἰς παρὰ μένους. Nam πάρεσις πάρεσις. idem quod παρὰ λυσις. Sed illa incertis quibusdam partibus, hæc in toto corpore obuenire dicitur. Sit igitur, veluti artubus resolutis.

Forte idem est quod dixit Hippocrates: καὶ χεῖρας καὶ πόδας, καὶ σκέλη ἐχέει ἐκτεταμένα. Hoc est, & manus & ceruicem & crura habere extensa: non contracta. Celsus dixit, ubi supinus aeger iacet porrectis manibus & cruribus.

Vel si etiam deorsum. Hoc inquit Galenus facultatis corpus gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Spiritum. Hoc est, totam respirationem: frigidum, ob extinctionem caloris natui. Græce est ἀναπνῆν, quod est, respirare, Celsus se-

ἀναπνῆν.
spiritum elidere.

Item pulsus languidus. Hippocrates pulsus non meminit. Languidus autem, quem alij obscurum vertunt, imbecillitatem virtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, deficiens per intervalla, aut ut percipi vix possit, extremam debilitatem.

Sudore digeratur. Græce est ἰδρῶν συνηπνῶς, quasi dicas sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Cardiaco dixit: Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente immodico sudore digeritur, ἰδρῶν συνηπνῶς.

Pulsus vegetior. Græca dictio est ἐνοσφυξία, quasi dicas, bona pulsa tio. Hoc est meliocris magnitudine, frequentia & celeritate: equalis sibi per omnia ἐνοσφυξία.

Bene erga cibum. Paulo aliter sonant verba græca, εὖ ἐχέει πρὸς τὰς προσφορὰς. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige sibi. πρὸς τὰς προσφορὰς.

IN V. CAPVT.

SI quatuor particul. Quum nimirum materia est extra vasa. Sicut autē morbus totus quatuor, habet tempora: principiū, augmentum, statum, & declinationem, ita quoque particulares accessiones. Vide Galenum de morborum temporibus, & de totius morbi temporibus, quem librum nos latinitate donauimus.

Cuius extremus. Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad

septimum vsque producitur. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad vsque diem quartum decimum producitur. Non exacte vero, qui vsque ad vigesimum durat, quanquam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem graeci *λεῖψα μεταπρωιν* appellant.

Quarto die crīsum. Nam quarto plerunque solunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

Sed duodecim. Quae accessionis longitudo maxima est, tertianae exquisitae dictae, quae intra quartumdecimum, hoc est, antequam omnino praetereat, soluitur.

Longus.

Talis morbus longus. Vt est quarta, & semitertiana, tertiana non exquisita.

At si particulares. Galenus libro 2. Duplex autem horum acutorum quoque natura est. Vel enim accessionum remissiones in exactam integritatem finiunt, vel continua, semper febris manet, quae particulares accessiones non habet, materia in maioribus viscerum vasis subsistente.

Corrigitur
codex graecus.

Si quidem facies, & totum. Intellige primis diebus. Nam fieri potest, longo tempore ex parua febre, ut corpus modice collabatur. Mordice autem dixit: quia nimium consumi & prater rationem facultatis retentoriae imbecillitatem testatur. In codice graeco, superflua est particula *εἰ*. Nam legi debet: *τὸ πρόσωπον, καὶ τὸ λοιπὸν* &c. non autem *τὸ πρόσωπον εἰ καὶ τὸ λοιπὸν*, nam vna haec vocula sententiam peruerit, quod nec Orosius intellexit, nec Basiliensis corrector.

ἀσύνητον.

Si prorsus nihil. Graece est: *εἰ δὲ πᾶσι πᾶσι ἀσύνητον*, quod est: Sin autem omnino non collapsum est. Celsus latinus lib. 2. cap. 4. de signis *lōgæ* valetudinis dicit: Vbi ager pro spatio parū emacrescit.

Pulsus.
Magnus.
Citatus.

Ex arteriarum motu. Magnus pulsus, qui in omnē distantiam attollitur, fit ob magnum refrigerij usum. Citatus, ubi magnitudo pulsus non sufficit, additur Celeritas. Sicuti cum qui magno incedit passu, non potest iter institutum tempestiuus absoluere, nisi eundem gradum acceleret. Creber, celeritatem adhuc adiuvat, dum breuem facit ab opere quietem. Veluti qui nunquam intermit, verum semper iter repetit, quod celeriter perficit atq; maximum usum refrigerij indicat. Vehemens, robustis viribus, natura strenue se ad fuliginosa excrementa expellenda accingente.

Paruus.
Tardus.
Rarus.

Contrarius longum. Hoc est: Paruus, tardus, rarus, languidus. Paruus quia tantus color non est, qui refrigerari valde requirat, aut viribus imbecillis, materiae oppressis.

Quatenus calidae, & vrentes. Subaudi ad tactum. Hec sumpsit

ex

ex libro primo Galeni ad Glauconem capite de curatione doloris capitis.

Delitescentes. *διον συνχόμενοι*, grace est. Interpretantur autem grammatici *συνχόμενοι ἀφανίσόμενοι*, quod est, non apparentes. Galenus utitur hoc verbo, praterquā in libro supra citato, secundo etiam de indicatorijs diebus. Qui nanque inquiring, ad quartumdecimum, aut vigesimum diem morbi prorsus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquam *συνχόμενοι*, lento motu. Nihil refert etiam si inter- *συνχόμενοι* preteris, mitiores & languide. Habetur in codice Græco ante *συνχόμενοι* dictio *μαλθακώτεροι*, fac tu *μαλθακώτεροι*.

IN VI. CAPVT.

Magna ex parte. Recte dicitur, magna ex parte. quoniam plurimi longi affectus teste Galeno libro secundo de diebus decretorijs, etiam excretionibus finiuntur, sed non manifestis. Potissimum autem abscessibus, & concoctione. Qui enim ad quartumdecimum crudi sunt, non ante quadragesimum soluantur.

IN VII. CAPVT.

Dierum decretoriorum. Antequam dies ipsos enumeremus, apte prius dicetur, cur ita appellentur, Græci vocāt, *λεησιμὸς* quasi iudicijs dicatos. In quibus natura cum morbo pugnante, iudicium expectatur, natura ne morbum sit superatura, an morbus naturā. Hoc autem fit, quando facultas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus offendentis, operi suo valentissime se accingit: quæ vere Crisis dicitur. Hæc autem singulis diebus potest accidere, teste Galeno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus noster inquit: Dierum decretoriorum alij de agris frequenter, cum fide, nempe cum excretionem quadam copiosa, aut abscessu non obscuro. Post quæ morbi recidua timenda non est.

Dies decretorij qui.

Salubriter. Græca dictio est *ἀγαθὸς*, quod est bene: quo die morbus ad sanitatem desinit, eoque dixi salubriter.

Perfecte. *τελειὸς* interpretatus sum perfecte, iudicat autem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquum.

Manifesto. Hoc est: Quo cum excretionem, aut abscessu quodam euidenti morbus solutus est.

Insigniter. Paulus dixit grace *ἐπισημὸς*, Galenus *ἐνσημὸς*, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contemplatorio indicatus sit.

lam

Natura motibus ordinatis gubernatur.

Iam intelligendum venit, natura motus proportionibus definitis fieri, & circuitibus ordinatis, cum morbi materiam superauerit: prohibetur autem quum non plane superauerit. Septenarij igitur circuitus validissima sunt virtute praediti: mox quaternarij: quadam vero extra hos excidunt: quos coincidentes seu intercalarios nominare licet. At perfectus circuitus est, ex tribus septenarijs compositus, qui nimirum viginti constat diebus. Vnde liquet non omnes septenarios inuicem separari, sed nonnullos coniungi, ut etiam quaterniones. Nam hi teste Oribasio in ipsis partibus à precedente numero incipiunt: post ipsas vero partes absq; precedente numero procedunt. Porro secundus sextenarius circulus à primo disiunctus est, testimonio Hippocratis ex Aphorismo quarto decimo libri secundi, secundi septenarij, octauus dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo cohaeret. Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimum diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi est, tertius incipit: post vigesimum diem, idem circuituum ordo perpetuo consistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, vigesimum, vigesimuseptimum, trigessimusquartus, quadregesimus. Respondebit ergo trigessimusquartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenarijs sit coniunctus. Et quadregesimus, vigesimo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadem ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, vigesimum, ut perfectos circuitus. Iam quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo separatur. Quartus autem tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; ita quoq; post vigesimum, ut in septenarijs proportio seruatur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad indicandum septenarij: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit. Vndecimus quos septimus non discussit. At si maior morbus sit quam ut quarto die crism subeat, certe solutio ipsius in eodem praepratur: septimo autem finis morbi adycitur. Qui vero morbi septimo die non finiunt, vndecimo natura soluere molitur. Atque sic in ipso vel decernit, vel quartodecimo praepratur. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissio errore, ad quaternionum circuitus indicia omnino perueniunt. Erratis autem quibus silam admissis, in coincidentes, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crisi indicanda, praestat eam in nono factam esse, quam octauo, ut quae sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalarijs, natura & usu: natura ut dictum est, usu, quod ad futurae crisis cognitionem sufficiant.

ficiant. At morbi acuti impari dierum numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas acceſſiones in diebus paribus, qui longorum morborum indices sunt. Protinus autem ut acuti propter acceſſionis vehementiam finiuntur, hi etiam secundo die interficiunt, & quarto: verum sexto plurimos. Caterum dies intercalarij, tertius, & quintus, non minus quam quartus decernunt. Nam perturbationis euidentia naturam ea quæ moleſtant, etiam ante tempus propulſare compellit. Proinde primariam decernendi virtutem non habent, sed per acciſſens aliquod ſic eueniunt. Quoniam enim natura non conuenienti ſemper tempore de morbis decernit, ſed concitata plerunque aliàs alijs de cauſis, à quibus acceſſio in morbis acutis maxime continua redditur, in imparibus acutorum iudicia fieri ratio eſt.

Exiguum naturæ impetum. Hoc eſt, ſi vel modicè natura ad expetendum aliena ſe accinſerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc transcripta ſunt, ubi ita habetur: ἡ μὲν γὰρ ἰσθμὸς ἡμέρα, καὶ ἡ αἰὶς τὰς βραχέας παρασυνάσσει φύσιν ἐξ ὅσων πρὸς τὴν διὰ γενέσεως ἰσθμῶν. Hoc eſt: Nam ſeptimus dies etiam ex paruis naturæ apparatibus ad criſim quæ per euacuationem conſtit, erumpit. Itaq; ad quartumdecimum uſq; diem valentiſſima. Græce erat ἀγωνιστικώτατα, hoc eſt, maximo cum certamine, & impetu naturæ. Ex libro ſecundo de diebus decretorijs.

ἀγωνιστικώ
τατα.

Prorſus elanguescunt. Superius dixit de diebus poſt rigefimum ſuccedentibus: quod ſcilicet vehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui poſt quadrageſimum ſunt, prorſus elanguere in naturæ motibus. Græce eſt τελείως ἐὼς ἰκλυτοί, quod eſt, omnino ſunt reſoluti. Male autem in codice Græco impreſſo eſt ἰκλυτοί pro ἰκλυτοί. Nec hoc aduerterunt Oroſcius & Gemuſeus.

Lectio codi-
cis Græci ca-
ſtigatur.

IN VIII. CAPVT.

Concoctionis ſigna. Galenus libr. i. cap. 3. de Criſibus eadem plane habet. Dicit autem ſigna decretoria nonnunquam male euenire, propterea quod apparentibus ſcilicet decretorijs citra concoctionem, natura ob perturbationis violentiam, quæ aliàs ab alijs cauſis acciſſit, ad expellendum coacta, criſis vel bona, vel mala fiat.

Neque igitur per initia. Ex eodem Galeni libro capite octauo ſumptum eſt: ſequitur autem in Paulo Græco: ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οὐτε ἐν ταῖς ἀναβάσειν αὐτὰ φαίνονται καὶ, ἀλλ' ἐν τῷ παρακμῆς χρόνῳ. Hoc eſt: Neque igitur per initia, neque in augmento ipſa apparere, ſed declinationis tempore conuenit. Galenus
autem

Lectio codi-
cis Græci vi-
tiata.

autem habet : ὅτι γὰρ ἀναβάσει, ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμῇς αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est : Neq; enim in augmen-
to, neque principio, sed in vigore ipsa apparere oportet. Cui lectio-
ni ego assentior. Nam testimonio Galeni libro tertio de Crisibus, ca-
pite quinto : Exquisita concoctio status tempore confit. Ergo si mor-
bus ante statum iudicatus fuerit, malo est. Mutandum itaq; in Pau-
lo ἐν τῷ ᾧ παρακμῇς in ἐν τῷ ᾧ ἀκμῇς. Hoc non intellexisti Oro-
sci, nec tu Gemusæ aduertisti.

Si accessiones vrgeant. Galenus libro tertio de Crisibus, capi-
te quarto inquit, in hunc modum : εἰ μὲν γὰρ ἐπείγειντο, καὶ προ-
λαμβάνουσιν αὐτὴν ἡ συνήθης ὥρα &c. Hoc est : Si enim vrgeant,
præuertantq; horam consuetam. Paulus habet : εἰ μὲν ἐπιτάσσουσιντο,
hoc est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam:
Et vehementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum
censeo, ἐπείγειντο, non ἐπιτάσσουσιντο, quanquam non adeo refert, ut-
rum malis. Galenus certe paulo post eodem verbo eadem in re uti-
tur : πρὸς δὲ λέγειν inquit : ὡς ἐπὶ τῷ λήθει ἐπείγεται &c.

Item iis qui ob rigores. Nempe iis qui febribus laborant inter-
mittentibus. Parum proprie dixi rigores, nam hi proprie de figori-
bus vehementibus, aut duritie ex frigore contracta, aut etiam sine fi-
gore dicitur. Ut apud authores idoneos est inuenire. Græca autem di-
ctio ῥίγος, totius corporis concussionem significat. Celsus eam vo-
cabulo horroris qui Græcis φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius
tamen libro septimo capite quinquagesimo scribit: Certis pestifer ca-
lor remeat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro vehe-
menti horrore, ut Galenus est autor.

IN X. CAPUT.

ANte quamlibet iudicationem, agrotus grauius ex-
cruciat. Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem li-
bro, sumptum est. Excruciat autem grauius, quia natura in to-
tum contra morbum insurgit, ad expellendum ea quæ præter natu-
ram sunt. Græce est δυσφορίᾳ πονηῖται. Hoc est ad verbum: Dif-
ficilis tolerantia præcedit. Nam δυσφορεῖν verbum, signat agre mor-
bum ferre, inquietum esse, exagitari & affligi.

Atque his obuenientibus. Galenus libro citato : εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν
τοῖς ἀπασιν. Hoc est : Si enim præter hæc omnia. Sublimius attol-
lantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit
pulsus sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad

Ad hæc si dies decretorius indicetur. Hoc est si predicatur ab alio contemplatorio, vt septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.

Exilientem. Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem inscripsit $\omega\pi\iota\ \omega\pi\omicron\tau\iota\nu\omega\sigma\kappa\epsilon\upsilon$, in hunc modum habet : Cùm natura incumberet in ea quæ grauabant, expellenda, æger erexit se tanquam vellet è lecto exilire : Rogatus cur id vellet facere, respondit se videre serpentem rubrum extegula emergentem, ac vereri ne in via ille aberrans, super ipsam caderet, eoque fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet. $\epsilon\iota\ \tau\iota\ \omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$ Græcus codex habet, vt etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat autem $\omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\mu\alpha\iota$, idem quod moueor, concutior, palpito. Vide libellum Galeni de palpitacione, quam alij tremorem interpretantur. Libro primo de crisibus pro $\omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$ habetur, $\sigma\epsilon\iota\epsilon\tau\eta$, quod est, mouetur, additurq; $\eta\gamma\epsilon\iota\ \rho\omicron\mu\acute{\omega}\lambda\delta\epsilon\ \gamma\iota\nu\epsilon\tau\eta$, id est, & tremulum fit, vt labrum.

Venæ in temporibus. Quod signat sanguinem ad superiora erupisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit arteriarum pulsare.

IN XI. CAPVT.

SI euacuatio. Ex Galeno de Crisibus. tertio, cap. 3. fere omnia scripta sunt. Meminerint autem lectores, aliquando me dictione Græca crisi scilicet $\nu\tau\iota$, quod medicorum familiæ sit & visita, & familiaris. Aliquando interpretor iudicium, vel indicationem: quod vt mihi liceat post alios, oratos ipsos volo.

Crisis.
Iudicium.
Indicatio.

IN XII. CAPVT.

PULSUS. Hoc caput ex varijs Galeni libris de pulsibus transcriptum est. Primum itaq; Paulus definitionem ponit, qua dicit cor & arterias attolli, & deprimi. Attolluntur autem, longis fibris in se coeuntibus: alijs omnibus relaxatis. Submittuntur, hoc est deprimuntur, astringuntur, longis relaxatis, latis in se coeuntibus. Græce est $\omicron\ \mu\epsilon\lambda\lambda\ \sigma\phi\upsilon\gamma\mu\omicron\delta\ \lambda\acute{\upsilon}\nu\eta\sigma\iota\varsigma\ \delta\epsilon\tau\iota\ \lambda\alpha\rho\delta\iota\chi\epsilon\varsigma\ \eta\gamma\epsilon\iota\ \alpha\rho\tau\eta\epsilon\iota\alpha\upsilon\ \lambda\iota\alpha\tau\alpha\ \delta\iota\alpha\sigma\tau\omicron\lambda\eta\upsilon\ \eta\gamma\ \sigma\upsilon\sigma\tau\omicron\lambda\eta\upsilon\ \gamma\iota\gamma\upsilon\mu\epsilon\upsilon\eta$. Hoc est: Pulsus sane motus est cordis, & arteriarum qui fit secundum diastolen & systolen.

Pulsus partes.

Fuliginosa. Quæ ex functione obita collecta sunt. Nam hæc teste Galeno, non aliter calorem natium, quàm flammam ignis extinguunt.

Primo pulsuum genus. Hoc ad verbum ex Galeni libello ad candi

candidatos medicinae sumptum est. Habetur enim: Ex ijs quae proprii motus sunt, celeritas existit & tarditas: alius vrgens motus, alius resolutus.

Διάστασις.
Interuallū.

Quoniam enim. Hunc syllogismum ex primo de differentijs pulsuum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia vero & arteria tria interualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, longum, latum, & profundum, necesse est omnino in singulis distantijs quantitatem distoles, & sistoles metiri. Verti autem interuallum, διάστασις, quod neoterici dimentionem interpretantur. Celsus libro tertio dixit: Si vena non aequis interuallis mouentur, arterias intelligens.

Humoris infusi. Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarto etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nam aliàs plus, aliàs minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aërea humiditas.

Pulsus plenior.

Plenior. Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile iudicabunt. Caterum plenus pulsus habet tria genera, ut summam dicā: Primum, quod ipsum corpus arteriae, quo statu sit declarat: alterum quod qualitatem substantiae quam continet: tertium natui spiritus facultatem indicat.

Corrigitur
exemplar.

Quoniam vero caloris. Hic locus ad verbum ex libro primo de differentijs pulsuum desumptus est. Verba ita sonant: ἐτι καὶ τὸν αἵματι ἀρτηρίας τέρον, ἐν ὁρίσσει γινώσκόμενος αἱ τὸ πῦρ τοῦ θερμότητος & δια τῆς θερμότητος, ἢ ἐκ κατ' ἄλλοις μέγεθος ἀπὸ τοῦ πῦρος ἴδιον εἶναι τισὶ καὶ τοῖς τοῦ γένους σφυγμῶν συνάριθμοις τοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione videtur addendum in Paulo τινὲς, ut sit ἡ ξίωσας τινὲς καὶ τὸ τοῦ &c. quod praterierunt Aristarchi.

Nam cum arteria. Galenus primo de differentijs pulsuum in hunc modum habet: αἱ ἀρτηρίαι σώματι & ὅσους κοίλου, καὶ μακρῶ καὶ περὶ ὁρῶν, λινυμένους τε διὰ πᾶσιν διπλῶν λίνυσιν ἐναντίας οὐκ ἐπιτορ μορίων: ἢ καὶ εἰς ἑαυτὴν συνίσταται πᾶσι καὶ ἑαυτὴν ἢ διὰ τὴν ἀλλοτρίαν πᾶσι καὶ ἑαυτὴν, καὶ τὰς αἱ διπλῆς λινύσεως ἐνομαζόμενος σφυγμῶν, διττὰς ἀναγκαῖον αὐτῇ συμπίσσει ἡρεμίας ἐφ' ἡν ἄτορα &c. Hoc est, ut Graecae linguae ignari intelligant. Cum arteria corpus sit cauum longum, & teres, moueaturq; perpetuo duplici motu, ex contrarijs composito particulis (vel enim in se undiquaq; subsidet, vel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroq; coincidat. Deinde pergit, atq; has duas quietes exercitata manus cognoscat, & ratio demonstrat. Pauli lectio videtur corrigenda. Habet enim codex impressus αἱ

ἡ ἀρτηρία διπλὴν κινούμενη κίνησιν ἐν αὐτῇ συνεκμεινῶ κίνησιν. Quod est: Cum enim arteria duplici moueatur motu, contrarijs composito motibus, pro ἐν αὐτῇ συνεκμεινῶ μορίων. Sic itaque tu corrigo. Oroscius & Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Corrigitur
codex græ-
cus.

Differentiæ rhythmi. Ex primo de differentijs pulsuum Galeni transcripta sunt. Quare qui omnia planius fusiúsque explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinem inæqualitas, id quod maturius, aut tardius assumpserit. Hoc est, ut apertius interpreter: quanquam sic habeant, ac cum inæqualitas ex magnitudine sumpta, inæqualitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ratione constat, assumpserit. Sed malui esse obscurior, quàm non fidelis Aristarchis nostris videri.

Ac si id quod in situ est. Eadem locutio. Idem intelligo, ac si dicas: Si eam differentiam inæqualitatis sumpserit, quæ ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit. Sequentia Pauli dicta, ex Galeni libris de causis pulsuum, & de prænotione miro artificio, compendioque sunt decerpta.

Magnus igitur pulsus. Galenus πρὶ προγνώσεως σφυγμῶν, in hanc sententiam ait de magno pulsus ἦτοι γὰρ διὰ τὴν ἰσχυρότητα τὸ σώμα, ἢ διὰ τὴν δριμύτητα τὴν ἡρώσεως, ἢ διὰ τὴν ἐπικρίτητον κίνησιν. Hoc est: Vel enim fit ob corporis (intellige arteriæ) gracilitatem, aut temperamenti calorem, aut motum acquisitum.

Causæ ipsius naturales. Paulo post Galenus habet: ἀλλ' αἱ μὲν ἐπικρίτητοι κινήσεις, αὐτὰ καὶ λαβίσταται, παραμένοντες δ' ἐπὶ διὰ τὴν ἰσχυρότητα, καὶ τὴν ἡρώσιν, quod est: Verum motus asciticij statim subsidunt, qui autem ex gracilitate, & temperamento proueniunt, adhuc perseverant.

Ut etiam manu admota. Galenus ὥς ἐν ἐστὶ σοι τῶν σφυγμῶν ἀφαιμένῳ, λαβέτω βραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἐφαφαιμένῳ σταθερὰ διαγινώσκαι τὴν μετεβολήν. Hoc est: Ut liceat tibi pulsus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rursusque iterum attingenti, mutationem manifestissimam dignoscere &c. Habetur autem in codice græco Pauli bis τῶν αὐτῶν, tu igitur postremum expunge, quod neglexerunt nostri mastiges.

Textus græ-
cus castigatur.

Qui sane ob balincas. Hæc fere & sequētia lib. i. iam citato inuenies. Nisi quod Galenus verbis nonnihil immutatis eadem dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, ad-

Cause pul-
sum & co-
rum differen-
tia.

huc submissionem magis citatam. Galenus libro secundo προ-
γνώσεως σφυγμῶν hanc sententiam interpretatur in eum modum:
διηλώσει τοιγαρῶν τὸ μὲν τάχ' & τὴν συστολῆς ἀξιόλογον τι πλεονέχον
αἰθωλωδῶν περιττωμάτων ἀθροίζεσθαι ἀμὰ καὶ ἐκκρίνεσθαι. Et
statim: παμπόλιν μὲν γὰρ ἀθροίστην λατὰ τὰς ἐκφύς τ' χυμῶν &c.
Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quan-
dam fuliginosorum excrementorum copiam colligi simul, & excerni
&c. Per multum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam li-
bro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit
corpus arteriarum distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimi-
tur. Superat autem alias diastole, cum scilicet maior refrigerij usus
est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Verum ad magnum pullum. Galenus primo de causis: Con-
uenit igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus
magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipsorum urgentem,
virtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino
duras.

Celeritas accedit. Eodem libro: Copiosiore calore in corpore
collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationem: pulsus-
que maiores. Qua autem ratione maiores, hac etiam velociores &
frequentiores. Ut enim sitientes non solum multum, sed etiam cito, &
frequenter potionem assumunt, ita qui refrigerantem substantiam
requirunt, multam simul hanc, & celeriter & frequenter attra-
hant. Quare proprij sunt copiae caloris pulsus magni, celeres, & fre-
quentes non tamen necessarij sequentes, verum si nullum ex predictis
impedierit.

Dubij solu-
tio.

Non amplius id quod in. Primo de causis Galenus. Fortassis
videbuntur pugnare ea quae apparent tum inter se, tum una cum
causis propositis. Conuenit enim, ut in caliditate, primum sane ma-
gnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiam in frigidi-
tate, primum sane oriri paruitatem: mox tarditatem: tertium ra-
ritatem. Quae igitur solutio? Quoniam virtute robusta, & si usus
paulo minor fuerit, primam sane actionem neque exiguam, neque
tardam necesse est fieri. secundam vero post longius tempus, si usus
urget, ratio est absolui. Sicut enim cum urgebat stimulabatq;, & im-
pellebat virtutem ad actionem, ita cum non urget, diutius conquie-
scere permittit.

Sin autem tarditas paruitasque accreuerint, e contrario
raritas in crebritudinem. Quod sit cum non totum arteriae spa-
cium absoluit pulsus, sed medium duntaxat, unde saepius repetere co-
gitur:

gitur: alioqui in magno vsu cum frequens est, totum spacium peragat, crebro id repetens. Si verò maior frigiditas oborta, sit, eoque vsus abunde solutus fuerit, vnà quidem cum eo motus etiam celeritas ita soluetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe virtute robusta absolute tardi, aut parui nunquam fient, etiam si vsus admodum fuerit solutus.

Itaq; latitudo. Latos omnino pulsus post criticas excretiones fieri docet Galenus libro secundo de pulsuum causis. Paulo post: Frequenter lati fiunt ob humiditatem, & praesertim cum ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, vt in hydrope, aliquando ob pondus, quod extrinsecus arterijs accidit. Id autem pondus plerunque cutis ipsius rugositas est.

Quemadmodum sublimitas. Sublimis in ira & ante crises, scilicet cum natura ipsa quae molestant, expellendis incumbit.

Longus. Cum quo reliquarum duarum distantiarum quantitas existimatur, ob tenuitatem corporis aut peculiarem magnitudinem talis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrat arcus sane & gracilis adeo vt chordam tenuem representet. Sive enim veluti gracilis cuiusdam chordae, sive vt pili occursum appareat, ex hoc ipso magna quaedam tunica arteriarum durities apparet.

Non enim extrema. Idem Galenus habet primo πρὶ πρὸς γυναικας ἀρρυθμῶν, hisce verbis: ἀσθενὲς καὶ λεπτὸν καὶ τὸ ἀλγύειον δὲ λεπτότερον ὅσον τὸ σῶματι γίνεται. Hoc est: Pulsus defectio reuera quidem nunquam in corpore viuo accidit.

Corpore emaciato. Hanc sententiam & superiorem in libello de pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur. Vide libellum iam citatum, & prognosticis.

Durum pulsum. Galenus lib. 3. de differentiis pulsuum in calce: & 1. de dignotione: Durus inquietus, & vehemens esse possunt, sed non vehementissimus, & durissimus. Vide etiam primum de praesagij pulsuum.

Reliqua pituitae vicia. Alia quae arteriarum tunicas humiditate multa, & praecipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus. Vide secundum Galeni librum de praesagij, & tertium de causis pulsuum.

Deficientes. Alij vocant intermittentes. Fit quando facultas grauatür humorum copia, & impeditur, quo minus motu conuenienti

Pulsus deficiens vnde.

tempore auspicetur: vel ob crassitudinem, vel copiam humorum praeter arteriarum cordi vicinarum obstruentem.

Coincidents
pulsus.

Coincidentes. Fiunt hi teste Galeno ob frequentiam inaequalem: quod cor saepe functionem minus ac vsus exigit, obierit. Hoc autem ipsum rursus fit, vel grauato corde humorum copia, vel instrumenti obstruclis, vel coactis: quae & deficientium causa erat. Differunt autem inter se, quod coincidentes virtutem testentur repugnantem, & contendentem cum ijs quae molestant. Deficientes, detrectantem id subire. Coincidentes saepe crisim intulerunt. Deficientes illis periculosiores. Vtrique accidunt in febribus ardentibus.

Inclinans.

Inclinantes. Cum virtus imbecillis erit, corpora autem arterias ambientia, emaciata & colliquata. Multae sunt causae, Inflammationes, scirrhi, abscessus, phymata cruda, omnis tumor praeter naturam, duricies squalida, frigiditas nimia. Galenus primo de causis.

Caprizans.

Caprizans. Fit cum virtus quantum ad se pertinet, naturale robur seruat, sed à motu impeditur, vel propter copiam immodicam vel obstruclionem, vel instrumentorum compressionem. Vide secundum de causis pulsuum.

Dicrotus.

Dicrotus. Hic & caprizans bis feriunt, sed dicrotus duritiam instrumentorum habet, & intemperiem.

Vndosus & vermiculans. Hi duo quantitate sola differunt, una species existens. Sunt autem in diuersis particulis, sed vno in pulsu, causa est, imbecillitas virtutis, aut copia humorum, aut mollicies instrumentorum extrema: cum robur vitale arteriam nequit attollere.

IN XIII. CAPVT.

Aluus.

Aluus optima. Hoc caput partim ex prognosticorum secundo, partim ex primo de Crisibus libro Galeni sumptum est. Dixi autem aluus, pro deiectione, secutus Celsum, qui libro secundo eandem fere sententiam habet. At venter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modo conuenientia his quae assumuntur. Caterum qui causas omnium volet intelligere, commentarium supra citatum leget.

Leuiter ruffa. Sic interpretatus sum λευκέρρον quasi dicas subruffa: hoc est, quam bilis ex iocinore leuiter tinxerit.

Conuenienter spissa. Grece est ἀμὰ τῇ προσμύσει συστάσει, quod est cum conuenienti spissitudine. Apud Galenum de Crisibus συστάσις non est, quod satis in verbo συστάσις, hoc est, cohaerens, intelligatur.

Non

Non nimis foetida. Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foetitas odoris accessit.

Non exuccata. Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasq; nō sit per venas mesentericas iecori distributa. Ut fere idē, sit quod alius li- quida aquosaq;. Cum enim distributio parū absolute peragitur in ventre, extremēta liquida, tenuia & aquosa permanēt, si Galeno & rationi credimus. Græca dictio est ἀχύρωτον, quam Leoniceus vir alioqui in Italia habitus maximus in re medica, vertit, humoris ex- pers, quod quā sit ad rē, eruditi indicent. Est autē ἀχύρωτον, id quod Galenus libro octauo de compositione medicamentorum secundum lo- cos, ἀνεχύρωτον dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν δὲ ἐλ- κειν ἐν τῇ κοιλίᾳς τε καὶ τῶν ἐντέρων πλεονάζῃ ἀτονίᾳ τὸ ἥπαρ ὑγρὰ, καὶ ἀνεχύρωτα ἐκκρίνεται διὰ τῆς ἰδίας. Hoc est: Cum igitur iecur alimentum ex ventriculo & intestinis præ debilitate ne- quiuerit attrahere, liquida, & non exuccata per sedem excernuntur &c. Ex hisce verbis liquet non debere accipi pro ἀχύρωτον, aut ἀχύ- λωτον, sicut nonnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & tenuis esse potest, etiā si venter pro munere suo sit functus. Necesse au- tē est & circumpositis, ut partes à vicio immunes esse, et distributionē pro- be in iecur fieri, ut alimentum concoctum esse, ex aluo indicemus. Cæ- terum ἀχύρωτον videtur contrarium fere esse verbo σπυγερός. Nam hoc tū est substantia moderatum, ut vndiq; cohereat, simulq; existat molle. Illud contrā tam liquidum ut vndiquaq; diffluat.

ἀχύρωτον
Leoniceus

At mere ruffa. Iam ad tertium deiectionū genus descendit, quod nonnihil excrementis à toto corpore in ventrem confluentibus: non ex ciborum confectione indicare potest.

Viridis æruginosa. Aeruginosa in ventre gignitur & por- racea: alia bilis differentia in venis procreantur teste Galeno in com- mentario de atra bile.

Animantis particularum consumptionem. Græce est σύν- τμησις ἀνδοῦ τῶν τοῦ ζώου μορίων, quasi dicas colliquationem animan- tis particularum indicat: Intellige autem solidarum: quæ absolute σύντμησις particule dicuntur.

IN XIII. CAPVT.

Virina igitur. Ex libro primo de Crisibus omnia mutuatus est Paulus. Ceterum vbi de exacte aquosa agit, Galenus fusius pleniusq; persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δὲ ὁχρῶδες ἀπὲς πύθου, ἐπεὶ δὲ τὸ ὁχρῶδες ἀνελθὲς, διορᾷ ἀπὲρ πλεονάζει τῆς σφύξης

Vrina cruda

μα το φλεβώδες γένος ὑπάρχει. Hoc ut interpretatus sum. Galenus autem τὸ τοῖνου ὁχάτως ἀπειλὴν ὑπὲρ ἀπαίτια ταῦτ' ὅσιν. εἴη δ' ἂν ὑδατῶδες ἀκριβῶς τὸ τοῖστον, ὅτ' ἦδη περὶ μόνον, ὥς τὸ δολερὲν ὅτι μέλλον, ὥς τὸ μετ' ὀλίγον ἀναθρομένου, ἀλλ' εἶον ἀπεγνωσμένης τ' ὑφ' αὐτοῦ σύμπτωμα, τὸ τοῖστο το φλεβώδες γένος ὑπάρχει πᾶσι, εἶον ἀκριβῶς ἀπειλία γαστρίος. Quod est: Itaq; extreme cruda prater has vniuersas existit. Talis autem erit exacte aquosa, ut quæ nec modo coquatur ut turbida, nec coquenda est, ut quæ paulo post turbatur, verum ut desperata concoctionis accidens. Talis venosi generis affectus existit, qualis exacte ventris cruditatis.

Aduerte.

His vicina est. Recenset ordine crudarum differentias, quas etiam Galenus breuiter hunc in modum commemorat: χείρονον μὲν ἢ εἰς ὅρα διάρροια, μοχθηρὸν δ' ἰκανῶς καὶ τὸ λεπτόν ἐν τῷ καὶ λονῶν, εἰονπρ καὶ τὸ ὑδαρ. τοῦτω δ' ἐγγύς ὅσιν ἑτέρων ἔνρον ἐν πολλὰς τῶν νόσων φαίνεται, ὥς δ' ἰον δονῶν ἰκανῶς λονῶν καὶ λεπτὸν μιγνύμενον ἐχρὶ ἰσίων. Quod est: Deterrima quidem in vrinas profluxio. Iam verò praua admodum est tenuis adeo & alba, qualis & aqua existit. Huic autem vicina est alia vrina, quæ in multis morbis apparet: & vini albi admodum & tenuis mixtam habere speciem videatur &c. Paulus fere eadem habet, nisi quod ἰον hoc est, vini, nullam mentionem faciat. Tu igitur apud te considera, num Galeni scripturam malis, an intelligere ἐγγύς ἰκανῶς το λεπτὸν καὶ λονῶν, quod est: Alteram vrinam esse admodum propinquam tenui & albe vrina, quæ aquam representare dicebatur. Oroscius locum hunc nimia sua diligentia intactum præterijt.

Castigantur
græca.

Tantum vero crassitie ipsam ab aquosa. In græco codice est το ὑδαρ, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὑδατῶδες, id est, ab aquosa, nec hoc aduerterunt Aristarchi.

IN XV. CAPVT.

Sputa.

Sputum subflauum, subrusum. Ex eodem Galeni loco, & Orisij sexto libro collecta ista videntur. Hippocrates in prognosticon secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem. Hac periodus libro secundo prognosticon à Galeno sic scripta est: πλὴν γὰρ το αἵματος, εἰς ἂν ἀκρᾶς ἢ μοχθηρὰν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐπὶ θρῆμῳτι φλογώδῃ πλὴν γενεῖν ἐχων, ὃ μὲν ξανθὸς, ἐξοπῶμενος αὐτῆς τ' ἐρῶδες ὑγρότητος ἢς ὑδαρμιγνύμενος ὥχρὸς ἐφαίνεται, ἢ ἡ ἰώδης ἐξ ὑπ' ὀπῆς τὰς τῆς. ὃ ἡ μέλας ἢ τοι τ' αὐτῆς ὑπ' ὀπῆς τῆς, ἢ πρὸς ἀνὰ λανισσῆ τε καὶ διαθροτικῶτάτη γίνεται μέλαινα χορὴ ἢ το παρὰ αἵματος ἐμῶνς ξυρῶδες, ἢ ἀγῶν νεφρῶνς τε καὶ ψύξης. Hoc est: Nam prater

fin

sanguinem, quicumque syncerus humor fuerit, prauam indicat affectionem, ex flammea caliditate trahens originem. Flauus sanè, serosa ipsa humiditate retorrída, qua admixta, pallidus apparebat. Et uirginosus autē, hac nimis adusta. Niger, vel eadē supra modū adusta, quae efficitur atra bilis et pessima, et maxime erodēs, vel crasso sanguine similiter resiccato, vel ratione tū mortificationis, tū perfrictionis.

Cruenta igitur. Galenus loco iam citato in istum modum habet: τὰ μὲν γὰρ αἰματώδη καὶ φλεγματώδη, μέτρια, τὰ δὲ αὖτε ξανθὰ καὶ μελαινὰ χολῆς, χαλεπὰ διαβρωτικὰ μὲν γὰρ ὄντι ἀμφὺ τὸ σωματικόν, καὶ τῶν αὐτῶν λειψόν. Hoc est: Etenim cruenta et pituitosa moderata: Flauae autē, aut nigrae bilis sputa difficilia. Quippe ambo corpora erodūt, atq; hoc ipsis est cōmune. Paulus non habet φλεγματώδη.

Nam si prompte excreentur. Hoc est ex Hippocrate: εἰ γὰρ ἐν πετίῳ ἀναψύσῃτο. Galenus interpretatur dictionē ἐν πετίῳ, quod nos vertimus prōpte, hoc pacto. τὸ δὲ ἐν πετίῳ ἀντὶ τοῦ ῥαδίως τε καὶ ἐτοίμως οἱ ἑλλώδῃ λήγῃσι. Rursus: ἐν πετίῳ γὰρ ἀναγῇ τῷ σπύγῳ, τὰ τε σπύγῳ τε καὶ ῥαδίῳ γίνεσθαι, μήτ' ὁδύνῃς ἰσχυρῶς ὄντος κατὰ τὸν δάρακα.

Valde crassum. Graecus codex habet ὑπερπαχὺ quod est subcrassum, pro ὑπερπαχὺ, hoc est, supra modum crassum, ex pituita nimium assata nimirum. Praeterijt Gemusaeus.

At si expuatur quidē. Codex graecus deprauatus est, habet enim εἰ δὲ μὴ τῷ σπύγῳ μίλαν, ἀλλὰ, pro εἰ δὲ μὴ τῷ σπύγῳ μίλῳ, ἀλλὰ ὣς. Castigatur codex graecus. Emendatur graeca.

IN XVI. CAPVT.

Diarias febres. Hoc principium sumptum est ex primo Galeni libro ad Glaucōnem circa principium. Dicuntur autem ἐφημέριαι graecis, quasi dicas ad diē durantes: ἀμφημέριαι autem, circa singulos dies infestantes, quotidiane uno verbo latinis appellantur.

Opportuni sunt. Isia cum sequentibus ex octauo Methodi Therapeutices huc translata sunt. Paulus ἐφ' ὧν αἱ ἀπὸ ῥῥοῖας τοῦ σώματος εἰσὶν ἢ ἀτμώδεις, ἀλλὰ ἀρρυθμικαὶ διὰ τὸ λαμπρῶς εἶναι ὡς ὥς. Galenus autē habet: ἐν οἷς ὄντι τὸ λαμπρῶς εἶναι ἢ ἀτμώδεις, εἰς οὗς ἐν τοῖς ἐν χύμοις. ἀλλὰ λαμπρῶς, καὶ ἀρρυθμικαὶ, καὶ λαμπρῶς τῶν ἀπὸ ῥῥοῖας ἐκείνης ὥς.

Lauare quidē nō subindē. Paulus graece habet λούειν μὲν μὴ πλύνειν, hoc est ut verti. Galenus autē οὕτως φησὶ, ὅτι λούειν δεῖν τῇ πολλῇ, quod est: Neq; frictionibus, neq; balneis multis indigent. Conferūtur loci.

Vehementer refrigerata. Graecus codex deprauatus est. Habet enim ψυχρὰ τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶς κατὰ χάριν ὥς. Vbi sit legendum ciata. Graeca vi.

Viētus dulcibus. Hoc est bonis. Nam bonus in corpore succus aut sanguis, dulcis ē est, & dicitur: malus autem, amarā, acidam, aliāve qualitatem extraneam habere ostenditur. Perperam igitur nos corripuit Oroscius, quod dulcis succi γλυκύχυμ & veriterini: cum idem sit dulcis & bonus in probi sanguinis significatur. Male habet Codex græcus viciatus. græcus codex γλυκύθυμ &. Vide Galeni octauum circa principium.

Aliquos horum nutrire. Codex græcus est deprauatus habet, τὸ τῶν τινὰ τρέφειν, pro τῶν τινὰς φέφειν. Vide octauum Galeni de morbis curandis. corrigenda sunt omnia exemplaria impressa.

Sed vlceri quod. Plenius in Galeno hac sententia habetur in hunc modum: ἀλλὰ τὸ ἔλκος ἐφ' ᾧ πρὶν ὁ βλεφάρων αὐτοῖς ἐν γυγνῇ μὲν &, αὐτὸ τε το βλεφάρων & πρὸς τοῖς ἀμφοτέροις λείπει τὴν παρὰ μὴν το γονομένου παροξυσμῶ. Hoc est: Sed vlceri ob quod Bubo ipsis fuerit excitatus, ipsiq; buboni prospicientes in accessionis declinatione lanant.

Cæterum à vino. Hac clausula ad verbū ex primo ad Glauconem sumpta est. Vbi etiam dictio πρὶν accipitur pro μέχρις αὖ, hoc est donec: aut sic dicendum: Cæterum priusquam inflammationes fuerint solutæ, arcendi à vino sunt egroti. Atq; hoc pacto seruabit dictio communem significatum.

IN XVII. CAPVT.

Putridæ febres. Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro totum transcriptum est: sed varijs ex locis. Textus autem in græco Pauli codice deprauatus est. Habet enim τὸ ἐπὶ σήψι πυρετῶν διάγνωσις, τὸ μὴ δὲ πρὸς τὴν προκαταρτίαν αἰτίων προσηύσασθαι, ἢ τὸ μὴ ἀπὸ ῥίγος δὲ ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν. Hoc est: Februm ex putredine contractarū dignotio est, quod nulla causa primitiua præcesserit, & quod non à rigore febris inceperit &c. Que sententia plane falsa est. Nam proprium plane febrium putridarum est à rigore inchoare. Oroscius & castigator Basiliensis, clarissimi & medici, & philosophi, ut ipsi audire volunt, hæc opinor tanquā parua neglexerunt. Tu autem quisquis veritatem amas in hunc modum corrige: τῶν ἐπὶ σήψι πυρετῶν διάγνωσις τὸ μὴ δὲ πρὸς τὴν προκαταρτίαν αἰτίων προσηύσασθαι, τὸ δὲ ἀπὸ ῥίγος ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν, ὅτ' ἐγκύσιος &c.

Corrige græcā. Hoc enim singulariter. In codice græco superfluum est τὸ, post μίετον adde δὲ particulam. quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipsas. Græce est ἰδιὸν ὅτι μάλιστα τῶν τοιούτων πυρετῶν. Galenus habet: ἰδιὸν δὲ τῶν ἐν τοῖς μάλιστα. Si voles, ita legito.

IN

IN XVIIII. CAPVT.

SI vires sint validæ. Ex Galeni vndecimo Methodi sumpta sunt ad verbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum: Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem iubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum vt excrementa descendant, videbitur.

Putrida per vrinas. Et hæc ex vndecimo, sed paulo ante, mutatus est Paulus. Oportet enim id quod putruit, omni ratione vacuare, quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducere &c.

Si vero febris magnitudo. Galenus addit ad planiorem intellectum, vt in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quam intermittentes.

Vires inuvalidæ. Græcus codex Pauli habet καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires validæ, cum sit legendum καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires non validæ. Præterijt hoc Gemusæus. Textus græcus viciatus.

IN XIX. CAPVT.

Tertiana febris cum sit. Ex secundo libro de crisibus, capite tertio hoc transcriptum est vñdem plane verbis. Cæterum Galenus post illa, in hanc quoque sententiam habet: τὸν δὲ ἀνελβὴν τεταύρου ἐκ ἐνδεκα καὶ μὴ ἐκ μεταξὺ πέντε καὶ ὀκτώ γινέσθαι. Quam orationem Leonici Leonici error. cenus vertit. Tertianam itaque febrem fieri contingit sine rigore vehementi &c. Cum sit dicendum: Exactam itaque tertianam non licet nisi cum rigore vehementi fieri.

IN XX. CAPVT.

EXquisitam tertianam. Ex primo ad Glauconem hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno variat, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: πρὸς πεπευ δὲ καὶ τὸν μὲν εἰς τὸν γαστήρα συρρίνωσκει καὶ ὁδῶναι δι' ἐκείνου. τὸν δὲ καὶ τὸν ἰόντα ὡσαύτως διὰ τῆς καὶ τὸν ἐκείνου. Quod est: Humorem itaque in ventriculum confluentem, per euomitiones euacuare oportet: inferius autem descendentem similiter per internam excretionem. Paulus autem in istum modum: καὶ τὸ μὲν εἰς γαστήρα συρρίνωσκει καὶ ὁδῶναι δι' ἐκείνου τε καὶ καὶ τὸν. Hoc est: Et quod sane in ventrem confluit, euacuare per vomitum, & inferna &c. In Galeni verbis γαστήρ pro ventriculo: apud Paulum pro toto ventre positum esse existimandum, si concordēs alio qui intelligas.

Vinis autem admodum vetustis. Lectio in codice impresso

plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπὲς δὲ μέλιτ & ἡγεῖ νάπυ & ἡ ταρίχης, ἡγεῖ τῶν φύσει δρμῶν ταῦτα μὲν ἐπὶ πάλαιον. Ex Galeno & Oribasio legendum: ἀπὲς δὲ μέλιτ & τε ἡγεῖ νάπυ & ἡ ταρίχης, ἡγεῖ τὴν δριμύτην ἀπὸ τῶν, ἡ δὲ τῶν φύσει δρμῶν, ἡγεῖ πάλαιον ἡγεῖ. Et. Atq; sic nos reddidimus latina: In priore enim lectione nulla vel acriū, vel vini facta est mentio. Orosius & castigatus Basiliensis non aduerterunt.

IN XXI. CAPVT.

L Auare in tertianis spuris. Hæc quoq; ex eodem loco sunt hæc trāsata. Dictio autem τὴν in græco exemplari desideratur. Lege igitur: ἀλλὰ τὴν ἡγεῖ τὸ τριμῆνοτον. Quod ceu paruum Aristarchi nostri contempserunt.

IN XXII. CAPVT.

Quartana. Ex primo etiam ad Glauconem & sexto Oribasij hæc sumpta sunt. De rigore autem quartana febris, Galenus cum alibi, tum in libello de tremore & palpitacione inquit: τὸ δὲ τὴν ταρίχων ἡ γεῖ νάπυ & ἀπὸ τῶν φύσει δρμῶν. Hoc est: Rigorem quartanarum qui experti sunt, etiam ad ossa usque penetrare affirmant, cum vehemens fuerit.

Nec bilis vomitus. Sed pituita intelligas, comitatur etiam lienis inflammatio, tumor, interim fastidium, intesa interim cupiditas.

Pulsus exiguus ac rarus. In hac febre inæqualitas pulsuum in uno ictu manifestissima deprehenditur. Multo enim velocius principium motus finemque inuenies quàm medium.

IN XXIII. CAPVT.

Quartana. Ad verbum omnia ex Galeni libro iam saepius nominato, compendiose transcripsit. Quamquam id antea fecerit Oribasius libro sexto

Castigatur
codex græ-
cus.

Qui refrigerant corpus siccantq;. In græco codice erat ὑπαρ-
νύων, hoc est, humectantium, pro ξηραίνων, quod est, siccantium.
Miror tā apertū vicinū indices nostros adeo oculatos nō deprehendisse.

Restitutus
codex græ-
cus.

Tum per dies aliquot. Male est in exemplari græco διήμερων
τῶν. Quod est: Per dies tres pro διήμερων τῶν. Id est: Per dies:
aliquot. Basiliensis corrector hoc quoque neglexit.

Quod succum Cyrenaicum. Galenus hoc medicamentum ma-
xime etiam commendat libello de Tremore, ceu ad rigorem, quarta-
nosq; circuitus, vtilissimum.

IN XXIII. CAPVT.

Quotidiana. Ex quinto capite secundi libri de crisi-
bus excerpta sunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentia
enim

enumerat in hunc modum : ἀμφιμερὲς δὲ παρέπειθ' ὑγρότης ἔξως, καὶ φλεγμῶδες ἔμειτοι, καὶ δὲ ὅνι ἰδίτετα μέλον, καὶ βαρυσμός τοῦ σώματος ὅλος, καὶ ὕπνος λερώδης, καὶ λεταφορικὸς καὶ σφυγμὸς μέγας, καὶ ἄραια καὶ χαῖνος τὸ πρόσωπον ὑποπελιδνον, καὶ χαῖνον, καὶ πεπονῶδες, καὶ πολὺν ἰμφᾶνον πλὴν τῆς λεχιξίας, καὶ ἴσπην &c. Hoc est, vt ignari linguarum intelligant: Quotidianam vero comitatur habitudinis humiditas, vomitus pituitosi, sitis non intensa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, veterinosusq; pulsus magnus, rarus, laxus, facies subliuida laxa, peponum modo tumida, quæ magnam materie prauitatem, & mutationem representet.

Aquosiora. Gal. addit lib. iam citato: καὶ φλεγμῶδες καὶ πυκνότερα, quod est pituitosiora, quæ ipsam febris causam ostendunt.

IN XXV. CAPVT.

Quotidianam curantes. Ex primo ad Glauconem libr. Galeni Paulus hæc descripsit.

Oxymelite. Simplici intelligendum, vt quod omnes meatus artus aperiat, ne crassus alibi humor, vel glutinosus adhærescat. Conuenit autem cum etatibus, tum naturis vniuersis.

Primis diebus. Græce est λεῖτα τὰς πρώτας ἡμέρας. Male autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας habetur, castigatus. quod etiam castigator Basiliensis non mutauit.

Ventriculi. Sic verit' γαστὴρ, quæ dictio nunc pro ventriculo, γαστήρ. nunc pro toto ventre accipitur. Galenus libello de typis febrium ait: συνίσταται ἡ μέλις ἐπὶ τοῦ μάχ λενοπράδνι. Quod est: Constituitur autem potissimum ob stomachum male affectum. Propterea Paulus recte dixit ventriculi, & oris ipsius rationem esse habendam, quāquam accadat interim, vt in hac febre etiam lien scyrrhum contrahat.

Idq; tam diu, quā. Græce est: λεῖτα πολὺν ἔως οὗ παύσῃ. Hoc paulo secus sonat, quā reddiderim. Galenus non habet: Eoq; multi, à quodam alio quā Paulo fuisse adiectum putant.

Nota.

IN XXVI. CAPVT.

Si vitrea pituita. Ex Oribasij sexto sumptum est. Vitrea autem pituita à Galeno libro secundo de febrium differentiis explicatur, in hunc modum: ὑαλώδης δὲ μοι δυνεὶ προσαρρώζον ὁ πρᾶξις τῶν χυμῶν τοῦ σώματος, εἰ νύτῃ δὲ ὡς ἔστι καὶ φίλιππος ὁ μὲν ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc sententiam: ἐν μέντοι δὲ ἐπὶ τῇ ξανθῇ ἢ μελαίνῃ χλῆσι ῥίγῃ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ ψυχρῇ φλεγμᾷ γίνεσθαι. κατὰ δὲ ὑαλώδης τὸν χυμὸν τῶν δὲ πρᾶξις, &c. Hoc est: Non solum autem ob flauam, aut

nigram

nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam valde pituitam fieri solet, vocat autem humorem hunc Praxagoras, vitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor non adeo vehemens est: quāquam pluribus nonnunquam diebus subsequētibz perseveret.

IN XXVII. CAPVT.

σωηχῆς.
σωοχὸς.

Continentes. Ex sexto capite libri secundi de Crisibus excerpta sunt. Interpretatus sum hic febres continentes, quas Græci σωηχῆς appellant: continuas autem, quas σωοχὸς. In Latina quoq; lingua duas voces usurpamus. Caterum Galenus intelligit continentes, quarum materia in vasis subsistit: vbi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatae, fiunt.

Acumine. Græce est ὀξύτης. Nam vt ὀξύς acutus morbus dicitur, ita deriuatiuum ipsius ὀξύτης, acumen, celeritas, aut precipitantia, aut quocunq; modo libet appellare.

IN XXVIII. CAPVT.

Restituitur
codex.

Continuarum. Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per continuas autem hic intelligo σωοχὸς, qui ex sanguine potissimum constituuntur. Male in Græco codice legitur τῶν σωηχῶν pro σωοχῶν. Neglexit hoc Gemusæus. Nam σωηχῆς vocabulum generale de omnibus febribz ex quocunq; humore continue affligentibus. σωοχὸς autem de febre ex sanguine vel putrido, vel effervescente usurpatur. Barbari hanc fæminino genere synochant nominarunt.

Emendantur
Græci.

In vigesimo nono capite codex Græcus habet παχῆα pro παχῆα. Non enim crassa lingua, sed aspera, vel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo aliqui emendato non aduertit. Caterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Precipit autem ardenti febre laborantes non sola aqua, sed mulsa aquosa nutriendos esse. Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis: Aqua, scribens, natura frigida, tardè penetrat, & quā plurimo tempore in precordijs subsistens, in acutis morbis corrumpitur: mel bile scit, ob id mulsa aquosa dari debet: vt aqua nulla in superiore venire facta mora à melle mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

διατᾶν.

Sustinere. Ita sum interpretatus διατᾶν, hoc est, nutrire, alere. Celsus ait, cremore ptisanæ sustentandi sunt. Atq; hoc loco proprie dicendum est, Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum viribus sustinendis sufficit.

IN

IN XXXII. CAPVT.

DVplex hecticarum. Galenus libro primo de febrium differentijs, Oribasius sexto eadem plane habent. Leonicens & Laurentianus parum recte in translatione Latina se gerunt. Quid autem sibi velit Orosius interpretando ἢ καὶ μὲν οὖν ἐστὶ συχνὴς, vel etiam si humiditatis aliquid continuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, vel etiam madore adhuc copioso, aut multo permanente. Nam συχνὴ non tantum συνεχὴς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολλὴς. Præterea sensus hunc significatum requirebat. Caterum Hectica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, vel quod totum corporis habitum occupet.

Aduerte.

IN XXXIII. CAPVT.

HECTICA febre. Vide Galenum libro decimo Methodi medendi: ubi paulo manifestius curationem hecticarum persequitur.

Moderato. Græcus codex habet aduerbium μεμετρημένως, quasi dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curam habendam esse dicit mensuræ, frigida febricitantibus exhibendæ.

μεμετρημένως.

IN XXXIII. CAPVT.

QVANDOQUIDEM tertiana. Hæc Galenus in secundo fere de febrium differentijs, Oribasius in sexto tradidit. Caterum nomenclaturæ rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertiana triplex: Parua, media, & magna. Parua viginti quatuor horas absoluit. Media triginta sex. Magna quadraginta octo, atque continua proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumnii, cum etiam valde periculosa est, non solum stomachum, sed etiam nervosam partem, & ut summatim dicam, media attingens.

IN XXXIV. CAPVT.

PUBLICÆ grassantes. Vide Oribasium sextum, Hippocratem in commentario περὶ ἰδιότητων, & de natura hominis. Caterum morbos publicæ grassantes voco, quos Paulus πανδημίας & λοιπὸς sua lingua appellat. Opportunum autem hic est explicare, quos nam Græci ἰδιότης ἐνδήμιας, πανδημίας, & λοιπὸς, nominent. Galenus itaque commentario primo in primum ἐπιδήμιων in hunc modum scriptum reliquit: μνησθῆναι καὶ τοῦτο εἰς τὰ μέλλοντα λεγέσθαι γινώσκουσιν, ὥς ἐνία μὲν τῶν νοσημάτων λοιπὴ πολλὰς καταλαμβάνει, ἂν λέγεται λοιπὴ. Hoc est: Meminisse convenit horum ad ea quæ post dicentur, sciendumq; nonnullos sane morbos communiter multos corripere: qui sane vocantur communes. Statim subdit: τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν ἐνδήμια εἰσι, τὰ δὲ ἐπιδήμια καὶ ἐπιδήμια.

τῶν

τούτων δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη λεγέσθαι. Id est: Ex communi-
bus alij vernaculi sunt, alij aliunde in populum ingruunt. Horum
periculosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἐνία δ' ἐκαστοῖσι λέγεται
τὰ σποράδην προσεχόμενα. Nonnulli singulos priuatim in-
uadentes dispersi, ac erratici nuncupantur. Paulo supra: διὰ δὲ
ὡς ἐκ τοῦ γένους τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων ὅσα λεγέσθαι γινώσκονται,
καὶ λοιμώδη λεγέσθαι. τὸ δὲ τῶν ἐπιδημίων ἐκ τοῦ τῶν περὶ δημοῦ
παγκοίνων γένους ὅτιν οὗτοι τῶν σποράδην νόσους ἀνίσταται. Hoc
est: Itaq; constat ex popularium morborum genere eos esse, qui mali-
gnissimi generantur, & pestilenciales dicuntur. Populares autem
illorum genere comprehendi, qui undiquaq; & communiter in omnes
grassantur. Quod genus morbis priuatim, & inter se dissimilibus op-
ponitur. Habes fere omnium appellationes explicatas: quo autem di-
lucidior fiat interpretatio, pauca ex primo Hippocratis de victus ra-
tione in morbis acutis subiiciam. Verba sunt Galeni in commentario
primo: ἀλλοῖ δὲ λέγει τὸ λέγει τούτου, τὰ μὲν τινὰ πολλὰ γινώσκει
νοσήματα λεγέσθαι ἐν αὐτῷ χρόνῳ, ἅπασιν ἔτι μὲν ὁμοῦ γινώσκει, λοιμῶν
δὲ μάλιστα, ὅταν ἡ ἐπικρατέστατη τινὶ προσεχόμενα διδῶσι, ἐπιδη-
μὰ λεγέσθαι, ὥστε εἶναι τὸ μὲν ἐπὶ δημοῦ νόσημα τὸ λεγέσθαι χρόνον τι-
νὰ πλεονάσαντα τινὶ χωρίῳ, τὸν δὲ λοιμῶν ἐπιδημίων ὁμοῦ. ὅτι-
ν ἡ καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων λεγέσθαι πολλοῖς ἐπὶ ὅτι τὸ λεγέσθαι χρό-
νον ἐπὶ γινώσκοντα, τὰ ἐνδημὰ λεγέσθαι. τούτοις δὲ ἀντίκεινται
πᾶσι αἱ σποράδην νόσοι, διαφύδνως ἐνοχλῆσαι τὸς νοσούντας ἐν
λεγέσθαι τὸν χρόνον ῥέπου σιωπῆσαι. Hoc est: Indicat autem in
hac oratione, multos sane quosdam morbos uno tempore fieri, quos,
cum perniciosi fuerint, pestilentiam nominant: cum mitiores, alia
quadam appellatione significant populares aut vulgares nuncupan-
tes. Vt popularis quidem morbus sit, qui certo tempore in regione qua-
dam dominatur. Pestilentiam vero morbum popularem perniciosum.
Iam vero aliud quoque morborum genus est, multis commune, quod
ex loci natura superuenit, vernaculum appellatur. His autem omni-
bus opponuntur, priuati morbi, diuersa ratione agrotos infestantes,
non communi modo constituti &c. Haelenus Galenus nos: cuius
sententiam ita interpreto. Morbi qui undiquaq; popularim, nul-
lo non tempore anni grassantur, nulliq; nec sexui, nec aetati, nec corpo-
ris statui parcunt, περὶ δημοῦ, & παγκοίνους appellantur Graeci, ex
aëre infecto trahunt originem. Qui autem certo tempore in regione
quadam publice dominantur, ἐπιδημῶν, quasi dicas populares, aut
vulgares nuncupant, similiter ex aëre, aquae viciatae potu, stagno-
rum, paludumq; graui halitu procreantur. Qui autem perpetuo in re-
gione

gione quadam in crudeſcunt, ἰνδύμους Græci, patrios noſtri & ver-
uaculos nominant, ſimili fere ex cauſa oriuntur. Porro fit interdū,
vt morbus regioni peculiariſ, & generalis vno tempore ſimul inua-
dant, pro aëris, aliarumq; circumſtantiarum ratione. At morbi pri-
uati cuiq; inter ſe diſimiles, σποράδας vocauit Hippocrates, ex vi-
ctus ratione trahunt originem.

Cibi que igitur communes. Non ſolum aër teſte Galeno com- Cibi commu-
munes morbos efficit. Siquidem qui in Aëno dum fames graſſare- nes.
tur, leguminibus reſcebantur, crurum impotentes euaserunt. Item
qui Erwo genuum dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos,
qui etiam triticum ſemiputridum fame coacti ederunt, in commu-
nem incidiffe morbum ex cauſa communi. Et alibi exercitum totum
praua uſum aqua ſimiliter in omnibus militibus noxam ſenſiſſe.

Afflictiones corporis. Cum Hippocrates dicit alios morbos ex
victu procreari, intelligit etiam vitæ ſtudia. Nempe exercitia, otii,
vigilias, triſtitiā, iram, perfrictionem, inſolatum, balnea quoque
non ſuo tempore uſurpata, morbos excitare, ſaltem ratione ſecun-
daria.

Hæc quidem non. Græcus habet: τῶτα μὲν ἔν, quod ſonat: Caſtigandus
Hæc quidem igitur. Verum mea ſententia legendum videtur τῶ- Græcus.
τα μὲν ἐν, negatur, id quod tum autoritate Oribasij tum ipſa ratio-
ne probare poſſum. In primis enim Oribasius ſexto libro hanc lectio-
nem confirmat: deinde in eodem capite ſtatim Paulus dicit: Si qui-
dem in aliis cauſis nec omnes ſimul incidimus, neq; eis toto die im-
moramur: aër autem quoniam omnibus circumſuſus eſt, & inſpiratus
attrahitur, vt animalium quoq; corpora afficiat, eſt neceſſe. Non di-
co quod Galenus primo commentario in Hip. Epidemia, vnde iſta
partim ſunt excerpta, in hunc modū habeat: τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐν αἰσ-
μάτων καὶ τομμάτων πάγια ἔσθι. Hoc eſt: Qui autem ex cibo aut
potu fiunt, rari ſunt &c. Gemuſæus noſter vituperandi ſtudio, da- Gemuſæus
minat hanc meam lectionē, nullam adferens vel autoritatem vel ra- natura ma-
tionem. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem ledicus.
ex aëre procreari, aliunde autem rariuſ? Sed inquit Gemuſæus, ex
euaporatione lacuum frequentius accidere: cui in hoc reſpondeo, nul-
lum vel ſtagnum, vel paludem morbum communem generare, niſi
τῷ θερμότητι τὸν αἶρα, vt ait Galenus. Aër autem ipſe vel ca-
lidior, vel frigidior, humidiorve ſæpe nobis circumdatur. Qua-
re etiam iſ morbos potius, quàm Solæ paludum vaporations, ef-
ficat. Quæ vt dixi, nunquam corpora humana afficiunt, niſi
prius

prius aërem ipsum corruerint. At rursus obijciat Gemusæus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, verba hæc sunt : πολλάκις μὲν γὰρ ἀναθυμιάς τις ἐξ ἐλῶν ἢ λιμνῶν, ἢ τελευμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίας γίγνεται τῶν αἰσθημάτων. Hic dico Galenum velle indicare non solum ex aëre intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates videtur innuere, sed etiam ex aëre, euaporationibus paludum infecto. Non tamen negat ex aëre frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meā possum aītruce. Nam conferens ille aërem cum alijs omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aëris usum effugiamus. Adde quod aëris tantum remedia enumeret, ubi intemperies aliqua subesse videtur, reliquarum causarum, non item. Vide ergo candidè lector, quid faciat procliuis hominum quorundam ad male dicendum natura.

Nota.

Præterea lignorum. Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam : ὡς περ ἐπαυῶν καὶ τὴν θαυμασιώτατον ἰπποκράτην ἐστὶ τὸν λαμῶν ἐκείνου τὸν ἐκ τῆς αἰθρίας εἰς τὰς ἡλλωας φθασάντα ἐν ἄλλῃ ἐθέρῳ παύσθαι, ἀλλ' ἢ φέψας τὸν αἶρα, καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μὴ κτενὶ τοῖς ὅσων ἀναπνεύσαι. κελεύσας ἐν ἀνὰ τὴν πύλιν ἡλίου θάπτεσθαι τὸ πῦρ, δὲ ἀπὸ τῆς ἀνὰ φέψας τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ σιφάνωνσι καὶ τῶν ἀνὰ τὴν ἐκείνου θάπτεσθαι, τοιαύτα συνεισέλασθαι εἶναι τὸ πρὸς τὴν φρόνην, καὶ ἐπισπένδον αὐτῶ τῶν μυρῶν λιπαρώτατα, καὶ ἰδῶν τὴν ὁδὸν ἔχοντα ἵνα ἐν τῷ ἡλικθάρῳ γινώσκον ἐν ἀνθρώποις ἀναπνεύσωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν αἰρά. Quod olim sic Latine reddidimus: Quamobrem etiam Hippocratem illum, multis admirandum laudo, qui luem illam pestilentie ex Aethiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quam aërem mutando, alterandoq; ne talis amplius inspiraretur. Cum igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset, non simplicem lignorum materiam, verum ferta, floresq; suauissimos, fomitem ipsius esse consuluit, vnguentaq; pinguisima, & odorifera ipsis superfundi, ut aërem purum hoc modo redditum homines in mali subsidium inspirarent.

IN XXXVI. CAPVT.

Nares destillant. Galenus in commentario Prorrhethici Hippocratis scriptum reliquit : ἀπασῶν δ' ὁσῶν τ' ἀπὸ ῥίνος στάξιν χαλεπῶν ἔταν παχέα καὶ μέλαινα ἀπὸ σταξίς, ταύτας οὐδὲν ὁλερωτάτας ἐν ῥίσις. Id est: Cum autem omnes e nare stillationes sint periculosa, cum crassa, & nigra fuerint, has perniciosissimas reperiēs.

Venter

Venter colliquata, ἢ γὰρ τὰς αὐτῶν ξῆς habet graecus codex. Est autem σύντηξις colliquatio, consumptioq; nempe cum particulis quotidie aliquid decedit, nec alimentum recipiunt. Plinius libro vigesimo secundo, cap. vicesimo quinto hac voce vititur, Tali, inquit, sorbitionis genere emendantur syntexes, hunc syntectici eodem autore dicuntur. Licebit igitur interpretari hanc sententiam, venter Tabida, & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in ipsum confluente, emittit, partim vomitu, partim inferius.

Aloës partes duæ. Hac est descriptio pillularum communium: quæ in Nicolao illo prapósito viciosa & deprauata habetur. Nam is Catapotra. ponit aloës uncias duas, croci & myrrhæ utriusq; unciam vnā, in peste addendum consuluit, bolum armenum. Primum vetus scriptura croci non meminit, deinde thymiamatis ammoniaci, non boli armeni unciam præcipit. Id genus permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Theriacen ex viperis. Hoc etiam Galenus libro de Theriaca ad Pisonem confirmat in eum modum: τὸν αὐτὸν λόγον νομίζω καὶ τὴν διερετικὴν ὥσπερ τι καὶ αὐτὴν ἴσασιν ὡς καθάρσιον, τὰς μὲν πορπύρας αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ κατὰ κράτος, μὴ δὲ ὡς ἱερὴ ἀλίσκοιτο τῷ λυχνῷ. τὰς δὲ καὶ τὴν φθασαύρας παθεῖν βιάσθαι δύνασθαι, ἀλλίσσασθαι, καὶ ῥέπασθαι τὴν τοῦ ἀναπνεύειν & αἵματος πονηρίαν &c. Hoc est: Simili modo Theriacen, seu ipsa quoq; ignis quidā purgatorius existat, presumentes in pestifero aëris statu, ne utiquam malo corripi sinere nouimus. Corruptis autē mederi posse, aëris inspirati maliciam in alterando mutandoq;. In Galeni codice graeco, qui Basileæ nuper impressus est perperam legitur ἀναπνεύειν αἷμα &c. Quasi dicas: Aëris reformati, positum est pro ἀναπνεύειν &c. Quod est, inspirati. Nam qui corrupti peste sunt, malum aërem attraxerūt respiratu, non reformatū aut refectū, aut quomodocunq; dicere libeat.

Codex graecus vicius.

IN XXXVII. CAPVT.

Nonnulli febricitare. Galenus lib. 12. omnia hac ad verbum habet. Variat autem nonnihil lectio graecorum codicum. Gale ni habet ἐν ὄγκῳ τὴν μέσσην τοῦ κατὰ φύσιν ὅλον τὸ σῶμα &c. καὶ ἡ χρεὶα τοῖς μὲν &c. Hoc est: Et totum corpus vastiore mole quam pro natura modo cernitur, & color &c. Pauli τὸ σῶμα τὸ γὰρ τὸ, quod est, os ventriculi vastiore mole cernitur. Mea sententia cum Galeno legendum esse censeo. Nota codicū varietatem.

Vt pote quos. Apud Paulum impressum est εἰ δὲ καὶ χρεὶς τὸ τῶν, pro ἄγε καὶ &c. Sic etiam Galeni exemplaria omnia habent. Corrigere graeca. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut purgationem non su-

Ad

stineant. Signat igitur hoc loco si quidem, dictio *ἀντι*. Praterijt Oroscius, castigatior Basiliensis neglexit.

Sin autem robore mediocri. Galenus si autem pulsus mediocri robore sit, & magnitudine paulum ad egrotantem refert, cuius tamen vires ex pulsu cognoscuntur.

Ergo si astas. Galenus non habet, *ἡγεῖ δὲ τοῦτος*, quod ego interpretatus sum, calidi temperamenti. Nō enim referri potest ad *δὲ* &, ut Grammatista putat.

Balneum his aduersissimum. Galenus addit, & aer ambiens vel nimium calidus, vel frigidus.

IN XXXVIII. CAPVT.

Quitenuium humorum. Ex eodem loco Galeni, & 6. libro Oribasij transcripsit. Dicit aut paulatim & continue alendos huiusmodi humoribus laborantes: praterea fructus, quos *ὀπώγας* graeci nominant, exhibendos. Supra verti poma, quod nihil refert. Nā fugaces seu horarios, seu tempestuos, *ὀπώγας* graeci appellant. Hoc re-
 Historia. medium olim Lutetiae in quodā adolescente continua febris laborante sum expertus salutare. Nam quoties ille vel aluum deicere, vel urinam reddere extra lectum volebat, aut etiam quoties pedibus tantillum consistere, aut in sella, quousq; ei lectulus sterneretur sedere, in sincopen solebat incidere: ac videntes hoc aliquot medici, de salute minus sperare coeperunt. Ego videns iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine praeditum, cogitavi illi quoquo modo virium dissipationem impedire: ac statim quum è lecto in sedem esset collocatus, porrexi ei urinam recentem nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua assumpta, paulatim per dimidiam horam seruavi hominem extra lectum citra animi defectionem, quod feliciter successisse animaduertens, sequenti die idem facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad unam usq; horam sine vllō incommodo ut prius seruavi. Factumq; est tandem diebus insecutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te velui celare lector. IN XXXIX. CAPVT.

Reliquae occasionēs. Ex eodem Galeni loco sumpta haec sunt ad verbum. Enumerat autem Paulus syncopae causas, dolorem vehementem, siue ex intemperie, siue humoribus, siue virisq; vel etiā ex continui diuortio ortum, vigilias nocte dieq; affligentes nam somno mediocri vires recreantur, immodica inania aut per ventrem, aut vomitu, aut sudoribus, aut urina, aut sanguinis profusio. Ac in ijs qui aliena loquuntur, hoc est, qui mente non constant, qui delirant, desipiuntq; Nam *παράπαισις* verbum signat *παράφρονισμα*,
 ἀλλὰ

ἀλλοφάσαι, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculiar- ἀλλοφάσαι
res, nequeat edere. In ijs si motus quandoq; corporis fiat, vires collabi
necesse est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen vitandam, singu-
lare est praesidium, temperamenti custodia. Ante omnia vero trium
principiorum: mox reliquarum partium, quaecunq; illa in consortium
affectus principia secum ex facili trahunt.

IN XL. CAPVT.

ITaque dolor. Hac magna ex parte Galenus in secundo de lo-
cis affectis habet. Reliqua in duodecimo Methodi medendi.

Dolor stupidus. Graece est ἡ μὲν νερνώδης ὀδύνη διὰ ψυχρὰν γί- νερνώδης.
νται διάθειν. Quod interpretatus sum ad verbum in Paulo. Ga- ὀδύνη.
lenus libro iam citato ait. καὶ τοίνυν τὸ νερνώδὲ ἀλγος διάθειν
ἔργασται ψυχρὰν τε, ἀμὲν ἡδὲ ὀδυνηρὰν, quod est. Itaq; stupidus do-
lor affectionem frigidam simul & dolorificam parit. Aduerte le-
clor, Paulus hic dolorem ut affectum, Galenus ut affectus causam
interpretatur. Verum sequentia in oratione Galeni eos conciliant.
Nam stupor, inquit, frigiditas quaedam est non exigua, eoq; membris
hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus
dolor, non indicat doloris speciem, verum dolorem simul & vel affe-
ctionem frigidam, vel difficultatem sensus, motusq; ab ea particula
obortā. Caterū non solū in neruis, sed alijs omnibus partibus accidit.

Pulsatilis autem dolor. Graece dicitur σφυγμώδης, & σφυμα-
τώδης τὸν σ, quasi interpreteris, pulsorius, & pulsatilis labor, vel πόνος σφυ-
dolor: insignium inflammationum proprius, arteriarum quidem sem-
per, primario affectu, aliorum vero corporum sensilium omnium, con-
sortiū lege. Caterum vocem graca τὸν σ Galenus sit exponit: ὁ γὰρ
τοῖς τὸν σ αἰσθησις ἔστιν ἀνίαρὰ, καθάπερ ἡ ἰδὼν ἡ προσωπὴ αἰσθη-
σις. Hoc est: Siquidem dolor, sensus est molestus, sicut voluptas est
sensus suauis, quod Cicero eleganter dixit. Omne id quo gaudemus,
voluptas est, quo offendimur, dolor.

Sin autem tanquam à palo. Colicorum dolor est, qui in imo vē- Colicus do-
tris ea potissimum parte vrget, qua vrinarij meatus ex renibus ad
vesicam exporriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à ne-
phritide potest.

Pūctorius autē. Galen. habet: ἀγξίμυθ' ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς νυγματώ- Pūctorius.
δὲς ὀνομαζόμενον, συνιστάμενον πρὸς τὰς ὑμῖνας μάλιστα. εἶον ῥίψης
τὸ πάθος καθὰ τὸ νύττεσθαι δυνάμειν ἔργασίμενος ἐκίσχυόμενος δ' ἐπὶ
πλείον ἐν λύκῳ ἐπὶ τῷ τοῦ ὀδύνης. Hoc est, ut Copus noster vertit:
Igitur iterū incipiamus à pūctorio vocato dolore, ac videtur quidem
veluti ipsius affectus inter pungendam circa membranas potissimū.

verum dolor circa locum punctum ad magnum spacium extenditur. Nos autem, pace illius dictum sit, in hunc modum vertendum putamus. Incipiemus itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa membranas potissimum constituto, cuius affectus veluti radix in eo quod pun-
gi videtur defixa est, dolor autem longius orbiculatim ad id extendi-
tur &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat, acri humore
membranam costas succingentem pungente.

Pertundens.

Pertundens, vehemensissimis. Hic dolor græcis dicitur διαίρων, quod idem est, ac si dicas διορμῶν, id est, cum impetu perrumpens. Cop-
pus vertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalæa,
caluaria ipsa perrumpi, pertundi ve dolētibus videtur. Id autē tūc acci-
dit, quando veluti à radice incipiens, ad vicina transit, vt ait Gale.

**Viciatum
exemplar.**

Membrana quidem. In græco codice deest μὴ particula. Le-
gendum enim ὁ μὴ τὸ τῷ διαμαῖ, vt respondeat sequenti, ὁ δὲ,
quod omnes nostri Aristarchi nō aduerterunt. Nec impressum exe-
plar à Gemusæo castigatum habet. Caterum membrana cuti subie-
cta quæ sit, audi. Continetur ea cute & corporibus subiectis per fibra
rum tela modo subtilium traductus: quam vena cutem nutriendes &
nerui sensum communicantes permeant.

**Viciosus co-
dex.**

Diuellentes cruciatus. Impressa omnia exemplaria habent διορ
διασπῶμενς pro διασπῶμενός: quanquam Orosius hoc & casti-
gator Basiliensis non annotarint.

Profundi sunt. Hoc est in alto delitescentes, vnde quibusdam
ἐσθῆκοι quasi osium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia. Ex 12. Methodi medendi Gale-
ni, & 6. Oribasij sequentia sunt transcripta.

Auxiliantes. Miror cur Gemusæus hunc locum deprauatum re-
liquerit in suo codice, cum plane ad sensum nihil faciat dictio προσ-
παρῶν, lege igitur προσβοήθοντες ex Galeno, vt nos etiam antea
vertimus.

**Castigatur
græci codicis
lectio.**

ἡλαυνῶν.

ἡλαυνῶν.

πυρίαις.

πυρίαις.

πυρίαις.

διμασμά.

Irrorationibus. Hoc est, asperisionibus. Nam ἡλαυνῶν est ἡλαυνῶν
θλαῖν, quod signat superfundere. Linacer vertit ἡλαυνῶντες ἢ πυ-
ρίαις, humidis & siccis fomentis. Quanquam non parum diuer-
sa nomina sint, variâsq; res significant. Nam ἡλαυνῶν is est asper-
sio irroratioq; vt Celsi more loquar, ex oleo potissimum ad rem propositam
idoneo facta, veluti cū multa pituita in ore ventriculi heret, oleum
in quo absinthium ebullierit, id superfundimus πυρίαις quæ & πυ-
ρίαις, & πυρίαις, & διμασμά græcis dicitur, triplex est. Nēpe hu-
mida, sicca, & mixta, si Hippocrati & Galeno credimus. Humidū
fomentum, spongia mollis magna; ex aqua calida expressa, applica-
taq;.

taq̃. Huius generis est aqua calida, aut oleum in vtriculos, aut va-
sa area, fictiliaq̃; aut in vesicam coiecta, partiq̃; dolenti admota. Sic-
cum fomentū est, miliū, sal, harena in sacculos coiecta, aut solū lin-
thrū. Itē lateres & titiones pāniculis inuoluti, & sic circumdati. Pa-
ce cuiusdā docti viri dixerim apud Celsum li. 2. nō esse viciū scriptu-
ra in dictione, titionibus. Nā tertio eandē repetit, fomentisq̃; inquit, &
protinus validioribus totū corpus circumdare cōuenit, maximeq̃; inuo-
lutis extinxis testis & titionibus. Mixtum fomentum est, hordeum,
eruumq̃; prius cōiūsa, aceto & aqua macerata, vel etiā farina simili
modo preparata, & in sacculis apposita. Caterum humida fomenta
conueniunt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca ūs,
quae ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassus, visco-
sisq̃; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq̃; expediunt.

Sin moles. Quidam parum versati in medicina vertunt dictio-
nem ὄγκου in græco codice positam, tumorem, nullo plane sensu, quan-
quam id quoq̃; hac voce significetur. Voco autem hoc in loco molem,
corpus, quod ab externo supercecidit: quod vel durum, vel magnum,
vel graue, vel simul ambo fuit. In fine capitis male legitur in codice
impresso ἔνθε pro ἔνθε.

IN XLI. CAPVT.

QUum per ventrem. De hoc accidenti Oribasius li. 6. eadem
tradit. Caterum syntexin, seu vt latine dicam, colliquationē
corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcore quem μα-
ρασμὸς græci nominant, videre est, aut etiam in hectica marasmode.

Ex fonte. Huius loci castigationem Oroscius exemplari suo de-
bet, & Oribasio. Nam omnia exemplaria quæ mihi videre contigit,
habent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πηγῆς, quanquam aqua ex terra intelligi
possit, aqua ex fonte. Hoc præteryt etiam Gemusæus.

Castigatus
codex græ-
cus.

IN XLII. CAPVT.

Nonnunquam palpebras aperire. Hoc Galenus confirmat
lib. 1. de febribus: ὅ μιν inquit, ὁ ἀνακείνους ἐπιπλεονέχοντες
τε εἰς τὰ βλέφαρα, παραπλησίως τοῖς νησάσασιν ἀνιδιανέμενοι, καὶ
μύητοι μύουσιν ὡς τὰ πολλὰ, λευκά πρὸς ὑπνώειν. ὅτι δ' ὁ ὕπνος
αὐτῶν τὸ πάθος, ἀλλ' ἐγρηγόρεως ἀδυναμία. Hoc est: Nec vero
palpebras diutius attollere possunt, similiter nictantibus perpetuo af-
fecti. Quinetiam plerunq̃; conuiuent oculis, veluti dormitantes. At
affectus ipsorum somnus non est, verum vigilandi impotentia &c.
Hæc quidem de hectica Galenus pronunciauit: nos autem de cuni
febri, in qua vigiliæ vrgeant.

Si conuiueant. Male in græco codice ἢ μύσαι, quod est vel con-

Restitue ex
plar.

niuerere, legitur pro εὐρύστατον, quod etiam Oroscius annotauit: Basilienfis autem corrector neglexit.

Cibus quodāmodo sit magis accuratus. Ita reddi dictionē græcā *πειρίτρετον*. Nam verbum *πειρίτρετον* in bonā partē acceptum est, quod accurare. Id signat ex cura & cōsilio aliquid gerere. Aliquādo in malā partē sumitur, pro eo quod est *περίτρετον τὰ πειρίτρετα*. Galenus alibi *διὰ τὴν ἀνερίαν* in eodē significatu protulit, hoc est vīctū ac curato, exquisitōq; non de tenui intelligens, sed ex defectu sumpto.

Linctus ex papaueris. Hanc compositionem etiam hodie officinæ vocant diacodyon. Dixit autem Paulus ex sapa, quia duplici modo fieri solet, scilicet ex sapa, & ex melle. Quæ sapa recipit ad somnum conciliandum utilis est. Quæ vero mel, ad spūti reiectionem.

In quibus autem caput. Contrario supradictis modo affectos recenset. Nam illi ob tuſſim ex defluxu capitis pulmones infestantem dormire nō possunt, eōq; diacodyon ex sapa assument, quod tenuis humores incrasset. Hi autē quibus caput defluxionibus obnoxium non est, suffitu inuabūtur. In sequenti sententiā pro *παράχμας*, legitur *παράχμας*. Itē pro *λι*, quod signat librā pone 7, quod notat drachmam.

Arnabo. Recentiores quidam modo carnabum, modo carnabadium, alij *ζαρναβιον*, & *ζαρναβιον*. Odoramentis expetitur. Vide Paulum in septimo. Sunt qui Doronicum in officinis appellatum esse pronuncient. Non salicis folia, id esse putes, ut quidam grammatista hesitabundus exponit. IN XLIII. CAPVT.

λυταφορὰ. Soporis noxi. Ita sum interpretatus dictionem *λυταφορὰ*, quam si penitus introspicias, & ex etymo interpretari libeat, impetus somni vehementioris merito dicitur, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas, ut Celsi more loquar. Dixi autem, noxi, quia *γαλακτικός* sopor etiam bonus est. Lactis modo tepenti. Tantiū valet *γαλακτικός*, quasi dicas, lactosus. Galenus multis in locis hac voce utitur pro tepido. Non autem pro eo, cui lac sit admixtum. Si vero morbus. In codice græco deest particula *ἀ*, ac legendum est *ἐπιμενόμενος ἀπὸ γάλακτος*. Noua enim sententiā incipit, quod miror Oroscium & Basiliensem correctorem voluisse præterire, cū alibi etiā minora à me prætermiſſa ceu capitalia clamiēt. IN XLIII. CAPVT.

Nonnullis etiam cum igneus sensus, Hoc est, cum comburi videntur nimio calore febris, pulicaris herba, quam græci *ψyllium* nominant, conducit.

Permulceri q; Græce est *διὰ ψιλάφην*, à *διὰ ψιλάφην*, quod Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo veteri permulceatur, &c. hic autē manibus tantū permulceri debet, somni cōciliandi gratia.

IN

IN XLV. CAPVT.

EX absinthio. Hoc est, vt Galenus ait, in quo absinthij coma sit feruesfacta. Siue autem oleum, siue vnguentum, dicas, nihil refert. Quanquam Orosius olea in quæ etiam aromata coniecta Olei vox sunt, vnguenta dici nolit. contra veterum sententiam.

Nardino. In græco codice est νάρδα, quod signat nardo: eadem ni νάρδα. mirū locutione qua vsus est Celsus, & Scribonius Largus aliq; veteres. Celsus lib. 3. vngi rosa debet, pro rosaceo. Vt in cōpositione 210. apud Largū. Idem rosa dilutum explet concava vulnera. pro rosaceo dilutum. Sin autem inflammatorium quiddam. Codex græ. Emendato
cus habet φλεγματώδες τὸ πρὸ φλεγματώδους τι, quod omnes cāsti
codicem græ.
gatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt. cum.

IN XLVI. CAPVT.

Rigori Medici hodie dictione rigoris vtuntur pro græca ῥίγῃ. quanquam non ita latine Celsus Hippocratis sententiam aliquando vertens pro ῥίγῃ horrorem reddit. Verum nos ῥίγῃ horrorem vocamus. Inop: a itaq; lingua, ῥίγῃ febrim, quasi ad verbum, rigorem interpretamur.

Concertationē naturæ. In græco codice est: δὴ ἐκλύειν τὸ ἀγῶ. ἀγῶν: va. Quod Paulus ἀγῶνα dixit, ego concertationem naturæ exposui. Nam in crisi natura certat cum morbo. Si eo sit superior, bona crisis est: si morbus vicerit, mala. Quamobrem si natura se accingit ad ea quæ offendant, expellenda, vt in rigore accidit, meliendum nihil est. Dixi igitur concertationem naturæ dissoluere, vel certamen vel pugnam quam cum morbo habet. Natura quidem in græco non est, sed sententiæ clarioris gratia addidi.

IN XLVII. CAPVT.

Adiutareq; calfactu. Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism erumpens, etiam adiuari debeat, nempe fori medicri, quiete, calido clystere, adeoque in quiete manere egros vult, vt sudorem non abstergant.

Recreate. Græce est ἀναψύχῃ, quod verbum duo significat, re. ἀναψύχῃ: frigerare, & recreare, s. u. reficere. Hesychius grammaticus dicit idē esse quod ῥιπίζῃ, euenilare, & ἀναψύχῃ interpretatur παρὰ θυμῷ, hoc est solatium. Congruit magis id hoc in loco, nempe vires sudorum copia lassas, oppressasq; recreare.

Tenui velamine. περιβόλαιον λεπτὸν in græco codice est. Celsus περιβόλαιον ait: Veste leui, madida, interpretatus sum ἐμβριμνῶν ab ἐμβριχῶ quod est irrigo, madefacio.

Ambæ liquidem. Ad calcem & floces vini referuntur. In

græco neutrum genus est. ἄμφω ἀναβαλλόμενα. ambo ad fouendum applicata, genuino corporis tepore siccantur: sicca ita meatus per quos sudores erumpunt, obstruuntur.

Qui per validam expressionem. Græce est, λυτ' ἐκθλίψιν, quæ fit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus vehementissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicuntur fieri per expressionem, validam addidi, significantiæ gratia: Quidam pro ἐκθλίψιν, legunt ἐλλείψιν, quod est animi defectum, quod non male etiam hic quadrare potest. Eruditi indicent.

IN XLVIII. CAPVT.

ὑπερλωττία

HYPoglotitia. Formule quedam medicamentorum sunt, quæ in tussi, thoracis arteriaq; vicijis assumuntur. Hodie bechicas officina, & penidias appellant. Fiunt autem potissimum ex radice dulci, tragacantho, terebinthina, Zaccaro, alijsq; ad rem propositam congruis. Caterum Galenus vocat ὑπογλωττίδας.

Lana sulphure imbuta. Græce est ἐλαίῳ τε θεικμυρῶν, ad verbum sonat: Lana sulphurata. Oroscius corripienti studio potius quàm veritatis, vertendum clamat sulphure suffita. Quomodo autem lanæ suffiantur, nusquam me legisse fateor, homines suffiri sulphure in tussi lego. Lanam autē ut pice, aut alio pingui, ita sulphure imhui. Imbutas sic applicari. Nam suffitus parū in lana proficit.

Pingue. Græcus codex habet ἡγεῖν ἢ λιπὼς, pro ἢ λιπὼς, accipimus pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunque re pingui.

Permulceri. Hoc est, molliter contrectare, supra interpretatus sum διαψιλάειν permulcere, ex Celsi more.

IN XLIX. CAPVT.

STERNutamenta. Vide sextū Oribasij, quomodo autem fiant: Galienus tertio de symptomatum causis explicat. Hic autē Paulus remedia persequitur sternutationis, quæ in febribus molesta esse solet.

ἀάγων.

λεονίων.

Corrige græcum
cum codice.

Ilum intentio. Græci λαγῶνα & λεονῶνα eam partem esse volunt, quæ latinis dicitur, Ilia. Quidam vero male ὑποχόνδρια vertunt Ilia, in bonis autoribus parum versati. In codice impresso est ἐνταῖς lege ἐνταῖς. Neglexerunt Aristarchi.

Castigato
codicem.

Summarum partium. Hic Oroscius debet exemplari suo. Nam omnia quæ mihi videre contigit habent, τῶν ἀνθρώπων μέρων, quod est, summorum, muscutorum pro τῶν ἀνθρώπων μέρων.

Mollis contrectatio. Quod ante dixi permulcere, hoc molliter contrectare interpretor Nam idem esse puto. Græca vox est διαψιλάειν.

Spongia ex mari vacua. Quidam in codice græco legunt pro λενοί, quod est vacua, λενοί, hoc est, recentes. Et trunque instituto co-

menit.

uenit: quam tu malis lectionem sequere.

IN I. CAPVT.

Vel attemperatos. Cibi fastidium aliàs ex humore pituitoso, aliàs ex bilioso nasci solet. Si pituita in stomacho redūdat, vomitu educenda est. si bilis supernatat, deorsum euocanda. Vbi vero totū corpus purgare vales aliter faciendū docet Hippocrates. Quod si in primis venis crudi humores, semicoctiq; habeantur, disseccandi, cōcoquendiq; quod Hippocrates πεπασμὸν, quasi mutationem. Huius autē πεπασμὸς. Nota. seculi medici perperam digestionē appellant. Si in extremis venis corporis habitu sunt infixi, relaxandi vniūt. At biliosi humores, & melancholici, qui vltra sanguinis terminum processerunt, caloris violentia expelli prorsus debent: Si in stomacho nausēā excitēt per inferiora: si in toto corpore biliosi, quod estate potissimum accidit, vomitu purgari debēt: melancholicus aut infra semper. Porro cū iā educūtur, necesse est eos infrenare, coercereq; ne transitu partes afficiant. Itē meliores hoc agendo in locum restituere. Quā rationē, seu potius, vt Galenus ait, cacochymiae curationē greci ἐπιπρασιμὸν nomināt. Verba Galeni nono Methodi in hunc modū habent: χρὴ γὰρ διανοῶντι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐναρτώσεως τῶν ἐνδείξεων κατὰ βραχὺ μὴ ἐκκινῶν τὸ μοχθηρὸν, κατὰ βραχὺ δ' αὐτ' αὐτὸ τὸ χρηστὸν ἐνισθῆναι. καλεῖται δ' ἐπιπρασιμὸς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἢ τοιαύτη θράσεια τ' ἡλικνοχυμίας. Paulus igitur recte etiā dixit: ἢ τοι ἀπαρρῦψαι ἐκκινῶν, ἢ ἐπιπράσσειν τα, βελτίως ὀφείσεται. Quod est: Vel abstergendo excernunt, vel attemperando, coercendo, mitigando furorē illorum, obtundendoq; meliores in locum restituēt. Hippocrates libro de ratione victus in morbis acutis materiā eorum quae attemperare possunt, commemorat. Galenus autem eius interpres paulo apertius in hūc modum differit: de torminibus orationē instituens: σκοπὸς ὃ ἐστὶν αὐτοῖς, τὸ μὲν τοι καθάρσαι ἀπὸ ἡλικνοχυμίας, τὸ δ' ὑδινεράσαι, τὸ δ' ὑδιξηράναι, τὸ δ' ἐμψύσαι. τὸ μὲν γὰρ τὸ ὄνειρον, καθαίρει δύνανται, καὶ ἐπιπράσσειν, τὸ δ' ἐμψύσαι τὸ σπέρμα ξηραίνειν καὶ ψύχειν, τὰ δ' ἐν τῶν πυρῶν ἀλφειτα, τὸ ὑδινεράσαι καὶ καλῶς δ' αὐτοῖς ἀναμίμνηται καὶ τὰ λιπιδίνα, ξηραίνειν καὶ τε καὶ ψύχειν. οἱ δὲ Αἰγυπῖοι λιναμοι μεδίως ψύχει δύνανται. τὰ δ' ὡς καὶ ἡ σιμιθάλαι, καὶ ὁ κόκκος παχύχυμα καὶ ἰσχυμα, καὶ ὑδινηράσαι. Hoc est: Eo ipsi spectant, vt viciosum humorem partim purgēt, partim attemperent, partim desiccant, partim refrigerent. Lac itaque asinum purgare potest, & attemperare. Lini vero semē siccare, & refrigerare. Triticea polenta, attemperandi facultatē obtinet. Recte ipsis & ordeacea admixta est, quae & siccāt, & refrigerat. Aegyptiæ autem fabæ, mediocriter refrigerare potest. Oua similago, &

Αα 5

chondrus crassi bonique succi, & attēperatoria existunt &c. Vides igitur, quomodo Galenus utatur dictionibus ἐπιπράσαι, & ἐπιπράσσειν. Item ἐπιπράσσειν, & ἐπιπράσσειν. Galenus duodecimo methodi de vinis suis agēs scribit ἐπιπράσσειν δ' ἐστὶν ἡ δυνάμις, quod postea interpretatur πρῶτον δὲ μάλλον, καὶ λιγνοχυμίων ἐπ' αὐτῷ δύνει. Hoc est: Nutriunt magis, & prauitatem humoris corrigunt, emendantque. Linacer superiore sententiā nescio quo modo exponit, certe dictionis vim ignorasse videtur. Nā quid sibi vult, praterea mistibilia sunt, & nutriencia? Dicere enim oportebat, attēperatoria autē sunt (intellige malorum humorum, bonos in locum reponendo, & qui nondum longius terminos concoctionis excesserunt, reducendo, acrimoniam ipsorum obviando.) Ne autē putes bilem absolutā, aut flavā, aut nigram meliorem reddi posse: imo nec salsam pituitā: eoquē nemo doctus medicus hos humores alterandos, concoquendosque, vel ut barbari dicunt, digerendos dixerit. Sed purgandos potius, meatibus per quos transibunt, ad apertis, medicamentis in id efficacibus. Ne autē acrimonia sua & rosione infestent, ut in torminibus docuit Hippocrates, cibi & potus ἐπιπράσσειν assumuntur, quibus potes etiam syropos quosdā mitigatorios annumerare. Ceterū male in codicibus graeci ἀπορρίψαντα, quod est, proijcientes, pro ἀπορρίψαντα, quod signat abstergentes. Præterierunt id Oroscius, Gemusius & alij. Potissima vero polenta. Codices graeci omnes male congruam habent lectionē hanc, περατίον ἀναμίξαι τὸν ὄρεξιν, μάστιγα δὲ ἀλείψαν, pro μάστιγα δὲ ἀλείψαν, aut μάστιγα δὲ διαλείψαν. Nō tamē ab iis multū. Hic quoque deprauatus est codex graecus. Habet enim μὴ τὸν ὄρεξιν μίαν τοι τοῖς τῶν πυρετῶν χροίαις, pro μὴ τὸν ὄρεξιν μίαν τοι τῶν πυρετῶν χροίαις.

IN LI. CAPVT.

SI vero in grandē famē. Apud graecos vna dictio grādē famē signat cōposita ex βῆς & λιμὸς. Quicquid enim grādē illi voluit significare in vna dictione, per ἱππ & et βῆς, quod est apud nos si verbum ex verbo interpreteris, equus & bos, explicat, ut ἱπποειδὺς, βελίμ &c. Ceterū eadē fere habes remedia bulimi apud Gal. lib. 8. de cōpositione medicamentorum secundū locos. In sequentibus verti ἐξύτληας pro seuitia furore, ad verbum sonat acumine.

IN LI. CAPVT.

QVoniam igitur à pituita. Galenus de symptomatum causis libro primo scriptum habet. Canina appetentia fit, cum vel ob acidi humoris vicium ventriculus infestatur, vel ubi totum corpus immodice digestum dissipatumque, continua nutritione indiget &c. Ceterum in Aphorismorum libri secundi commentario, cap. 20. rationem hanc ad verbum persequitur.

Aduerte.

Caligato
exemplar
græcum.
Restitue
exemplar.
Emendato
græca.

Incident, abstergeantq̃. Superius & hic male in codice Gra- Aduerte.
 το ῥίπτισιν, pro ῥύπτισιν habetur, vnius literae mutatione: quod ceu
 nullius momēti castigatores Pauli neglexerūt. Quāquā ad sensus pu-
 ritatē non parū faciat. Quippe diuersi sunt, proijcere, & abstergere.

Pinguia. Galenus adiit, ἢ ὡς ἀνὰ πηκτισ, ἐλαυώδη τῶν ἐδεσμά-
 των, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

IN LIIL. CAPVT.

Particularum per quas. Hæ sunt, stomachus, os ventriculi,
 ipse ventriculus. Galenus commentario quarto in opus de ratio-
 ne vietus in morbis acutis, partes commemorat, quæ aliquando sitim
 procreare soleant. Idq̃ in hunc modum: πέντε μέρη πρῶτον ἡγεῖ μά-
 λις τὸ στόμα καὶ γαστήρ. ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ. καὶ μετὰ ταύτῃ τὸ στό-
 μαχος, ἅτα πνεύμων, ἅτα νῆσις.

Prauas autem potiones. Codex Græcus deprauatus est. Ha- Emendatur
 bet enim μοχθηρῶν δ' ἐπιθυμῶσι ποσιτύτων. Hoc est, prauas autem codex.
 appetunt qualitates, pro ποσιτύτων, quod est, potiones. Orosius cum
 alijs Aristarchis negligenter hoc præterijt.

Cæterum siti pressos. Hæc apud Gal. lib. i. de symptomatum
 causis inuenies. Habet autem ille paulo ampliora in istum modum:
 ἀπαύστοι δὲ δίψαι καὶ χαλεπὴν ὄψιν, ὅθεν πρὸς ἡγεῖ ἀποθανόντας οἰ-
 δα, τούτῃ καταφαγόντας τὴν ἐχιδνα (ἢν δ' ἄρα δίψας) καὶ τοὺς ἐν τῇ
 δίνου πίνοντας ἐν περιτάσειως διεστῆς, ἐν ᾧ τοῖς τὸν τὴν θέρειον ἐν πα-
 τεθνήκει, καὶ τὸν ὅθεν πάλαι μὲν δίναν, καὶ τὸν ἀποκαρῆσαι
 ἀποθνήσκοντες, καὶ τὰς ἐν τῇ πλοῖον ἐπιπλέοντες τὸ ὕδατος ὅν
 ἔσσι τὸ δαδάσθαι ἐτέλμεν αὐτὶ πῶν ἀμφοτέρων διψῶντες τῇ
 ἄλλων, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπαχθῆναι τὴν γαστέρα, καὶ ἀνελθῆναι
 σφοδρῶς ἐξ ὑπὸ τοῦ καὶ τὰς λείπας ἀπέθανον, &c. Vide igitur an
 ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam velis castigare. Ego sa-
 ne, saluo aliorum iudicio, legerem δίψαι δ' ἀπαύστοι καὶ χαλεπὴν ὄ-
 ψιν, ὅθεν πρὸς καὶ ἀποθανόντας οἰδα τοῦτε φαγόντας ἐχιδνας διψῶ-
 δας, καὶ τὰς δίναν πάλαι μὲν δίναν, καὶ τὰς ἐν τῇ, &c.

Rosaceo cum impetu salientis modo. Græce est μετὰ ῥευσ-
 μις γινώμενη, hoc est: Cum crunisimo facta: à verbo ῥευννίσιν, quod ῥευννίσιν.
 est, cum impetu decidere. Gal. lib. 8. Methodi vtitur verbo καὶ χαλεπὴν ὄ-
 ψιν in hac sententiā: καὶ δ' ὑγρὸν αἶμα τὸ προσφερόμενον, ὅθεν ἡ καὶ χαλεπὴν ὄ-
 ψιν βάλλοντες, καὶ οἷον καὶ χαλεπὴν ὄψιν, id est: Sin autē id quod adfertur,
 liquidum fuerit, ex alio loco deicientis, & in salientis modū fun-
 dentes. Ibidem vsurpat dictionē ῥευννός. ἐτι δὲ μάλλον εἰ ῥευννός ὅ-
 δα τὸ ψυχρὸν καὶ ἀπαρτίτῃ τοῦ ἀγρίου ψυχρὸν τὸ ὑγρὸν. Hoc est: Præter-
 ea magis humore refrigerat, si desiliens aqua frigida vas illudat, &c.
 Cæterū superfundimus aliquādo liquores, ut in hoc symptomate, syn-

capiti sublata in altum manu, per mediocrem lanae hapsum.

Dilutum.

Iam dilutū. Sic vocamus humore in quo aliquid maduerit, aut maceratū per horas aliquot sit. Recētiore medici infusionē appellāt, ὡς ἀπὸ ῥευμα. infusionē rheubarbari, agarici, cotoneorū Graci ἀπὸ ῥευμα dicunt.

IN LIIII. CAPVT.

MElius autem facit myxion. Myxion vel myxa, vel myxion fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat. forte hodie officinis dicitur sebesten.

Salem indicum. Hic sal nimirum est saccharum quod nos candum appellamus, natura non arte, proueniens, quanquam hodie Venetys & alibi artificio naturam imitentur. Auicenna interpretatus hunc locum Pauli, saccharum tabarzet ponit.

IN LV. CAPVT.

Textus græcus vitiatus.

IMbibito. Similia apud Galenum lib. 7. medendi Methodi. Eadem vero apud Oribasium sexto. Sed perperam hic in Codice impresso legitur ἀναπίμπου, quod est sursum missū, pro ἀναπιπνύμενος quod valet imbibito ab ἀναπνέω, inde ἀναπιπνύω. Sic habet Galenus loco supra citato, ἐν ἑστῇ inquit, ὅτι αὐτὸς τὰς χιτῶνας, ὡς ἂν εἴποι τις, ἀναπιπνύμενος ἢ ἐμπιπλάσμενος. Hoc est. Nunquā vero in ipsas tunicas imbibitus, ut ita dicā, vel impactus.

IN LVIII. CAPVT.

Porro ubi concoctrix facultas. Ex hac sententia opinio quorundam de remedijs spinæ applicandis in ventriculi affectibus, satis refellitur, etsi euidentia ipsa quæ in confectionibus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna vino macerata. Non in dādi casu, legenda sententia est sed nominandi. Corrige igitur codicem græcum ita. ἢ μάννη ἐν οἴνῳ φυραθεῖσα.

Agathium. Pastillus est, qui retinendi suppressendiq; potestatem habet. Vide septimum.

IN LX. CAPVT.

Typhe.

TYphe. Specie filigini non dissimilis, simplici culmo, grano multiplici, tunica velato, atq; leuissimo, radice numerosa, largior eius in Asia prouentus regione, ut vult Galenus, quæ super Pergamum sita est. Hanc agricolæ, quod triticum in oppida conuehi solet, ad panificium vsurpant. Huiusmodi igitur arista, hoc est, spicæ apice narium foramina pungere interim præcipit Paulus, ut irritatus sanguis largius profluat.

FINIS LIBRI SECVNDI

COMMENTA-

RIORVM.

C O M M E N -
T A R I O R V M I N
P A U L V M A E G I N E -
T A M L I B E R T E R -
T I V S .

*

TERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particula convenientia remedia complectitur. Primum autem cuiusque morbi curandi Methodum artificiosam exponit, quæ ex causarum notitia, partis temperamento ægriq; natura, & alijs indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea veniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικὰ nominant. Quod Galenus lib. 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octavo Oribasij transcriptus est: admixtis interim remedijs quæ Paulus ipse usu comprobavit.

I N I . C A P V T .

Quemadmodum stitipium. Ex primo capite Galeni de compositione medicamentorum secundum locos ad verbum hæc sunt transcripta. Iam quartodecimo Methodi pene eadem habentur.

ἀσκήσω δὲ ἐν τῷ διαπνεομένῳ χυμῶν ἴσον ἰσὺ δόσιν ὅστις ἀρχὴς τε ἐνθέως, τὰς βίχας ἐγούνησι, καὶ τοῦ λέγου λαθ' ὑπόφυσιν ἀνέχου. τὸ δ' οὐκ ὅταν ἡτοιγ' ἀπόλλυται παντάπασι ἢ μοχθηρὸν γυννηθῇ, φθείρεται τὰς βίχας ἀναγκάσιον ὅτι. καὶ γὰρ οὐκ ἢ τὰ φυτὰ καὶ τὰ διττὴν αἰτίαν ἀπόλλυται, ποτὶ μὲν ἀπορροῖα δι' ἀφροσύνης ὑγρότη-
τος. ὅτι δὲ ὅτι ἐκ δικαίας χρώσεως. τιλίως μὲν ἀπολλυμένα τοῦ φέ-
φοντος

Pilorum ori-
go & nutri-
mentum.

φον] & χυμὸς τὰς ψυχὰς ἢ φελάκωσις γίνετῃ. μοχθηρὸς δ' ἀποτελε-
 δι] & αἱτ' ὀφιάσεις λελέμεθα, καὶ αἱ ἀλώπενες. Hoc est, ut tu
 diiores intelligant: Oñten sum vero est ex humoribus, qui per latentes
 meatus perspirant, limosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos
 producere, & reliquo sequenti tempore, veluti materiam suggerendo
 augere. Hoc igitur, cum vel in totum perit, vel prauum generatum
 fuerit, pilos corrumpi necesse est. Quandoquidem etiam stirpes dupli-
 ci ex causa pereunt, interim sanè humiditate quæ ipsas nutrit, desti-
 tuta, interim non propria vtentes. Vbi humor pilos nutriendus prorsus
 interijt, caluicium prouenit. Cum autem viciosus est redditus, & o-
 piasēs, & alopeciae excitantur, &c. Celsus hæc duo postrema vicia
 communi vocabulo *Areas* appellat, quod nimirum loca pilis vacua
 eos in capite representent. Orosius reprehendit hic me quod Celsum
 imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia & opiasī. Recte facit lite-
 rator, interpretandi muneris imperitus.

Nonnullæ vero alienis. Græce est ἀλλοφίσις ἑαυτῶν, quod ad
 verbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius dixit:
 ὑγρὸν ἀλλοφίσις τ' ἑαυτῶν φύσις, quod est: Humoribus alienis à
 sua ipsorum natura. Atq; ita nos reddidimus, potius iudicantes esse,
 dictionem sententiæ addere, quàm rem obscurare. Quemadmodum igitur
 quedam alimenta sunt homini, quedam sturno propria, ita herbe
 quoq; idoneum, familiaremq; naturæ suæ humorem quo alantur, at-
 trahunt, alienum respuunt.

Castigatur
 codex Græ-
 cus.

Inter se. Deprauatus codex est Græcus, tū Venetys, tum in Ger-
 mania impressus. Habet enim διαφέρεσα τῶν ἄλλων, pro διαφέρου-
 σα τῶν ἀλλήλων. Rursus hic Galenus aperitius dixit: ὀνόματα δ'
 ὁρμητικὰ διαφέρουσιν παρὰ τὸ σχῆμα. Hoc est: Nomina autē secun-
 dum figuram diuersa habentes.

Græcus mu-
 tilus instau-
 ratur.

Quoniam in Ophiasī. Codex Græcus hic mutilus est. Quid
 enim sibi vult ἐτι παραπλήσιον ὅτι τὸ βέλταμίνον φαίνεται μί-
 εον, nisi addatur in quo affectu. Addendum igitur necessario ex
 Galeno non nihil est, legendumq; in Paulo ἐτι λεῖα τὰς ὀφιάσεις
 παραπλήσιον, &c. Orosius & Gemusæus non animaduertentur,
 tam bonis alioquin ut ipsi gloriantur, exemplaribus vsi.

Orosius.

Deinde loco viciato. Hoc ubiq; obseruandū præcipit Galenus,
 ut semper totius corporis vacuatio præcedat, nisi admodum exiguus
 sit affectus. Dixi loco viciato auxilia inducemus, pro τοῖς τοπικοῖς
 ἀποθεραπεύομεν βοηθήμασι, quod est, localibus persanabimus re-
 medijs.

Si igitur color ad nigrius. Hoc est, si nigrior, albidiorve con-
 spiciat

piciatur. Nam quod Paulus εἰ μὴ ἐν τῷ μελάνθῳ ἢ λευκό-
 reon ἢ χροία παρὰ φαρμάκων dixit, Galenus in methodo in hunc mo-
 lum: εἰ μὴ γὰρ λευκότερα τοῦ λευκοῦ εἴναι, ἢ εἰ μελανότερα. Quod
 est, si albidior quàm pro naturæ habitu sit, & si nigrior.

Antidoto Hiera. Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descri-
 ptionem habes lib. septimo Pauli, Archigeni ascriptam. Scribonius Hiera diaco-
locynthidos.
 autem Largus eandem pene ad verbum habet. Officina vocat Hie-
 ram compositam Galeni: verum in multis adulteratam. Quæ vero
 ex aloë, & alijs sex rebus, nempe cinamomo, xylobalsamo, asaro, spi-
 ca nardi, croco, & chiamsitiche, constat, simplex dicitur. Et hæc in
 officinis, non parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane præter
 medicamenta quæ ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, pu-
 ta xiloaloe, & castiam, vnum supposititium carpobalsamum, loco
 xylobalsami. Deinde pondera etiam diuersa continet. Nam omnium
 partes æquales habet, Galeni autem hiera, aloës centū, aut cum præ-
 stantior fieri cupit, aloës drach. nonaginta, aut etiã octuaginta reci-
 pit, reliquorum vero sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tantū quinqs.

Catapotia ex aloë. Hæc recipiunt cucurbitæ syluestres, quam
 colocynthida vocant, partem vnā aloës, & scammonij singulorum
 partes duas. Galenus hic absinthij succi partem vnā admiscere so-
 lebat: antea quoq; mastichen chiam, & bdellium. rediguntur in gra-
 nula Ciceri similia. His fere respondent Pilula nostræ Cochleæ à Ra-
 si descriptæ.

Dein ad præsidia. Cum iam purum ex purgatione corpus fue-
 rit, humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti Methodus
curationis.
 debet: diligentia adhibita, ne adeo calida, acriq; admoneantur, vt
 cutis exulceretur. Ad hæc ne nimium sicent, prouidendum est, nam
 talibus non tantum viciatus, sed etiã utilis qui confluit, absuntur.
 Græce erat ἐν τῷ τοπικῷ χροίῳ ὡς ἀδὲ μελάνθῳ quod ad verbum so-
 nat, ad localem veniendum curationem, sed Latinius est vt redididi.

Primæ asperitatis. Locutio est Varronica pro asperissimo. Græce
 erat τὸ φυχύτατον.

Aliud experientia prob. Hoc medicamentum in Codice Ioan-
 nis Lascaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane coheret,
 ac peregrina plane videtur. Additum est
hic vt curio-
sis fiat satis.

Vnciæ octo. habebatur in Græco & pro ὧ sicut alia pleraq;
 absurda. Miror Orosium in tanta veterum exemplariorū copia hoc Orosius.
 non monuisse lectorem, cum tamen in sequenti medicamento adnotes
 legendum μὲν pro λευκός.

Euphorbiæ, thapsiæ, baccarum lauri. Male in Codice Gra-
 co ha

Viciata le- co habetur *λαφύριον* quod est laurim pro *λαφύριον*. ut Galenus ha-
tio Græca. bet. Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem me-
dicamento à Paulo ratione ponderum dissentit. Legit enim Euphor-
bii, thapsiæ, & baccarum lauri, singulorum drachmæ duæ, sulphuris
vivi, hierati singulorum drachmæ: ceræ drachmæ sex, &c. Neglexe-
runt Aristarchi.

Orosius, & Nasturcij. Impressus Codex tum Venetys, tum Basileæ habet
corrector Ba *λαφδάριον*. Sed Galenus & ipse sensus requirit *λαφδάριον* quod im-
pileæ. petigines & lepras discutit, eadem vi præditum qua sinapi. Nec hoc
Orosius, & à castigatōribus animaduersum.
Gemusæus.

Recinini aut veteris. Paulò ante etiam deest particula disiun-
ctiua in codice Græco. habet enim *λινύς παλαιός ἐλαιός*: cum le-
Orosius, & gendum sit ex Galeno *λινύς ἢ παλαιός ἐλαιός*. Nam si ricinum
Gemusæus. deest, etiam commune vetus oleum eadem præstare potest. Omiserunt
correctores.

Leporum ventriculi quinque. Ex Critone hæc sunt, citante
Gal. à Paulo Galeno. Verum scriptura illius à Paulo variat. Galeni codex ha-
variatur. bet *κοιλίας ἕξ* hoc est ventriculos sex. Paulus tantum habet *πέντε*.
Vide utrum malis sequi.

His adiciantur. Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in lo-
co. Nam habent. *πρὸς τοῖς λάμβανει τὸ σίτον, μυροῖνς, ἀνθα-
Castigatur codex Græ- μίνων, ἀκκνίας λαπῆς, &c.* Quid quæso hinc colligi possit? Legen-
aus. dum igitur cum Galeno censeo in eum modum: *πρὸς τοῖς λάμ-
βανει μυστῶν, μυροῖνς ἀνθαμίνων, ἀκκνίας λαπῆς, &c.* Pondere
nonnihil apud Galenum variant.

Quolibet oleo aromatis imbuto. Sic interpretatus sum ὃ
ἴδις ἢ δύσµατι. Celsus dixisset, quolibet vnguento. Nam Græca
ἴδυσµα. vox ἴδυσµα nihil aliud signat quàm vnguentum ex oleis succisve
preparatum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia acces-
serit. Non autem sum ignarus ἴδυσµα apud alios quosdam aliter
accipi, ut apud Plinium libro tertiodécimo, capite primo, ubi habet in
hunc modum: Ratio faciendi duplex, succus & corpus. Ille olei fere
τύµµατα. generibus constat, hoc odorum, hæc stymmata vocant, illa hedyismata,
&c. In qua oratione planè à Galeno, ceterisq; Græcis dissentit. Nam
olea ipsa quæ in vnguentis sumuntur, hedyismata videtur appellare:
stymmata vero aromata. At Galeno & Dioscoridi stymmata, alia
medicamenta aromatica, nempe quæ spissitudinem vnguento conci-
lient, appellantur, vnde etiam spissamenta possis nuncupare, alia ve-
ro hedyismata, nimirum quæ gratiam odoris & suauitatem eis impri-
mant. Vide Dioscoridē in vnguento cinamomino, & Nardino alijsq;
cum

cum paucis. Galenus voces Hippocraticas interpretans, hedyismata, inquit, pro ipsis aromatis apud Hippocratem accipi.

Anemonæ flos tritus. Oroscius hic in græco codice legendum Oroscius. censet, ἀνεμώνος τὸ ἐν τῷ μέλει φέψας μετ' ἐλαίου μυρσίνας, hoc est: Anemonæ interior pars nigra, cum oleo myrteo trita, ut habetur apud Archigenem, citante Galeno libro primo de compositione medicamentorum secundū locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc locum adfert, de medicamentis nigrefacientibus, ab Archigene comprehensum, cum paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis, de remedijs illos conseruantibus, unde Paulus hanc orationē ad verbum planē transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis: ἀνεμώνος τὸ ἀνθ' φέψας μετ' ἐλαίου, κατὰ χεῖρα. Iam flos ipse non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Stercus caprillum. Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillum σφύραθ' & teste Galeno libro decimo de simplici medicina, ubi habet σφύραθ' αἵμα μὲν ὄνυ χρώμετα ταῖς τῶν αἰγῶν λίπασιν, (σφύραθ' αἵμα ἰδίως ὀνομάζουσαι.) Quod est: Frequentissime igitur σφύραθ' &. caprarum stercoribus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Oroscius nouus interpres, aliorū autem, si dūs placet, corrector, filum Oroscius. caprillum exponit.

IN II. CAPVT.

ECinere lixiui. Paulus libro septimo lixiuium, quod græci λῶνιον appellant, cineris lotionem esse dicit: enumeratque eius differentias. Aliud enim ex cinere fici, caprifici, sarmentorum, & tuihy-mallorum confit, quod vim absterforiam maxime, siccantemque, & exedentem propemodum obtinet. Si calx admisceatur, vrentem, πρωτότακ' &. τὸς ἀκ' & dicitur, quasi primum lixiuium. Interim ex sola fit κ' &. calce. Iam quoddam ex sapone preparatur, unde σαπωνάειν λῶνιον nuncupatur. At nomen λῶνιος plura signat, nempe calcem ipsam, σαπωνάειν κ'. & lixiuium, cineremque. Solet autem alijs adiungi, quæ ipsum, quæ λῶνιον. dere intelligi debeat, interpretentur, utpote λῶνιον τὰ κ' &, pro lixiuiio λῶνιον τὰ κ' &. liquido, λῶνιον ἀκ' & &, pro calce viua accipitur, cum ἀκ' & & per κ' &. se calcem non extinctam signet, ut τίτακ' & ἀκ' & &. Porro cum λῶνιον ἀκ' & & ponitur, hoc est duo substantiua, alterū in nominatiuo, τ' &. alterum in genitiuo, lixiuium calcis intelligendum venit. Caterum apud latinos scriptores lixiuij vox alijs atq; alijs dictionibus iuncta, diuersa etiam significat. Primum apud Varronē, Columellā, Pliniū frequenter habetur Cineris lixiuia, cineris lixiuij, è cinere lixiuium, Lixiuuium è cinere. pro simplici lixiuiio. Deinde apud Largum, unde Galenus aliquot

cinere lixiua. In sequenti rursus: Cum cinere lixiui diutius terere. Paulo post in altera: Teruntur ex cinere lixiua qua vtuntur culinarij sicut apud Paulum Meginetam *λιγία πωλοποιητικὴν* pro lixiuio quo pilearij vtuntur. Legendum est in Codice graeco per simplex i non per η, vt quidam faciunt, putantes à *λίαν* quod est lutum, *πωλοποιητικὴν* *λιγίων* appellari, vt sit lixiuium quo figuli vtuntur: cum tamen nullum eius vt mihi videtur vsum habeant. Quare locus in sexto Methodi deprauatus Linacrum interpretem decepit: aliosq; non paucos eum citantes. Verba graeca sic habent. *μυδιὲν τῷ παρὰ χρομὶ φάρμακον ἔχον, ἥτις αὖτε ἡ *λιγία* τὰς *ἐκ* ἑαυτῆς ἐν γαστρὶ τῷ *λάμπτει* & *πωλοποιεῖν*.* In qua oratione *πωλοποιεῖν* legendum est. Galenus aliquando *λιγίων πωλοποιητικὴν*. Aliquando *ὕδωρ πωλοποιητικὴν* pro eadem re exponit: vt lib. sexto de compositione medicamentorum secundum genera in hunc modum, *ἄλλα ἢ διὰ τὰ ἀφρονέστατα ἔχοντα ὡς *λάγγει* & *λυγὸς λίφαν* & *τρυμνύουσι λίφαν* & *μάνυσι λίφαν* & *ἀφρονέουσι λίφαν* & *ἐλαίου ξύλων* & *ὕδωρ πωλοποιικὸν ξύλων* & *μίσου* & *ἀμύγδαβ. σιωπιδίου* κατὰ *φύσιν*.* Largus composit. 21. temporis iniuria nōnihil mutilus est. Verba ipsius haec sunt. Cerae pōdo libra, resinae terebinthinae pōdo libra, nitri rubri pōdo libra. Haec teruntur ex cinere lixiua, postea cū olei cyathis sex liquefiunt ad ignem: quibus adiicitur thuris pollinis se libra. Vides hic *ὕδωρ πωλοποιεῖν* nihil aliud esse quā cinerem lixiuum, aut lixiuium, aut quomodocunq; voles appellare. Atq; ita ego etiā antea sum interpretatus. Paulo post Galenus eodem in lib. τὰ *ξηρὰ διαλυέτω πωλοποιικὴν* hoc est arida dissoluuntur lixiua, vbi simpliciter *πωλοποιικὴν* dixit pro *λιγία πωλοποιικὴν*. Apud Plinium cineris vox simplex interim pro lixiuio vsurpatur: nempe ex Dioscoride vertit dictionem *λιγίων*.

Ruellius. Ruellius vir alioqui antiquae eruditionis etiam in postrema editione lib. 6. Dioscoridis *λιγίων πωλοποιητικὴν* vertit cum luto suo lixiuium, quā accommodatē iudicent alij, certe lutum nemo potui dabit, sed lixiuium, lacte in ventre coagulato. At Oroscius noster non tantum sensu inaccommodato, quod de me dicit, sed longe omnium absurdissime vertit, calcem qua in tectorijs dealbandiq; parietibus tectores vtuntur. Vide optime lector quā sit quibusdam maleferiatis hominibus innatum, alios reprehendere in ijs etiam quae ipsi non intelligant. Iam pondus viciatum in Codice graeco non aduertit.

Graecus codex deprauatus Oroscij, Aristarchus. Nam pro, & quod est drachmae quatuor, reponendum *ἔξ* hoc est sextarij quatuor. Idem itaq; est *λιγία πωλοποιητικὴν* *ὕδωρ πωλοποιητικὴν*, *ὕδωρ πωλοποιεῖν* & *τὰς *ἐκ* τῷ πωλωταρίμ*.

IN

IN III. CAPVT.

PORRIGO. Sic interpretatus est Celsus πυτυρία. Plinius etiā πυτυρία. Sulfures secundum græce dictionis etymologiam appellat: quem admodum interpret *Auicenna*. Vide *Galenum* libro primo de compositione medicamentorum secundum locos.

Resoluuntur. Græce est: ἔξιμ ἀπέτιξις, quasi dicas, esto particulā rū eliquatio, vel particula eliquantur. Celsus resoluuntur, quē imitatus sum. Nā quædā veluti squamula surgunt eaq; acuta, resoluuntur.

Creta sutoria. Sic interpretatur *Largus* μελαυσία, compositione 218, *Aluminis* inquiens rotundi, melanterius quæ creta sutoria dicitur, qua ligula calceorū denigrantur. Diuersum est ab atramento sutorio si *Dioscoridem* consulas, quanquam *Orosius* exponat atramentum sutorium. Melanteria.
 Orosius.

Cerusæ singulorū drachmæ. In græco codice habebatur το.ιβ. quod est *Vncia* duodecim. ego autem legendum censeo > ἰβ hoc est *Viciatus* co-
 drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet *Alexander*, & magis cōuenit. dex græcus.

Ex quibus sanies. Græce est: ἀφ' ὧν ἰχώρες ἀποτίνονται. Inter-
 pretes latini mirum in modum cruciantur, dum græcam vocem ἰχώρ explicare student. alij namq; imitantes *Plinium* ubiq; saniem interpretantur, alij serosos humores & acres, tenuēsq; quidam sanguinis cruorem. quidam vt *Celsus* ipsum sanguinem. *Aristoteles* ἰχώρ δέ, inquit, ἔστιν ἀπὸ τῶν αἱμάτων, hoc est *Ichor* autem est sanguis crudus.
 Ex hac tanta varietate, certi aliquid adferre conabimur, quod in authoribus exponendis tuto sequi possis. Itaq; ἰχώρες aquosæ, serosæq; & superflue sanguinis humiditates existunt nunc acres & calidæ, Calidæ.
 Frigidæ.

nunc pituitosæ & frigide. *Galenus* lib. 6. de sanitate tuenda ita scriptum reliquit. ἐταυ μὲν γὰρ ἡ μὲν ἐλαυ το σώματι & λεῖα ἔστι ἢ χολω-
 δετέρα, τὰ δὲ κατὰ τοὺς αἰσθητῶν, τῶν δὲ κατὰ τὴν διὰ τοῦ σώματος ἐν τοῦ σώματος, μὴ γονομενῶν δὲ τῶν τοῦ σώματος, κατὰ τὴν φύσιν ἰχώρες εἰς αὐτὴν, οὗς ἀποτίνει τὸ σώμα πρὸς τὴν φύσιν. Paulo post, ἅρ δὲ μὴ μόνον ἡ λεῖα ἀλλὰ & σφοδρὴ ἰχώρες ἐπιτίμει τοῖς κατὰ τὴν φύσιν χρωστικαῖς. Rursus de frigidis in hunc modum. ἐταυ ἡτοιγῶν δὲ σφοδρὴ κατὰ τὴν φύσιν ἐν τῷ σώματι εἰς τὴν φύσιν κατὰ τὴν φύσιν ἰχώρες &c. *Hippocrates* libro quarto de ratione victus in morbis acutus *Artemidorus* καὶ χολωδίας ἰχώρες dixit, quod *Galenus* interpretatur in eum modum, ἐτι δὲ ἰχώρες ἐνομάζει: τὰς κατὰ τὴν φύσιν ἰχώρες, ἰνδιδυμ. *Galen.* autē libro secundo de elementis: ὡς δὲ ἐν τῷ γάλακτι τὸ μὲν ὀσμὴν ἔχει, τὸ δὲ τυ-
 γρὸς, ἐν τῷ καὶ ἐν τῷ αἵματι τὸ μὲν δισμὴν ἰχώρ αἱματὴν & ἀνάλογον ὀσμὴν γάλακτι, τὸ δὲ δισμὴν ἐλαυ τῶν καὶ τῶν &c. Quādm igitur in corpore adhuc sunt ἰχώρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, vel aquo-

Interpreta-
 tio ἰχώρ &
 apud Gale-
 num.

sanies,

si humores sanguinis latinè dici poterunt. Nam ipse Galenus eosdem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est, humores nominat. Vbi verò extra corpus aut viuum, aut mortuum eruperint, sanies appellari debent. Vt apud Galenum tenue in vlceribus excrementum ἰχὼρ, nobis sanies non incommode exponitur. Item in capitis vicjs quæ ἰχὼρæς nuncupantur, ἰχὼρæs sanies recte dicuntur. Plinius in assai iecoris saniem appellauit: humorem, qui abs iocinore, vel pulmone, vel alia parte dum assatur, emanat. Ceterum Paulus hoc in loco apposite dixit ἀποτινωῖς, hoc est, eliquantur, sicut in corporibus mortuis per solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa viscosaq; existit.

Medicamentum ex charta, xerion. Huius descriptio est in septimo. Vocatur autem xerion quod aridum sit, & in puluere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum. In impresso codice habetur πῶς ἰχὼρῶν, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem puto legendū πῶς ἀχὼρῶν, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nam titulus idem habet, nempe ad Achoras, non ad ἰχὼρæs. Quanquam Oroscius ἰχὼρῶν legendum censeat.

IN IIII. CAPVT.

Oroscius,

Capitis dolor. Hæc ex libro secundo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus autem αὐτῶν πῶς δόλον esse refert, vbi Galenus διαθεσιῶν ponit. Ille hunc superuenire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus apud Galenum plures causæ commemorantur, una sane, simplex intemperies citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, item obstructions humorum, vaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis partium imbecillitas, interim externa quedam causa, quam græci πῶς ἀχὼρῶν nominant: ego sape primariā interpretatus sum.

Causæ dolorum capitis.

Addendum græco.

Nisi caliditati aut. Deest particula in codice græco impresso. Tū igitur lege πῶς ἀχὼρῶν ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigidityte. Deerat enim ἢ.

Prodest fronti & temporibus. Recte hoc dicit, nam per initia spinalis medulla dolorem non experitur, eoq; posteriora capitis vngi non debent.

Pastilli ad cap. Alexander medicus hunc pastillum describit. Sed pondera nonnihil in quibusdam medicamentis variant. Commendat enim ad diuturnos dolores, omnibus alijs remedijs nihil proficientibus. Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opij momentum iniiciendum præcipit.

At si

At si frigus. Ad verbum ex Alexandro hæc ut superiora mutatus est Paulus. Facies non concidit, hoc est, non macrior est reddita, ut ex calore, sed colorē decorēq; amisit, pallida effecta. Sic ἀχρεῖ, ἀχρεῖ, quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, unde pallor necessario superuenit.

Præsertim si recrementa. Hoc est, si ex crassius glutinosiſq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἡ γὰρ παχὺ τὸ δὲ γλυκὺ καὶ πῶμα καὶ εἶναι. Quæ verba satis obscura in hunc modum intelligi debent, si humores crassi viscosiſq; in capite tenacius hærentes, dolorem excitant.

Locus obscurior.

Si biliosus humor. Hæc & sequentia ex Galeni secundo de compositione medicamentorum secundum locos, nullo verbo mutato, habentur. Caterum ambo præcipiunt, tum Galenus, tum Paulus primum balneum temperatum, inunctionem, cibum potumq; refrigerantem. Deinde offerunt medicamentum a bilem educentia: quod sane Alexander medicus suo seculo clarissimus in hunc fere modum exponit. Conuenit igitur, ut superflua medicamentis bili ducende idoneis educantur. Verum ut hoc secundum rationem fieri possit, corpus antea preparari humectariq; debet, cibis temperatis, balneis & inctionibus. Huius enim probe contemperatus, resolutus, & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabitur.

Quomodo biliosus humor præparari debet.

Abſinthii diluto. Hoc est, ut officina vocant, infusione: tunc nimium cum pauca bilis stomachi tunicas imbuerit, irrigaritq;.

Vel aloë. Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi maxima bilis copia dolorem excitarit, nec alia violenta medicamina. Picra autem prodest, ubi crassi aliqui succi bili sint permixti.

Si caput consortij lege. Græce est συμπαρόχθις, hoc est compatitur. Celsus lege consortij alij per consensum patitur, exponunt. συμπαρόχθις namq; est, cum pars aliqua corporis, alterius malo, vel consensu, vel connexus, vel communicationis gratia condolescit. Huic contraria ἰσὺς παρόχθις, vel πρὸς τοὺς παρόχθις cu per se, & suo vicio tantum afficitur: quem affectum primum nominare licet, & ἰσὺς παρόχθις, primario affectu laborare.

συμπαρόχθις, quid.

Lege consortij.

Consensus.

Emolienur. Verbum græcum est ἐμολιῶμαι quod de pertinaciter herētibz proprie dicitur, ut de viscosis, crassiusq; humoribus partē aliquā tenaciter obsidentibus: item de induratis affectibus. ἐμολιῶμαι idem est quod λυῶμαι, libro septimo ait: ἡ πρὸς τὸ ἐμολιῶμαι διὰ τοῦτο ὁ ἰατρὸς μελέτω, de medicamentis efficacioribus sermonē habens. Propterea mihi visum est, emoliri verbum non incommode hic usurpare.

ἐμολιῶμαι.

Vterque hic affectus. Ad verbum è Galeni secūdo de com-
positione transcripta sunt, nisi quod pro hac dictione, permanēs,
παράμνι- Paulus παράμνιμι, Galenus χρόνι & ἡδὲ δύσλυντ, hoc est,
μ. diuturnus, & soluta contumax, habeat. Celsus acutum & pestiferū
morbum appellat λεφανάριον.

Hiera quam exacueris. Scammonio, aut veratro adiecto hiera
vehementior redditur. Atq; id per ἐξυμύσας intelligitur. Nam ἐξυ-
μύσας idem est quod acutum reddere, intendere, vehementiorē efficere.

Vnguenti irini. Ad verbū habetur hoc in Alexandro. Apud
Galenum variat nonnihil hoc modo. Vnguenti Irini expressionis,
castorei, singulorum pars vna, baccarum lauri pars vna, viticis se-
minis pars vna, rosarum siccarum, pars vna, ruta summitatum par-
tes quatuor. Aceto resoluta excipiuntur cerato &c.

Dum intabescerent. Sic reddidi ἔως τὰ λεπτὰς, Celsum imi-
tatus Oroscius improprie vsq; ad eliquationem dici iubet.

Partem affectam irrorabit. Lege in græco λεπτὰς pro λεπτὰ-
ς, quod est, λεπτὰς, λεπτὰς, superfundebat, aspergebat, non in-
spergebat ut vult Oroscius.

Oroscius. Aspergebat ut vult Oroscius.

Dropax. Huius descriptionem habes in septimo Pauli ad finem,
vbi etiam sinapismus exponitur. Hac sunt medicamenta noxios hu-
mores in summam cutem euocantia, μετὰ σὺν κριτικὰ græci nomi-
nant. Sic etiam Celsus verbum hoc videtur interpretari, vbi summā
cutem, inquiens, relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum
corporis mutari expedit.

Malagmate, quia liquidum est parygron. Galenus lib. 7. de
compo. medicamentorum secundū genera, inter malactica ponit, quod
recipit adipem suillum curatum, ceram, & argenti spumā. Eoq; me-
rito interpretatus sum dictionem, contra opinionem Oroscij. Male
est in impressis πᾶν ὄγγω.

Sani. Lege in codice græco ὡς μετὰ λήραν ὕγιαιν γινώσκει πᾶν ὄγ-
γῳ, ut habet Galenus libro secundo iam sapius ci-
tato, ad calcem.

Apophlegmatismus. Nūc verto medicamentū, quod pituitā per
os educat, nunc quod salinā moveat. Ut hoc in loco, Celsum imitatus
in capite de Cephalæa, cap. 4. Caterum in græco codice habetur το.ιβ.
quod est, ὀνκίε ιβ. ego puto < .ιβ. legendū. sicut interpretatus sum.

AT quæ mentis alienatio. Quia multæ in hoc caput vo-
cule incidunt, idem propemodum significantes, non abs re fue-
rit.

rit, eas curiosius in utraque lingua distinguere. Mentis igitur alienatio verti pro græca dictione *παραισιον*. Nam in febris vehementis statu, ut ait Galenus, accidunt ægros *παραισιον*, *παραισιον*, *παραισιον*, & *παραισιον*, que latini exponunt, mente alienari, mente non constare, aliena loqui, delirare & desipere. Si autem hoc continuè accidat, phrenitis dicitur. At si in statu dementia superveniat in declinatione autem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Celsus eundem ponit distinctionem libro tertio cap. 18. Phrenitis, inquit, tum demum est, cum continua dementia esse incipit.

Vel Lemis, hoc est. Oroscius male exponit *Aquaviles*, id est lip-
pientes. Non enim *Lema* lippitudinem signat alioqui omnes quibus
Lema in oculis innatant, ut hectica vel petrus marasmo confecti, lip-
pitudine laborarent. Supra dixi *Plinium* dictionem graecam usurpa-
re. *Celsus* p^uitum interpretatur.

Coma. Galenus commentario in primum τῶν προῖστικῶν re- Coma
fert, Coma & Cataphoram apud Hippocratem idem esse. Sed Coma
duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituito-
so generatum humore, grauis sopor, & quasi inexpugnabilis dormiē-
di necessitas. Quod si biliosus humor mixtus præpolleat, vigilans co-
ma dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt vigilantium munia sub-
ire, sed tum palpebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

Commodum incident. Hoc est, opportunitate & occasione sumpta se ingerent. Hoc enim apud grecos προσφάτως ἐν τυχαίῳ προσφάτως significat.

panis quoque aqua lotus. Galenus panis eluendi rationem in-
uentam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic pa-
nis lotus quàm minimū habet crassicie, glutiniq; et pote ex terre-
stri ac graui, aereus, leuiq; salu.

Peponis duracini. Sunt qui non duracini legendis censeant, sed rhodacini, quanquā Palladius, Paulus, aliq; recētiores græci ut Cōstātinus Ἀρκενίηx legūt, quos Palladius ubiq; imitatus, duracina conuertit, quicquid sit siue rhodacina hoc est, à Rhodo nominata, siue duracina à duritie, persica proferas, non multum interest. Plinius etiā cerasu, & vuas duracinis nuncupat. Tu virum malis sequere.

Duracina.
Rhodacina.

Hordeacea farina. Græce est ὠμὴ λύσις quasi dicus, cruda solutio, vel cruda farina ordeacea, ad differentiam polente quæ torretur. Verū latini interpretes crudam omittunt, lectori id intelligēdū relinquentes. Aliquando etiam de aliorū farina ὠμὴ λύσις dicitur, verū tunc apponitur frugis nomen, ut πυρίνη ὠμὴ λύσις ἢ λυσοπέμμη. Saepe ex superabundanti λεῖθινη ὠμὴ λύσις nominatur.

ἀσθ.
Orosius.

Multus angor. Caput hoc ex octauo Oribasij transcriptum est. Grace habetur πολλὴ ἀσθ, quod interpretantur plerique, sicut etiam Orosius, fastidium, cum verè hoc loco sit dicendum multus angor. Nam adeo torquentur, vt nesciāt quid ipsis sit agendum. nunc lecto se erigunt, nūc rursus decumbunt, vitæ quasi pertasi. Morbus hic intra septimum sæpe iugulat.

ὀίδημα.

Tumore molli. Sic reddidi ὀίδημα, qui tumor. prementibus digitis cedit, eoque dixi, molli. Tu si libet dicas, cum œdemate.

Emisicij. Hoc est. qui foras propelluntur, dolore nimio exprimente. Græcè est ἐκπορεύειν.

Porro vititor. Post totius corporis vacuationē deriuationēque per propinquiores particulas ad topica venit remedia. Primum aspergines ex hydrelæo, aut vino & oleo, vt in alijs partibus inflammatis conueniunt: deinde cataplasmata ex pane, aut farina hydrelæo subacta, quæ ad maturationem perducunt. Id enim verbum παύειν significat.

LEthargus. Oribasius lib. 8. omnia ad verbum habet. Galenus commentario in primum prorrheticon, in hunc modum scriptum reliquit: φρονίτις μὲν γὰρ ἡ ἀκριβὴς, καὶ ἀμύνη & ἐπεφρασμένητι γινώσκαι καὶ τὰς ἐκείνης λατρεῖας τὴν τέχνην ὡς τὸ ἀπὸ φηχῆς ἡγεμόνιον ὅτι. λήθαργος δὲ τὸν αὐτὸν τέχνην ὑγρὰν αὐτὸς καὶ διαβρεχάμενος φλέγματι. Consentiunt hac cum Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiores habeat.

Cari species.

Caros. Vide Galenum secundo commentario Prorrheticorum, vbi refert tres quasi species Cari, nempe morbofi, quo de hic agitur, mediū vt ex vino contracti, & boni, qui post longas vigilias solet accidere. Cæterum arteriæ Carotides à caro nomen habent, quanquam si intercipientur, non statim mutum animal, aut soporosum euadat, sed omnes arteriæ quæ supra vulneratas partes habentur, pulsus amittunt. Interpretari licet. soporem veterinosum.

Orosius.

Febrium accessionibus. Emenda codicem græcum, ac pro παρὰ ξύμ & lege παρὰ ξύμοις, quod Orosius & castigator Basiliensis studio, opinor neglexerunt.

Membrana custode. Sic interpretatur Celsus libro octauo, capite tertio: Quomodo os excindatur. Hac autem sunt ipsius verba: Factis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circumspēctius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eadem membranā violet, do nec fiat aditus, per quem membranae custos immittatur, μὴ γὰρ φύ-

λαπ

αἷα γράει vocant &c. Nunc quid sit membranæ custos, audi. *La-* Membranæ
 mina, inquit, aenea est. firma, paulum refirma, ab exteriori parte le- custos
 is quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit, subinde ei *μλουγγα-*
 ubijcitur quod scalpro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, *φύλαξ.*
 ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalprum mal
 eolo subinde medicus ferit, donec excisum vndiq; os eadem lamina
 euetur, tolliq; sine vlla cerebri noxa potest &c.

Quæ cito transeunt. Hoc est, quæ cito per totum corporis habi-
 tum rapiuntur. quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur.
 Habes vtriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sani-
 tate tuenda. Græce est τινὲς τῶν ὀξυπύρων. Non intelligit hic Pau-
 lus, quæ per aluum cito transeunt.

Nota.

Iis autem qui in vetustatem. Id est, quibus morbus in vetusta-
 tem incidit, quiq; tremuli sunt. Nam postea ob diuturnitatem mor-
 bi externarumq; partium imbecillitatem, tremor accidit.

Angusti oris vasculis. Sic interpretatus sum βομβύλια. Nam βομβύλια.
 Hesychius ait: βομβυλὶς ποτηρίῃς γένος ἔστιν ἀπὸ βομβή. ὡς ποτήριον ἔστιν
 ἡ βομβή. διὰ τὸν ἥχον ὅν τῳ λεκλῆσθαι. Conuenit igitur ut eiusmo-
 di poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

IN X. CAPVT.

INterim rubore tincta est. Græce erat ἐρυθρὰ & αὐτοῖς ἐπαυθεῖ.
 Hoc est, rubor eis efflorescit, riuidus est. Auicenna hoc caput ut
 alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, mutato ordine tan-
 tum, vocatq; affectum Subet asahari.

Qui vero malo victi sunt. οἱ δὲ λεπταὶ καὶ ὀφθαλμοὶ. Celsus vertit ma-
 lo victi. Opponuntur ijs qui mediocriter habent: qui morbo, possunt
 resistere.

In iis autem periculum maius est. Reddidi sic græca hæc χα-
 λειοὶ δὲ μάλλον σίγειν, quod est, difficiles autem magis sunt curati
 scilicet, quibus vigilie sunt continuæ.

IN XI. CAPVT.

CAusam habent communem. Subintellige, mentis noxa, & *Causa pru-*
 memoriæ iactura. Fatuitatis causam Galenus commentario in- dentia.
 libellum Hippocratis de natura hominis ita memoriæ prodidit: τὸ *Stultitiæ.*
 μὴν ὀξὺ καὶ σιωπὴν ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸν χολώδη χυμὸν ἔχειν. τὸ δὲ
 ἰδρωτὸν καὶ βίβαιον διὰ τὸν μελαγχολικόν. τὸ δὲ ἀπλὸν καὶ ἡλιθί-
 ον διὰ τὸ αἶμα, & δὲ φλέγμα. ἢ φύσις αἰς μὴν ἡθοποιεῖν ἀχρη-
 σται. Quæ verba olim sic reddideram: Stumē ingenij & prudentia
 ex bilioso humore nascetur. Constantia vero & firmitas ex melan-

Bb 5

Vitiatus cholico: simplicitas stoliditasque ex sanguine: pituita vero natura ad mores fingendos inutilis &c. Caterum communem causam refert Paulus & mentis noxae, & memoriae iactura. Male habetur in graeco codice $\eta\gamma\epsilon\iota\ \nu\upsilon\mu$ pro $\lambda\omicron\upsilon\upsilon\eta\mu$, ut annotauit Oroscius quoque. Sed hoc sane debet exemplari suo. Quod autem $\tau\lambda\omega\ \sigma\upsilon\tau\alpha\sigma\epsilon\upsilon$ verterit, illic consistentem, cum dicendum esset, constituentem, efficientem eruditioni suae & ingenio debet. Nam si consistentem, hoc in loco Paulus dicere voluisset, non opus erat articulo $\tau\lambda\omega$, qui velut autorem & episcum demonstrat. Sic etiam Galenus intelligit lib. 3. locis affectis, unde haec partim descripta sunt.

Vel utique in humiditate inspersa. De ea nimirum dicit humiditate, quae per totum corpus cerebri dispersa est. Galenus tertio locorum affectorum habet sententiam eandem, sed paulo apertius.

div.

IN XII. CAPVT.

Vertiginum affectus. Vide Galenum libro tertio de locis affectis. Alibi autem refert causam inordinatam statuos spiritus motionem, qui vel in cerebro generatur, vel ab inferioribus sursum fertur.

Rotas, vorticēve. Graece est $\delta\iota\omega\rho\ \rho\acute{\epsilon}\chi\omicron\upsilon\varsigma$ η *divas*. Galenus $\rho\acute{\epsilon}\chi\omicron\upsilon\varsigma$ η *divas* $\epsilon\iota\ \pi\omicron\tau\alpha\mu\omicron\iota\varsigma$, hoc est, rotas vel vortices in fluminibus. *div.* Nam *div* $\sigma\upsilon\tau\alpha\phi\ \eta$ $\upsilon\delta\acute{\alpha}\tau\omega\rho$. At *div* σ , ait Galenus, $\epsilon\nu\omicron\mu\acute{\alpha}\varsigma\epsilon\tau\alpha\iota$, $\epsilon\tau\alpha\nu\ \eta$ $\lambda\epsilon\phi\alpha\lambda\eta\ \pi\epsilon\pi\epsilon\phi\epsilon\iota\delta\alpha\iota$, $\phi\alpha\sigma\iota\acute{\alpha}\varsigma\epsilon\tau\alpha\iota$. $\epsilon\tau\alpha\nu\ \delta\epsilon$ $\epsilon\nu\omicron\tau\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$ η $\delta\iota\phi\tau\varsigma$ $\alpha\mu\acute{\alpha}$ $\tau\acute{\omega}\delta\epsilon$ $\phi\alpha\acute{\iota}\nu\epsilon\tau\iota$ $\epsilon\nu\omicron\tau\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$ σ $\lambda\alpha\lambda\epsilon\tau\alpha\iota$ &c. Apud latinos vertigo alterum nominari potest, alterum si ad verbum interpreteris. Tenibricosa vertigo.

div.

Vertigo.

Medicamentis quae odore mouent. Hoc est, quae naribus odoranda adhibentur, atque ita cerebrum commouent, graece dicuntur $\delta\sigma\phi\alpha\upsilon\tau\acute{\alpha}$. $\epsilon\sigma\phi\alpha\upsilon\tau\acute{\alpha}$. Celsus, quae odore mouent, conuertit.

IN XIII. CAPVT.

Morbus comitialis. Vide Galenum libro tertio de locis affectis, & Oribasium in octauo, unde Paulus haec ad verbum transcripsit. Graeci vocant $\upsilon\delta\iota\lambda\epsilon\psi\iota\chi\upsilon$, quae dictio comprehensionem, retentionem, obturationemque significat. Nam spiritus animales hoc in morbo detinentur, adeo ut in membra corporis distribui nequeant.

Vel certe aliis quoque. Graece est $\eta\gamma\omicron\upsilon\rho\ \eta$ β $\alpha\nu\alpha\delta\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$ $\epsilon\tau\epsilon\phi\omega\rho\ \mu\omicron\rho\acute{\iota}\omega\rho$, ad verbum sonat: Vel etiam ex aliarum partium distributione, quod est, vel etiam alijs particulis cerebro communicantibus.

τάσις.

Voluntatis & consilij expers. $\tau\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ $\alpha\pi\omicron\phi\alpha\acute{\iota}\rho\epsilon\tau\ \sigma$ in graeco co-
 $\alpha\pi\omicron\phi\alpha\acute{\iota}\rho\epsilon\tau\varsigma$ dice habetur, quod est: Status qui citra voluntatem & propositum, sit, veluti

ti angustia, aut tristitia. Aristoteles distinguit *προαίρεσις* ab *εἰσότης*. Illa enim fit cum ratione & intelligentia, *ἀνοήσις* contra. *οἶσος* itaq; dicere, inuitus corporis & animi status. Galenus libro suo à nominato ait: Dormientes spirant, quamuis nulla alia accedat *ἔλθω*, quæ voluntate & consilio regatur. Item *μυήτι* *παρὰ νοῦν* *παρὰ νοῦν* *ἔχον*, quod est: Non amplius constare mente & intelligentia: ad *θεῶν* *ἐαυτῶν*. Verbum vero sonat, seipsum assequi.

Eorum quæ perceperant. In græco duæ tantū dictiones habentur, *τῶν* *προσεχῶν* *λίθη*. Suidas *προσεχῶν* interpretatur *προσοχήν* hoc est, meditationem, perceptionemq;. Sunt qui malint *τῶν* *προσεχῶν* *λίθη* exponi, propinquorum obliuionem, vel necessariorum.

Menstruis purgationibus. Græce est simpliciter *κατὰ τὰς* *κατὰς* *ἐμenses*. mox addit *κατὰς* *ἐν μήτρᾳ*, hoc est cum in utero habere cœperint Celsus apte dixit, In pueris, veneris, in puellis menstruorum initium collit. Paulus hoc pubertatis vocabulo comprehendit. Vide Aphorismum septimum libri quinti, eiusq; commentarium Galeni.

Si infans adhuc fuerit. Galenus exiguum quidem, sed elegantem puero comitiali commentarium dicauit: in quo morbi huius omnem curandi methodum & rationem est complexus. Reliquarum ætatum meminit etiam libro tertio de locis affectus.

Mane passum auferetur. Codex græcus habet *λεπτόσχιζα*, pro *λεπτόσχιζα*, quod Orosius annotauit. Gemusæus ut exiguum nimis præterijt.

Sinapismus. Nempe ut noxi humores ex alto corpore in extima euocentur. habes autem sinapis oblinendi rationem libro septimo Pauli abunde & eleganter expositum.

Iam etiam acrium ciborum esus. Græce est *ἀγρυμπαγία*. Celsus de eodem morbo verba faciens, acria, inquit, assumat. Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit vomitionem acrium ciborum esu concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum. Galenus hoc commemorat libro sexto de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide disputat. vidi inquiens puerum totis octo mensibus, morbo liberum & cum forte fortuna radix à collo cecidisset, rursus conflctatum &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiore intellectionem, communicare morbum aliàs obscura nimis esset sententia, *ἐπειδὴν ἀνοήτως ἡ νόσος*, id est ubi senserint particulam, intelligendum affici, vel à particula morbum excitari. Hec dixi ne Aristarchi nostri aliquid me præter sensum Pauli assuisse clament.

Cum autem remitti. Græce est *ἐν* *ἀντιστοιχίᾳ* *ἀποθραύσεως* *πύων*.

In re

In remissionibus autem apothepia uti. Est autem ἀποθεραπεία corroborare & firmare corpus. nec non vindicare à lassitudine. Sequitur autem omnium exercitationem magnam ne corpora in lassitudinem incidant. Hic autem post accessionem corpus ante agitatedum recreare nonnihil oportet, vel particulam, unde morbus excitatus est. firmare caustico medicamento, quod calorem in eo excitet, ne amplius in eam humor frigidus, aut superuacuis confluat, & inde ad cerebrum feratur.

ἀποθεραπεία.

Inconniuens è sublimi conspectus. Sic exposui καὶ τὸ ἀποθεραπεία ὅτι ὕψος, quod ad verbum sonat inconniuenter conspiciere ex alto. Celsus vertit clarè è Græcis, loci præcipitis conspectus.

IN XIII. CAPVT.

Melancholia. Galenus de hac multa libro tertio de locis affectis. Oribasius eadem libro octauo habet. Caterum vno omnes consensu dicunt insaniam, mentem ipsam occupare, nunc cerebro ipso peculiari vicio laborante, nunc totius corporis affectionem simul experiunte.

Per se ægrotante. Ita interpretatus sum Græcam dictionem, πρῶτον πάθος & quasi primario affecto exponas. Idem vero est, per se apud idoneos scriptores, quod nimirum, nullo alterius consensu.

Homines auersantur. Misanthropia est eiusmodi animi affectio, qua quis in solitudine viuere cupiat, vitet hominum consortia, ut Homerus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in cæpis mærens errabat Aleis,

Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans,

μισανθρωπία.

ut Cicero vertit. Dicimus etiam μισανθρωπία, & apud Hippocratem ἀπανθρωπεία, hominum consuetudinem auersari.

ἀπανθρωπεία.

ἀπαχθίσι-
ται.

Inane violenter tractent. Ita exposui ἀπαχθίσιται Celsum secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alij consurgunt, & violenter quadam manu faciunt. Non sum ignarus ἀπαχθίσιται ab Hesychio exponi φονεύειν, quod est occidere, verum hoc non semper contingit. Tractant quidem violenter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia faciundo. Neque hic debebat Orosius nimum esse grammaticus.

Orosius.

Qui igitur ex primario. Hac ex libro tertio de locis affectis ad finem transcripta sunt. Reddidi πρῶτον πάθος primarium affectum, qui non ex alterius partis dolentis consensu oritur. Caterum omnia remedia melancholice Galenus loco supra citato enumerat præter hoc, vñ cum decenti animi delectatione, quæ Græcis dicitur δυνάμεια.

δυνάμεια.

Aut

Aut gestandi grabato intra lecticam infanientibus pecu-
arem. Celsus etiam inquit, maxime suspensi lecti motus. γύγα- γύγαθον.
in teste Suida, ἡλινὴ ἐν ἡ τὰς παρ' αὐτοῦς ἢ δαίμονι ὁδὸς τ' ὁδοῖσι.

IN XV. CAPVT.

EPhialcen. Hunc affectum appellauit Incubonem secutus Scri- Incubo.
bonium compositione centesima, ubi inquit: Facit hæc compo-
sio ad suspirium, & ad vocis abscissionem, & subitas præfocaciones ex
ualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone
ludi. Plinius nocturna delubria nominat.

Nocturna
delubria.

IN XVI. CAPVT.

Qui lycanthropia detinentur. Hic morbus apud Latinos
nomen nullum habet: si ad verbum interpreteris, Lycanthro-
pi sonat lupini homines, hoc est, qui lupos imitantur. Auicenna in-
egrum caput de Cutubut hinc transcripsit.

Oculi ad videndum imbecilles. Græce est, ὀφθαλμοὶ ἀδρανῆς,
quod sonat, vident imbecille. Nam ἀδρανῆς idem quod ἀδυνῆς. Aui
cenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

IN XVII. CAPVT.

AMores. Barbari vocant, amor ereos, quasi dicas, amor amo-
ris. Nam ἔρως Græcis amor appellatur. Auicenna iſci nun-
cupat, ex Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum de ocu- Nota.
lis, & sunt, inquit, omnia membra arefacta, præter oculos. Paulus
refert: Et cum reliquæ corporis partes non collabantur, soli hi aman-
tibus concidunt.

Pulsus propriè nullus. Vide Galenum in libello περὶ προγινώ-
σκων, ubi se mulieris amorem ex pulsu deprehendisse testatur.

Balnei abſtinentia. Oroscius legit pro ἀλσείας, hoc est balneo- ἀλσεία.
rum abſtinentiῶς, ἀλσείας, hoc est, vinculis vt exponit: quasi aman-
tes in vincula sint coniungendi. At sequens sententia Pauli facit, vt
ἀλσείας legendum censeam. Nam prudentiores inquit, ad balnea,
computationemq; eos ducendos præceperunt. Tu autem candide lector,
vtram malis scripturam sequere. Nam haud ita multum refert.

IN XVIII. CAPVT.

Quando commune quidem. Ex tertio Galeni libro de locis
affectis, & deinde ex octauo Oribasij hæc collecta sunt. Ga-
lenus autem non meminit dictionis, hemiplagias, quæ idem signat ἡμιπλάγια
quod paralyſis. Ad verbum si interpreteris, sonat semiplexia, hoc
est in dimidia parte percussio. Nam verbum πλῆττω, vnde apo-
plexia, & hemiplagia deriuantur, serio, percussio apud nos significat:
vnde non omnino male tali percussos affectu, attonitos Celsus nomi-
nat,

nat, quorum scilicet, & mens, & corpus stupet.

Quomodo
fiat apople-
xia.

Commune neruorum principium. Cerebrum omnium neruorum tam sensilium, quàm mouentium fons & origo existit. Medulla vero secundario neruorum mouentium principium dicitur. Nam & ipsa à cerebro propagatur. At in hoc affectu primum anteriores ventriculi, deinde medius, postremo q̄ qui in cerebello habentur, obturantur adeo, vt ne pauxillum quidem spiritus animalis ad medullæ spinalis neruos deriuentur. Vnde sensus, motusq̄; intercidat, aboleaturq̄; necesse est.

Ita vt pariter principis animæ. Tres sunt secundum Platonis, Aristotelis, & Galeni sententiam in humano corpore animæ species. Vna θυμοειδής, altera ἐπιθυμητική, tertia νηγεμονεσσα, vel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ νηγεμονεῖον, ἢ λογιστικόν, ἢ λογισμεῖον. Prima in corde sedem ac domiciliū habet. Secunda in iocinore. Tertia quæ aliarum dux & princeps est, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, ventriculis omnibus obstruētis, præsertim medio, vbi ratiocinatio consistere dicitur.

Sin autem in altera. Hoc est, si alterius partis cerebri tantum, sinus, aut ventriculi, aut quomodocunq; appellare velis, impediti, obstruētiq̄; fuerint.

Voce intermortua. Græce est ἀναυδοί, quod ad verbum sonat, sine voce, vt apud Hippocratem ἀναύδους. At Galenus interpretatur, ἀλέγως, quod est sine sermone. Nam ἀνδὴ etiam λόγος dicitur. Intellige igitur voce intermortua, pro sermonem edere non valentes, quippe omnes nerui, tum sermonis, tum aliarum actionum duces, spiritu animali sunt destituti.

Toruli eleuantur. Hoc est, ipsæ venæ attolluntur, quod capitis repletionem testatur. Græce est τῶν σφαγιτίδων ἐπαγµα.

Oroscius.

Ipsi inhærescunt. Haud scio cur Oroscius ἐνέειµεν molesta verterit. ἐνέειµαι enim ab ἐν & εἶµαι venit. Nec pituita solum ori molesta est. Imo non adeo molesta est ijs quibus sensus omnino perijt. Rectius igitur quæ inhaerent, aut eo decumbunt ex capite, auferantur.

χυλῶδης πο-
φή.

Cibus mollis, distribui facilis. In codice Græco habetur παχέ-
ληψέμεθα πλὴν ἀπαλὴν καὶ ἐν δισκίοντι, καὶ χυλῶδην ποφήν, quod est: Assumemus tenerū, & distribui facile, & succulentum nutrimentum. Celsus libro tertio de morbo comitiali inquit: Neque sortitiones autem his, alijq̄; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλῶδην quod nos reddidimus succulentum, intelligit cibum ex cremore, vel prisana, vel chondri, vel alterius frumenti. Nam χύλος cremorem signi-

gnificat, qui in forbitionibus dari solet.

Unctioni vero accommodata. λιπάσματ'α τε σύγχευσι'α τοι-
ντα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse videtur: Un-
ctione vero, inquit, aptissimum est vetus oleum. Ad verbum sonat
Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

In quo scilla intabescit. Græce est ἐνταριχεύειναι verbum, ἐνταριχεύει-
ναι. quod signat proprie agros abstinentia immoderata exiccare. Ita scil-
icet in Sole eliquescit, consumiturq; Celsus etiam dicit: In quo scilla
intabescit.

Attendentes. Male in codicibus Græcis legitur πρόχειναι, pro
προσχειναι, hoc est aduertentes. Deinde in eadem sententia: διὰ
τὸ μὴ σωαίνεσθαι μὴ ἐπὶ λιχθῶσιν pro διὰ τὸ μὴ σωαι-
νέσθαι μὴ ἐπὶ λιχθῶσιν. Quo in loco dum Orosius alios repre-
hendit, nec locum Græcum emendat, & male vertit ἐπὶ λιχθῶσιν,
re vehementer vrantur: cum Paulus velit vehementer quidem, sed
non nimium, non supra modum, nec magis quàm conuenit.

Cutis ruborem. Sic interpretor τὰς φοινιμοὺς, Celsus habet: φοινιμοί.
Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, vel vr-
ticis cesum, vel impoſito sinapi, sic vt ubi rubere cœperit corpus, hæc
remoueantur.

Feculæ. Græce est φέκλις quæ fex combusta dicitur. Gal. lib. i.
de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoras in-
quit, πυρὸς οἶνον λιπαρὸν μέλ'ος, ἢ ῥωμαῖοι φέκλιω λιχθῶσιν. Latina
itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλιω nominant.
Largus etiam vititur pro fece vini combusta. Hoc ignorabat Oro-
scius, dum alios reprehenderet.

Canum more conuelluntur. Verbum è verbo reddidi. Largus
autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his verbis: Facit ad
λεωινὸν σπασμὸν, cum in utramlibet partem deprauata est facies.
Celsus libro quarto habet: Circa faciem vero morbus innascitur,
quem Græci λεωινὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febris est, os
cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quàm disten-
sio oris.

Per narium clysterem. Græce est διὰ ρίνας χύτης, hoc est ρίνας χύτης.
ad verbum per narium infundibulum, per quod medicamenta in
nares infunduntur. Quemadmodum ὠτιγχύτης, clyster auricu-
larius, & μηρὶ γχύτης uerinus. Celsus libro quarto, capite secun-
do, fere eadem.

Per rectos siphones. Sic videtur Galenus significare, qui λε-
αῖταις libr. 5. Methodi ἐν θυρήτοις, quasi recto foramine præditos
canal

Vitiatus co-
dex Græcus.

Orosius.

φοινιμοί.

Orosius.

Canina con-
uulsio.

Oroscius. canales interpretatur. Oroscius rem medicā ex Celio maluit discere. Lentisici. Male in utroque exemplari habetur σχοίνου, quod est iunci odorati, pro σχίνου, nam astringentia in hoc morbo requiruntur.

Codex Græcus depravatus. Vitulinumque & oleum. In Græco codice deest particula ηγε. Nam habetur tantum, τῆς ὕλης, ηγε χύμιον ηγε μολόχινον ἔλαιον. Corrigere Græca. Cum sit legendum: ηγε ἔλαιον in fine. Nam molochinum oleum nullum dicitur.

Cum communi curatione. Hoc est præter communem resolutionum curationem, quæ medicamentis extrinsecus adhibitis, alijsque absoluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostri ætate. Quod Paulus suo tempore accidisse in morbo colico commemorat, nos quoque nostri ætate frequenter videmus. Nempe ex magno, diuturnoque colico cruciatu artuum resolutionem, præsertim brachiorum, quanquam & crurum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febris quæ humoribus ad intestina confluentibus, ubique dolorem vehementem excitantibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio, quod nuper in Canonico quodam, sed non iuxta regulam vivente, sum expertus.

IN XX. CAPUT.

Cum particulae corporis in anteriora. Hoc Celsus paucis comprehendit: Cum mentum inquit, pectori annectitur, emprosthotonos, cum scapulis opisthotonos: cum rectam & immobilem cervicem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaque præsidium. Hippocr. lib. 4. Aphorism. sectione 57. Qui convulsione, aut distensione nervorum tenentur, febris superveniente liberantur.

Rifus Sardonicus. Nonnunquam & risus ipsis Sardonicus oboritur. Dioscorides lib. 6. sardona ranunculi genus esse testatur, quæ rescentibus mentem adimat, & quadam nervorum distensione, dehiscere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeant.

Cucurbitulas admovere cum lacinatu. Græce est μετὰ ἀμυχῶν, quod sonat cum vibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lancinatum scalpelli.

Oroscius. Abstergere, ne imprudentes. Dum Oroscius alios reprehendere instituit, ipse corrigendus venit, qui tam impure, & nullo sensu penitus vertit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autem lexicarius adhuc esse interpretes, μὴ λάθωσιν ψύξαντες, quod ad verbum sonat, ne lateant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescij, ac non advertentes, refrigerent particulas.

Hydromeli spissius. Sic exposui ὑδρομέλι λιπαρόν, hoc est ad verbum,

verbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; $\lambda\iota\pi\alpha\rho\epsilon\nu$ ad pinguetudinis crassiciem incoctum. Nam ad dimidiatis coqui precipit.

Et laserpicij radice. Nescio cur hic Oroscius succum laserpicij intelligi velit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris mentionem facit, $\epsilon\pi\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ ponitur. Adeoq; in opisthotonicis. At radicem in puluerem reductam, tum decoctam saepe & in his, & in alijs affectibus dari legimus, ut plane non sit, quod Oroscius in hoc loco versionem nostram reprehendat. Quin potius in exemplari graco legendum putet $\epsilon\mu\pi\alpha\delta\epsilon\nu\varsigma\alpha$ pro $\epsilon\mu\pi\alpha\delta\epsilon\nu\varsigma\alpha$ & $\alpha\phi\epsilon\psi\mu\alpha$ aut $\tau\iota\varsigma$ pro $\alpha\phi\epsilon\psi\mu\alpha\varsigma$, ut sit decoctum ipsius radice. Quid enim est, silphij radice cochlearia duo, aquae mulsae cyathis tribus inspersa, vel decocto ipsius dari? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quae iam cocta est, quantum opus est. Itaq; ad radicem magis competit. Ea enim vel pulueris modo inspersa, vel decocta exhiberi potest.

Myrrhae drachma ex mulla, hyssopiq; decocto. Hic rursus codex gracus deprauatus est, habet enim $\eta\ \sigma\mu\upsilon\rho\nu\varsigma$ < $\alpha.\mu\epsilon\lambda\iota\kappa\acute{\alpha}\tau\omega$ $\upsilon\alpha\omega\pi\omega\ \tau\epsilon\ \alpha\phi\epsilon\psi\mu\alpha$. Cui nimirum legendum sit $\eta\ \sigma\mu\upsilon\rho\nu\varsigma$ < $\alpha.\sigma\upsilon\rho\ \mu\epsilon\lambda\iota\kappa\acute{\alpha}\tau\omega$, $\upsilon\alpha\omega\pi\omega\ \tau\epsilon\ \alpha\phi\epsilon\psi\mu\alpha\varsigma$, quod Oroscius & Basiliensis castigator non aduerterunt.

Nardi. Dictum est pro nardini, ut apud Celsum & Scribonium aliquando Rose pro rosaceo, nardi pro nardino usurpantur.

IN XXI. CAPVT.

TRemoris origo. Vide libellum Galeni de Tremore, quē nos aliquando latinitate donauimus, ubi habet: $\tau\acute{\rho}\epsilon\mu\omicron\varsigma$ $\pi\acute{\epsilon}\rho\ \delta\epsilon\ \gamma\iota\upsilon\epsilon\tau\eta\ \tau\acute{\epsilon}\ \delta\chi\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$ $\eta\gamma\epsilon\iota\ \lambda\iota\upsilon\acute{\nu}\iota\sigma\iota\varsigma$ $\tau\acute{\omicron}\ \sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ $\lambda\iota\upsilon\alpha\acute{\mu}\epsilon\omega\varsigma$ $\alpha\acute{\rho}\rho\omega\sigma\iota\alpha$. $\delta\ \gamma\acute{\upsilon}\delta\ \beta\acute{\iota}\alpha\upsilon\tau\acute{\epsilon}\ \lambda\acute{\iota}\mu\pi\omega\ \tau\acute{\alpha}\ \mu\acute{\omicron}\epsilon\iota\alpha\ \tau\acute{\omega}\nu\ \zeta\acute{\omega}\nu\ \epsilon\upsilon\tau\omega\varsigma$ $\delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\ \beta\alpha\rho\acute{\iota}\alpha$ $\eta\gamma\epsilon\iota\ \lambda\acute{\alpha}\tau\omega$ $\phi\epsilon\rho\epsilon\delta\alpha\iota$ $\pi\epsilon\phi\upsilon\kappa\acute{\omicron}\tau\alpha$, $\tau\acute{\alpha}\varsigma\ \epsilon\iota\varsigma\ \alpha\pi\alpha\upsilon\varsigma\alpha\ \tau\acute{\omicron}\pi\omicron\rho\ \epsilon\chi\epsilon\iota\ \lambda\iota\upsilon\acute{\nu}\iota\sigma\iota\varsigma$. $\alpha\lambda\lambda\ \eta\ \delta\iota\alpha\ \tau\acute{\omega}\nu\ \nu\sigma\iota\gamma\acute{\omega}\nu$ $\tau\acute{\omicron}\iota\varsigma\ \mu\upsilon\omicron\iota\upsilon\ \alpha\pi\acute{\omicron}\ \tau\acute{\epsilon}\ \alpha\phi\chi\acute{\eta}\varsigma$ $\epsilon\pi\iota\pi\epsilon\mu\pi\omicron\mu\epsilon\lambda\acute{\eta}\nu$ $\lambda\acute{\upsilon}\nu\alpha\iota\mu\iota\varsigma$. $\delta\iota\omega\rho\ \delta\chi\eta\mu\acute{\alpha}\tau\iota$, $\eta\gamma\epsilon\iota\ \pi\acute{\epsilon}\rho\iota\omega\mu\alpha$ $\alpha\lambda\ \lambda\iota\upsilon\acute{\nu}\iota\sigma\iota\varsigma$ $\alpha\upsilon\tau\acute{\omicron}\iota\varsigma\ \delta\acute{\epsilon}\gamma\iota\upsilon$, $\eta\ \delta\tau\acute{\alpha}\rho\ \mu\epsilon\lambda\acute{\eta}\ \alpha\pi\omicron\lambda\acute{\epsilon}\iota\sigma\eta\ \tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\omega\varsigma$ $\alpha\pi\acute{\epsilon}\lambda\lambda\upsilon\sigma\iota$ $\delta\epsilon\ \tau\acute{\alpha}\ \pi\alpha\rho\alpha\lambda\epsilon\upsilon\mu\epsilon\lambda\acute{\eta}\alpha$, $\lambda\alpha\tau\alpha\phi\epsilon\rho\epsilon\tau\eta\ \eta\gamma\epsilon\iota\ \pi\acute{\iota}\nu\iota\varsigma\ \lambda\acute{\alpha}\tau\omega$ $\lambda\iota\kappa\omega$ $\delta\acute{\epsilon}\gamma\iota\upsilon\theta$ $\epsilon\pi\acute{\iota}\rho\acute{\rho}\eta\upsilon\sigma\alpha\iota$ $\epsilon\delta\theta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\ \mu\acute{\epsilon}\iota\alpha\ \lambda\acute{\iota}\nu\kappa\iota\varsigma$ $\alpha\pi\omicron\lambda\acute{\epsilon}\iota\pi\epsilon\tau\alpha\iota$ $\tau\acute{\omicron}\iota\varsigma\ \epsilon\upsilon\tau\omega$ $\pi\alpha\theta\acute{\epsilon}\sigma\alpha\iota$. Hoc est ut linguarū rudes intelligant: Tremor itaq; fit imbecillitate facultatis, quae corpus vehit, mouetq;. Quippe animalium particulae, tam graues cū sint, & deorsum ferri natae, non ex seipsis nimirum motiones, in omnem locum habent. Verū facultas quae à principio per nervos musculis transmittitur ceu vehiculum quoddam, & ala motionis ipsis exisistit, quam cum prorsus perdiderint, perdunt autem resoluta deorsum feruntur, caduntq; auiis pennis destituta modo, unde nullus motus ita affectis relinquitur.

Cc

In oleum descendant. Hoc est in solium oleo repletum, quo olim
uti solebant, resoluti, contracti, arthretici, tremuli. Grace est ἰμβρῖ-
σιον εἰς ἰλαιον. Celsus descendant in solium, ait.

IN XXII. CAPVT.

Quanam ex affectione corporis. Hec in omniū particularū
morbis obseruandum docet Galenus, ut corporis primū affe-
ctionem, quam vulgus dispositam appellat, graci διαθεσις, antuea-
mur. Nam hac neglecta, quicquid particulis admoueamus, sinistre
accidit. Ceterum hoc te admonitum volo candide lector, ubi in ver-
sione mea dictionem inuenis, affectionem, pro διαθεσις, positam esse,
intelligas. Nam dispositio hoc in significato apud idoneos autores non
vsurpatur.

Affectio.
διαθεσις.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore natu-
ræ alieno. Postrema clausula, naturæ alieno, male in codice graco
habetur, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν. Vbi legendum πρὸς τὸ κατὰ φύσιν.

Græca de-
prauata.

Membrana
adnata. Membrana adnata. Intellego membranam coniunctam, siue
coniunctiuā, ut barbari appellant. Graci τὴν ἐνταυριότητα, eo quod
alijs quæ oculum ipsum constituunt, tunicis extrinsecus adnascatur,
ligamentum & ipsa existens totiꝫ oculo ad ossa circumiacentia, ex
pericranio ducens originem.

De deflexionis impetu.

Angiologia
Arteriotom-
ia.
Hypospatis-
mus.
Perisphyph-
mus.

Angiologiam, arteriotomiam, hypospatissimum, & periscy-
phisinum. Omnes has rationes Paulus libro sexto complexus est.
Prima est venarum in fronte ad tempora præsectio quod in hemicra-
nijs etiam fieri solet. Altera est arteriarum retro aures per trans-
uersum sectio. Tertia est ab instrumento chyrurgico appellationem
sortita, quasi dicas spatæ submissio intra partes quæ à subiectis libe-
rabuntur. Quarta ratio est, qua diuisionem in fronte à tempore ad
tempus transversum moluntur, cura tamen adhibita ne temporaliū
musculorum motus violetur.

Oroscius.
speculariū.

Recte huic specularium. Hic legit Oroscius σφειλάριον, ut
significet σφειλλω, hoc est, ficulam cupiditate magis reprehendendi,
quàm ratione adluctus. Diligens homo non legerat apud Galenum
hoc remedium citari pro lapide speculario: nec etiam apud Paulum
qui lib. 7. hunc in modum habet: σφειλάριον, εἰ δὲ δια μὲν τὸ σφει-
λάριον, ἢ τινος, ἀντὶ σφειλλῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς χερῶν, ἀπὸ καὶ δια-
φάνος παραγορεύεται γυψῶδες ὑπάρχον τι τοιοῦτον, δύναμιν ἔχον
παραπλῆξιν τοῖς λευκομένοις ὀφθαλμοῖς ὡς οὐ σφειλῶν. Si verò fex cō-
busta quæ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, cer-
te elo

e elotam esse oporteret.

Xerophthalmia. Celsus lib. 6. interpretatur aridā lippitudinē. Est enim, inquit, genus aridæ lippitudinis, ξηροφθαλμία, græci ἀ- ξηροφθαλ-
vellant, neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum do-
ore quodam grauescunt, & noctu præ graui pituita inarescunt.

Ertropion. Hoc viciū est inferioris palpebræ, quod parum sur- Ertropion.
sum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiori committi.
Id interdum accidit ex mala curatione, interdum ex senectute.

Aegilops. Est veluti parua fistula maioris anguli, per quam pi- Aegilops.
tuita assidue distillat. Nonnunquam etiam exeso osse vsq; ad nares
penetrat.

Lixiuio quod ex cinere & calce. Græce habetur absolute πρω-
τοσάκισ, quasi dicas, primario lixiuio. Paulus lib. 7. habet: αὐτὸ πρῶ-
τοσάκισ καὶ τιτάνου ἢ τετρα λικουτικὸν ἀργάσει τὴν κοιλίαν ἢ δὲ
καὶ πρῶτῳ αἵματι ἐνομάσει. Quæ verba Orosius non videtur in- Orosius.
tellexisse, dum interpretatur cinerem lixiuum, qui primus distillaue-
rit, secutus Hermolaum. Recte igitur quis interpretetur lixiuum,
quod per cinerem & calcem distillauerit.

Cum manus opera. Hoc remedium in exemplaribus vulgatis
non est, sed in Lascaris codice manuscripto additum inueni. Si itaque
placet ascribere, aut expungere, per me certe licebit.

Chalazion. Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digi-
to huc, illuc impellantur curationem manu præstandam docet libro
sexto.

Encanthis naturalis. Varijs de causis hoc viciū gigni solet. Encanthis.
Interim ex vngue parum exciso, vel ob tuberculum, quod palpebras
parum diduci patitur. Quod si vngue caruncula nimium abscindatur
putrescit foramen per quod postea humor descendit, ac viciū superio-
ri contrarium nascitur, quod græci ἐνὰ δα nominant.

Terra samia. Duplex ea terra apud Dioscoridem habetur, una
simpliciter terra samia dicitur, altera γῆ ἀστὴρ, hoc est, terra aster, ἑνὶ αὐτῷ.
quasi dicas, terra stellata. Celsus itaq; ubi posterioris mentionem fa-
cit: Terra, inquit, samiae, quæ ἀστὴρ dicitur. Non ut Orosius vole-
bat, terræ asteris, obscure nimium. Cæterum ante hoc medicamentum
in græco exemplari est διὰ μύλῃς perperam, pro διὰ ἀμύλῃς, quod etiā
Orosius annotauit.

De oculis purulentis. Duæ sunt apud Græcos diciiones, quæ
fere in omnibus sibi respondent, nempe ὑπὸ πύ & ὑπὸ πύριον. Pri-
ma significat pus subesse membranae cornea. Largus & Celsus ro-
cant oculos purulentos: altera dicitur, teste Galeno, quasi ὑπὸ πύ.
ὑπὸ πύριον.

Orosius. ὠπας, hoc est, sub oculis. Ac veteres latini hoc vicium appellant, sug-
gillata, genere ecchymomatum comprehensa. Parum prudenter Oro-
scius, dum in aliorum erratis castigandis occupatur, ipse in grauissi-
mum incidit, qui πύρον, quod est, purulentum, conuerterit suggil-
latum.

Arida medi-
camenta. Floris æris. Hoc medicamentum in impressis non habetur, sed in
manuscripto codice Iani Lascaris scriptum inuenitur.

3 pte. Contritis ad læuorem aridis. Hoc est, aridis in tenuissimum
puluerem redactis. Græce est λεύκας τὰ ξηρά, hoc est, lævigans ari-
da. Celsus autem de Aridis mentionem facit libro quinto, capite vi-
gesimo secundo in hunc modum: Quædam mixtura medicamentorum
sunt, quibus aridis, neq; coactis vitimur, sic ut inspergamus aut cum
aliquo liquido mixta illinamus. Alia medicamenta sunt his opposi-
ta, nempe, que liquari possunt. Hæc græcis τικτὰ nominantur. Vbi
itaq; Galenus aliq; habent τὰ τικτὰ τήνωντ, τὰ ξηρά ἢ λεύκην δὲ
ἢ λεωπίδην. Latini scriptores exponunt, que liquari possunt, ad ignem
eliquentur, arida conterantur: Celsus inquit libro quinto, arida ex eo
conteruntur. Rursus arida medicamenta contrita humore non pin-
gui coquuntur. Item arida ex aceto teruntur. Largus simili vititur
locutione, & verbum λεύκην δὲ lævigare oportet, interpretatur.

Orosius. Que cum ita sint, immerito Orosius nos reprehendit, negans lati-
ne, & fideliter dictum, aridis contritis, cui magis placet, pulueribus
dilutis. Et si apud nullum idoneum scriptorem huiusmodi locutio in-
ueniatur.

Orosius. Sublinimus medicamentis. Hic queso candide lector animum
aduertas cauillationi Orosij. Damnat me quod verterim ex græco
τοῖς τοῖς τὰς παλαιὰς διαβίσεις, medicamentis que ad veteres affe-
ctiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyrijs. Quasi vero col-
lyria non sint medicamenta. Certe ego à preceptoribus meis olim di-
dici, substantiam collyriorum, esse & dici medicamenta: ipsum vero
nomen collyrij, formam medicamenti indicare. Celsus li. 6. ita inquit:
A secundo die graui quoq; lippitudini per medicamenta recte suc-
curritur. Item in collyrio trygodes. Quo grauior quoque inflammatio
est, eo magis leniri medicamentum debet.

IN XXIII. CAPVT.

AN ob exteriorem causam acciderit. Ex octauo Oriba-
sij hæc mutuatus est. Exterior autem causa, est ventus frigidior,
aut lauacrum aque frigide, similiaq;. Hæc itaq; solent interrogari,
an

Elío. Quamquam in eo nulla sit hyssopi herbe mentio, sed lanarum potius succidarum. Nonnulli autem adiiciunt hyssopum herbam.

Græca vitia
ta.

Bulborum, polentæ. Admonuit Orosius græcum codicem esse viciosum, qui habet: βολβῶν ἀφρώων pro βολβῶν ἀλφίτων &c.

IN XXIII. CAPVT.

Linamento-
rum genera.

σπειρίον.

ξύσιον.

ἐλλυχνιώ-

τίον.

πειραπει-

σκιόν.

σφήνισκος.

λημνικός.

Linamento ex ellychniis contorto. Varia sunt apud græcos *μωτῶν*, hoc est, linamentorum genera. Aliud vocant *σπειρίον*, quasi dicas tortile, aliud *ξύσιον*, hoc est, rasile, aliud *τιλτίον*, quod est concerptum filatim, aliud *ἐλλυχνιώτιον* ex ellychniis preparatum, aliud *πειραπεισκιόν* à pudendi humani similitudine nuncupatur: aliud, quod cunei formam referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut coniuncta separet, *σφήνισκος* & dicitur. Vt Paulus sexto vocat *σφλωίσκος* & *σπειρίος* ἐν *ράκκος*, hoc est, cuneolos intortos ex panniculo. Adhuc aliud est *λημνικός* græcis dictum, implicitum in longitudinem linamentum, si Celso credimus, quod alibi vocat linamentum inuolutum & oblongum. Sicut *σπειρίον* linamentum implicitum, seu intortum simpliciter appellari possit.

IN XXV. CAPVT.

ῥεγμός.

ἄλστρον

λευάμιον.

ἔτυον.

λεονύον.

Pisana fresca. Hoc est confracta. Græce est *ῥεγμός* ἢ *ῥεγμός*. Vt *ῥεγμός* significet omne id quod fersum est, vel ipsam confractionem, omnium scilicet, leguminum, nomine tamen ipsorum appposito, ut *λεονύος ῥεγμός*. Cui vero simpliciter *ῥεγμός* ponitur, de faba fresca dicitur. Que si molam experta sit: *ἄλστρον λευάμιον* & *ῥεγμύον ἄλστρον* appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & reliquis leguminibus fersis paratum, *ἔτυον*, ex fersorum autem farina pulmentarium, *λεονύον* & Galeno cum alibi, tum in libello de bonis malisq; succis generandis nuncupatur. Quoties autem in Paulo alijsq; græcis inuenitur *λευάμιον ἔτυον*, pro faba fresca elixata ad ferculum intelligito. *λευάμιον λεονύον*, pro fabæ fersæ farina elixata ponitur. Sic *ῥεγμός λεονύον*, & *ῥεγμός λεονύον*, aliorumq; leguminum dicitur. Vbi verò hac vox *λεονύον* sola citra alterius adiectionem ponitur, Luthem uni significat apud medicos. Orosius male *ῥεγμός* pro lomento tantum usurpauit.

Orosius.

ῥεγμός.

Ephelis.

Lenticula.

Ad Ephelidem & lenticulas. Ephelis asperitas quadam & durities mali coloris est in facie lenticula & in alia parte nonnunquam nasci solet. Celsus ineptias putat curare varos, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata.

Suggillata. Græci vocant *ὠπία* ut antea annotavi. Sunt autem

tutem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alij plerique medici appellant cutis affectum, quo venis in ea tenuibus contusis sanguis inde effunditur, qui ita excretus non vno in loco, nec subito concrevit. Temporis spacio liuescit, migrescitq; cutis.

Cum melle adinouero. Galenus habet in eodem medicamento, ἔστι ἀντιφλογικὸν ἀδινάμειον & ὀλίγον ἀναισθητικόν. Hoc est aceto excepta, mellisq; momento subacta.

IN XXVI. CAPVT.

Dentium dolorem. Ex quinto Galeni de compositione medicamentorum secundum locos ad verbum hoc caput est transcriptum, nisi quod ubi Paulus ad inflammationem habet, Galenus & Oribasius ad dolorem dentium medicamenta subscribunt.

Ad parulidas Parulis græca dictio est, ἀπαρὺς quod est iuxta, παρὺς & ὅλῳ hoc signat gingiuam. Celsus libro sexto, capite tertio decimo: Solent etiam interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quadam oriri dolentia παρὸνδιδας græci vocant.

Tonsillæ. Glândule quadam sunt in ore utrinq; singule penitus sitæ spongiis similes, quæ humiditates ex capite recipiant ad fauces παρὸνδιδας humidandis παρὸνδιδας græci nominant, quæ si post inflammationem induruerint, ἀρσενικὸν appellantur.

Vua. Grace est luvris, quod ad verbum sonat columella. Est autem hac carnosæ quadam particula, in summa oris parte suspensa vocis plectrum, recipit ea maiorem à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iusto humiditatis recipiat, interim laxatur, ac fastigiata descendit, interim inflammationem experitur, & ne potius, nec cibis denorari possit impedit. Veteres græci παρὰπαρὸνδιδας & λυῖν παρὰπαρὸνδιδας recentiores λυῖνδιδας appellant. Παρὰπαρὸνδιδας vero quasi dicas vuam. par- tem ipsam appellari non vult sed affectum. Celsus aliq; latini scriptores etiam partem, vuam nominant.

Vbi æqualiter crassa fuerit. Paulus præter Galeni morem λυῖνδιδας appellandam particulam censet, ubi in æqualem crassiciem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albâq; cernitur. Interim ima crassa, summa tenuis, & liuida est.

IN XXVII. CAPVT.

Angina. Apud recentiores medicos varia sunt angine nomina nunc per literam n. nunc per c. m. hoantia. At Galenus commentario tertio in prognostica Hippocratis parum interesse dicit, modo de re ipsa constet, λυῖνδιδας, an λυῖνδιδας proferas. Ibidem etiam tres anginae species enumerat ex Hippocratis sententia: Pessima

species anginae.

quiens, agunt, qui vehementer quidem dolent nullum autem in ceruice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem non difficulter spirant, verum dolent grauiter, collum ipsis intumescit, fauces apparent rubicundiores. Postremi neque dolent, neque agere spirant, ita ut suprema gutturis pars λάρυγξ graeci nominant incolumis quidem ipsis permaneat, sed fluxio magna parte biliosior aut in fauces, aut in collum, aut in utraq; descenderit &c. Rursus libro quarto de locis affectis quatuor species recenset. Paulus item noster quatuor enumerat, pro musculorum vel interiorum, vel exteriorum inflammatorum ratione. Ego sane musculos primum intelligendos puto, qui in ore circa linguam ex omni parte habentur: qui superiores palatum versus eam mouent: qui inferiores deorsum. Laterales in latera adigunt. plurimi ex osse & graecam literam υ referente produnt. Deinde duodecim proprios summae arteriae parti quam λάρυγξ vocant, oculo autem communes, qui scilicet laryngem corporibus vicinis colligant: necnon eos qui ceruicem constituent. Iam musculis qui αφοφαγο subijciuntur, inflammatis, angina quadam eriri solet.

φάρυγξ.

Faucium pharynga graeci vocant. Magna harum vocum ambiguitas apud authores inuenitur. Unde fit, ut plerique graecorum librorum interpretes mirum in modum torqueantur & subinde etiam aberrant. Itaque φάρυγξ duo significat, nempe fauces, & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulae, tum asperae arteriae extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt hoc pacto: φάρυγξ θυληκὸς σημαίνει τὴν λυγρίως φάρυγξ ἢ δὲ ἑστὴν ἢ ἀχενία ἢ μετὰ τὴν φάρυγξ γλώττης εἶσιν, ὅτι δὲ ἀρσενικὸς σημαίνει πολλάνισ τὴν λάρυγξ. Quae verba sonant ita Pharynx faeminino genere prolata, proprie dictam pharyngē, hoc est fauces significat. Haec autem est oris ampla capacitas post linguae radicem sita. Masculino autem genere dictus pharynx, laryngē, quod est, arteriae asperae summum vel ipsam arteriam signat. Hippocrates libro prognosticon per dictionē φάρυγξ in faeminino genere fauces etiam intelligit, cum ait: φάρυγξ δὲ ἐλκευμένη σὺν πύρεϊ δεινὸν Paulus post, αἱ δὲ λυγχαὶ δεινόταται μὲν εἰσι, καὶ τάχιστα ἀναίρεσιν, ὁκοῦται μὲν ἐν φάρυγι μολὴν ἐν δὲ λάρυγι ποιοῦναι, hoc est: Anginae grauiusculae sunt, & cito interimunt, quae neque in faucibus, neque in collo quippiam manifestum edunt &c. Hanc sententiam Galenus exponens inquit: ὅτι φάρυγξ τὴν προκειμένην χάριν τομάχου τε καὶ λάρυγξ δὲ θυληκὴν σημαίνει. Hoc est: Quod pharyngem nominat regionem, gulam & asperam arteriam summo prepositam, nemo ignorat. Rursus φάρυγξ δὲ τὴν ἐν τῷ λάρυγι τὸ εἶμα, καὶ πύρεϊ τὴν γλῶττιν.

γλώσσω λέγω φαινόμενον ἐνρυχωρίαν ἐν ἢ τὰ δύο τόματ' αὖτε τὸ
 τε το τόμαχος, καὶ το λάρυγγ. At pro larynge, & aspera arte-
 ria posita, non solum in masculino genere, vt Suidas putat, sed etiam
 in fœminino inuenias: praeipue apud Galenum, vt secundo de placi-
 tis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τ' ἡραχίας ἀρτηρίας ἢν πρὸς δὲ
 καὶ φάρυγγα προσαγορεύουσιν. Ibidem, ἐπὶ δὲ τὰ τοῖς ἀπασιν ἔξῃς
 παραδείξουσιν σοὶ τὸ τ' φωνῆς ἰδιον ὄργανον τὸν φάρυγγα, καὶ τὸς λε-
 γόμενους αὐτὸν μῦς. Hic pro larynge accipit: de qua ita scribit, octauo
 de usu particularum: καὶ τόγε πρῶτον τε καὶ λεγόμενον ὄργανον
 τ' φωνῆς ὃ λάρυγξ ὀνομαζέται, τὸ ἄνω μέρος ἐστὶ τ' ἡραχίας ἀρτηρίας ἢν
 δὲ καὶ φάρυγγα λεγόμεν ὁμωνύμως τῇ πρὸς το λάρυγγ, hoc est:
 Ac primum, principalissimumq; vocis instrumentum, quod larynga
 nominant, superior pars aspera arteriae existit, quam sanè etiam pha-
 rynga vocant, eodem nimirum vocabulo quo pharynx (id est, fauces)
 ante arteriae asperae caput, nuncupatur. Atque hic in fœminino ge-
 nere vt superius in masculino positum est nomen pharyngis, contra
 grammaticorum opinionem. Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρ-
 γυγα masculino genere prolatum, pro gula extremo accipiat.

Pueris raro talis. Pueris interim vertebrae colli è loco suo exci-
 dunt propter ligamentorum quae eas connectunt imbecillitatem, Unde
 de angina periculosissima oritur, quae nullis cedit remedijs, quare ei
 admonenda manus non est. Intelligenda autem sunt haec, Pueris ra-
 ro talis. Raro quidem, sed tamen interdum angina hac accidit, idq;
 in pueris magis quam adultis, ob causam superius dictam. Hippo-
 crates huius meminit libro secundo περὶ ἐπιδημιῶν in istum fere mo-
 dum: ἢν δὲ τῶν λευκαρχικῶν παθήματ' αὐτὰδε, τὸ ἡραχίης οἰσπέν-
 δυλοι εἶσω ἔρρεπον. τοῖς μὲν ἐπιπλίον, τοῖς δὲ ἐπ' ἐλαττέρον.

Porrò ex strangulatis. Hippocrates lib. 2. aphorismorum hanc
 profert sententiam τῶν ἀπαρχομένων καὶ λευκαρχομένων μὲν πῶς δὲ
 τεθυκέντων ἐν ἀναφύσει οἷς ἂν ἀφρὸς ἢ πρὸς τὸ τόμα, hoc est, Qui
 bus strangulatis, solutisq; nondum vero mortuis spuma circa os ex-
 titerit, non restituntur.

Discussis autem colli. In graeco codice est λευκαρχομένων δὲ τῶν
 πρὸς τὸν ἡραχίον ἐρυθρίματ' αὐτῶν, quod antea verteram, Simulatq; ve-
 ro colli impedimenta dissoluntur, intelligens nimirum vincula qui-
 bus strangulantur.

IN XXVIII. CAPVT.

GRauedo. Celsus libro quarto dictiones graecas eleganter expo-
 nit, λερύνειν grauedinem nominans, λεταστάγμους, vel vt Pan-
 lus habet, λεθαρόεις destillationes.

Tussis. Aquiloniis diebus. Grace est ἐν βορείοις λατάνιας, quod est aquilonis aeris statibus seu constitutionibus. Ego Celsum secutus sum. Tussis. Tussis varijs de causis excitatur, nunc ob intemperiem nunc ob humores, vel tenues, vel crassos ex alto descendentes. Interim ob incineris inflammationem: interim ob pulmonis affectum.

Anaphotici. Anaphoticos. Interpretatus sum eos qui agrè reijciunt, scilicet qui crassa glutinosaq; ex pectore reijciunt, hi enim difficulter propter crassiciem educunt. Sunt qui ad sanguinem reijcientes referant, mea opinione, incommode.

IN XXIX. CAPVT.

Qui febris. expertes. Galenus libro septimo de compositione medicamentorum secundum locos copiosius hac, Aetius item & Oribasius ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo Paulus, nisi sunt. Caterum ἀόδυα suspirium vertit: quod latine etiam dici possit anhelatio.

Acetum scilliticum. Valentia hic commemorat medicamenta, purgationemq; fortissimam, ea nimirum ratione, quod multas numero partes pertransire oportet, antequam ad pulmonem perueniant, nempe os, gulam, stomachum, ventriculum, tenuia intestina, venas meseraicas, venas in sima parte incineris, item eas, quae in gilda habentur, hinc venam cauam, postremo pulmonem.

IN XXX. CAPVT.

Tunica oculi ceratoides. Ex octauo Oribasij haec sunt transcripta. Dixi autem in pinguedinem languescit, pro modice aut leuiter pingues sunt. Grace est ὑποπαραρσι φαίνοντι, hoc est subpingues apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem languescit.

**Explicata
sententia.**

Suffragantibus qui huc req. Grace est ἐπιπρόσθεντων μὲν τῶν αἰσ τῶτο ἀπιδυμῶν. hoc est ad verbum, permittentibus quidem ad hoc numeris. Quae sententia obscura quibusdam videri possit. Hoc autem sibi vult, omnibus quae huc requiruntur indicationibus consentientibus: nempe viribus, morbi natura, aetate, & alijs id genus reliquis.

Hydromalo. Hoc est potione dulci ex malis Cotoneis, melle & aqua confecta.

**Hydrorofa-
tum Aetij
iunioris.**

Hydrorofato. Huius etiam misturam Paulus libro septimo exponit, ex rosas, aqua & melie. Recentiores autem graeci, ut actharius paulo delictiorem compositionem hydrorofatum appellant, ea recipit aquae libras decem, Zuccari libras quinq; hac feruescunt una donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Iri

Iridem insparfam. In Græco codice est ἰρεως ἐμπεπασμένους. male nimirum, pro ἰρεως ἐμπεπασμένους quod Oroscius & Basiliensis castigatur codex.

Epithema. Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda venit. Nam Aëtius eam apponit. Ceterum per resinam, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentia vocabula, Per oēsypum quod in Græco est, ὀασώπω, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aëtius legit οἰούπευ ὕγρῳ, hoc est oēsypi liquidi. Ceteris iridem siccam mandi de- tritam, ac in puluerem redactam.

IN XXXI. CAPVT.

CRuentum sputum. Tribus potissimum de causis sanguis per os educitur. Vel enim exesa parte aliqua venosi generis, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam διαβρωσις, secundam ῥήξις, tertiam ἀναστόμωσις Græci appellant, authore Celso libr. 4. At sanguis vel cōfertim vel paulatim erūpit. Vase quidē eroso sensim educitur, nisi magna adeo sit iactura, ut etiā pars aliqua pulmo- nis, vel eius Cartilaginis reijciatur. aut si casus ex alto, vel compressio vel aliud id genus superuenerit. Rupto autē cumulatim prorūpit, ut in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire videtur. cū ait, εἰ ἡ λύξις διαβρωσις ἐν ἀγγείῳ, ἀλλὰ λύξις βραχὺ τὸ αἷμα ὁ ἀναγωγὴ γίνεται. Nā ille quarto de locis affectis libro inquit, εἰ δ' ἀναβρώσεως ἀγγεία ὑπάρχουσιν αἷματος ἐπὶ τὴν πρὸς τοὺς πνεύμονας βραχέας πύλιναι καὶ τοῖς αἵματι τὸ πνεύμονα ἀρύματα πνεύμασι. Hoc est: At cumulatæ sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt sputa, & acres in pulmonem fluxiones &c. Quomodo igitur hæc cum Pauli verbis cōsentient? Aëtius lib. 8. in istum modum litem dirimit: Quibus ex erosione venarum pulmonis, educio sanguinis contingit, his per intervalla modica sigillatim expuitur. Mox subiicit. Fieri etiam potest ut ex erosione sanguis coacernatim erumpat. Cum enim præcedenti tempore paulatim quis expuerit sanguinem, nec diebus insecutis vel casus, vel alia quadam causa violenta superuenerit, sanguinis tamen eruptio multa prodierit, magnam subesse erosionem oportet. &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reijcitur. Si acriores fluxus in pulmonem destillarint, quæ magnam erosionē pepererint, confertim prorūpit. Non possum satis hoc in capite Oroscium demirari, qui pro dictione Græca πλεῖστος multitudinem verterit, tantus medicus ut ipse videri vult.

Quercus mēbrana. In Græco est Ἀρὺς τὸ ἰνῶδες, καὶ τὸ ἐπὶ τῷ λευκῷ

Membranae
quercus.

λελύφει ἢ βαλάν. In septimo tantum, ὑμνῶδδδ. legitur. Diosco-
rides habet τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιῦ καὶ τοῦ ὑμνῶδδδ. Prima
est interior & subiecta cortici tilia quæ ligno membranacea cohaeret,
altera tunica putamini glandis subiecta. ἰνῶδδδ. itaq; sit ὑμνῶδδδ.
Vtraq; astringendi vim obtinet.

Lectionem
obserua.

Phagi autem & ilicis membranæ præstantiores sunt. Gal.
lib. 6. de simplici medicina eadem fere habet. σφοδρότερον δ' ἐστὶ τὸ ὑμνῶδδδ.
καὶ ἔχει πρὶν &. Intellige τὸ ὑμνῶδδδ.

ἰπύρα.

Cochleare vnum. Exemplum Græcum Basiliense habet λο-
χλιάριον. hoc est cochlearia undecim. quæ mensura magna est ni-
mis, eoq; legendum λοχλιάριον. α.

Fructibus. In Græco erat ἐπώρον. aliàs verti, poma, quod sci-
licet lignosi nihil habeant. verum hic recenset etiam malum puni-
cum extrinsecus durum. ob quam causam, fructibus, dixi, quia la-
tius patet, fructus quàm pomum. Et differentia superius exposita
nonnunquam confunditur.

IN XXXII. CAPVT.

ἰμπύμα.

Puris illuies. Sic interpretatus sum ἰμπύμα: quasi dicas pu-
ris in parte aliqua collectio. ἰμπύμα Purulenti Plinio vocantur.
alii exponunt, pectore suppurati.

IN XXXIII. CAPVT.

Ingu-
lū præ-
cordia.

Pleuritis. Celsus interpretatur laterum dolorem libro secundo,
& quarto. Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco ver-
bum est σπυγνέται, quod signat, simul accedit, assistit, ac quasi
indiuina est.

Vsq; ad iugulum & præcordia. Alij dicunt vsq; ad clavi-
culā, & hypochondria. Ego Celsum imitor, qui claviculam seu λεγέλα
iugulū exponit, & ὑποχόνδρια, præcordia. Distinguit autē postea,
quando ad iugulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

Pulsus
fer.

Pulsusq; durus & ferræ modo inæqualem. Hæc pulsus
species secundo libro exposita est. Galenus eam aperte interpretatur
libro quarto de pulsuum causis in hunc modum: ἐν λόγῳ δὲ ὅτι σκληρό-
τερος ἢ πᾶσι τοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πυρετοῖσι ὁ σφυγμὸς γίνεταί, καὶ
προσέτι γὰρ διὰ τὴν δυσσυστάσιν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλ-
οῦ καὶ μίαν προσβολὴν, καὶ διὰ τὸν ὅτι ἀμφὶν σπυγνέται τὸ ἐν τῇ
νωτῇ τῇ ἐν τῇ ἐξῆς τῇ σφυγμῷ, τὸ διὰ τὴν ἐμπύραν τὴν ἀφ' ἑαυ-
τῶν ἀνάγκη φαντασίσθαι τὴν ἀπ' ἑαυτῶν ὁρμάνου σκληρῆς τῆς
προσβολῆς ἀνώμαλον ἔχουσαν. Hoc est: Bona itaq; ratione omni-
bus qui ob inflammationem febricitant pulsus oboritur durior. Pre-
terea ob intemperiem arterias obsidentem inæqualis in vno istu, &
nimitis

nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta, veluti ferra tangenti manum secans. Ita enim necesse est imaginari eum qui tanget durum instrumentis quod occursum habet inaequale.

Quæ nihil emolitur. Hoc est, qua nihil exspuitur. Sic Celsus loquitur libro quarto.

Atque si tumor purulentus. Hoc est ex inflammatione musculorum externorum collectus, nisi dissipetur, in exteriorem partem scalpello incidi debet. Græce est ἐν τῇ ἐξωτερῇ ἀδιδυμῶναι παρὰ γινώσκου, quod ad verbum sonat, ad exteriora incidi comodo est. Nā παρὰ γινώσκου signat βοηθεῖν, ἐπιτρέφειν, παρέχειν. Hoc Orosius in Albano quem ferè in singulis verbis reprehendit, non adnotat.

Illam namque nisi vel extra, vel intus. Hoc est, nisi per os, vel per aluum fuerit expurgata. Foras enim per cutem purgari non potest.

Remedium est sanguis dimissus. Non dicit qua ex parte mitti debeat. Hippocrates sane lib. 4. de victus ratione in morbis acutis manifesto docet his verbis: ἢν μὲν ἐδύνη ἄνω πρὸς τὴν κεφαλὴν ἢ πρὸς τὸν στήθος καὶ πρὸς τὸν βραχίονα τὴν μὲν καὶ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν εἰς τὸν ὀνότιον ἢ τὴν μὲν καὶ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν εἰς τὸν ὀνότιον. Hoc est: Siquidem dolor sursum ad ingulum, aut circa mamam, aut brachium pertingat, internam brachij venam secare oportet, illa nimirum parte, qua dolor fuerit. Galenus exponens hæc ait: Cubiti internam incidere convenit illius partis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis missione habet: Pleuriticis autem ex ipsa parte que dolet auferendus est sanguis. Hæc obiter posui candidè lector, ut isti Arabum sectatores videant, veteres illos ex eadem parte per initia semper, non ex adversa sanguinem detraxisse.

Pleuriticis
vnde mittendus sanguis.

Solidiore utetur cibo. Græce est κατὰ τὴν ἀδύοτιον. Nam λεπτότερον, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, mulsa sorbitio ex pissa chondro, alijsq; opponitur ἀδύοτιον, qui recte dicitur solidior, qui videlicet magis nutrit. Gal. interpretatur ἡ παρὰ φύσιν φέσιν, quod est adaugens alimentum, quod Celsus dicit valentis materiae. Ut enim tenuis cibo corpori parum adjuvat, aut nihil, sed vires tantum conservat pro tantillo tempore: sic solidior plus corpus alit. Non est quod Orosius alios reprehendat, vertentes ἀδύοτιον solidius. Non nego aliquando plenius posse dici.

Cibus solidior.
ἀδύοτιον.

IN XXXIIII. CAPVT.

Cordis affectus. Gal. cum in quinto de locis affectis, tum vero secundo in librum Hippocr. de ratione victus in morbis acutis commentario de cordis affectibus pene eadē tractauit. Principia itaq; tria in humano corpore existunt, cor, cerebrum, hepar. Hæc autem inter

terim

terim per se afficiuntur, interim ex consensu tum mutuo, tum aliarum quarundam partium. Corde itaque affecto per se, praesens est periculum: secundum locum obtinet cerebrum, postremum iecur. At si ex ventriculi dolore, cor afficiatur, syncope oritur, si cerebrum consentiat, delirium, vel convulsiones.

syncope diff
ferentia.

Syncope appellatam. Syncope totius habitus est resolutio. Sunt autem aliquot eius species, cardiaca scilicet, quae intemperiem cordis, vel inflammationem, vel erysipeles sequitur. Stomachica quae ob oris ventriculi affectum, corde simul consortij lege dolente generatur. Flatuosa, ex cruditatibus constituitur.

παλμός.
Palpitatio.

Noui inquit. Lib. 5. de locis affectis hanc historiam commemorat Galenus, unde etiam haec sunt transcripta. Est autem palpitatio quam Graeci vocant παλμός, qui est teste Galeno περί τῆς καρδίας καὶ παλμός, καὶ σπασμός, καὶ ῥίγος: διὰ τὰς καὶ συνήθειας παρὰ φύσιν, ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello Galenus ostendit his verbis πνιγμὰ παχὺ καὶ ατμώδης ἐν ἰχθὺσι διὰ τὸν ἰχθὺν, hoc est spiritum crassum, & vaporosum qui non habeat exitum. Cordis autem palpitationem humor aliquando generat, in ambiente cor tunica quam pericardion Anatomeni vocant, collectus.

IN XXXVII. CAPUT.

Nam si sola. Ex octavo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos, & ex Oribasio haec sunt translata. Paulus dixit, sola, ubi Gal. habet ἀμικτὸν τὸ τονωτικὸν διωκτικὸν hoc est, non admixtio corroborante praesidio.

Orosius.
Castigatur
codex.

Omphacij drachma. Omphacium est vuae acerbe succus: quem Barbari agrestem vocant. Male in Codice Graco legitur ἐμφακίον pro ἐμφανίον. Orosius neglexit.

Orosius.
Deprauatus
codex.

Augendus autem. Vtiose legitur in Graco exemplari παραύξην pro παραύξην, quod etiam vterque Aristarchus praeterijt.

Aloe trita inspargitur. Gracus Codex perperam habet ἐμπλάσσεται pro ἀδιπλάσσεται nec hoc aduertentibus Aristarchis, sicut etiam paulo post ἐμπλάσας pro ἐμπάσας habet.

De cibi fastidio.

Si cibus quodammodo praeter voluntatem. In Graco Codice est, εἰ βιαδένῃς τὴν φάσιναι τύχῃ. Huius respondet Gal. hoc ad Glaucanem primo: εἰ δὲ ἐνθὺς τὸν ὀλέανον φάσιναι ἰσχυρῶς ὥστε ἀποσφίγειν τὰ σπύγ, καὶ εἰ βιασάμενοι λάβοισιν, ἢ μὴ λαίχην, ἢ μὴ πύλιν λαλῶς, hoc est, quidam vero statim os ventriculi habet affectum, ut cibos auerferentur, & si coacti assumpserint, aut non retineant,

reant, aut male concoquant.

Quam Romani Melcam. Constantinus Caesar Melca præpara Melca.
rationem lib. 18. de agricultura tradit. Est autem lac in feruentes ol-
las, quæ iam acetum incalescendo absorpserint, reconditum acidumq;
restitutum, ut species eius quod oxygala dicitur, videri queat.

Conditum. Constantinus Caesar lib. 8. conditi præparationem in Conditum.
hunc modum tradit: *πεπρωτος πεπλυμενος, καὶ ἐβρυχεν, φεβομι-
νον πικρὸν γυλμαῖα ἢ μέλιτι & ἀτῆνός. α. ὅντα πάλιν καὶ
λινὸς & ας α.*

Maloplacuntion. Hoc est placentula ex malis Cotoneis. Pau-
lus lib. 7. latius exponit.

Sorbtionibus ex oleo. In Græco codice *ἐκτὸς* male legitur pro Castigatur
ἐν τῷ ἰδαίον. Gemuseus vitiosum reliquit exemplar. codex.

Aloe, masuchæ. Masucha compositio, non simplex remediū exi-
stit, habes eius descriptionem libro septimo Pauli expressam.

IN XXXVIII. CAPVT.

CVM tormine intestinorum. Græca dictio est *οἰστρον*, quæ
Largo tormina intestinorum significat, quanquam & dolorem
stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate. In Græco est, *ὡς οἰστρον* & *χλιαρὸς*, qua-
si dicis caliditate tepida. Aetius mediocri dixit.

IN XXXIX. CAPVT.

CHolera est immodica. Cholera commune stomachi & inte-
stinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio, & vo-
mitus est, præterq; hæc, inflatio, intestina torquentur. Bili supra, in-
fraq; erumpit.

Hydromalū. Hoc est aqua ex malis Cotoneis preparata, scriptu-
rā eius habes li. 7. Pau. sumitur aut et per se potui, & cū micis panis.
Horarios seu fugaces. Alias exposui qui sunt horarij quos Plin.
vocat tēporarios & tēpestiuos. Sūt aut hi qui diu asseruari nequeāt.

Suum petunculi. Hoc est suum pedes. Celsus alibi Trunculos
videtur nominare suum pedes inter ea quæ boni sunt succi.

IN XL. CAPVT.

Lenteria. Celsus ad verbum interpretatur hanc vocem, leui-
tatem intestinorum nominans. In hac cibis non continetur, &
quicquid assumptum est, imperfectum protinus redditur.

Cerata ex myrteo. In græco legitur *λερωτά διὰ μυρσίνας* pro
λερωτά διὰ μυρσινών quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam
Aetius habet.

IN XLI. CAPVT.

IMplacabilis desidēdi, græcè erat *ἀπαράτητος* & *προθυμία πρὸς ἀπαράτη-
τον*. Celsus ponit frequēs desidēdi cupiditas: *ἀπαράτητος* & *τ*.

signat inenitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & asidua est. Quidam τεινισμὸν scribendum putant à verbo τείνω, quod est tendo.

IN XLII. CAPVT.

LAtini tormina. Celsus lib. 4. ita inquit, Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consueverunt, δυσκοιλία Græcis vocantur. Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasi librum nonum.

Tenesmi mutatione. Græce est ἐν μεταπρώσεως τινισμῷ, quasi dicas ad verbum ex decentia tenesmi, cum videlicet Tenesmus in dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Corrigitur
codex.
Orosius.

Deinde leniter subcruenta. In Græco malè habetur εἶτα πρὸς γέγον ἀματώδης pro εἶτα πρὸς ἐλίγον ἀματώδης. Celsus etiam quodam loco interpretatur, Leniter subcruenta. Orosius & Gemusæus non annotarunt.

Cochlearum integro tostarum. Græce est κοχλιῶν ἕλκων quod sonat cochlearum totarum quod nostri dicunt, cum toio.

IN XLIII. CAPVT.

Colon. Hoc intestinum apud Latinos scriptores varia sortitur nomina, nunc intestinum crassum, nunc plenius, nunc laxius appellatur, Paulus dicit, cum pars sit intestini crassi, hoc est, recti. Nam rectū octo fere digitos longum, statim colon vocatur, quod tenuibus est crassius. A sinistro rene ad dextrum super ventriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. Quid dicet aliquis, quod Paulus contra Galeni sententiam à dextra ilium regione procedere colon pronunciat. Huic respondeo, Si à tenuibus intestinis numeremus, per dextra ilia prius superneclum colon ad sinistra prodit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexteriolem obliquum conuertitur.

Dolor coli
qualis.

Ex cruciantur præsertim sensu. Græce est ἡ ὀδύνη γίνεταί, μά λιστὰ δὲ κατὰ δεξιὸν τοῦ κόλου ὑπερπνοῦσας συναισθήσεως γινόμενης. quod ad verum sonat. Color oritur, maxime vero iuxta suum Coli, terebrali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hanc doloris speciem lib. 2. de locis affectis exponit his verbis. διὰ δὲ κατὰ δεξιὸν τοῦ κόλου ὑπερπνοῦσας συναισθήσεως ὀδύνῃ σφοδρῶς ὀδύνῃ, ὥς ὑπὸ πᾶσι δυνάμει διατιθέσθαι κατὰ τὸ βάθος αἰσθητικῶς. Rursus in eodē capite, τὰ μὲν δὲ τοιαῦτα τῶν ἀληγμάτων ὥς ὑπὸ πᾶσι φαίνεται γινόμενα.

Brassicæ caule probe polito. Græce erat λεγμῆς λευκῇ λευκῇ θεισμένη. Orosius intelligit per θεισμένη, cocto, quod ἐθεισμένη potius significasset. Præterea Dioscorides leniter feruefactam, si edatur,

tur, aluo idoneam: percoctam vero, aluum sistere.

Iubebis vt lauent, incalescantq; laconico. *Ad humorem pituitosum concoquendū consulit naturales balneas, & Laconicū. Est Laconicum.* autem Laconicum etiā hodie adhuc in vsu, testudo illa thermarum, quæ igne concalsccta vaporem siccū excitat: qui deinde sudorē mouet in corporibus. Columella meminit his verbis, quotidianam cruditatē laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim quærimus. Græca sunt *πυρρὰ δαίηρ ἀκρότερος τοίχους*, quasi dicas de sudare intra ignitos parietes. Non opus erat ponere ignitos parietes, cum Laconici vox hoc comprehendat, sed vt sciolis quibusdam fiat satis, apposui.

Cucurbitæ quā maxime cū flamma. Sic interpretatus sum *κινυαὶ ὡς πυρρὰ δαίηρ ἀκρότερος*, quasi dicas cucurbitæ quā maxime ignitæ. Celsus cum flamma dicit, quem imitatus sum.

Tanquā in crisi, causa. Paulo pluribus verbis reddidi hanc sententiā: *ὥσπερ ἐν λήξει μεταστάσις τῆς κρίσεως*, hoc est ad verbum, tanquam Crisi causa mutata. Is autē sensus est, Colicus hic morbus tandem ex intestinis materia tãquā per crisin expulsa in alias partes finitus est.

IN XLIIII. CAPVT.

Ileos. Morbus hic nomenclaturam ab ipsa parte affecta, vt superius, colicus, accepit. Nā tenue intestinū, vt ieiunum etiā, dicitur. Incipit si ab imo incipias, à cæco, & desinit in ieiunum, in varios implicatum orbes. Quidam recentiores morbum vocant Voluulum. *Ileos.* *Voluulus.*

Colica affectione. Hoc Paulus superius dixit vbi habet: Inter colicas affectiones hæc est grauißima, quæ in Ilei trāsitionē mnatur.

IN XLV. CAPVT.

Colicis in dexteriore potius ilium. Quia per dextra ilia superuectum, ventriculi fundo incumbit lienem & iecur attingens: deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius initio, cæco intestino, dici intelligas. Nam infra sinistram magis partem occupat.

Eiusdem lateris ac è. Hoc signat græce *ἐκ τοῦ δεξιού & ἐκ τοῦ ἑξισ* si *ἐκ τοῦ δεξιού.* Galeno credimus. Hippocrates prior his dictionibus vsus est. *ἐκ τοῦ ἑξισ.*

Hoc inspergi potest. In codice græco perperam scriptū est *ἐκ τοῦ πλάστου*, pro *ἐκ τοῦ πλάστου*. Nam de puluere, non emplastro mentio est. *Orosius.* Aristarchi libenter omiserunt.

Phyllique momento ex mero & melle. Hoc est, phylli modico cum mulso. Nam *ἀκρότερος* nihil aliud est quā *ἐνέμελι*. Contrarium est *μελίπαστον*, quod videlicet ex aqua & melle confit. In græco erat *ἐνέμελι* & pro *ἀκρότερος* &.

Injectione recti syphonis. Lib. 7. hanc rationem indendi canalis recti in vesicam habes expositam. Vocant *ἐκ τοῦ συφώνος* ab instru-

D d

mento λευκότης. Solent autem quassationes corporis simul adhiberi, ut calculus facilius excidat.

Ex vino & oleo rosaceo, vel ex aqua & oleo. Græce est ὁ ὀποδίνος ἢ ὀδοπόδινος. Quidā de vino rosaceo, & aqua rosacea intelligunt: male nimirum: quia ὀδίνος per se oleum rosaceum significat.

Hermolaus. Hermolaus barbarus in corollario suo pace illius dixerim, oxyrhodium interpretatur, acetum rosaceum, pro aceto & oleo rosaceo, ut Galenus, & alij græci accipiunt.

Archigenes in epistola. Idem refert Aëtius sermone undecimo. Ad finē deest particula: in græco habetur enim σινύου σπέρματος λευκότης ἀπὸ μῶ. λ. cum legendū sit, σινύου ἰμὲρ σπέρματος λευκότης ἀπὸ μῶ. λ. Paulo post, amyli cochlearia duo. Perperā character χ. qui heminā signat, ac legēdū est κοχλ. ut sit cochleare. Iterū: σινύου σπέρματος ἢ pro σινύου σπέρματος λευκότης ἢ.

Deprauatū
exemplar græ-
cum.

Nonnihil ex vena laxant. Hoc est ut latius exponit Aëtius, ex vena caua propter amplitudinem osculorū remittunt. Interim per circuitus hoc mali repetit. Per initia ægri nihil mali sentiunt, cōq; nihil tentandum. Sin autem perseveret, occurrendum, aliās gravissimæ symptomata solent provenire.

Aut lixiuium. Simplici verbo dixit Paulus ὁ σακτιών, quod antea quoq; annotavi.

Diabetes.

Diabetes. Multa nomina hic affectus habet, vide Galenū de locis affectis libro sexto. Venit à verbo διάβημι, quod signat, pertransseo. Potus enim quā primū assumptus est, statim transit.

Nota.

Rosato. Forte legendum in græco pro ῥοσάτης ὀδοροσάτης. Nam apud Paulum in septimo nulla est mentio rosati, sed hydroprosati, ubi etiam Rodomelon exponit.

Ex anatome
constant.

Musculus qui ceruicem. Musculus hic transuersus constat fibris, variāq; habet officia. Primum quidem vesicam claudit, licet sine illo claudi possit. Deinde post emissionem urinae cōtractus vniqua; id quod in meatu est, propellit. Præterea quicquid eo exprimente in urinarium meatum incidit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cum urina mordax est.

Resolutionem repræsentat. Græcè est παραλύσεως ἐμφασίς ἢ ἐρᾶσις, quasi dicas, resolutionis emphasi efficit. ἐμφασίς autem est representatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

In succum quidem conuersa. Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autē Paulus χυλοποιηθῆναι, quod est in succum seu chylum redacta beneficio ventriculi. Simile verbum Galen. lib. 8. de compositione medicamen-
torum

χυλοποι-
θῆναι.

torum secundum locos habet, ut antea quoque annotavi: nempe ἐν χύ-
μωτα quasi dicas exuccata. sed hoc plus signat, chilum scilicet à ieci-
nore attractum ita ut liquidior pars sit distributa, siccior veluti re-
crementum relicta. Dicimus itaque Chilum ἐν χύμωτα cum & ven-
triculus probè concoxerit, & iecur attraxerit. ubi vero ille quidem con-
coxerit, iecur autem attrahendi vim habeat infirmam, ἀνὲν χύμωτα
& liquida excernuntur.

Bilis insigniter colorata. Hoc est bilis colore suo abunde exaturata
per aluum descendens vel deiectio mere bilis. Nam Gale. apud Hip-
pocratem interpretatur λεῖτα κορία, τὰ ἀνδροτοχολῆ διαχωρήματα.

λεῖτα κορία.

Quādo iecoris substantia. Græce est ἡ δὲ ἢ ἢ τὸ δόξας αὐτῇ οὐ-
τὴν οὐκ ἔστιν ἢ πᾶσι, quod ad verbū sonat, Iā verò etiā iecoris sub-
stantia cum ea colliquescente: Cum ea, intellige bile. Nā ubi humor
fermè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscunque partis.

Flammeus ardor. Sic fere ubique sum interpretatus dictionem
φλέγμων. Inflammationem verò φλεγμὸν, secutus Celsum.

φλέγμων.

Chamæpyteos radices. Pondus apud Galenum & Alexan-
dram medicum variat. Nam Chamæpyteos drachmæ octo ponuntur.
Verum Aetius cum Paulo consentit.

Adhæc intybum, troximum, & sonchus. Troximum hoc est,
eris per se esui aptum significat. Sereos autē genera iam hepatis affe-
ctibus conveniunt, ut etiam cruda comedi possint.

Troximum.

In quibus calor intenditur. In codice græco habetur τὰ τοῖς
δὲ μὲν pro τὰ δὲ ὅτι. Basilienſis Corrector hoc non castigavit.

Exemplar
græcum vi-
ciosum.

Corruda. Græce est μύρανα, quæ latinis Corruda dicuntur, hoc
est asparagus sylvestris.

Illud autem in summa præcipiendum. Hoc Galenus lib. 8.
de compositione medicamentorum secundum locos commemorat. iecur
& stomachum semper adstringentia cum relaxantibus requirere.
Aliàs sæpe stomachicis syncope iecinorosis interitus suscitatur.

Copton. Sic dicitur medicamentum quod tunditur. Est autem
malagma libro septimo ad duriciem stomachi & iecineris inscriptum.

IN XLVII. CAPVT.

Cottabismi. Cottabismus olim ludus apud Græcos erat, quo vi-
num ex alto fundebant strepitum facientes. Hic autem possit
accipi pro superfusione in partem aliquam, aut pro ruboris excitatio-
ne quo sanguis in exteriora elicitur, hæc dum meliora occurrunt, bo-
ni consule.

Cottabif-
mus.

VT corpus albedo, & pituita colore. Græce est, *ὡς λευκὸν καὶ φλεγματῶδες* τὸ εἶμα φαίνεσθαι ad verbum sonant hac, ut album & pituitosum corpus appareat. Dicit autem de externo colore apparente. Eoque albedo & pituitoso colore vertendum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituitosum apparet, mortui instar. Ex nono Oribasij sumpta sunt.

Codex græcus
vitiatus.

Coqui autem possit etiam in aqua. Perperam in codice græco legit *ὁ δὲ αὖ* pro *ὁ δὲ αὖ*. Ceterum *τὸν χρόνον* de futuro intelligendum est.

φλεγματῶδες
quid.

Ad hæc in arena contacti desudant. Sic interpretatus sum *φλεγματῶδες*. Solent autem hydropici in arena à sole excoacta sepe-
liri capite excepto, ut humiditas meatibus aperta extrahatur.

τὸ λευκὸν καὶ
χρὸν quod vi-
get.

Quia si cum febris aqua subter cutem. Si duo uno tempore vi-
cia infestent, vehementiori insilendum, altero non neglecto, quod
Paulus per verbum *τὸ λευκὸν καὶ χρὸν* signat.

τὸ λευκὸν καὶ
χρὸν.

Calumnia.
παρὰ τὸν χρόνον

Corpus emaciant, colliquantque, releganda. Quidam nasu-
tus propter malè impressum codicem latinum hic me corrigendum cen-
suit, quod liber habuerit eligenda. Quasi vero nescierim quid sit *παρὰ τὸν χρόνον*. Gemusio Luteria indicam legendum relegenda pro eligenda.

Ad perforationem veniendum. Græcè vocatur hac chirurgie
administratio *παρὰ τὸν χρόνον*, hoc est pertusio & punctio. Nam eos qui
asiate laborant, ad peritonæum usque imo in ventre diuidunt, sicut lib.
6. de hydropici comprehensum est. IN XLIX. CAPUT.

Cum lien melancholicus. Galenus li. 9. de compositione me-
dicamentorum secundum locos. Oribasius lib. 9. & Aetius 10.
sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderunt.

Centaurei. Male habet codex græcus *ταυρίον* pro *λεωνταρίον*. nec
tamen hoc castigauit Basilienensis.

τὸ λευκὸν καὶ
χρὸν.
Orosij ex-
por.

Cera libra, terebinthina, Græcus codex habet *λεπὶον τερβιν-
θίνον*, pro *λεπὶον λίβανον*. τερβινθίνον λίβανον. Orosius cum Basi-
liensi hoc neglexit. Cinis ex officina fabrilis. Cinis hic est quem
ferrum dum in officinis fabrilibus ignis, ac malleo tunditur, abicit. Ver-
ba græca hæc sunt, *καὶ τὸν τέρπον καὶ τὸν χαλκόν*; ubi Orosius interpre-
tatur, pro *καλκόν* legendum putat *λεπὶον*. At Gale. li. 9. in
citato primo aqua in qua ferrum ignis sapius extinctum sit, potius lie-
nosis prabet. Paulo post Cataplasma ex cinere fabrilis officina obli-
scit exhibet hoc pacto inquit, *καὶ τὸν τέρπον ἐν τῷ χαλκόν μετ' ὄξος*.

Acetabulum cum oxymelito. Lectio codicis græci deprauata
est: habet enim *ξύδαρον πᾶν καὶ ὄξος μετ' ὄξος*, ἀναγαλλίδος. pro
ξύδαρον μετ' ὄξος καὶ ὄξος ἀναγαλλίδος.

IN I. CAPVT.

SI enim febricitante agro. Græca sonant. ἀμὲν ἢ ἔτι πρὸς τὸν
 ὁρμητικὸν νόσον ἀθροῦς γὰρ ὡς ἐκείνους ἀποπαύει τὸν πυρετὸν. hoc
 est ad verbum. Si enim post febrilem morbum subito ortus arquatus
 febrem finierit. Vide nouum Oribasij, & decimum Aetij.

Si absq; febri alba deiiciantur. Alba quia bilis in meatibus ob- Excrementa
 structa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret. alba.

Seminis autem atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, χρυσάττι-
 aut alio passo. In græco exemplari habetur. μετὰ χρυσάττιος ἢ ἀλ- κερ γλυκύ-
 λον γλυκύς. Aetius meminit passi Chrysattici. Alexander item
 sapius citat. dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis se-
 men cum mulsa Ictericis conuenire.

IN II. CAPVT.

CAusam umbelici prominentis. Hoc vitium vno vocabulo ὀμφαλός
 Paulus vocat libr. 7. ὀμφαλός, quod videlicet aut rupto in ea
 parte peritoneo, prolapsq; aut omento, aut intestino, interim ocioso
 humore umbilicū subeunte; interim carne subnata, aliās sanguine ob
 vene aut arterie rupturam concreto aliās spiritu indidem collecto,
 generatur. Celsus etiam caput facit de umbelico prominente. ἐρεγμός

Fabæ frescæ corticum. In græco est ἐρεγμός λεπύρεον. Significat
 autem ἐρεγμός fabā frescā seu fractā. Dicitur autem etiā de alijs
 leguminibus confractis, nomine ipsorum appposito. Quāquā hic possit
 simpliciter de faba dici λεπύρεον, ut sit fabæ corticum. tu virū
 malis sequere.

IN III. CAPVT.

ASellorum domesticorū qui tacti cōduplicant se in orbē. ὀνιστός
 Sic interpretatus sum ex Largo ὀνιστός ὁ τοῖς ἰδιῶς τῷ εἶ-
 περ, ὀνιστός. Ipse autem addit in pile rotundissime similem. Caterum
 varia habent nomina, πολύποδες enim græcis λευκάδες. Dioscori-
 di λεύκας Galeno appellantur. Nasuntur sub aquarjs vasīs ut ait
 Archigenas. imo etiam omnibus locis humilioribus.

Calcis viuæ partibus duabus. In græco est ὀβύς ὁ λευκός. Na
 ὀβύς ὁ λευκός. In extimā calem significat. Si autem λευκός
 ὀβύς ponatur, pro Lixiuo calcis accipiendum est.

IN IIII. CAPVT.

AQua frigida peruso. Græce est πρὸς τὸν ἰδιῶς ὕδατι ψυ-
 χρω. ante hoc πρὸς τὸν ἰδιῶς habetur, videtur legendum πρὸς
 ὕδατι ψυ, ut scilicet prius intro reprimatur. Nam quid confert prius
 intestinū confricare, quod πρὸς τὸν ἰδιῶς signat. nolū tamen immu-
 tare, quod non haberem quem sequer.

Medicamento tam spisso. Sic verti ἀμολύντο χρῶ. Signat au-

Nota

Amolynto.

Erratum
Oroscij.

tem ἀμείλιχτον non inquinans à verbo μολύνω Coquuntur medica-
menta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint. Liquida im-
mittentis digitos inquinant: dura ac spissa non itē. Est itaq; ἀμείλιχτος
spissitudo qua digiti, aut manus nō inquinantur, quāquā Oroscius
verterit, postquam ex coctura recrementa iam separata fuerint.

IN LIIII. CAPVT.

Error Oro-
scij.

Tenuissimę parti. Sic fere ubiq; παλαιῶ sum interpretatus:
aliquando pollinem, quod Oroscius reprehendit, mihi vero pla-
cet, cum alios etiam doctissimos ita vertisse videam.

ἀφθώτης.

Aphthę ulcere pressos ἀφθώτης in græco habetur. quid sit
ἀφθώτης alibi exposuimus.

IN LVIII. CAPVT.

Priapismus. Galenus ad verbum lib. 10. hæc habet. Vbi male in
codice græco ἐνιμάται legitur pro ἐμμοστω, quod miror corre-
ctore Basiliensem non aduertisse. Nymphæam igitur. Vulgo
nenupharim appellant insigni refrigeratoria vi præditam. Duplex
est eius species: de qua alius.

IN LVIII. CAPVT.

Particulæ.

DE particulis inefficacibus. Hoc loco particulis intelligo, eas
corporis partes, quę generationi dicatę sunt. Barbari caput fa-
ciunt de frigidis & maleficiatis.

Præuatim stellio concrematus. Hoc ex Oribasio sumptum est.

Ætius sermone vndecimo mentionem facit: aliorumq; complurium.

Satyriace. Hoc est medicamentum, quod penem erigat, à satyris
satyri. dictum, qui naturalibus arrectis depinguntur.

IN LIX. CAPVT.

SIn etiam altè descēderint. In græco est εἰς τὴν ἰσχυρίαν & αὐτοῖς
τις αὐτῶν, hoc est: Sin autē profunditas etiā quādā ipsis adfuerit.

Resina.

Iuuat resina fricta. Hoc est sicca & retorrída. Duplex resinę
species est, sicca & liquida. Sicca præparatur, ut Dioscorides memo-
rie prodidit. Liquida viribus conditur, quanquam idem autor ex ipsis
dem arboribus alias esse siccās, alias haberi liquidās autumat. Sicca
græcis φρυγίη nominatur, liquida ἢ ἐν τῶν λιπαρῶν ὑγρῶν, hoc est si
ad verbum exponas, retorrída, & ex viribus seu dolijs liquida.

φρυγίη.

Puluis inspergitur parti vino prius. Hoc est, ista in puluerem
reducta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est, habet enim
προαπενίπρω ἀπίω, pro προαπενίπρω δίνω, ut ego conueriti. Nec
Oroscius nec Basiliensis castigato animaduertit. Triginta nume-
ro. Viciosus est codex græcus, ut qui habeat < α hoc est drachmam
vnā pro λ. quod signat triginta, facili nimirum lapsu. Galenus &
Oribasius vnde Paulus sumpsit, lectionem hanc confirmant.

Ovis venarum quę quod. Ita simplicē dictionē græcā ἀμορφοί

des

des sum interpretatus. Sunt autem venulae quadā recti intestini, ore ^{Hemorrhoi}
hiātes, eo quod statō tēpore sanguinē crassum seculētumq; excernūt, ^{dū differēti}
hamorrhoides appellatae: cum autē apertae non sint nihilq; excernunt, ^{tia}
sed tumidae apparent sanguine in eis suppresso, τὸ φλαῖ graci, Caca, ^{τὸ φλαῖ}
quasi foramen nullū habentes, latinis vocātur. Differūt autē situ et
origine, si Galeno in *Anatomicis* fidē accōmodamus, aliae siquidem
in recto intestino, aliae in ano, aliae in circulari musculo aliū constrin-
gente qui σφρυγίη appellatur, consislūt. Atq; hoc est quod Paulus
dicit, quaedam superius delitescunt, nō apparētes, ob loci lōginitatē.
Quantū ad originē attinet, aliae vidētur ex ramis venae portae, qui ^{situs hama}
omento, lieni, ventriculo cōmunes sunt, propagari: aliae ex caua venae ^{rhoi.}
diuicatu in crura factō, ubi grandis arteria caua venam con-
scendit. Haec itaq; vel ex porta, vel ex caua ortae nūc iusto largius pro-
fluunt, nunc supprimuntur, quando remedia adhibere cōuenit. Sin au-
tem mediocriter fluant, corpus multis morbis liberant.

Infeliciter contabescere. Sic reddidi τὸν ἄποσιτος γίνε- ἀπέσιτος
σθαι. Abusus est Paulus verbo ἀποσιτος pro ἀσίτους, hoc est, ἀφ' ὧν
γίνεσθαι, quod signat, cibum non sentire, contabescere.

Quare cum plures sint haemorrhoides. Ex Hippocrate sum-
ptum est, apho. li. 6. ubi habet, αἱμορροΐδες ἰνδύσι χρονίως, ἢ μὴ μία
διαφύλαχθῇ λίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγορεύσθαι ἢ ἐθίσι. Miror cur Ae-
tius à Galeni sentētia, aliorumq; fere omnium graecorum discesserit,
nullam esse relinquendā censens. Quaedam vero superius. Hoc
est, quaedam in recto intestino habentur: quae superiorem locum occu-
pant, quam quae in ano, & circulari musculo apparent.

Cacae autem. Hoc est cum apertae vena, dolorem mouent, copia
humoris melancholici grauatae.

Cretae sutoriae, aluminis rotundi singulorum. In graeco co-
dice deest ἀνὰ, & στρογύλως per se signat alumen rotundum, sicut
σχιστὴν scissile. Aliqui tamen pro μελάνθρα, legunt σπῆρσις.

Recrementi plumbi rus syriaci singulorum drachma. In
vulgatis codicibus graecis habetur vnciae octo. Verū Galenus & Ori-
basias habent drachmas octo, quod non annotauit Orosius.

IN LX. CAPVT.

Circa statum menstruale tempus. Graci vocant certum pre-
finitumq; tempus πρὸθεσμίαν, vel προθεσμίαν τῶν, & τῶν πρὸθεσμίαν.
μηνῶν ut Budeus etiam annotauit.

Detrahetur autem sanguinis. Hodie sumus timidiore quam
ut libram integram vna vice detrahamus, tantum abest, ut libras
duas & dimidiam auferamus.

Est autem pessus. Descriptio pessarij. In græco codice autem superfluum est ἡτοι, vel in hunc modum legi debet: πικρὸς δὲ ἄγινος ἀνδρομελὲς ἡτοι καὶ σφαγῶν. Aliqui legendum putant ἡτοι καὶ, hoc est, vel aliquid.

Amus, sion. Malè in exemplari græco impresso οἶνον habetur, pro οἶνον aut σίον. utraq; vim semina prouocandi menses obtinent. Paulo post λιπιδες pro λιπιδες substitutum est.

IN LXII. CAPVT.

ἀπὸ τῆς τῆ
λεως.
Erratum
Orosij.

OB legitimum partum. Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, vel ob abortum, illegitimum scilicet partum profusa accidere. Verum quæ ex naturali partu fiunt sua sponte plurimum cessant. Erat in græco ἐν τελείῳ ἀπετέλειται, quod Orosius noster vertendum censuit. In fine partus, quàm eruditè, vel mediocriter literatus iudicare poterit.

Vel combustæ ipsius citis. Lege in codice græco pro λιπαρὸν, λιπαρὸν αὐτὸ δὲ ἐπιτίθει, quod castigatores omiserunt. Paulo post λιπιδες ἄγινος habetur, in hac λιπιδες ἄγινος. Quod etiam annotauit Orosius ex suo exemplari.

IN LXIII. CAPVT.

Vntio ex melle. Sic Galenus libello de prænoscendo præcipit in uxore Boetii, Romanorum consulis. Ita fere sonant verba ipsius: ὑπόκειται τῇ συστάσει καὶ διαίτησι πικρὰ καὶ ἀσθὰ καὶ τὰ πικρὰ καὶ ἰλαχίστεν καὶ βίψας ἰδὼν τὸ σῶμα καὶ ἐτίθει χρίσας ἐν τῷ ἐκναζομένῳ, καὶ διὰ τῶν τῶν καὶ πικρῶν, ἀλλὰ διὰ μέλιτος καὶ μένι καὶ πικρῶν καὶ μὲν ὑποτίθει, hoc est ut rudiores intelligant: Consideraui scopum intentionemq; videlicet insilire ex potione paucissima, ex totius corporis frictione, et præterea vnctione ita preparata, non ex pice, et resina, sed ex melle solo diutius incocto.

Corrigitur
codex Oro-
scius.

Quercus liber. In græco codice habetur ἄγινος τὰ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τὸ πρέμνυς τὸ ὑμνωδὲς. Galenus ita legit, ἄγινος τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τὸ πρέμνυς τὸ ὑμνωδὲς. Dioscorides, τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιῷ καὶ τοῦ πρέμνου ὑμνωδὲς. In Paulo igitur legendum cenfeo: ἄγινος τὸ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τὸ πρέμνυς ὑμνωδὲς. Quod Orosius neglexit, et castigator Basiliensis.

IN LXIII. CAPVT.

DE inflammatione vteri. In ipso titulo græcum exemplar deprauatum est. Habet enim παρυνδύσας pro παρυνδύσας, quod etiam Aristarchi omiserunt.

Tendo me-
dius inter
neruū &
ligamentū.

Dolor capitis, tendinis. Hic nimirum intelligit tendinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrescentiam vermicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adiacentes, illigat, ne errabunda vagetur, vel nervos in sincipite intelligunt.

Per

Per hapsū. Sic reddidi *πίλημα* contra Oroscij opinionem. At *πίλημα*.
Celsus libro septimo ita inquit: Tum multo is oleo perungendus, indu- Error.
endusq; hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus &c. Quod sibi velit Oroscij.
velamen Oroscij, nemo facile intellexerit. Ex lexico suo ita exponen-
dum censuit.

IN LXV. CAPVT.

Praterea vero inordinatæ. Oroscius græcum codicē depraua- Oroscius.
tū dicit, legendūq; putat *πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φοβῆς ἐν ταῖς*
ἐπισυναρίαις γίνονται. hoc est: Febres autē inordinatæ cū horrore in
accesionibus sūt &c. At *ἐπισυναρίαι*, per se febrium accesiones si
gnificant: nisi forte inflammationū accesiones, aut in pure generando
intentiones natura intelligere velimus. Tunc enim, vt ait Hippocra-
tes, dolores ac febres accidunt magis quā in iam confecto. Et tam tu-
malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exemplaria quæ mihi
videre contigit, impressi codicis verba habent.

Aut candidum oleum. In græco est *λευκὸν καὶ μένον ἐλαιον*, hoc
est, dealbatum oleum. Quomodo oleum fiat candidum, ex Dioscoride
condisces.

IN LXVII. CAPVT.

Turpem humorum colluuiem. Græce est *εἰδεχθῆς*, hoc est, *εἰδεχθῆς*.
turpem aspectu, qualis in Elephantorum facie alijsq; parti-
bus videri solet. Usus est eo vocabulo lib. quarto in hac sententia. Ha-
bet enim *εἰδεχθῆς ὅρις δὲ πῶς μένον τὸ πρὸς ὤπον*. Hoc est: Faciem
autem solam aspectu quodammodo tetram horridam & deformem.

Amurca. Hoc sedimentum in aneo vase ad mellis spissitudinem
decoqui solet. Interim torreri in duriciem, seu puluerem. Ac postea
etiam alijs liquidis commisceri.

IN LXVIII. CAPVT.

Helleborisimus. Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit veratri
exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncriticum. Superius exposui, quid sibi velit *μετασυγ-
κρίτικον*, quod alij male re corporaticum interpretantur, nisi forte in-
telligas noxium humorem euocando restauraticum.

IN LXIX. CAPVT.

Sanguinis vero eruptionem. Cum mola scilicet in utero affli-
git, ita curabimus, vt sanguinis profluuiū, quod in immoderata
purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem flu-
xum, de quo supra quoque est comprehensum. Basiliensis cor-
rector dictionem unam expunxit superfluum esse ratus. Nam le-
git. *τὰς δὲ αἱματώδεις ὡπὶ τὸ καὶ τὸν πρῶτον*. Ego ex ipso sensu & ex
Dd 5

plari veteri legendum censeo: τὰς δὲ αἱμορρογίας, ὥσπερ τὰς αἱμορρογίας καὶ τὸν ῥῆν. Primum αἱμορρογίας refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: τισὶ δὲ καὶ αἷμα φέρεται, hoc est quibusdam vero etiam sanguis effertur. Secundum αἱμορρογίας ad caput de immoderata purgatione ubi habet: συνεχῶς δὲ καὶ ἐν ἀμβλύσει καὶ ἰσχυρῶς αἱμορρογῶσιν. IN LXXII. CAPVT.

σπλάγχνον
Interaneum.

QUe interaneum id. In graeco codice est ἐν λαιτέχσει τὸ σπλάγχνον, quod est, quae continent viscus. Appellat vterum, viscus. Ego dixi internaem, nam cor iecur, cerebrum, pulmo, lien proprie viscera appellantur.

Vulua pro-
cidit.

Quidam vero & totam vuluam. Paulus negat totam vuluam posse procidere. At nostris temporibus in vna & altera tota procidere extra sinum vidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc ligamentis suspensam, cuius rei etiam hodie testimonium adferre possumus.

ὑπατμισμοῖς
δυμίσμα.

Vaporibus & suffimentis vaporum. Verba graeca ita habent. ὑπατμισμοῖς, καὶ δυμίσμασι, quasi dicas subuaporationibus & suffimentis. IN LXXV. CAPVT.

ῥαγάδες.

IN vulue ostio. Rime, aut fissa vocantur latinis, quae apud graecos ῥαγάδες, etsi nonnulli ῥολιάδες ita nomenclant. Celsus libro sexto rhagadia appellat.

Subliuida & feculenta. Codex graecus impressus alijq; nonnulli scripti manu habet: ὑποπλιον καὶ τραγωδία, pro ὑποπλιδίων καὶ τραγωδία, ita etiam legendum putat Oros. Gemusaeus autem non aduertit. Volsella praeheas. Graece sonat μύσλη διαπραχέσας. Est autem μύσλη, μύσλη, ferramentum quo aliquid prehendimus, quod Celsus Volsella. Volsella. lam nominat: Neq; quicquam, inquiens, commodius est quam volsella prehendere, sub eaq; quod volumus excidere. Graecus quidam autor anonymus ait: ait τὰς δὲ λειχλασμένας τραφύλας ἀμύπως ἐν τῷ μύσλῳ, καὶ μύσλῳ λαβόμενοι, hoc est: Vnas autem immodice relaxatas volsella praeheas excindimus.

IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα.

AGibba natium regione. Graece legitur ὁ δὲ πόνος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν λαιῶν σφαίρωμα καὶ τὸν βυβῶνα τόπων. Ad verbum sonat: Dolor autem ipsis ex locis iuxta spheroma, & bubonem &c. Quae iam pars sit σφαίρωμα, audi. Autor quidam graecus anonymus ita scriptum reliquit: λέγει δὲ ὁ ἑσφύς εἰς τὸ ἱερὸν ῥῆν, πᾶν ἑνὰ τῶν δὲ τῶν τὰ ἰσχία ὅτι, ἐφ' οἷς οἱ γὰρ τοὶ διὰ τὸ ὅτι εἶναι ὑποπλιμένα μέγιστα ἔχοντες ὑποπλιθῆν αὐτοῖς σώματα σαρκώδη, ὧν τὰ λυγρόματα ἐν τοῖς περιφρῆν εἶναι, σφαίρωματα προσεγγρεύεται. Hoc est ad verbum: Desinunt autem lumbi in os sacrum. Vtraq; huius parte

COXX

xxe sunt super quas nates eo quod ossa subiecta sint maxima. Hinc arnesa corpora ipsis substrata sunt, quorū gibba, inde quod rotunda int, *σφαίραμαζα*, quasi orbiculata appellantur.

In quibusdam & vomitus à radiculis. Ita ferè semper Celsus interpretatur, *ἐμετ* & *ἀπὸ ῥαφαείδων* intelligit autē raphanum. Vide septimum librum, ubi de vomendi modis præcipit.

Lixiuio. Sic grecis *λορία*, aut *λορία τανή* vertimus. Male Oroscius hic *λορίον πωγρωσάνη* lixiuū vertit cinerem, qui primus detillauerit, cum *πωγρωσάνη* sit lixiuium quod cinere & calce adiecta sit, apud Paulum in septimo.

IN LXXVIII. CAPVT.

Non sola particularum. Vide Galenū libro decimo de cōpositione medicamentorū secundū locos. Oribasij nonum, & duodecimum Aetiū.

Et cum absunt. Deest in græco codice particula *ἡ*, ut sit *ἡγὲ* *χωρὶς*. Vult itaque Paulus, ut lauet & cū defluxiones adsunt, & cū non adsunt. Oroscius & Basiliensis corrector omiserunt.

Statim igitur cum quis morbū primum experiri cœperit, sanguinis missio erit tentanda. Nam quas iam fluxio frequenter infestari, ij plus. Pauli sentētia est, ut quāprimū quis fluxione cœperit infestari, mittēdū sanguinē curet. Vbi autē iam saepe eadē fuerit cōsuetatus, præcipue in frigidioribus natura, & imbecillibus. Nescio quid Oroscio in mētē venerit, legenti *ὥς εἶγε φθάσας ἡδὲ πολλὰς ῥαυματιδῆνας, βλάπτουτ* &c. Cū & ratio, & vera sentētia in hunc modū habeat. *ὥς εἶγε φθάσας ἡδὲ πολλὰς ῥαυματιδῆνας, βλάπτουτ* &c. Nō sum ignarus Aetiū ferè cū superiori sentētia cōuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detractio, præcipue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorum recrementis. In his enim antequam dolores obohantur, venam secare oportet, bis in anno &c. At Paulus de ijs mentionem facit, qui iam ex sanguineo temperamento, ad pituitosum inclinant temporis processu, naturaq; frigidiore, ac imbecilli sunt, quæ duo sanguinis missionem recusant.

Anxietatem, & cibi fastidium. *ἀσώδης ἡγὲ ἀνορεξία*, hoc est, anxios & inappetentes. *ἀσὴ* quid sit, antea sum interpretatus. Alii qui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies. Hoc est humor pituitosus per se frigidus, ubi accensus, inflammatusque fuerit temporis spacio, ut viridia ligna, aestuat, incandescitque, & si bilem habuerit
admi

admixtam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admixtionem omittam.

Oroscius.

Bulbi per se: vel cum polenta polline ad ruborem usq; suffricti. Oroscius legit *ἔως συμμιξεως*, hoc est, ad commistionem usque, idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quam rationi & veritati. Non enim ad commistionem usque sunt infricandi bulbi, sed *ἔως ἀμύξεως*, quod est ad ruborem usque in cute excitatum, unde tumor relictus discutatur.

IN LXXIX. CAPVT.

OLeilenticini. Deest in codice impresso τὸ ἀνταρhes, quod Oroscius præ nimia diligentia præterijt.

Minij. Sic verti *μίνης*, Celsum imitatus qui *μίνης σωματικῆς* reddidit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod *μίνης* exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis viuidæ. Hoc est, calcis non extinctæ, Verba duo græca idem significat. *ἀσβεστῆς* & *ζῶον*. Sed primum calcem viuidam per se positum signat, cum dictione *ζῶον* calcem tantum.

Oroscius.

μοτρί.

Emmoton.

Emmoton. Hoc est, medicamentum, quod linamentis filatim cōcerptis excipitur. Nam *μοτρί* linamenta græcis appellatur, quibus ore vulnorum obturari solent. IN LXXX. CAPVT.

Claui. Celsus inquit: Clauus autem nonnunquam quidem etiā calibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis. Hoc est, puluis qui fistularum callis exte- rendis conuenit: Dixit græce Paulus *σπινγγιακὸν ξηρὸν* quasi syringiacum aridum.

IN LXXXI. CAPVT.

IN græco codice habetur *συμμάτρων*, quasi dicas spissamentorum, Oroscius *σύμμεως* legēdū ex veteri exemplari putat. Mihi autē videtur *σίμμεων*, quod est, lupinorum, ut superius citā habetur. Nā de co- ctione met allorum, præsertim sýmmeos in hac re nihil apud bonos au- tores habetur.

Ne manus inquinent. Hoc est, tam sissa duraq; fiant, ut di- gitos iniectos non inquinent, ea enim est emplastrorum crassities. Græci eam *ἀμύλωτος* appellant, ut superius annotauī. Sic disjuncto verbo dixit Paulus, *μὴ μόλεωσάντων*. Nique hæc contra opinio- nem Oroscij, qui in hoc ipso verbo reprehendendū me censuit.

FINIS COMMENTARII

libri tertij.

COM

C O M M E N -

T A R I O R V M I N

P A V L V M A E G I N E -

T A M L I B E R Q V A R -

T V S.

*

I N I. C A P V T.



LEPHANTIA. Morbus hic Græca tantū habet Elephantia.

nomina, vocaturq; ἐλεφας, ἐλεφαντίασις, ἐλεφανσίη.

Ab quibusdam λεοντίασις, aut οατυρίασις. primū

ab elephanto, aliam à Leone, & satyris nomenclatu-

ram accepit. Est autem is nimirū, qui vulgo dicitur

lepra. Græcorum enim lepra cutis tantum asperitudo est. Iam bar-
bary elephantiasim vocant pedum tumorem quendam, qui febribus
superuenire solet, ne te fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidunt. Hoc est digiti pedum manuumq; auricula-
rum summa, pili, nasus, sed hac posterius. Istam speciem efficit atra
bilis ex flaua supra modum naturæ adusta, quæ ideo perniciofa esse
videtur Galeno, quod vehementer erodat, & terram fermentet.

Neque tamen eminentiæ tuberosæ. Sic reddidi μήτε μήν
ἔχθρας. Sunt enim ἔχθραι tumores verrucosi, tuberosiq; in elephanticiis ὀχθραί.
apparentes. Vnde ὀχθράδην ἔλκην vlcera dicuntur prætumidis labris.

Sola capitis adustione. Vide lib. 6. vbi habes expositiū, quomodo
ferramento quinque excitant crustas in elephanticiis. Est autē cap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus. Miror hic Oroscium nihil Oroscius.

vel ex antiquo suo exemplari, vel ingenioso cerebro attulisse: cum &
codex Græcus impressus sit viciuosus, & multi hoc in loco impegerint.

Primum enim habetur in Græco, τὰ μὲν ἀπαλλόμεναι, & τὰ δὲ
πλεονάζοντα cum legendum sit τὰ μὲν ἀπαλλόμεναι, & τὰ δὲ
πλεονάζοντα

Walteres.

Alteres.

ἀφιδρωτική-
εια.

ἀπότμησις.

πλῆθος ἀλτήροι. quod etiam antea in meis annotationibus monue-
ram. Quia igitur Paulus valide exerceri vult elephanticos, prae-
cipit illis saltum, alteres & follis usum. Sunt autem alteres masse
quedam graues, vel ex lapidibus, vel metallis, quales hodie in li-
brandis rebus adhibentur. Galenus libr. 2. de sanitate tuenda in-
quit πολὺν δὲ δὴ μᾶλλον ἐτι βάρει τὰς χερσὶν ἀναίς περιλαβόντων
ἐνατέρη λαταμένους διαπρὶς ἐν λαΐσιν παλαίστρων εἰσὶν ἀλτήρες, ἀ-
βήμας ἔχει ποταίνους, ἢ ἀναλείνας αὐτάς, hoc est: Mulio autē magis
fiet si quodlibet pōdere summis manibus prehēso utraq; seorsum (qualia
sunt quæ in palaestra alteres dicuntur) protēsis aut sursum elatis ipsis
in eodē consistat habitu. Itē eodē in libro exercitiū modū præscribit in
hūc modum ἐνισι μὲν λαταμένους ἀλτήρας ἐν τῷ περὶ ὧν διεσῶτας
ἀλλήλων ὠργύον, ἔτα ἐν μέσῳ ἵσχυς αὐτῶν ἀνίστηται πορευόμενος
τῇ ᾗ δεξιᾷ χερσὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τῇ ᾗ ἀριστερᾷ ἔτι ἐν τοῖς δεξιοῖς,
ἡγεῖ αὐτοῖς ἐνατόρου εἰς τὴν διείξιν λαταμένους τῇ χερσὶ. Ex his satis
liquet, quid alteres apud Martialem, & alios veteres scriptores fue-
rint. At litera una addita ἀλτήρες, dicti, non sunt masse quadā,
sed adminicula, quibus in saltu innitimur: quales sunt cuspides, ha-
stæ, arundines. Galenus horū quoq; mentionē facit libro iam citato, in
hāc sententiā: ἡγεῖ μὲν δὴ ἡγεῖ διὰ τῶν χερσὶν ἐν τῇ ἐν γυμνάσιον
ἐμίσπορον γυμνάσασθαι χερσὶς τοῦ λαταμένους ἀλτήρας &c. Hac exer-
citia supernis partibus valēt, lūbis & obliquis spinæ regionibus. Ba-
siliensis castigator reliquit locum deprauatum.

Insuper melissæ herbæ. Quæ herba ita vocetur nōdū apud ido-
neos authores cōperi nec castigatores locū corrigūt. Aetius eā vo-
cat Milesiam herbam Sermonē tertio decimo.

Conferunt etiā si bibantur. Quia meatus viscerum vi quadā
peculiari adaperiunt, & aluum etiam mouent comprimendo ea quæ
intestinis inherent.

Eandem habet efficaciam. Interpretatus sum ἀφιδρωτική, quæ
desudationes mouet. Sudor autē Celso auctore duobus modis elicitur
aut siccō calore, aut balneo. Siccus calor est & harena calida, & La-
conici, & Clibani, & quarūdā naturalium sudationes, ubi ē terra pro-
fusius calidus vapor, edificio includitur, sicut super Baias in Mur-
tetis habemus. IN II. CAPVT.

VTerq; affectus. Nō de lepra vulgari hic agit, sed de extra-
neo cutis affectu, ut antea monui. Vide Orobasij librū septimū.

In qua corpus cōsumitur. Græce est μετὰ ἀποτμήσεως σώματι &
Est autē ἀπότμησις qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquatur-
que. Sic in externis, lib. 2. de internis usurpatur. Nā psora & lepra
melan

melancholici cutis tantum affectus sunt. Nam si in venis & carne proueniant, cancri vocabulum sortiuntur.

Stercoris argenti. Vno verbo græce dictū ἐλκυσμα & .quanquā ἐλυσμα. etiam σκωρία ἀργυρίου & ἑγκαυμα apud Dioscoridem appelletur.

Lotariorum rubrorum. Græce est λωτάρια ῥυθρα, forte legendū λωτάριον ῥυθρῶν. Hermolaus barbarus Lotariū rubēs quasi diminutiū loti interpretatur, nisi quis nō de siluestri potius dictū accipiat. alij de Aegyptica intelligūt. Citatur apud Paulū lib. 7. Pastellus dia Lotarion ad pudēdorum, sedūq; vicia. Præterijt Orosius. Orosius.

IN III. CAPVT.

Periq; hoc solo impetigines. Has Galenus lib. 5. de cōpositiōne medicamētōrū secūdū locos nominat μετάργας, voce nimirū ex latina & græca dictione cōposita, quod cōtra rationē grāmaticæ fieri videtur. Plinius etiā libro sextodecimo huius meminit, aitq; sub Claudij Tiberij Caesaris principatu potissimū hāc mēti impetiginem inualuisse quidam hanc morbum quem hodie Gallicum, aut Hispanicum vocant, esse opinantur.

IN V. CAPVT.

Leuce, cutis. Leuce vitiliginis species est albida, & altius descēdēs in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes. Duæ vero aliæ restāt, alphas & melas appellatæ Celso, Paulo autē alphas albus & niger. In prima color albus est, ferē subasper, & nō cōtinuus: ut quædā quasi guttæ disperse esse videātur. Interdū etiā latius, & cū quibusdā intermissionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia niger est, & umbrae similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucen pungito. Celsus libro quinto eadē ferē habet: Vtrū autē, inquit, horū aliquod sanabile sit, an nō sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet aut acu pungi, si sanguis exit, quod ferē sit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest.

Experimentum.

IN VII. CAPVT.

Stigmata curabis. Stigmata in vetere medicina dicta sunt, nō Spuncta, sed maculis punctorū quantitate & forma decolorata hominis cutis. Porro latinis etiam in vsu est ea dictio. Plinius enim & Largus aliquoties vsurpant.

Stigmata.

Quod matulae adhærescit. Hoc est, quod in vrina subsidet, hoc nāque matulae solet adhærescere Dioscorides oculorum cicatrices expurgare commemorat.

IN VIII. CAPVT.

Exanthemata. Puslule sunt exiguae Celso, quales ex vrtica, vel sudore fiunt. Interim pituitæ eruptiones, ita Plinio appellantur

Exanthemata.

tur

tur, de quibus hic agitur. Græci etiam *βανθίσαις*, quasi dicas efflorescentias nominant, à verbo *βανθίσαι*.

Cuticula. In superiore pellicula. Græce est *ἐπιδερμίδα*, quam Latine possis interpretari cuticulam. Nam summa pars, & veluti ipsa cuius efflorescentia existit.

IN IX. CAPVT.

Splenio illitas. Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, superimponi oportet splenium è melle decocto.

Salforum esus. Malè in codice Græco est *ποπορὰν*, tu fac *ποπορὰν*, eiusmodi minutias neglexerunt aristarchi interpretem.

IN X. CAPVT.

VThumoris colluies habeat emittarium. Græce est *λεῖψα* *ἐπὶ ῥύσιν*, quasi dicas, ex confluxu. Quidam Græcus autor habet *λεῖψα* *ἐπὶ ῥύσιν* in eodem significatu.

Calidis eruptionibus. Sic verè *ἐκβάλλουσα* feruentibus papulis, *πυρρὰ ματὰ*. Gliscentibus seu manantibus capitis ulceribus, *ἀχῶρα*. Atque hac autoritate veterum.

IN XI. CAPVT.

Ambusta. Latini *πυρρὰ* *ἀμβυστα*, vel combusta, vel exusta, citra ignis vocabulum additum exponunt. Propriè vero *πυρρὰ* *ἀμβυστα* signat vsta igne, eoq; Paulus primum *πυρρὰ* *ἀμβυστα* dixit. Combustionem vero ex aqua calente, *λεῖψα* *ἀνὰ ματὰ* *ἀφ' ὕδατος*. Quamquam & aliæ materie sepe adurant.

Oui albumen. Male in codice nostro legitur *ὠν ἔλαρ*, pro *ὠν ἔλαρ*. Ita etiam Auicenna habet, & Dioscorides. Annotauit id Oroscius.

Ordei farina. Simpliciter in Græco codice est *λεῖψα*, quod est ordeis. At significantius ex Auicenna & Serapione ordeis farina posuitum est.

Illitumq; lintheolo. Malè Græce habetur *ἐμπέσων* pro *ἐμπλάσων*. Id quod neglexit Oroscius, & Basilienis castigat.

IN XII. CAPVT.

OVum integrum. Græca sonant *ὠν ἔλαρ* *ἀνὰ ματὰ* *χωρὶς τῶν ἐρῶν*, hoc est: Ouum integrum sine eruis. Quid sibi velit, eruis, non video, cum nulla sit ante mentio eruorum facta. Puto igitur legendum, *χωρὶς τῶν ἐρῶν*, hoc est, sine putaminibus. Quamuis etiam eruum cæsis conueniat. Hunc locum praterijt Oroscius.

IN XVII. CAPVT.

MAli punici corticibus vino incoctis, rhu & polenta. Galienus eadem serè libro secundo ad Glanconem habet. Unde lectionem

Elionem Pauli corrigendam puto, ut legatur ῥῆτε καὶ ἀλφίτων, pro Castigatur
 ἡνῆστε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, ut bar- codex.
 barorum more loquar, astringendi vi praeditum. Oroscius hunc locum
 sua sponte praterijt, & Basiliensis castigator omisit. Oroscius.

IN XVIII. CAPVT.

CAtaplastmate ex ficis siccatis. Vide librum Galeni iam cita-
 tum. Voco autem ficus siccataς ἰσχάδας: quas etiam Caricas no ἰσχάδας.
 minare licet. Galenus autem habet: Non autem oportet ipsas caricas
 assumere, sed aquam, in qua illa decocta intabuerint.

Si voles magis intendere. Hoc est, si vehementius voles siccare.
 Nam Galenus pro ὑπερβαρὺς habet σφοδρότονον ξηρᾶναι.

Galenus autem memoriae. Libro quattodecimo methodi me-
 dendi meminit, unde etiam Paulus haec quasi mutuatus est. Eadem
 ferè tradit etiam libr. 2. ad Glauconem, & commentario de Tumori-
 bus prater naturam, ubi ad verbum ista habentur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu. Graeca lectio nō-
 nihil est viciata, habet enim τοῖς ἀπὸ συνήμας & μάστιχα χρονίαις
 σιν ἀποστήμασιν, pro τοῖς δὲ ἀποσκήμας & μάστιχα χρονίαις
 ἀποστήμασιν. Nam vna dictio est ἀπέσκημα. Quam Galenus in
 hunc modū exponit: ὁνομάζονται δ' ἐν τῷ τὰς διαβίσεις ἐνέχουσιν ἑταρ
 χυμοὶ τινες ἐνοχλεῦντες ἐτέρῳ μορίῳ, ἡ δὲ ἀλιπύντης ἐν αὐτοῖς, ἐν ἑτέρῳ
 μεταστώσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit
 itaq; δὲ ἀποσκήμας & quod ῥῆτε ἀποσκήμας, ut ait Gale-
 nus. Differunt igitur inter se ἀπέστημα, & ἀπέσκημα, ut apud
 idoneos autores licet condiscere. Non aduerterunt nostri aristarchi.

Locus casti-
gatur.ἀπέσκη-
μα.

Oroscius.

Porro abscessuum generationem. Graecus codex vitiatus non-
 nihil est, ubi habet ὅτι τῶν ἀποσκημάτων γένεσις, pro, ὅτι δὲ τῶν ἀπο-
 σκημάτων γένεσις, dictio δὲ omissa sententiam poterat confundere.
 Oroscius & castigator Basiliensis quantumuis oculati non anno-
 tarunt.

Codex depra-
uatus.

Oroscius.

IN XIX. CAPVT.

CUm inflammatio neque. Inuenies penè eadem in secundo ad
 Glauconem libro. Venti autem νεφῆται membrum emoritur.
 quod alij barbarè exponunt, mortificatur. νεφῆται.

IN XX. CAPVT.

CUm bilis flaua nulli mixta humori. Hoc est, cum sincera bilis,
 nullum aliū humorē vel pituitam, vel bilem atrā, vel sanguinē
 coniunctum habens. Oribasius libro quarto decimo similia habet.

Porri succi cyathi dimidium. Viciatus est codex graecus impres-
 sus. Nam pro βυ. legendum est βυ. ἡμίσει. quod valet Cyathi di-
 uis.

Codex vicia-
tus.

E

midium: Paulo post, myrtei uncia sex, in græco erat Γο. Ι. S. pro. S. hoc est sedecim, pro sex positum. Statim in eadem linea, Vino diluta, græcus codex habet οὐκ ἔστιν, pro οὐκ ἔστιν. Non multo post, recrementi plumbi uncia una. S. græce erat οὐκ ἔστιν μολύβδου ἑξάκοντα. S. Orosius. pro οὐκ ἔστιν μολύβδου Γο. Ι. S. quæ loca nec Orosius, nec Basiliensis Basiliensis corrector aduertit.

Circa tedam. Hoc est circa lignum ad tedam aptatum, cui lana cum alia quadam pinguedine circumuoluitur, ad flammam alendam. cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco reuntur.

Thuris, aluminis scissi. Hic quoque diligentiam Basiliensis Correctoris desidero, qui lectionem græcam & confusam & mutilam reliquerit. Nam habet λίθου σχιστοῦ < . α. quod ad verbum sonat, thuris scissilis drachma nullo sensu. cum legendum sit λίθου σχιστοῦ, ἀνὰ < . α. quod signat thuris, aluminis scissilis, singulorum drachma. distinctione post thuris addita, deinde post σχιστοῦ ἀνὰ.

IN XXI. ET XXII. CAPVT.

ERisypelas. Alii inter latinos scriptores interpretantur erisypelas sacrum ignem. Celsus autem hunc ab illo separat, eoq; maluit græca uti dictione quàm expositione esse obscurus. Vide Galenum secundo ad Glauconem: Aetium libro quatuordecimo, & Oribasij septimum.

Abcessorij tumores. Hoc est qui abcessum representant. sic verti ἀποστήματα ὀνόματι quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygetlon. Tubercula sunt tumida. Celsus græcis nominibus quoq; appellat Babo à loco nempe inguine, cui solet magna ex parte accidere appellationem accepit: quanquam etiam alas, & ceruicem interim infestet.

IN XXIII. CAPVT.

ORibalius. Libro septimo huius tuberculi mentionem. Pauli autem lectio nonnihil est viciata habet enim. ἀδινάδα ἢ ἀντὶς ἀνὰ πύλον pro ἀνὰ πύλον. Paulo post, τὸ ἴδιον λέγει pro ἴδιον λέγει ut sit una dictio. Id quod Aristarchi nostri omiserunt.

IN XXV. CAPVT.

Codex im-
pressus.

CARBUNCULUS. Sic veri græcam dictionem ἀνθράκων id est ad verbum, Carbones. Celsus autē, quem libenter in dictionibus latinis imitor, Carbunculum nominat.

Quod vlcus est crustaceum. Habetur in græco ἀπὸ τῆς λέξεως ὀφθαλμοῦ, quod est, siquidem sunt crustacea vlcera. Ego autem legendum puto pro ἀπὸ τῆς λέξεως ut referatur ad ἀνθράκων. Sua sponte praterierunt hoc, Orosius, & Gemusæus.

Depascaturq;. Sic exposui, κατὰ τοῦτον quod est cum depastione

ne. Sensus est, ita carni subiecte affixa est, ut eam quoq; depascatur. Volui itaq; versionis meae rationem reddere, ne quis seuerior censor nos à verbis ipsis discessisse clamet.

Circumſcribuntur. Ad verbum expoſui *ⲱⲉⲓⲣⲱⲥⲁⲣⲱⲥⲁ*. Si *ⲱⲉⲓⲣⲱⲥⲁⲣⲱⲥⲁ* gnat autem hoc loco circumſcribi, tolli, aboleri. Nam qui carbunculi *ⲉⲃⲁ*. carne obſidentur, facile tolluntur, qui partes ſolidas, pertinacius harēt.

Vel & ipsum similiter dilutu. In Græco codice pro si in facit, quod et si exiguum sensum tamen poterat confundere. Neglexerunt Censores interpretum. IN XXVI. CAPUT.

IN XXVI. CAPVT.

Cancer in qualibet. Hoc caput quasi ad verbum habet Aesculapii libro quartodecimo. Oribasius septimo. Galenus secundo ad Glauconem. Habet autem lectionem depravatam in exemplari greco, $\delta\iota\upsilon\sigma\tau\acute{o}\tau\epsilon\iota\pi\acute{o}\nu\mu\omicron\upsilon\omega\lambda\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ & . Γ.Α. S. quae sonant ad verbum, quale est epithymū pondere viciarum quatuor. At nemo non medicina peritus intelligit nunquam epithymū dari tanto pondere. Legendum itaq; venit in hūc modum, $\delta\iota\upsilon\sigma\tau\acute{o}\tau\epsilon\iota\pi\acute{o}\nu\mu\omicron\upsilon\omega\lambda\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ Γ.Α. S. id est quale est epithymum pondere drachmarum quatuor & . S. Nam Dioscorides, alique eiusmodi ferè pondus admittunt. Miror Orosium tam grauem interpretum Censorē & Genus suum, alioqui in medicinis exhibendis peritum hac non aduertisse.

Orosius.

Codex emen-
datur.

Gemusæus.

IN XXVII. CAPVT.

OEdema laxus quidam. Omnia ex Galeno ad Glauconem, septimo Oribasij, quartodecimo Aetij transscripta sunt. dixi autem indolens tumor, hoc est doloris expers tumor. Vide etiam Galenum libro quartodecimo Methodi.

Affectus qui hominem premit. *Lectio Galeni libro iam citato corrupta est: habet enim το λεατιχων & παλδς.* quod Linacer exponit multitudinis quæ hominem premit, cum legendum sit το λεατιχων & παλδς. *hæc est affectus qui hominem premit.* Galen. codex emendatur.

Tenerrimum ellychnion. Ellychnion est quod ex papyro, sparta, canabe, aut stupatoriū in lucernis uritur. dixi tenerrimum, hoc est molliſſimum. *græci. ἐπὶ ἀλκυον.* IN XXX. CAPVT.

Per subsultum, Grace subsultus dicitur, *Διαπύδνσις*. Galenus libro quinto Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modū, *Διαπύδνσις* pedis ex iuncta quālibet ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato: interrim etiam ex graciliū r. sorū adaperiū nascitur &c. quādo autem hoc fit, sanguis veluti subsultando ex vasis prodit.

IN XXXI. CAPVT.

Ruptio. Vnitatis solutio pro particularum natura, nomen clatu
ra sortitur. In osse græcis *κλάσσις* quasi fractura dicitur, in sphyæ.

carnosis musculorum partibus ex distentione perueniens, ῥῆμα hoc est ruptura, de qua hic fit mentio. Cū autem filamenta similiter tensa rumpuntur, vulsum. In carne vulnus.

IN XXXII. CAPVT.

Exactus quidem scirrhus. Vide secundum ad Glauconem, & quartumdecimum Methodi: Vnde hæc omnia fere sunt translata, quanquam Oribasius antea & Aetius ea quoque transcripserint.

Orosius.
Nota lectio
nem.

A balneo autem in totum. Orosius simpliciter vertit à Lauacris verò continuis abstineant, quod mihi non placet. Nam videtur Paulus præcipere vt in totum à lauacris abstineant scirrhus laborantes, aut si id non fiat, saltem à frequentibus. alioqui dictio συχρὺς ex superfluo fuisset adiecta. Ego itaque lego ἢ γὰρ duabus dictionibus, non ἢ γὰρ vt habetur in exemplaribus. Aetius abstinendum præcipit à balneis medicamentosis quæ atramentum sutorium, alumen, aut sulphur resipiant.

IN XXXIII. CAPVT.

Codex emen-
datur.

Nasturcij. Male in codice græco λαρδαμῶν pro λαρδαμῶν habetur, item σικκῆρας pro σικκῆρας. In fine ἀμυννῶνς δυμῆμας & < .β. Vbi Gemusæus ex codice Ruellij < .β. legit, à quo hic non dissentio.

IN XXXVII. CAPVT.

Orosius.
ἀχρῶ.

Querus folia applicata vlcerebus. Vide Oribasij librum septimum, ex quo Orosius græcam lectionem castigandam putat, legendumque; ἀχρῶ ἀλεύς pro ἀφ' ἀχρῶ vt sit pollen farina, nō aranei telum, quanquam hoc etiam recentibus vulneribus conglutinandis conducatur. Sed malo cum Oribasio legi ἀχρῶ.

Corrigitur
lectio.

Anagallis. Rursus ex Oribasio ponendum anagallis, pro ἀνὰ πάλιν ποιῶ. Expunge periodum. Exemplaria Ruellij, & Lascaris veterem lectionem retinent.

IN XLV. CAPVT.

Myrtha. Galenus tertio methodi fusius hæc exponit. Aetius pro myrrhā videtur, legere, myrtus, non omnino male. nā vlcerebus conglutinandis, si Dioscoridi credimus, efficax est, præterea astringit, & siccatur rosionem quod proposito conducit. facilis erat lapsus μύρρα ex μύρρην, aut μυρτῶ.

Ostreorum. Aetius habet, ostreorum crematorum, item in fin habetur singulorum vncia octo nimirum pro drachmā octo. Nam antiquum lascari exemplar non 70 quod est vncia, sed < habet. Orosius & Gemusæus noluerunt hoc annotare. Rursus in sequenti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur 70. pro < .mox sequi

sequitur, eris combusti singulorū drachma, vbi Codex græcus ro. hoc Deprauā
est vnciam habet. ta lectio.

IN XLVIII. CAPVT.

Si inferius spectet. Galenus secundo ad Glauconem hac fere
ad verbum habet. vnde etiam textus codicis Pauli impres-
si corrigendus est, legendūque, λατάρρεπς δὲ οὐτ' αὐτο
vbi habet ἀναρρέπς δὲ οὐτ' αὐτο, contrario nimirum sen-
su. Galenus autem dicit λατάρρεπς δὲ οὐτ' αὐτ'ς. Idem namque
est λατάρρεπς, & λατάρρεπς. Omisit Orosius & Basiliensis cor-
rector.

Corrigi-
tur græcus te-
xtus.

Etenim in cubito. Sic interpretatus sum ἐν πύχει, quæ vox
græcis significat eam brachij partem, quæ ad manum tendit interius
vlnam quidam recentiores nominant ἀγνώρι flexura ipsa recte dici-
tur. Veteres sanguinē ex cubito detrahi præcipientes hanc intellexerunt.

πύχεις

ἀγνώρι

De finibus diruptus. In græco codice est πρὸς ῥανωδῶν ἐλά-
πων. Signat autem ῥανωδῶν idem quod ῥανωδῶν, ἡγεὶς αὐτῶν γὰρ
hoc est fractus & ruptus. Venit autem à ῥανω, quæ vox significat
pannum & vestem laceratam. Sicut ῥανω apud Aristophanem
vestem vilem, detritam, & pertusam. Hic itaq; ῥανωδῶν abscessui
accommodatur. in quo cutis pus cōgestum integens, erosa extenuari
deteriq; instar pellum detritarum contingit.

ῥανωδῶν

ῥανω

Vt neque admodum sit durum. Mirum est quā Orosius
hic memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionem græ-
cam ἀμύλωτον verterim, manus non inquinans. Hoc autem loco nō
videt à Paulo emplastrum liquidum intelligi cum dicit μῆτε σκλη-
ρα, μῆτε ἀμύλωτον. Galenus ad Glauconem eadem habet.

Orosius

IN LIII. CAPVT.

AT scopus crustam generantium. Hoc est, eo consilium in
crustam generantibus dirigitur, vt calefaciant simul & astrin-
gant. Calx autem calefacit tantum eoq; non ita commode adhibetur.
Hæc sunt ex Rufo, petita.

IN LIIII. CAPVT.

Neruis vulneratis. Paulus hac fere ex Galeni tertio secundū
genera mutatus est, mutato tantū docēdi ordine. Aetius libro
quaridécimo, Oribasius septimo habet eadē. Caterū vocat in neruis
vulneratos, νερὸν ῥωτῶν in tendonibus, τενόνων ῥωτῶν. Curatio νερῶν ῥωτῶν
autem communis est.

Specillo subunctorio. Sic reddidi ὑπαλάσσω. nimirū à ver-
bo ὑπαλάσσω quod subungo significat. deriuato.

Maior conuulsionis metus. Male in codice græco habetur,

E e 3

ὁ μὲν λίνδιω & το σπεπαδῆναι pro ὁ μὲν λίνδιω & το σπαδῆναι.
 Oroscius & Gemuseus non aduerterunt.

IN LV. CAPVT.

ἀγνύλαι.

ANcylas. Celsus & Scribonius eius discipulus, Contractionem, ligationemque articulorum interpretantur græcorum dictiones ἀγνύλαις, & ἀγνυλώσεις.

IN LVI. CAPVT.

νῦν & σω-
δετινά.

NAm colligātes nerui. Hoc loco intelligit per σωδετινά νῦν & σω, ipsa ligamenta. quæ ossa colligant: vocat autem nervos quod eos imitentur. Nam alibi tres species enumerant, alios qui sensum motumq; præbent, alios qui motui tantum seruiunt, ut tendines, alios qui ossæam compagem ligant, vinciuntque.

IN LVII. CAPVT.

Corrigitur
codex im-
pressus.

TRes sunt vniuersæ. Aetius libro pono eundem fere docendi ordinem seruat. Celsus duorum generum meminit, Latorum quos etiam peiores dicit, & teretum, Græci addunt etiam ascarides. Habetur in Græco codice ἀσκαρίδων pro ἀσκαρίδων, hoc est extremorum perfictione potius quàm articulorum. antes notaueram.

ἰσχυρίαις.

Cochleari. Sic exposui ἰσχυρίαις. quod Grammatici Græci dicunt instrumentum esse, quo spuma ab ossis tollitur. Quia igitur nullum commodius vasculum ad hanc rem inueni, cochleari interpretatus sum.

IN LVIII. CAPVT.

Recentiorū
opinio.

Carnem falsam. Recentiores medici carnem suillam pinguem, falsamq; volunt subijci. Aetius pinguedine adæpta subdi præcipit. Tu vide quos imitari malis, utrobique bona est ratio.


FINIS LIBRI QVARTI

COMMENTA-

RIORVM.

*

COM



COMMEN- TARIORVM IN


PAVLVM AEGINE-

TAM LIBER QVIN-

T V S.

*

IN I. CAPVT.



E virulentis bestiis. Hoc libro in multis Diosco-
ridem Paulus imitatur. quoniam Galenus etiam
librum de Antidotis conscripserit post eum Oriba-
sius, Aetiusq;.

IN II. CAPVT.

Homo adhibendus est qui vulnus exugat. Celsus libro quin-
to idem praecepit. Si cucurbitula inqueiens non est, quod tamen
rari incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit: Si ne
id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Graece erat
ἐν τῷ στήθει τοῦ ἰατροῦ hoc est exustione vii.

ἐν τῷ στήθει

Galenus memorie prodit. De vipera multis in locis meminit,
tum in commentario simplicium medicamentorum, tum ubi antido-
ta, confectionemque Theriacae comprehendit.

Aut paliurum. Codex graecus deprauatus particulam ἢ deside- Codex casti-
rat. Legi q; debet, ἢ πάλιρον, quod etiam Oribasius libro octauo ha- gatur.
bet, praterit Castigator Basiliensis. Castigator.

Desudationes. Graece erat ὑδρωτική hoc est, quae sudores mouet, ὑδρωτική.
vt laconicum, aliq; id genus modi, vt scilicet venenum ab internis
foras inuocent.

IN III. CAPVT.

Hydrophobiam. Celsus hoc morbi genus miserrimum, aquae
Humorem appellat. Largus aqua hoc est, liquoris metum inter- Aquae ti-
pretatur ὑδρωφία. mor. ὑδρωφία.

E e 4

ἀπορία. Sudore & anxietate. *Ἀπορία* anxietatem. Est autem proprie ἀπορία consilij, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis nescit, quid potissimum acturus sit. Ruellius vertit ἀπορίαν languorem.

περιστομή. Carnis præscisio. Græce erat τὸ μὴ περιστομήν. quasi dicas circa carnem sectio, vel circumscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

IN IIII. CAPVT.

Celsus. **L**ata manu morsum ferito. Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquit, vulneri imponitur, superq; id duobus digitis verberatur.

πεπρωμένα δὲ γάτα. Ad feruidos autem iam morsus. Græca sonant πρὸς δὲ ἡδὲ πεπρωμένα τ' ἀγμάτωρ, hoc est ad morsus quos inflammatio iam feruida inuasit.

IN V. CAPVT.

Lac ficulneū **E**T lac ficulneum. Hoc est liquor ficulneus sic lac papaueris, lac laseris aliorumq; consimilium pro liquore aut lachryma.

IN VI. CAPVT.

Dioscorides & Paulus variant hic. **S**ed leniter rubidus. Græce habetur ἀλλὰ μετρίως μὴ ὑπερδρῶ, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides impressus habet pro ὑπερδρῶ, ὑπερδρῶ, hoc est humidus. atq; ita vertit Ruellius. Marcellus autem ὑπερδρῶ. quanquā supra Paulus dixerat. ἢ ὑπερδρῶ. vide vtra placeat lectio.

Et viridium cupressi foliorum. Mutilis est codex græcus. Nā desideratur dictio φύλλων legēdumque venit χλωρῶν ὑπαρίστων φύλλων ἢ σφυρίων. Id Oroscius non aduertit nec Gemusæus.

IN VIII. CAPVT.

Particula. **P**articula intēditur. Hic intelligo particulā penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ μορίον accipitur. Dioscorides ὀρθοπέχων huius loco habet, quod est pilorum erectionem.

IN IX. CAPVT.

Confer auctores. **A**t tolliturq;. Pauli Codex Græcus habet ἐπαίρει, hoc est attollitur, Dioscorides vnde hac transcripsit, περισσέπεται hoc est computrescit, legit. Item Paulus δυνάμει ponit pro δυνάμει, hoc est δύσφορον.

IN XII. CAPVT.

νομή. **A**lbū vlcus apparet. hoc est vlcus depascens, quod νομή græcis appellatur,

νότις. Frigidi madoris. hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador initium sudoris est. νότις græce dicitur.

IN

IN XIII. CAPVT.

DE amphisbena Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraque parte ingreditur, vnde nomen illi est inditum.

IN XV. CAPVT.

DRyinus. vide Galenum de Theriaca dictus est à ῥῑς, quod Dryinus. in quercuum radicibus viuat.

Torſiones. Græca dictio est τρῶφοι qui proprie tormina sunt circa umbilicum, omnēque id ſpaciū quod in anteriore parte ab ore ſtomachi ad umbilicū partes descendit hominem torquens.

IN XVI. CAPVT.

Qui hæmorrhoi iſtum. Hæmorrhui & hæmorrhoids ſuis Hæmorrhui. ipſorum nominibus ſimilem hominibus perniciem adferunt. quippe percuſſi ab eis, ſanguine per os, nares, totūque corpore effuſo intereunt.

Redduntur corpora. Græcus codex habet ἀπαώματα. hoc eſt raritatis. Dioſcorides quem Paulus ſequitur, σώματα eoque ſic vertendum duxi. quod Oroſcius & caſtigatoꝝ Baſilienſis præterierint.

Et ſi cicatrix toto corpore. Sic quoque legit Aetius. quanquā Marcellus Virgilius aliter legendum in Dioſcoride ſentiat.

Quem euomentes. Pauli codex impreſſus ἐξωμεινόμενος pro ἐξωμεινόμενος habet. Dioſcoridem ſecutus ſum vnde Paulus hæc tranſcripſit: licet ſententia non multum variet. Oroſcius non dignatus eſt annotare.

Aduerſus feram præſidia. Græca ſonant πρὸς τὸ θηρίον. Oroſcius dum nimis exacte loqui ſtudet, in alijs corrigendis, maxime fallitur. Paulo ſuperius damnauit quendam quod θηρίον beſtiam vertiſſet, ſemper eam dictionem pro vipera accipi affirmans. Cuius hic contrarium vides.

IN XVII. CAPVT.

Natricis morſu vulnus factum. Natrīx primum in terra videtur, & Cherſydios appellatur. deinde in aqua, vnde hydros dicitur. Similis eſt puſillæ aſpide, præterquam quod ceruicem latam non habeat ut aſpides.

IN XVIII. CAPVT.

Naſturciū. Dioſcorides legit καρδάμωμον hoc eſt cardamomū non λάρδαμον quod eſt naſturcium, ſequere utram malis leſionem.

IN XIX. CAPVT.

Reginam Cleopatram. Vide Galeni commentarium de Theriaca, ubi hiſtoriam ampliter comprehendit, ſpeciesque aſpidum enumerat. Oroſcius putat in fine capitis aliqua ex Dioſcoride apponenda. at ego breuitatis cauſa omiſſa exiſtimo.

IN XXIII. CAPVT.

DRachmis duabus. In Aldino exemplari erat Cyatho vno. Basiliensis corrector fecit cyathis duobus. Aetius integram lectionem ita habet. Drachmis duabus ex cyatho vno aceti: Sequenti die drachmis quatuor ex cyathis duobus. Tertia die drachmis octo ex tribus cyathis. hoc praterit Orosius. Lege igitur in graeco < β. μ. π. δ' ζους ρυ. α. τῇ δὲ ἐξῆς < α. μ. π. δ' ζους ρυ. β. τῇ δὲ τρίτῃ < η. μ. π. δ' ζους ρυ. γ.

IN XXVIII. CAPVT.

Historia Mithridatis.

Rex Mithridates. Galenus ea commemorat libro de Theriaca ad Pisonem. unde Paulus transscripsit.

IN XXXII. CAPVT.

Nota.

Ficus arida, item. Transposita et peruersa videtur lectio in Pauli codice impresso. Nam Dioscorides unde omnia haec sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum οὐκὰ ξυγὰ λαμβάνουσιν καὶ τὸ ἀριφύμα δὲ αὐτῶν σὺν οἷνῳ παρασκευάζονται. Ἄν τοι ἡσὶς ἐστὶ τῆς λιωθίνου ὠφελόντης διὰ τὰς βαλάνους ἰδιότης ἢ καλὰσμενὰς σὺν οἰνομέλιτι ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ καὶ ἀπὸ αὐτῶν ἀπαντὰ γένονται. ἰδιότης καὶ γάλα γυναικῶν πίνοντες. Ita quoque nos reddimus. Pauli scriptura ad verbum habet ut sequitur οὐκὰ ξυγὰ λαμβάνουσιν, καὶ τὸ ἀριφύμα αὐτῶν σὺν οἷνῳ ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ οἰνομέλιτι, καὶ ἀπὸ αὐτῶν γένονται. ἰδιότητες καὶ γάλα γυναικῶν λαμβάνουσιν. παρασκευάζονται. Ἄν τοι ἡσὶς τῆς λιωθίνου ὠφελούντης διὰ τὰς βαλάνους ἰδιότης καλὰσμενὰς σὺν οἷνῳ. hoc est iuuantur, si ficus aridas sumant, earumque decoctum cum vino aut lacte bibant, aut mulso, ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebri assumant, ubi periculum lenius fit & declinat, confert, si glandes thebaicas detritas cum vino edant.

IN XXXIII. CAPVT.

Mens impeditur. Graeci habent λαλῶν ἐμποδισμός, hoc est loquela impedimentum. At Dioscorides unde haec sumpsit sunt οὐκὰς ἐμποδισμός ul est mentis seu intellectus impedimentum habet. Ita quoque Aetius libro tertio decimo scribit. Quibus aulibus mutandam lectionem putavi, saluo aliorum iudicio.

Et resolutione viget. Hic quoque viciū exemplaris graeci est. habet enim καὶ ἰαχόσας pro ἰαχόσας, nec hoc annotauit Orosius.

IN XXXV. CAPVT.

Lectio graeca emendatur.

Piscibus virosis. Corrige lectionem graecam muta que ex, ἰχθυὶ βρομάδης. In cetera ἰχθυὶ βρομάδης. Paulo post, ἰχθυὶ δὲ αὐτῶν ἀμαρτμεμὶς μέλας. Mutata est lectio, quae sic instaurari debet.

debet. ὁ δὲ πρὸς δὲ δυσώδε, καὶ ἐμπεδοὶ χαλῶδη ἐνίοτε δὲ αἵματι μεμυ-
μένα. ut nos vertimus. Oroscius & Castigator Basiliensis hæc duo
loca deprauata reliquerunt. Non multo post πονηδάνου male ha-
betur. pro λυωδάνου.

Oroscius.
Castiga.
Basiliens.

IN XLII. CAPVT.

Cum oleo & passo. Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso
habet οὐν ἐλαίῳ καὶ γλυκῆ, hoc est cum oleo & passo, ubi Pau-
lus οὐν ὕνῳ καὶ γλυκῆ. quod est cum vino & passo. Actius tan-
tum ex vino dulci habet, sequere quemcunque voles.

Instauratur
Pauli lectio
ex Diosco-
ride.

IN XLVI. CAPVT.

Praesertim in exurgendo. Hoc est cum è lectulo leuare se co-
nantur, ut ait Largus. Græca sonant, ἐν τῷ βῆαι καὶ στα-
ναι.

Opobalsami drachma cum vino. Dioscorides habet cum mel-
le aut lacte. In primo libro etiam cum lacte opobalsamum valere cō-
tra aconitum tradit. vide an malis cum Dioscoride legere. Ego exem-
plar sum secutus.

Nota.

IN XLVIII. CAPVT.

Totum corpus prurire facit. Græce est λυνισμός καὶ ὅλον τὸ
σῶμα. Dioscorides etiam in hunc modum habet. Largus au-
tem cuius mentionem Galenus subinde facit, pro corpus, habet os in
hunc modum. Ephemerum potum protinus quidem os prurire facit,
velut scilla tactum postea etiam adurit, quasi pipere manducato.
Hæc te, lector, latere nolui.

Largus.

Nota.

IN LIII. CAPVT.

Pharicum dictum. Multi scriptores dubitant, simplex ne sit
an compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.
Nardum syluestre in. In codice Pauli Græco deest ἀγρία. Tu
ex Dioscoride restituito. Basiliensis Castigator omisit.

IN LIII. CAPVT.

VT vinum dulce cum rosaceo. Deprauatus est Codex græ-
cus impressus. habet enim γλυκὺν οἶνον pro γλυκὺν οἶνον. Omi-
sit Gemusæus.

Castigatur
textus Græ-
cus.

IN LV. CAPVT.

Atramentū sutoriū. Hic quoq; viciatus est codex græcus, ha-
bet enim χαλκὸς ἀρὶς & hoc est flos aris pro χαλκονόου, ut sit
atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basiliensis casti-
gator hoc etiam nō aduertit. Largus habet aris flos, sed male opinor.

IN LVI. CAPVT.

Dentes tincti. Græcus codex impressus habet ὀδόντες βιβρω-
μένοι hoc est dentes erosi. Dioscorides ἐν ὀδόντι βιβρωμένοι
quod

Impressum
exemplar
græcum cor-
rigitur.

quod est Dentes tincti. At Aëtius legit gingivæ corrosa. Secutus sum Dioscoridem. Præterijt Gemusæus.

IN LVII. CAPVT.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum. Sic interpretatus sum γάλα ἐμπιτυαδὲν ἀδροῖν. Nā s̄ prius coagulatum est quàm fuerit assumptio, non opus habet, ut rursus Marcellus. congeletur. Longe dissentio à Marcello cui ἐμπιτυαδὲν vertendum censet, cui coagulum sit admixtum. cum Paulus coagulum superbibi cum aceto præcipiat. Sed ἐμπιτυαδὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respirationem impediat. Vbi igitur lac assumptum repente ac cumulatim, in corpore coierit, remedia adserenda sunt.

E' cinere lixiua. Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliq; interpretes lapsi sunt, qui λονία πωλοποιικὴν verterint, nunc lutum excolatum, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quàm è cinere lixiuium, quo & pilotarij, & aliij artifices vtuntur. Sicut apud Galenum ὕδωρ πωλοποιικὸν, quod Largus in eodem medicamento dixerat, è cinere lixiuium, ut aliàs annotauimus.

IN LXII. CAPVT.

Castigatur
codex Graecus.

HOrmini semine. Male habetur in codice Græco ὄρμινον ἀγρίου. neglexit Gemusæus.

FINIS LIBRI QVINTI

COMMENTA-

RIORVM.


*

COM

COMMEN-
TARIORVM IN
PAVLVM AEGINE-
TAM LIBER SEX-

T V S.

*



v m humor oculis. Liber hic sextus curationem tradit, qua ferramentis & manu administratur.

Certe difficilis existit, tum quod nemo hac eo ordine tractarit, tum quod ij vnde transcripsit, non extant. Curabo tamen pro mea fide, vt nihil quod lecto

sextus liber
omnium dif-
ficillimus.

rem remorari possit, indiscussum relinquatur.

Ferramentis nuclei modo rotundis. *λευκοσπῆρες πυγλωσείδες.*

Grace dicuntur *πυγῶνες*, extrema specillorum siue acuta, siue ca- *πυγῶν δ.*

ua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda vt vslio commodius ad-
ministraretur, aliqui nuclearia vocant instrumenta. Celsus tenuibus, Tenuia, retu-
retusisq; ferramentis ait libr. 7. de oculorum humoribus reprimendis *λαγ; ferrame-
ta.*

At in elephantiasi. Paulus hoc lib. 4. iam docuerat, nempe mul- *vslio capi-
tis.*
tos qui ne in totum insanabiles fierent, ex capitis vslione seruatos.

IN III. CAPVT.

HYdrocephalon. Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum *Hydroce-
phalon.*
potest esse, vbi humor cutem inflat eaq; intumescit, & prementi
digito cedit *ὕδρον κεφαλῶν* Graci appellant.

In ociosam inutilemque mutato substātiā. Oroscius omnia *Oroscius.*
grammaticorum Lexica introspectit vt me in dictione Graca *ἀργῶν, ὀργῶν.*
tanquam male eam interpretatum reprehenderet. ac tandem Budai
nostrum in commentarijs in Gracam linguam consulens, *ἀργῶν* in-
uenit significare, contrarium ei quod elaboratum, confectum, conco-
ctumque

Crudum. *Clumq;* est, eoq; exponendum hic censuit ἀργύριον, crudam, non attendens, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquā dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed mordax, acris, crudum vero aut semicoctum succum, sanguinem mutari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudum adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto concoctionem ponit crudorum, vel etiam semicoctorum humorum, educationem acrium. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in venis etiam illis capillis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra vasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam. Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, non potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non item. Quare Orosius hunc laborem castigandi, non alio quā calumnie studio sumpsisse videtur, ipse maxime corripiendus.

λευγρωμί

•••

Orosius.

Pulvino sublimi. eis ὅ••••• λευγρωμί, hoc est, in sublime elevatus, quemadmodum pulvis in superficie tument gibbero exiit.

Et quia paucis particulis subiectus. Orosius coniungit hic sequentia cum prioribus. Græca sic habent ἂν ἐδὶξα ὁμαλῶς ὡς πρὶν λεῖξαι τὸ ἐν ἐργασίᾳ τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior λεῖξαι τὸ ἐν ἐργασίᾳ segreganda est à priori, cōnectendaq; sequentibus, in hunc modum, λεῖξαι τὸ ἐν ἐργασίᾳ τῶν δακτύλων πάλιν ὡς πρὶν.

Lineis incidere.

Duabus utemur lineis. Hoc est duas divisiones moliemur. Celsus ubiq; loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui novē lineas cutē capitis inciderent. Itē Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est Ἀνὶ λεχθῆναι δὲ διαγρῶς.

IN V. CAPVT.

AUt etiam acutus. Fluxiones in oculos nunc longæ, nunc breves eveniunt, pro humorum in illos decumbentium ratione particula ē in Græco codice male pro ἢ posita est, nec Orosio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit. Ut scilicet magis conspiciantur. Nam Celsus lib. 7. de eadē re tractans, frequēs curatio est, venas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamē ut inflentur, magisq; se ostendāt, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus. Codex Græcus viciatus est, ut qui ὅ••••• ἔν habeat pro ὅ•••••, omisit Orosius, aliq; castigatores. In fine capitis ἀφελωτικῶς vertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

IN VI. CAPVT.

Hypo

HYPOSPATISMO. Anonymus quidam Græcus inquit, hypospa- Hypospatis-
 mus itaq; tribus fit super frontem diuisionibus post latiore mus quasi
 specillo quod spatoulā vocāt. per corpora quæ interiacent, transmissio. spatæ trans-
 missis.

Exilem spatam. Hoc est gladioli modo latam Græco vocat Pan- Paulus
 lus ὑποσπαδισμός. paulo post σπαδίου, quasi dicat spatulam. Hæc ὑποσπαδίσ-
 autem dictione vsus sum non quidem latina, sed medicæ cogita. τηρ.

Panniculumq; implicitum. Græci πύγμα & πύγματον πύγμα. πύγμα.
 appellant. Galenus in commentarijs de Chirurgia.

IN VII. CAPVT.

PERISCYPHISMUS. Citatus supra Græcus auctor, memoria pro-
 dit, periscyphismus est, cum transuersis lineis coronæ modo frons
 secatur.

Penicillis. Sic reddidi ἀφολονεύς, quæ linamenta dicuntur cu- σφύνια.
 nei modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis.

IN VIII. CAPVT.

DE sutura. Titulus capitis habet πρὸ ἀναρράφης quæ dictio ἀναρράφη.
 deriuata est à ράφη & ἀνα. Sicut inferius caput facit de λα- λατάρραφῃ
 τάρραφῃ hoc est de sutura inferioris palpebræ à λατῶ & ράφη.

Græci appellant ἀστυχία. Celsus eleganter libr. 7. hanc di-
 ctionem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo
 subcresci. Quo auctore ego quoq; verti, cum naturali pilorum ordi-
 ni, alij præter naturam pili succrescunt: nihil tamen ex Pauli sen-
 tentia commutauit. Græce sonant in huius modum ἡ λαλουνμένη ἀ-
 στυχία ἐστὶ μὲν ἐν φόνει παρὰ φύσιν τρύχωρ, εἰς τὸν λατῶ φύσιν
 τρύχωρ το βλεφάρῳ προσγινομένη τρυχώρ.

Interim in phalangosi. Phalangosis est cum pilorum subnascen φάλαγγω-
 tium duplex, tripléxve acies vel in superiore, vel in inferiore palpebra eis.
 prouenit.

Cuspide specilli. Græce est πυρῆνι σμήλης. At intelligendum πυρῆν.
 venit apud Græcos πυρῆνα nunc pro cuspide accipi, nunc pro extre- σμήλης.
 mo quidem capi sed cauo, vnde aliquid infundi potest. Item rotun-
 do, nucleoq; specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, pli-
 casq; aut sinum coacta quod λοδπῶ αἴσις significat, inuertitur. Di-
 xi autem in rugas coacta, pro inuoluta circa cuspudem.

Vt croceno diarthodon. Sic appellatur collyrion apud Paulum λεονλῶν.
 7. lib. quod ex rosīs inscribitur, adiecto croco in Græco codice λεονλῶν διὰ ῥοδῶ.
 habetur pro λεονλῶν. Neglexit Orosius.

Et veluti lacte infu. Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Orosius. vo-
 luit instillato dici, quasi vero non etiā infundi dicatur in oculū medi-
 camenta. Cels. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet.

IN IX. CAPVT.

Orosius.
Vrina impu-
beris.

VRina pueri impubis. Orosius diligens aliorum iudex: ἀφ-
βέρου vult à me exponi, venerem non experti. At ego Plini-
um secutus dixi impubis. Ante pubertatem enim venerem exer-
cere nequeunt pueri. Hermolaus alijque docti viri eo quo ego modo
sunt interpretati. Simili calumnia in sequente capite vtitur, repre-
hendens ἰναδὸν verti amplam notandam magnā, sufficientem, dicen-
dum autem putans, idoneam contra Grammaticorū suorum quibus
adhaeret pertinaciter, opinionem. Item in Aldino exemplari habe-
batur, δ' αἰ γ' ὅ, ubi ipse ὅν relative legendum censet, at ego ex Ruellij
exemplari & sensu sine ὅ in hunc modum corrigendum codicem dico
δ' αἰ γ' ἂν τὸν τὸν δ' αἰ γ'. &c. In vndecimo capite pro διτυχίαν,
facito διτυχίαν.

IN XII. CAPVT.

Ectropium.

DE ectropio. Inferioris palpebra vitium est, quod parū sursum
attollitur, sed pendet & hiat neque potest cum superiore com-
mitti, vt ait Celsus.

Ectropium oboritur. Vide librū septimum Aetij. Inuertun-
tur palpebrae nonnunquam exulceratione praecedente & carne ipsa-
rum adaucta: nonnunquam ex duriore cicatrice.

Celsus.

Auersum specillum. Ita exposui autoribus Celso & Scribo-
nio, vt etiam antea annotaueram. At Graeci τὸ λυαδίσκον τὸ μέλας
videntur sepe confundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto
specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspidem abeunte accipitur, vt
hoc in loco. Celsus etiam libro quinto. Quicquid, inquit, inspergi-
tur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod par-
uulum est, super inguem in aluum vel digito, vel auerso specillo repel-
lendum est. Iterum vulnus digitis, vel aduerso specillo diducendum
est, vt torquentibus exitus detur: ὕσῃ; effusis tum diutius pura vri-
na descēdat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscal-
pio auerso, quam partem λυαδίσκον graeci vocant sensim tentare, mo-
uere ab alienatum oportet, quo celerius excidāt haemorrhoides.

IN XIII. CAP.

μήλωτις.
μήλωτρίς.

ANabrochismum graece dictum. Nulla est apud latinos di-
ctio, quae anabrochismum significat. Deriuatur à βρόχος, & ἀνά,
quasi illaqueationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehen-
si euellantur, vt non sit quod Orosius damnet, pilorū euulsionē à me
dictam, quae per filum administratur. Auriscalpio. Graece est.
μήλωτις, quod deductū est à μέλη hoc est specillū, & ὅτις, auris.
proprie enim auribus destinātū est. Dicitur etiam μήλωτρίς.

Specil-

Specillum quod utroque extremo in cuspidem. male in codice Græco habetur διπύρινον pro διπύρινον. Quod instrumentum est duplici cuspidē præditum. Nam πύρινον extremum, ac summam cuspidem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codicem deprauatum, sicut etiam Basiliensis Castigator.

IN XIII. CAPVT.

PAlpebræ cuti præter naturam. Codex deprauatus græcus το βλεφάρου ἀεργματι καὶ ἄ φύσιμ habet, pro παρὰ φύσιν. Nota nit Oroscius.

Collectionem quandam. Ita exposui, συναγωγὴν τινὰ ἀ ἐδάτιδ, hoc est congregātes aliquo modo hydatidem intra digitos.

IN XVIII. CAPVT.

PTerigion. Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Vnguis vero quod πτερίγιον græce vocant, est membranula nervosa oriēs ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eiq; officit &c. Hunc ego imitatus, dixi vnguem oculorum. πτερίγιον.

Hamulo modice inflexo. Græce est ἀγνιστῶ μινρον καμπῆ. Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, alibi, hamulos intus recuruato.

IN XIX. CAPVT.

Staphyloma est. Celsus nomē staphylomatis probe exponit libro septimo. In ipso autem, inquiens, oculo, nonnunquam summa attolitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura, acino fit, unde id staphyloma græci vocant. Itaque ἐρύτωις recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit μετωρισμός. Staphyloma ἐρύτωις. μετωρισμός.

IN XX. CAPVT.

DE purulentis Galeni verba. Græce purulenti ὑπόπνοι dicuntur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidium pus occupat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatorie libro quartodecimo. ὑπόπνοι.

Nisi quis admodum diligenter. In Codice impresso græce habetur, εἰ μὴ πάντῃς ἀνθρώπ. Deprauate nimirum pro εἰ μὴ πάντῃς ἀνθρώπ. Oroscius & Gemusæus ceu exiguum præterierunt.

Oroscius.

IN XXI. CAPVT.

Suffusio. Latini interpretantur ὑπόχυμα, suffusionem. Barbari Cataractam. Alibi Celsus enim ὑπόχυον nominat. ὑπόχυμα.

Lanamq; oui luteo cum rosaceo. Hunc locū Græce ita habemus ἐπερ λανκῶν δὲ σὺν ῥοδίω δανθῆρ, quæ Oroscius male & imprudenter vertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptum, deligatumq;.

Oroscius.

Ff

IN XXII. CAPVT.

ET si ad malas, subluuies. Hoc est si ad genas humoris impetus deciderit. Paulus dixit, καὶ εἰ τῶν μῆλων ὑποπίνῃται ἢ ὑποφορᾷ.

Ab vſtione lenticula melle adiecto. In Aldino exemplari habebatur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo Pauli inter potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est lenticula melle addito, vt superius τηλέμελι fenu grecū melle adiecto, item malicorio ex σιδωτῶ reddidimus, ἀείλις deriuatum.

IN XXIII. CAPVT.

Hic affectus à prima. Celsus septimo penè eadem habet. Solet inquiens tamen tumere, vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum sit, eoq; audiendi vsu careat. &c. Græci vocant ἀφ᾽ ἄτης. τῶν αἰσθητικῶν. In titulo male per iota ἀφ᾽ ἰτῶν impressum est.

Postea accidit. Hoc est, post natalem diem accidit hoc vitium, si præcesserit exulceratio.

IN XXIII. CAPVT.

AVriculario specillo. Sic exposui μηλοτίδα, quod aliquando etiā pro simplici specillo accipitur, vt in sequētib; interpretor. Celsus, Violenta capitis concussione, aure super circum. Celsus libro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoq; collocatur media in, herens capitibus vtrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in latus versus, cuius auris eo modo laborat: Sic vt extra tabulam emineat. Tunc malleo caput tabule quod à pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest, excidit.

luxαμῖς. Iam vero Calamo. græce est λυαλμῖς. Sic enim aqua potest elici, exugendo.

IN XXV. CAPVT.

POLYPUS. De hoc lib. 3. comprehensum est, vocat autem hic molliores, dictione græce ψαφαρτίγους, quasi dicas teneriores fragilioresq;.

spatula. Spatula. Celsus etiam hac dictione vtitur lib. 7. de Polypo. Ergo, inquiens, hunc ferramento acuto in modum spathæ facto, resolvere ab osse oportet.

luxαδισκός. Manubriolo ipsius. Græce est τῷ luxαδισκῷ ἀντὶ, quod superius exposui auersam specilli partem. Celsus autem videtur manubriolum capere pro aduersa specilli parte, vt lib. 7. de Chalaζio. Dein scapelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt &c. quanquam etiā dicat eodē libro, Aduerso scalpello subsecare magna cū moderatione.

Duplici cuspide præditi. Male rursus in codice græco luxαπυ-
ρίν

pluvu impressum est, pro ἀνθέρων, nec hoc emendavit Oroscius aut Oroscius.
Gemusæus.

IN XXVII. CAPVT.

ANtheron puluerem. Libro septimo Pauli cōpositionē An- Puluis An-
theri habes comprehensam. Dicitur autem ἀνθέρων quod rosa- theros.
rum flores inter alia recipiat.

IN XXX. CAPVT.

Tonsillæ. Latinos in hoc vitio peculiariter significando verborū
inopia laborare testatur. Siquidem per tonsillæ & partem cor Pariethmia.
poris, & morbum exponere cogimur. Græci autem distinctim partem ἀνθέρων.
παριήθρια, affectum ἀνθέρων appellant.

Deuorationi spirationique negotium. Græce est ἀνοσφύσια
τε παρὶχούσα τῇ τε λυταπύσει, καὶ τῷ πνεύματι, quod est ad ver-
bum, difficilem usum deuorationi, & spiritui exhibentes.

Quantum licet. Hoc est quoad possumus, ἐφ' ὅσον δύναμεθα.
Aucenna lib.3. Trahuntur ad exteriora quantum est possibile.

IN XXXI. CAPVT.

Gurgulio. Eadem fere Galenus libro sexto de compositione
medicamentorum secundum locos habet, Carnosa (inquiens) ut
nos vertimus) quædam particula in summa oris parte suspensa appa-
ret, si quis toto ore plurimum apertolinguam deprimat, hæc inquam
caruncula duobus nominibus à veteribus græcis nominatur Garga- Gargareon.
reon, & Cion hoc est Gurgulio & Columna. His posterius medici Cion.
prope omnes non ita, sed cronida quod est columellam ipsam nomināt. Gurgulio.
Nam eorum qui staphylen, hoc est ruam vocitant, satis est non me- Columella.
minisse. Non enim particulam, sed ruam aliquem ipsius affectum,
Staphylen hoc est ruam appellamus &c.

Tenues autem oblongæ. Celsus partem ipsam contra græcorū
opinionem, ruam appellat lib.7. rua inquiens, si cum inflammatione
descendit &c. Paulo post quasi verba Pauli recenset in hunc modū.
Si verò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra
modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba, præcidi de-
bet. Itemq; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

IN XXXIII. CAPVT.

QVomodo aspera arteria. Caput est τῷ λαρυγγόμοις. Su-
perius annotaui quid ὁ λαρυγξ apud græcos medicos sit, quid
ὁ φάρυγξ & ἡ φάρυγξ. Hic dico τῷ λαρυγγί & φάρυγγι pro aspera
arteria usurpari & inter se confundi, sicut etiā βρόγχον. Gale. codē
modo vititur lib.2. de placitis Hippocratis & Platonis magis autem

Larynx.
Pharynx.

ὁ λαρυγξ pro summa parte arteriae, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponitur, Verba Galeni sunt. τὸ μὲν δὲ φαχίως ἀρτηρίας ἔντι δὲ καὶ φάρυγξ προσαγορεύεται. Paulo superius. πλεῖστον μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν λαρυγξ ἢ φάρυγξ χόνδρων, οἷον ἐπὶ πλεῖστον τινῶν ἢ ἐν φύσει αὐτῇ φανὴ γίνεσθαι. &c. Iam eodem in loco ἢ φάρυγξ, nisi vicinū sit codicis, pro ὁ φάρυγξ usurpatur, in hanc sententiam. οἷον δὲ ἄλλο ἔχονσι λέγουσιν, αὐτὸ δὲ πλεῖστον ἔστιν ἢ λαρυγξ ἢ φάρυγξ διὰ τὸ τοῦ ἐκείνης ἀρχεῖσθαι τῶν φωνῶν. &c. IN XXXIII. CAPVT.

ANo proximos. Codices nostri deprauati erant, λαρυγξ habentes, pro λαρυγξ ubi non parum debet Orosius exemplari suo. paulo post fac διάφρησιν ex διάτρησιν.

λημνισκός.

Implicitum aliquod in longitudinem. Sic interpretatur λημνισκός. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquit, & implicitum in longitudinem linamentum (λημνισκός graeci vocant) in aceto tinctum demittere. In codice graeco est διὰ συζῆσιν distinctim, quasi duae distinctio- nes sunt, impressum, quod legendū est διὰ συζῆσιν, quod pertrahi possit & implicari.

Orosius.
μοτοφυλά-
κην.

Fomentū & medicamē. In exemplari graeco habetur τῶν αὐτῶν ἐμβροχῶν μοτοφυλάκην φάρμακον, pro quo legēdū censeo τῶν αὐτῶν ἐμβροχῶν, καὶ μοτοφυλάκην φάρμακον. Nam antea vino & oleo, aut aqua & oleo aspergi volebat, inde medicamen in lintheolis illitum accommodari. Capitur autem eodem fere sensu, quo ἐμμοτον, primum non annotauit Orosius, nec Gemusaeus.

IN XXXV. CAPVT.

φαχίλω.

IN Ceruice. superstitiosi quidam doctores, pro in ceruice, censent dicendum, in collo, quod ἐν φαχίλω graece dicitur. At Celsus fere ubiq; ceruicem pro collo, vt libro quinto de strumibus agens in hunc modum, nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus.

Carotides.

Arteriae quas Carotidas appellant. Haec arteriae in dextra, sinistraq; circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quae nomen inde sortitae sunt, quod tense, aut alterationem quandam ex-

Musculi.
λαρραδῆς.
Nervi recur-
rentes.

perta Caron inducunt, quemadmodum musculi λαρραδῆς apud Hippocratem de articulis.

Nervi recurrentes. Hi sunt nervi sextae coniugationis cerebri, qui iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, cōmuni utrinq; velamento, & in Anatome plenius condiscas.

IN XXXVII. CAPVT.

ARteria aperta. Galenus libello de tumoribus praeter naturam hunc in modum habet. ἀρτηρίας δὲ ἀνατομωθείσας, τὸ πᾶν ἀνύ

ἀνεύρεται καλεῖται. γίνετ' δὲ καὶ ταύτης αὐτῆς, ἐπειδὴ
 εἰς δὴν μὲν ἀφίκεται τὸ προσειλεῖν αὐτῇ δὴ καὶ μὲν τ' ἀφ-
 τήρας ἔλκος, μὴτε συμφύσεις, μὴτε σινουλωδύεις, μὴτε σαρκί φρα-
 χθείς. Διαγινώσκονται δὲ τὰ τοιαῦτα παθήματα τῷ σφυγμῷ τῶν
 ὀργασσόμενων ἀρτηριῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἀφαισίων πᾶς ὄγκος
 παλινδρομῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τ' ὀργασσόμενος αὐτὸν δόξας. Ex
 qua sententia, addendum in Paulo superius est ἔλκος, legendumq;
 μὲναι δὲ τὴν ἀρτηρίαν ἔλκος, non μὲναι δὲ τὸ τὴν ἀρτηρίαν, &c. Hac
 non annotavit Orosius, vel Gemusius.

Tumor omnis euanesceat. Codex græcus habet τῶν ὄγκων,
 pro τῶν ὄγκων. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

IN XXXVIII. CAPVT.

GRandis in ceruice & rotundus. Celsus libro septimo inquit, βρεγχοῦλλος
Gutturosi.
 At in ceruice. inter cutem, & asperam arteriam tumor incre-
 scit. βρεγχοῦλλος græci vocant &c. Qui hac vitio laborant gutturo-
 si apud Latinos nominantur. IN XXXIX. CAPVT.

CAnglion. Verti ganglion est nerui in modum concretio, quod græ- συστροφῆς
 ce est συστροφῆς νεύρου. Nam indurantur nerui, contorquenturq;
 ac in nodosam affectionem coeunt. συσφίεσθαι signat inspissari, coi-
 re, indurescere. IN XL. CAPVT.

Copia vero ipsius. Vide Galeni commentarium de plenitudi-
 ne: ubi copiam viramque fusissime exponit.

At in capitis morbis. Galenus libro de anatomicis tractatio-
 nibus quarto in eandem fere sententiam habet. In ijs qui infra iu-
 gulum afficiuntur, siquidem sanguinem detrahendum oportet, principem lo-
 cum praesidi ratione vena possidet: quæ cubiti flexum accedit secun-
 dum quæ ad cubitum ipsi deferuntur. Tertium communis: quartum Ordo venarum
in mitem-
do sangui-
ne.
 quæ ab humeraria ad flexum cubiti pergit. postremum humeraria
 ipsa. In illis autem quos supra iugulum morbus infestat, contra,
 humeraria primum: quæ inde ad cubiti flexum porrigitur secundum:
 tertium communis: quartum quæ ab interiori parte flexum adit:
 quintum, quæ cubitum ipsum.

IN XLI. CAPVT.

LEuis itaque Cucurbitula. Dicitur leuis cucurbitula, quæ si-
 ne scarificatu, & flamma imponitur. vide Galenum in libello Leuis cucur-
bitula.
 de hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Alij cucurbitulis vsi sunt vitreis. Celsus duo genera cucurbitu-
 larum ponit aneum, & corneum quâquam ex alijs quoque materie ge-
 neribus fieri doceat. ac si cætera defecerint caliculus quoque pulta-
 rius oris compressioris ei rei commodè aptatur. Genera cu-
cubitularum.

IN XLII. CAPVT.

Hippocrates. Libro de Articulis de ala mentionem facit. non autem certe aliud ferrum adigi precipit, quod nerui, vena, & arterie subsint, quæ calorem istum ex ferramento tolerare nequeunt.

IN XLIII. CAPVT.

Conuenit igitur. Græcus codex plane peregrinam habet lectionem, quid enim sibi vult aristolochia mentionē facere, uti ferramento crustæ excitanda sunt. Habet autem in hunc modum. *Ἀλὲ δὲ ῥα μυχρὰς ἀριστολοχίας τὴν ῥίζαν ἐλάω δονσαῖς ἐν τῇ βύβλιν αὐτῶν περὶ πυκνῶν μύσας τὰς δὲ χάρας.* hoc est conuenit igitur longe aristolochia radicis oleo imbuta imponere ipsis crustas ignitas. Mihi autem legendum videtur *Ἀλὲ δὲ αὐτῶν καὶ τῆς περὶ πυκνῶν μύσας τὰς δὲ χάρας ἐν τῇ βύβλιν*, ut nos vertimus. Neglexerunt locum Orosius & Basiliensis castigatōr.

IN XLV. CAPVT.

Galenus solam administrationem. Libro quarto decimo Methodi hæc ad verbum inuenies.

IN XLVII. CAPVT.

Vomica in
pectore.

Vomica laborat. Græce est *ἀφίστασθαι* quasi dicat, abscedēs. Celsus de vñtione iecoris agens, dicit si vero iecur vomica laborat, eadē facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus, quidam etiam contrā id scalpello aperiunt, ipsam vomicam adurunt.

IN L. CAPVT.

Ascites.

Quo veluti in utrem aqua colligitur. Hoc est, si ascites hydrops est. Nam *ἄσκη* utrem signat. Auicenna administrationem ex Paulo sumpsit.

Imum abdomen aduque tenuem. Sic reddidi *ὑπογάστριον*, quod ad verbum sonat imum ventrem. Sed abdomen imum ex Celso sumpsi, nam exterior ventris pars est, abdomen. forte *ἐπυγάστριον* legendum est, ut in sequentibus, *καλῶς λαλῶμεναι διὰ τὸ τὸ ἐπυγάστριον, καὶ τὸ περὶ τοῦ αἵματος διαίτης καὶ τοῦ αἵματος.*

IN LI. CAPVT.

Quomodo peritonæi. Hoc caput ex sexto medendi Methodi libro sumptum est: verum in codice græco, mirum quam mutilum & deprauatum. Orosius autem, & Basiliensis castigatōr, nō aduerterunt, in erratis interpretum occupati.

Quare etiam remedium. Lege in codice græco *ὥστε καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐν τῷ ὀβριμῶναι.*

Mox expressa calefacere. *fac ἐν ὀβριμῶναι τούτῳ τὸ ἐν τῷ.*

Quæ græci Syringotoma. muta in *τὰ λαλῶμεναι ὀβριμῶναι.*

Figur

Figura autem laboranti. Adde in græco dictionem hoc παῖς ἐπιπνεύων δὲ σχῆμα τῷ λιάμνοντι.

Cum in superioribus deorsum. Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς ἄνω, λιάσιν ῥόπον. Quoad totum exacte persuatur. Deest aliquid. Legendum enim ἀχειρὸς ἀνδρὸς ἀντιβῶς ῥαφῇ.

Inde per reliquum abdomen. Fac ex διαπείθῃ τὸ ἐν ἵσον ἐπιγαστρὶον hoc, διὰ πείθῃ τὸ ἐν ἵσον ἐπιγαστρὶον.

Deinde ab hoc rursus. Hic multa desiderantur plane necessaria quæ superioribus adijciantur ne quis compendij causa ab ipso Paulo prætermissa censeat. Sic igitur ex Galeno inſtaurari debent. αὐτὸν αὖ ἐκ τούτου πάλιν ἀφ' αὐτοῦ συρράπτῃ αὐτῷ τῷ ἀντιμενίῳ πριτοναίῳ, λιάπειτα διηβάλλειν διὰ τὸ πλεονεξίαν διημάτῃ. ἐνεί-
βῃ δ' αὖ πάλιν ἔσω διείρειν, συρράπτουτας αὐτὸ τῷ ἀντιμενίῳ πριτοναίῳ διηβάλλουτάς τε διὰ τὸ πλεονεξίαν διημάτῃ, ἄτα ἔστω.

Pari modo si proxime oras. Legendum est ἐν τῷ δὲ καὶ τὸ μὲν ἰγγυτάτω. Id autem fiet in eum modum. Fac ἔστω δὲ τῷ τῷ λιάτῃ τὸν δὲ τὸν ῥόπον. Quid enim sibi vult ἔστω δὲ τῷ τῷ λιάτῃ τῷ λιάτῃ δὲ τὸν αὐτὸν ῥόπον. Vbi hic tua diligentia Orosius?

IN LIX. CAPVT.

Sumpto igitur Cathetiro hoc instrumentum à demittendo dictum est. nam per id aliquis liquor in vesicam demittitur à λιάτῃ λιάτῃ ἑλκεῖ. Est autē rectus sypho, ut ait Gal. IN LX. CAPVT.

Ligaminibus sex processuum. Hoc est sex appendiculorum ἑξαχειλῶν enim ad verbum sonat. sex crurum. à geometris petita dicta est, qui figuris quasdam ἑξαχειλῶν neminant.

Super lapidem qui excidendis subincitur. Græce est λιάπειτα διηβάλλειν λιάτῃ τὸν λιάτῃ ἐπιπνεύων αὐτῷ τῷ λίθῳ hoc est de. ἰδιόκοπῃ
inde dividemus infra calculum super ipsum lapidem qui incidendus subincitur. At vitium exemplaris esse puto. ponendumque pro τὸν λίθον, quod est calculum, τὸν λιάτῃ hoc est colem. verū Acitius
ἑλκεῖ ἑλκεῖ veteres scitionem in cole non infra ad suturam, verum supra
fieri præcipiunt. sed λιάτῃ. Sunt qui intelligant. super lapidem ipsum qui inciditur.

IN LXI. CAPVT.

Tunica erythroides. Duæ sunt testiculorum tunice, dartos, ἑρυθροειδῆς. Hic autem male habebatur in Græco ἐλκεῖδῃς pro ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθροειδῆ τοῖς ἐρυθροειδῆ positi. Galenus locum iam citatū reliquit vitiatū. IN LXII. CAPVT.

Humoris ociosi in particulis secretum impli. In græco est ἑλκεῖ ἑλκεῖ συλλεγόμενον πρὸς τὸ μέγας τῶν τῶν δόχεων διὰ πλεονεξίαν συλλεγόμενον, quod ad verbum sonat. Orosius humor colle-

Hernia.

Etus circa partem corporum scrotum implicantium. Mihi visa est superior translatio manifestior. hoc te meminisse volui. Caterum communeramicum nomen est, Hernia ut ait Celsus: unde Herniosi appellantur.

IN LXIII. CAPVT.

Rhacosis.

RAcosin. Ita appellant graeci ῥάκω & quod vile detritumq; linamentum, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior cuius scroti & veluti lacera pendet, rhacosis vocant.

ἑπινόου.

Quod incidendis subiicitur. Graece est ἑπινόου ὑδρὸς, quasi dicas super asserē, super quē aliquid inciditur Superius de calculosis dixerat, ἑπινόου τὸ λίθου. Nonnulli calculum ipsum qui inciditur, exponunt, verum in sequentibus dictio ἑπινόου innotescet magis.

IN LXXII. CAPVT.

πριαπισιόν.

Pessarium aliquo cicatricem inducēte vinctū. πριαπισιόνος redididi pessarium. nam illud nihil aliud est quam penicillum, pendendi virilis figuram representās. Superius autem habetur, speculo quod graeci διόπτραν appellant, à perspicendo. Nam hoc instrumento triplici crure predito, naturalibus dilatatis, latentes in utero morbi cōspiciuntur modum vero aptandi instrumenti vocant δισπρίσιμον.

διόπτρα.

IN LXXIII. CAPVT.

λωτός.

Speculi tridente. Sic exposui τὸ λωτός διόπτρας λωτός. Cum enim speculum tria habeat crura, aut columnulas, aut dentes, inuicem iunctos, sed qui diduci possint, non plane abhorrrere visum est à sensu, si tridentem speculi dicerem. Nam quid sibi λωτός apud graecos aliud velit, nescire me fateor. Bernardus felicianus, qui mihi in Pauli sexto vertendo successit, graecam dictionem reliquit, Loton inquitens speculi.

Lotos.

IN LXXIII. CAPVT.

Contractum. Male in graeco codice est συσπόμενον pro συσπόμενον paulo post λελεπισμένον, pro λελεπισμένον, rursus, postea indicem digitum vinctum, λελεπισμένον habetur pro λελεπισμένον. quae omnia Orosius neglexit.

Hydrocephalon.

Hydrocephalō sit, hoc est aquam in capite. Hoc est ferè quod Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; profluat fædi odoris sanies.

IN LXXV. CAPVT.

MAnu siquidem sinistra calida, inunctaque. Graece est. πλὴν ἡ ἄριστα δὲ δόρυ, καὶ λελεπισμένον. fac λελεπισμένον à λελεπισμένον. Et hoc reliquerunt aristarchi.

IN

IN LXXVII. CAPVT.

SI oblique, specillo duplici cuspide. male in codice Græco habetur. Διαπυρίνω pro διπυρίνω.

Caulis modo porrecton. Græce est ἀποκαλιδέρ, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

IN LXXVIII. CAPVT.

ANi fistulæ latentes. Fistulæ ani alie tortuose, alie multiplices, alie transuersæ, alie simplices habentur.

Fistulæ.

Vel specillo per fistulam. Rursus male in græco διπυρίνω pro διπυρίνω habetur.

Instrumento quod ad sedem. Vocatur hoc διαστολὴς διόπτριον quasi dicas distendens speculum. verum proprie dicitur διόπτριον de vtero. Potest autem accommodari etiam sedi, cum latentes in ea morbi sint.

IN LXXXIII. CAPVT.

DE extremarum partium præcisione. Sic vocatur græcis ἀκροτηριασμός. Celsus libro septimo de Gangrena inquit, Gangrena inquies, inter vngues, alāsque, aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

διαστολὴς.
διόπτριον.

Ex causa exterius adueniente. Græce est ἐν προκαταρκτικῆς αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa. vt προγονιμύς.

ἀκροτηρια-
σμός.

IN LXXXV. CAPVT.

Pollicibus. In græco est ἡ χεὶρ τοῖς μεγάλαις δακτύλοις, hoc est ad verbum in manus digitis magnis. Quia vero pollex quasi maximus omnium est, verti pollicibus, Celsum imitatus.

IN LXXXVI. CAPVT.

VT sanie excreta, secta hæc. Codex græcus tantum habet, ἵνα ἐκκριθῇ, vbi adidendum est ἰχώρος. legendumque ἵνα ἐκκριθῇ ὁ ἰχώρ, quod Orosius & Basilienensis corrector nō annotarunt.

At in rectum superne deorsum. Hic quoque mutila est lectio exemplaris græci. Habet enim εἰς τὸ λατ' ἐνθὺ ποιήσας τομήν ἐν τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ λαλὸν μύνον ὑπὸ σάρκωμα γίνεται ἢ ὅτι. vbi legendum est, εἰς τὸ λατ' ἐνθὺ ποιήσας τομήν ἐν τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ λαλὸν, τὸ λαλὸν μύνον ὑπὸ σάρκωμα γίνεται, τῆς ὅτι. Istud quoque Aristarchi nostri neglexerunt.

IN LXXXVIII. CAPVT.

Telis extrahendis. Telum vocatur, quicquid manu iaci mitti in aliquem potest. vnde apud græcos βέλτερος ἢ βάλλω quod βέλτερος est iaceo dictum est.

Ff 5

ἄσπετον. Hastilia. Sic exposui ἄσπετον Galenus in exegeſi Hippocratis inquit ἄσπετον ἔχον τὸν αἶμα ἰσχυρὸν χρεῖται. ἀλλὰ καὶ τὸ ξύλον βέλους, hoc est atraclo non modo ad sacrificium vtilem sed etiam sagittæ lignum significat. Alibi appellat τὸ ἐπίθεμα, nempe id quod imponitur. Ego ut obtemperarem Oroſcio haſtile dixi, quanquam interpretatio mea ſatis erat manifeſta.

βελανός. Belulcurn. Celsus libro ſeptimo hoc ferramentum ad Authorē Dioſcori referi. Eſt autē lamina vel ferrea, vel anea etiā ab altero capite, duos utrinque deorſum conuerſos uncōs habet, ab altero duplicata lateribus, leuiterque extrema in eam partem inclinata quæ perforata eſt. Succus ex ventriculo. Hoc eſt Chylus, quæ vox licet græca ſit, medicis tamen non eſt incognita. Eſt autem proprie Chylus, ſuccus ex alimento in ventriculo prima concoctione factus, nec proprie ſuccus latine dicitur, quia vero aliam diſtentionem non habemus, ea utendum fuit. Lamina quæ membranam cuſtediat.

μικρογούλαξ. vocatur græcis inde μικρογούλαξ. Celsus ut alias annotauit libro octauo exponit in hūc modū. Lamina anea eſt, firma, paulū reſima, ab exteriori parte leuis quæ demiſſa eſt, ut exterior pars eius cerebro propior ſit, ſubinde ei ſubiungitur, quod ſcalpro diſcutiendū eſt &c. Sequēti capite ruruſus ait, ſubiciēda lamina eſt, quā cuſtodē eius mēbranæ eſe propoſui, et ſuper eam quicquid ſpiroſum eſt, et intus eminet excidēdū eſt, forte nō male ταινέπος dici poteſt. IN XC. CAPVT.

ταπλός. Vſque ad laminam ſecundam. Græce erat ἀχρεὶ ἢ ταπλός. Recentiores, uique barbari dicunt ad caluariæ tabulaturam, alij uſque ad duplicationem.

Mirum in modum Galeno commmendatur. Vide librum ſextum Galeni Methodi medendi, ubi de fracturis caluariæ agit.

χοινίσιον. Choenicion. Celsus interpretatur modiolum quod ita deſcribit libro octauo, cap. iij. Modiolus ferramentum concauum, teres eſt imis oris ſerratū per quod medium clauus ipſe quoque interiore orbe cinctus demittitur.

IN XCII. CAPVT.

TEnui & ſorbili cibo. Celsus lib. octauo in quo Hippocratem magna ex parte ſequitur, habet. Deinde die tertio humidum cibum, quod Paulus dixit ἀνταῖς, καὶ ῥοφημα τὸ δὲ ῥοφᾶν.

Maxilla intra tres potiffimum ſeptimanas. Huic ſententiæ

Celsus. Celsus aſti pulatur, ſerē vero intra quartum decimum & vnum & vigeſimū diem ſaneſcunt, maxilla, male, iugulum, pectus, latus, os ſcapulorum, coſtæ, ſpina coxarum, os tali, calx, manus planta.

Fracturarū differentia. Quod ſi fractura per tranſuerſum. Fracturarum differentia quoniam

quinque sunt: prima quae fit schidacedon, altera cauledon. Tertia raphanidon, quarta sycydon, postremo alphitedon. prima assulatim quasi per rectitudinem, secunda per transversum, tertia in raphani modum per fissuras, quarta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

IN CXIII. CAPVT.

Lamina quae à tuendis. Graece erat *μωυργοφύλακ* & ἡ ἐν τῷ *ἐκκοπέως*. Adhibetur etiam lamina quam in cerebri membranis usurpamus, alijs quibusdam excidendis: ut corium, vel asser, vel massa plumbea aenea; Puto autem legendum *ἀδικόπου* pro *ἐκκοπέως*. Nam superius *ἐκκοπέως* facta iam erat mentio. Præterea subiungitur, dictioni *μωυργοφύλακ* &. In sequenti capite Graeco habetur *πρωτοπῆδ* pro *πρωτοπῆδα*, quæ omnia Orosius & Corrector Basiliensis neglexerunt.

IN XCIX. CAPVT.

MAnubrij ligonis. in Graeco codice male habetur *διον τυλίον*, pro *διον τελίδς* quod Orosius & Gemuseus præterierunt. Exponit autem Galenus, rationem administrationis huius commentario secundo in librum Hippocratis de fracturis.

In medio membro. Græca sonant, *ἐν μέσῳ τῷ ὥλῳ*. frequentius vertunt *τὰ ὥλα* artus. Celsus autem lib. 8. videtur etiam in articulis enumerandis, dictione, membri, uti primum in hac sententia, Si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt. Item donec id membrum confirmetur, de humeris, brachijs, cruribus, feminibus, digitisq; confractis verba faciens.

ὥλα
Artus.
Membra.

IN CVII. CAPVT.

ADaptamus vero ossa vestre. Hoc est in locum suum commode restituiamus. Caterum *μοχλίσκην* quod à *μοχλὸς* descendit, *μοχλίσκός*. vestem reddidimus vide Hippoc. lib. de fracturis. ubi habet. *σιδῆσαι χρὴ ποιεῖσθαι ὅτ' ἑστὶν τὸν ῥοπὲρ ἐν πρὶ ἔχσιν εἰ μοχλοὶ οἷς εἰ λατύποι χέροντες, τὸ μὲντοι πλατύτοδον, τὸ δὲ τι στερότῃον, &c.*

Membris coniugalibus. Dicuntur membra coniugalia, cū duo inuicem iungantur, ut in cubito duo ossa, in tibia item duo. Rursus aiuga, quæ sola sunt, nulli consimili iuncta, ut brachium, femur, aliaq; id genus. Apud Galenum in anatomicis *φλέψ' αἵσυ* & de vena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, sola absq; pari relinquitur, mentionem faciens.

Membra coniugalia.
Membra aiuga.

Ut in litera *χ*. Graece est *λατὰ τὸν χρισμὲνον*, male, pro *χρισμὲν*, ut in sequentibus etiam habetur. Est autem *χρισμὲς*, imitatio literæ *χ*.

Linam

μοτοφύλαξ. Linamento illitum. Idem μοτοφύλαξ ἢ ἱμμοτὸν apud grecos est. prius qua in lintheolo servatum significat: alterum in lintheolo illitū.

IN CXI. CAPVT.

Differentias. Celsus ita scriptum reliquit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quæ iuncta sunt inter se delibunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à sura. Interdum saltu, calcis os à talo. Modo articuli suis sedibus excidunt &c. primum παρὰ ῥθρημα.

παρὰ ῥθρημα.

ῥθρημα.

Vsq̃ue ad superficiē. In graco legitur μέχρι τ' ὀσφύς & male nimirū pro μέχρι τ' ὀσφύς. neglexerūt locū Orosius, & Gemusæus.

IN CXII. CAPVT.

DE maxilla. apud Gracos γένυς cum voce ἰάτω significat maxillam. cū voce ἄνω, malis. quanquam barbari maxillam inferiorem & superiorem appellent. Graci etiam dictione γνάθος in eodem significatu vtuntur.

σχᾶται.

σχᾶται. Galenus commentario secundo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid sibi velit σχᾶται. in hunc modum ὥστε τὸ σχᾶσαι μὲν καὶ κατὰ τὴν φύσιν ἐστὶ πάθος ἀντὶ ἀρθρίμας. ὁποῖον δὲ τι τὸ πάθος τῶν ἐν τοῖς ὀστέοις μὲν ἰὰ τὸ φαῖναι παραλλαγαί. hoc est, quare σχᾶσαι musculorum & neruorum affectus est citra articulamentum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, peruerfiones.

Maxillam committunt. Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς ἰάτω γνάθος. codex impressus Pauli dictionē ἰάτω nō habet. Tu lectionem corrigito secundum Hippocratem. ex quo hæc ad verbum sumpsit. Omisit Orosius, & Castigator Basiliensis.

Sin autem vtraq; maxilla. Græca sonant, ἢν δὲ ἀμφότεραι αἰ γνάθοι. Hoc est si maxilla vtraq; parte luxata fuerit nō vt recēiores interpretantur, maxilla inferior, & superior, quæ male rectius dicenda sunt. Galenus orationem Hippocratis, vnde hæc sunt transcripta, in eum modum interpretatur. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει λέγει γνάθους δύο, μάστιγιν οὐ πλεονέχως, ἀλλ' ἐκάστην τῶν μέρων, ἰὰ τὸ πλατύναι αὐτήν. λέγει δὲ καὶ τὰ ἰάτω πέραν ἰὰ τὸ ἀγυμνον καὶ ἀσάρκον τὸ ὅτι ἐν δύο μάστιγι γένναις. &c. Quæ ita exponere possis. In hac oratione videtur γνάθους nō absolute maxillam appellare. sed vtrāque partem, in quibus ipsa dilatescit. videtur etiam ima extrema in quibus os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Interpretatio Hippocr.

Secundū horū directā aciē. Pauli codex græcus habet ἰὰ τὰ ξίφ, forte ἰὰ τὰ ἰξίφ & vt Gal. dicit ἰὰ τὰ ὀστέα, vt scilicet dentes primo

primores in maxilla, primoribus in malis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippocratis verba hæc sunt, τὸ δὲ ἀτραχὺς μάστιγ' ἔχει γυνὴς τοῖσι ὀρίοις τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω καὶ ἔχει. Non annotavit Orosius, nec Gemusæus correxit. Orosius.

Nam muscoli hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, carum inducunt. Græca ita sonant. λαρσείδης οἱ μὲν ὄντοι καὶ ἀλλοῖς μύνοι, καὶ ἐντείνονται παρὰ φύσιν. Galenus locum exponens commentario supra citato inquit, utrunq; & alteratio, & musculorum tensio carum potest efficere. Nam tensio hæc fit, filamentis quæ prius erant laxa, nunc omnibus secundum rectam lineam extensis. Alteratio, dum calefacti, aut refrigerati, aut humefati, præter modum fuerint, aut inflammationem, aut erysipelas fuerint experti.

Hic igitur decimo die potissimum moriuntur. Mutilus est codex Græcus Pauli. habet enim ὄντοι ἔν καὶ δυνήσκουσι καὶ μάστιγ' ἔχει. pro quo legendum est, ὄντοι ἔν δυνήσκουσι δυνήσκουσι μάστιγ' ἔχει, ut habet Hippo. lib. de articulis. Gal. ibidem exponit dictionem μάστιγ' ἔχει. pro ἐν τὸ πολὺ, quod est plurimum, magna ex parte, & ut nos diximus, potissimum. Orosius & Gemusæus locum præterierunt.

IN CXIII. CAPVT.

Processus ancoræ similis. Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchoræ modo, qui etiam ab alijs λαρσείδης dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculæ rostrum exterius inclinatur.

Musculi bicipitis. Vide Galenum de usu particularum, & de Anatomicis tractationibus. Est autem ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamenta fortia obtinet, vnum ex processu anchorali, alterum ex elata superficie scapularum cervicis.

Ipsūq; humeri fastigium. Quidam anatomici scapularum cum iugulo compactionem Græce nominant ἀνθρώπιον quasi dicas summum humerum. alij tertium os esse prædicant, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur. ubi igitur in Græco codice habetur ἀνθρώπιον, ego reddidi summum humerum, aut humeri fastigium.

Lignum quod Græci hyperon. Lignum est pistilli modo factum, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis. Hyperon.

Atq; hoc in scalæ gradu. Celsus lib. 3. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traiecitur, ita alie, ut consistere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalæ gradum separat ab ea quæ fit per

Scala gallinaria.

per hyperium. estq; apud illum, quintus restituendi modus. quâquam in sexto modo, scalæ etiam faciat mentionem.

Ambe. Celsus imitatur Hippocr. Ambe. Ad verbum transcripsit ex Hippocrate. & Celsus Hippocratem libr. 8. quasi expressit in hunc modum. At si vastius corpus, nervi ve robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos perveniat. In qua summa capitulum est rotundum & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit.

Panniculo circumdatum. Celsus idem alijs verbis exponit. Ea q; spatha fascia involuta, quo nervis tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur.

IN CXV. CAPVT.

Methodus
similitudinis
& dissimili-
tudinis.

Sani cubiti inspectio. Methodus hæc est quam Hippocr. libr. de medicina exponit: quanq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscitur, si cum sana conferatur. Codex autem Græcus male habet *πάθος* pro *μάθος*. Quid enim sibi vult, *ἡ τοῦ ὑγιαίνοντος & ἀγνώστου & ἐκείνου πάθος*. hoc est sani cubiti affectus arguit. quomodo id quod sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia *μάθος* quod est disciplina. ego dixi inspectio. Aristarchi nostri non adverterunt.

IN SEQVENS.

Appellavi Brachiale eam vincturam, qua brachium cum extrema manu committitur. Celsus palmam nominare videtur in octavo. Græci dicunt *καρπὸν*.

IN CXVII. CAPVT.

Vertebrae spinæ. Hoc caput Paulus magna parte ex Hippocrate transcripsit. Avicenna autem quasi ad verbum ex Paulo transtulit. In hoc discrepamus, vbi ego sculpturam verti, ille so- ueam habet: vbi ego asserem, ille tabulam.

IN CXVIII. CAPVT.

Intenso autem affecto Crure. Mutilus est codex Græcus impressus vel Basileæ, vel Venetijs id quod etiam ex Avicenna manifeste constat. Habet autem codex in hunc modum. *ἐντεταμένον τοῦ πεπονθέντος & ὑπὸ τῶν τέρνων ὡς δύο δακτύλους*. nimirum pro *ἐντεταμένον δὲ τοῦ πεπονθέντος & σκελὸς πλεον τοῦ ἐτέρου ὡς δύο δακτύλους*. quod miror Orosii ex suo castigato exemplari non aduerrisse.

Comprehendens qua crassissimum. Hic etiā male in Græco legitur *κατὰ τὸ βραχύτατον*, pro *κατὰ τὸ παχύτατον*. Id etiam omiserunt Orosius & Gemusæus. Ex superioribus lectio poterat corrigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent oculati.

FINIS.

C O M M E N -

T A R I O R V M I N

P A V L V M A E G I N E -

T A M L I B E R S E -

P T I M V S .

*

LI B E R hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride, partim etiam ex Oribasio, transcriptus est. ordines Galenus precipue, vires & descriptionem Dioscorides: compositionem medicamentorum Oribasius tradidit: quāquam hic quoque à Galeno & alijs misturarum rationem acceperit. In codice Græco habetur εννινγοι hoc est ad verbum, emortuum redit: nos diximus sensum aufert. Orosius male dicit legendum εννιστοι. cum potius quadraret εννιστοι, quod est enervat.

I N I I . C A P V T .

MOderatum sane medicamentum. Galenus secundum genera inquit, medicamentum affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Ceterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci τάξις: ηγεῖ ἀποσάσεις nominat. Galenus etiam ἀπίδυσ hoc est τάξις. numeros appellat. nos ordines, intervalla, abscessus, & gradus ἀποσάσεις. pellamus.

Ut iam sensu priuent. Græce est, ὥς ἂν νεκρῶν, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida vehementer, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuque priuentur. In summa nihil aliud est εννεκρῶν εννεκρῶν. quāam vita & sensu priuare. Poterat Orosius ex hoc loco, superiorem lectionē satis castigatam deprehendere. verum calumniandi animus eò illum prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

I N

A Gallochum. Aetius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilaloen nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloës appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes hæ vtuntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur, optimum spirat odorem.

ωλάδο. Flaccidum ex superfl. Gale. *ωλάδο* interpretatur *ωρίτω* *υγρότης*. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flaccescit, resoluiturq;. Hæc dixi, vt intelligas, Lector, versionis meæ rationem.

Anchusæ quatuor. Ex Galeno transcripsit: quanquā & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiunt, quod onochelon viperarum morsibus conuenire dicant, forma cataplasmatibus adhibitam, ad alligatum, & comestā his verbis, *καὶ ἀπὸ τοῦ μύου τε περιττομένου, καὶ ἐδιδωμένου*. Dioscorides de folijs *ὁ δὲ δόμνα καὶ τοῦ μύου, καὶ τοῦ ἀπὸ μύου*.

Polytrichū.
Callitrichū.
Trichomanes.

Adiantum. Adiantum & Polytrichon idem sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Dux igitur species tantū sunt, non quatuor, vt officinæ putant. Vna herba est adiantos in duas partes separata. vna proprie adiantum dicitur, de qua Dioscorides priuatim in vno capite tractat: folijs magis albis, coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, folijs filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus. hæc proprie vocatur Callitrichon. Pharmacopola in duobus comuni vocabulo capilli veneris vtuntur.

Capilli Veneris.

Athera. Ex Dioscoride sumptum. verum clausula hæc apud illum non adest, *ἀπὸ σίτου* quod est è fumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Quid loco acatiae veræ sumi possit.

Aegilops. Auenæ secundum genus. Primum *βρέμ* dicitur. Acatia. Veterum acatiam non habemus. vtimur autem quadam ex fructu pruni syluestris facta. verum recte aliquis vtetur loco acatiae veteris, rhu obsoniorum, quod sumach vocant officinæ, vt quidam eruditus annotauit.

Brācha vrsina.

Acanthus. Si Dioscoridis acanthum, & nostram Branchā vrsinam conferas, idem plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acanthus.

Acinos. Ex Dioscoride tantum hoc transcriptum est, vbi *φύγεθλον* interpretatus sum panum, & *ἱερὸν πύλα* sacros ignes.

Acorus veterum.

Acoron. Acorus veterum, Galanga nostra est: noster autem acorus species glandioli.

Amara

Amaracus. Paulus & Galenus duo capita de amaraco & sampsucho faciunt: easdemq; vires utrique attribuunt. ac si autores conferas idem plane sunt. Amaracus autem magis apud cyprum celebratus, sampsuchus in tota Gracia praterea amaracus paulo erit odoratior, quā hodie apud Gallos maioranam gentilem dicunt quāq; magis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscorides etiam diuersa fecit capita de vnguento amaracino & sampsuchino, quod alterum ex nobiliori maiorana in Cypro & cyzicenis, alterum per totam graciā fieret. Galeni autem Amaracus est, quam hodie Matricariam nominamus.

Amaracus.
Sampsuchus.

Amaranthus. Nota herba est apud Gallos, vocant eam passeu-
lutū, quod coloris gratia sericū coccineum vincat, annotauit Ruellius.

Matricaria.
Amaranthus.

Ambrosia. Frequens reperitur in gallia inter exiles & madidus
segetes qua messores se coronant. Vinosa herba rusticis dicitur, alijs
vinosa ruta, quod folio rutam, & odore vinum imitetur. Quā offici-
nae ambrosiam nominant, polemonium antiquorum est, non ambrosia.

Ambrosia.
Polemoniū.

Ampeloprassum. Exulcerat. Græcus codex habet ληνόι. at ego
legendum ex Galeno censeo ἐλνόι. quod castigator Basiliensis dissi-
mulat me annotasse priorem. Oroscius neglexit.

Oroscius.
Duo genera
Anemonæ.

Anemonæ omnes. Hoc est omnes satiuæ species. Duo enim ge-
nera tantum habentur. Satium, & sylvestre. Satium nos papauer
rubrum appellamus: eoq; utimur in triticis nascente. veteres autem
nunquam papaueris nomine vocarunt. Germani clapperrosen, galli
passe fleur. Ipsa nomenclatura à vento sumpta est, quod eo flante, flos
ipsius aperiatur. Erratica nuncupatur gallis coquerelles, primo vere
crescit flore purpureo, muliercula hac noua tingunt.

Lac in mammas suggerunt. Ex Galeno hæc omnia sunt tran-
scripta. Verum in illo ἀνασπῶσι quasi dicas, sursum in mammas ad-
ducunt: In Paulo autem & Dioscoride λήλασπῶσι.

ἀνασπῶσι.

Aparine. Addendum in codice græco particula τι. nam sententia
imperfecta est. si tantum legas ἐχθὰ δὲ νοεὶ λέντομ περ. fac igitur ἐχθὰ
δὲ λέντι λέντομ περ. Hoc Oroscius & Castigator Basiliensis anno-
tasse debuerant, vel exemplari adiecisse.

Aristolochia. Duabus tantū speciebus in officinis utimur, Longa,
& Rotunda. Sarmēacea negligitur, vnguentis alioquin utilissima.

Arction prosopitis. Herba est, quam officinae vocant Lappam
maiorē. Alterū arction virbasco simile, Lappam minorē appellant.

Lappa.
Maior.
Minor.

Armeniacum. Hoc est lapis armenius apud Dioscoridem libr. 5.

Arnabo. Idem est, quod Serapio vocat Zurumbet, Casīæ fistulæ,
& cubebis viribus respondens.

Arnabo.

Arthemisia. Arthemisia. Duplex, monoclonos, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distincta. Nam & haec plures habet ramos.

Baccara. Asarum. *Vulgus* Baccharam appellat. Germani *Hasel vurtz*. Galli, *Racabarant*.

Fuligo. In græco est *λατάρυα*. Sic etiam habet Dioscorides. Nescio cur Oroscius *λατάρυα* legendum censeat: cum ipse quoque fracturæ ossium ad cicatricem venire dicantur. siquidem raro sine ulcere carnis fractura accidat, nec *λατάρυα* solum de capitis fracturis dicitur. ut putat Oroscius, sed omnium membrorum, quod intellexisset Oroscius si Hippocratis librum de fracturis legisset.

Oroscius. Aspalthus. Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Mumia loco ipsius uti. Nam in Syria pauperes mortui bitumine implentur, vendunturq; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, alijsq; id genus conduntur.

Asphodelus. Pharmacopole, aphrodilorum vocant.

Atriplex. In græco codice videtur addendum *ταχέως*. Nam *ἀτρί* *καὶ* *λατάρυα* *γαστρίκα* *διεξέρχεται*, quod est, quare etiam per ventrem transit, imperfecta est sententia, & cōmunis cū alijs omnibus. Nā per ventrem vniuersa quidem transeunt: alia vero cito, quæ *ταχύπορα*, alia tarde, quæ *βραδύπορα* dicuntur. Legendum igitur cum Galeno *ἀτρί* *καὶ* *λατάρυα* *γαστρίκα* *διεξέρχεται* *ταχέως*, non aduerterunt nostri Aristarchi.

Vngula caballina. Bechion. Officinae vocant vngulam caballinam.

Buglossum. Dioscoridis & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem vocamus. Ei vero quam buglossam appellant officinae, respondet veterum Cirson dictum. Itaq; buglossum duplex erit, alterum minus, diciturq; nostra vulgaris borago: alterum maius, quod Cirson apud veteres dici monuimus.

Sabina. Duplex est, altera Cupresso similis, altera tarmarici. Germani *seuerbaum*, Galli *saunier* appellant.

Corallina. Muscus marinus. Officinae Corallinam vocant. In græcia ad vermes puerorum quasi presentaneo remedio vtuntur. Imo etiam purgare dicitur, etiam vim astringentem veteres ei ascripserunt.

Minium. Lemnium minium. Celsus minium vertit *μίλτον*. *Μα* *να* *ν* *δ* *ε* *ς* *κο* *ρ* *ρ* *ι* *γ* *ι* *τ* *ι* *ς* *Β* *α* *ρ* *β* *α* *ρ* *υ* *μ*, quod minium dixerit, non rubricam, ipse culpandus. Caterum officinae vocant Terram Sigillatam, quam multis annis fictitiam, imo etiam hodie vendunt, rubricam quandam ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. veram nunc Venetijs ex Lemno allatam habes: quæ ibi in colle quodam fuluo colore nascitur.

nascitur. olim Dianæ sigillo eam imprimebant, vnde etiam sphra-
is dicitur. nunc Turcico insignita est.

Terra armenia. Hactenus globulos quosdam in medio im-
reptos ex Germania allatos pro bolo armeno officina vendiderunt,
erus autem bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis lite-
is, si supremam & inferiorem partem auferas. nam cum in Tur-
la imprimunt, adiungunt sabulum album, ut melius signum reci-
iat.

Senecta anguis. Hoc est exuuium, quod verno tempore depo-
unt.

Nuclei acinorum vix. Græcus codex deprauatus est, qui ha-
et $\psi\upsilon\chi\alpha$ hoc est frigidi. pro $\sigma\upsilon\upsilon\psi\alpha$ quod est acerbi. Dioscorides dixit
 $\psi\upsilon\psi\alpha$ hoc est astringentes. Orosius omisit. Gemusaus inuitus cō-
edit ita legendum, dissimulans me id antea annotasse.

Gingidium. Paulus siccare dicit ordine tertio: Galenus $\lambda\alpha\psi\alpha$ Nota.
 $\lambda\epsilon\omicron\upsilon\sigma\tau\epsilon\rho\alpha\upsilon\alpha\pi\omicron\sigma\tau\alpha\sigma\iota\upsilon$ hoc est secundo ordine vel abscessu.

Pollen farinaceus. Tritici intelligendum est.

Teda. Teda proprie dicta, à græcis $\tau\acute{\alpha}\varsigma$ & $\tau\acute{\alpha}\delta\iota\omicron\upsilon$ vocatur. sui Teda.
generis arbor in Illyrico est: redundantior humore quàm reliquæ,
parcior liquidiorque quàm picea, flammis & lumini sacrorum quo-
que grata. Improprie tedas appellamus, tum picea sativæ partes imas
tum alia quoque ligna, quæ flamma olei vel picis illitu concepta fa-
cule modo lucent.

Daucos. Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur, Noster dau-
cus in officinis est species pastinaca sylvestris. Cum autem easdem vi-
res habeant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus. Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur. Vn-
de facile haberi potest, quam officina pro Dictamno vendunt, non Dictamnus.
est, nec etiam pseudodictamnus.

Dracunculus. Duplex est: maior, & minor. maior Serpentaria
in officinis appellatur.

Quercus. Quod sub glandis corio. Dioscorides etiam habet. Tu-
nica glandis putamini subiecta.

Ehenus. Paulus habet $\alpha\delta\iota\omicron\lambda\alpha\tau\epsilon\omicron\tau\alpha$ nullo sensu pro $\alpha\delta\iota\omicron\lambda\alpha\tau\epsilon\omicron\tau\alpha$. Sic etiam Dioscorides Orosius non aduertit, nec Basi-
liensis castigat. Orosius.

Veratrum. Olim veratrum album in usu frequentissimum erat:
nunc nigrum, id quæ solum forte quod illud molestius euacuet. At ve-
ratrum album si recte correctum exhibeatur, citra molestiam purgat,
maxime atra bile laborantes, & lue hispanica.

Hermody-
lus.

Hermodylus. alius hic est ab eo quem officina hermodactylus appellant. Hermodactylus serapiones duo comprehendit, ephemerum, & colchicum. Illud non lethale, hoc perniciosum. Sed in Italia colchicum minus noxium est: officinarumque hermodactylus, colchicum existit. Soluit ad sanguinem usque. Ephemero caremus.

Eupatorium. Eupatorium antiquorum est nostra agrimonia: quid autem nostrum Eupatorium sit adhuc me nescire fateor.

Spelta.

Zea In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.

Zithus. Potus est ex ordeo aqua resoluta. vocant ubique cerevisiam: quanquam ea ex alijs etiam frugibus fieri solet.

Isatis. Glastum latini vocant. Galli Guadam.

Caucamum. Serapionis lacca est, non autem ea quam officina vendunt. Tria enim nomine laccae veneunt: unum verum caucamum: alterum grana quaedam arte facta: Tertium inde color carmesinus confit.

Orosius. *λεπτομερές τριπλάκιον ἀπὸ πικρῆς καὶ ἀλμυρῆς ὕλης.* Orosius omisit Gemulus dissimulat me annotasse.

Calamintha. Nepita Romanis vocatur. Tres sunt species. Prima folijs ocymi, altera odore pulegij habet. Tertia folijs mentastri. Officina secundam vocant herbam cattorum. Tertiam calamentum, quae

Calamin-
tha.

ceteris est ignavio. Quidam secundam speciem proprie Nepitam à Romanis nominari dicunt. Galenus autem libello de paratu facilibus inquit, Calamintham absolute Nepitam Romanis appellari.

Caros. Officina Carui appellant.

Cubebae.

Carpesium. Myropola Cubebae nominant.

Nux. In graeco deesse aliquid ex dictione *λίαν* intelligo. Nam Galenus ita habet, *λίαν τὸ δένδρον ἐκ τοῦ μύτι λίαν τοῖς βλαστοῖς τῶν πικρῶν, λίαν τοῖς φύλλοις.* Tu igitur hinc restitue. Castigatores neglexerunt.

Cassia. De Cassia odorata hic intellige. Cassia fistula antiquis eadem erat quae odorata. Officinarum Cinamomum, seu canella vilioris frustra, Cassia illa antiquorum videtur. Nunc autem vulgus cassiam fistulam accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena, veteribus incognita, qua purgamus hodie bilem.

Cerasia. acida inquit conveniunt phlegmaticis & excrementosis stomachis. Male in codice graeco legitur *φλεγματοειδὲς καὶ φλεγματικὸς*. Mutanda autem ex Galeno *φλεγματοειδὲς καὶ περιττωματικὸς*. quod Censores nostri non annotarunt.

Ceratoniac. Pauli codex graecus habet, *ξηραντικὸς ὅτι καὶ ψυκτικὸς.*

is. hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro ψυσι. Notā
is, legit ψυσι. hunc nos sumus imitati. non admonuerunt casti-
atores.

Galla. Duo gallarum genera tantum in vsu medicorum sunt.
num solidum, alterum perforatum. aliorum complurium nullus est
vsus.

Cinamomum. Hoc caremus. Nam quod nos Cinamomum, aut
canellam vocamus cassia potius fistula antiquorum existit. Nam ci-
namomum fistula aut canella non est, sed arbutum. vide Galenum
de Antidotis.

Hedera. Quod officinae gummi hederae, appellant, non est lachri- Gummi
ma hederae, sed alterius cuiusdam arboris quam ignoramus. potest au- Hederae
tem haberi lachrima vera hederae.

Cichoreum. Paulus vocat cichoreum, syluaticam serem seu in- Intybi spēs
tybum. Græci tamen alij cicherei vocabulo tam domesticā, quā agre- cies
stem appellant. Domestica duplex est. una laticribus folijs, lactuca
similibus quam vulgus corrupto vocabulo Endiuia quasi intybum
nuncupant. Altera striatioribus folijs. Officina las duas scariolam
quoq; nominant. Iam syluatica etiam duplex habetur: ac proprio no-
mine cichercum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci
alij cicherei nomine, tam domesticam quā agrestim serim accipiāt.
At quam hodie vulgus herbariorum Endiuia ostendit in aruis
sonte nascentem. folio lactuca pusillo, aculeato, caule spinulis horrido;
candicante, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Clematis. Bis habetur in codice græco κληματίτις pro κλημάτις. Orosius
non emendarunt censores.

Cnicus. Officina Cartamum appellant.

Gummi. Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuum. Protoctacton. multi etiam celebres viri transtulerunt Lixiuū pro-
cinerem qui primus distillauerit, verum ideo non est dictum lixiuū toctacton;
protoctactum. sed quod primarium sit lixiuū, & principale.

Costus. Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria
haberi.

Hordeum. Polenta græcis ἀλφίτσα dicitur. Est autem proprie
ordeum torrefactum. Pisanum verò ordeum decortatum.

Cyclaminus. Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut
Rapum terræ latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillū Mariæ, Sigillum
officinis appellatur. Mariæ.

Lichen. Hæc est herba, quam officina hepaticam nominant, ioci-
norum fibris similis.

Leucoion. Per se signat violam albam quam gariophyllatam albam vulgus nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias violas: praesertim ad eas quae primo vere nascuntur, siue albae, siue purpureae, siue luteae fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

Fuligo. Fuliginem pini, coni, & piceae acriorem esse prodit. Mirum in modum variant interpretes in his vocibus reddendis, misereque se torquent. Γαζα πύκλω transfert pinum: πύτιν, piceam. πύτις. Κώνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πύκλω exponat tedam. Conum autem nucem pineam interpretatur: ut accipit Dioscorides, alijque veteres graeci. Galenus autem Conon arbo-rem appellat, fructum eius, hoc est nucem. κόνναλον, & τζέβιλον. Atque hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides. In graeco est μέροξ, lege μέροξ. Dioscorides vocat μέροχθον. alij etiam μέλοχθον.

Lycium. Officinae verum Lycium non habent.

Atramentum Indicum. Dioscorides vocat lapidem Indicum, praeterca astringentis esse naturae tradit. unde codex Pauli graecus emendari debet. legendumque: τῶν στυφέντων pro τῶν ψυχέντων, quod Orescius non annotauit. Gemusaeus dissimulat me id ostendisse, textumque relinquit deprauatum.

Melantheria. Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium. Nigella est. Quam officinae ostendunt, vera non est. Nam semen est substatuum, cum nigrum esse debeat, acutum: boni odoris. Galli melle noyre, Germani ratten appellant.

Myxa. Officinae Sebestem nominant.

Oenanthe. Duplex, una solani folijs herba, quae vitis non est, sed ob fructum racemosum vitis appellatur. Altera labrusca, quae à vite domestica nihil differt, nisi quia syluestrem habitum referat, nec colitur. vocant Oenanthe, labruscae flores, quanquam & herba sit eiusdem nominis.

Opus. Codex Pauli Graecus ὀπίον habet, Galenus ὀπ. Superius de lachryma papaueris quae opium dicitur, actum est. Hic de laserpitij liquore: qui partim belzumum partim assa fetida dicitur officinis.

Eruum. Dubitatur, an officinarum eruum verum sit. nam intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum. Vulgus in Gallia vocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Ory

Oryza *Vulgus Rixum* appellat. prima adempta litera.

Rizum.

Petroselinum. Verum petroselinum non habemus. forte nostrum est apium hortense, quod Dioscorides condimentis accommodatum dicit.

Peuce. Vbiq; interpretes græcorum πεύκω pinum, interim pinastrum reddunt.

Pistacea. Officinæ phislica nominant, aut physticorum grana. co. phystica. dex græcus male habet λειψωρ, pro λειπωρ. Non emendarunt cense. Oroscius res nostri.

Pityides. Dioscorides pini, piceaq; fructus nominat. Galenus picea tantum. illosq; abuti dictione ait qui vtriusque arboris fructum ita appellant. Sunt autem interni nucum pinearum nuclei.

Poligonatum. Officinæ Sigillum Mariae, vel Salomonis dicunt, sigillum. item genicularem & fraxinellam. Mariæ.

Pompholyx. Officinæ Tutiam nominant. codex Græcus σαρπώ- Tutia. dici hoc est carnosus vlceribus, pro λαγνυώδης habet. Non aduerterunt Aristarchi nostri.

Propolis. Vnguentarij Ceram virgineam nuncupant.

Resina. Dicit non potest, quàm interpretes Græcorum tum antiqui, tum recentiores in arborum quæ resinas fundunt, nomenclaturis euariant. E pinu dixi, quam Græci πεύκω vocant, hanc Marc- cellus Thedam exponit, quæ ratione, ignoro. Gaza, Hermolaus pinum aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus verit, Resina è Strobilo. ut hæc etiam sit arbor. Nam Plinius de pinu & pinastro agens, Easlem arbores alio nomine esse per oram Italie, quas strobilus vocant, plerique arbitrantur &c. Eadem igitur arbor est strobilus, quæ Conos superius dicta est, pineas nuce ferens. Ruellius interpretatus est Resinam Strobilinam quæ ex nucibus pineis fiat: secutus Plinium, qui sextodecimo libro inquit, pinus fert minimum Resinæ, interdum ex nucibus ipsis. Itaque confundunt hæc nomina πεύκω, λείωρ, σπείβιδωρ addit etiam πύτιν. pro pinu, aut pinastro, aut picea. cum inter se etiam viribus respondeant. eoq; minus periculi est in expositionum diuersitate.

Notæ

Rhus. Officinæ sumach appellant.

Sagapenum. Septisarij Serapinum vocant.

Sandaracha. Officinæ veram sandaracham nō habent. aut saltē sandaracha ignorat, vernicē teā vocantes. vera autē est quæ in argenti fodinis cū vera. auro & argēto inuenitur, flāmēo colore rufescit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris viras. Id quod in auripigmentis rubrum.

est. vera est sandaracha, licetque auripigmento loco sandarache uti, cum idem quasi sint, simulque, alterum alteri iunctum ex fodinis colligantur. Hoc solum differunt, quod auripigmentum nondum à natura perfectum sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli. Tria sunt genera seselios, *Massiliense*, *Aethiopicum*, & *peloponnesiacum*. *Massiliensis* descriptio conuenit cum nostro, *sileri montano*, ut vocant vulgares. at quod officinæ ostendunt, *Aethiopici* semen videtur. facillimum est, verum comparare.

Affa odorata.
Affa foetida

Sylphium. *Laserpitium* herba est. Liqueor *Laser* vocatur. Affertur partim ex *aphrica*, *armenia*, & *india*, suauissimo odore, præsertim *cyrenaicum*. unde etiam liqueor *Cyrenaicus* apud autores vocatur. atque hic officinis dicitur, *assa odorata*. seu *belzuinum* partim ex *Media* & *Syria* viroso odore, quod liqueorem *Medicum*, & *Syriacum* nuncupant, officinæ vero, *assam foetidam*.

Ceteræ.

Sisymbrium. In *Gallia* officinæ mentam aquaticam appellant. In *Italia* *Menta florentina* vel *menta gentilis* aut *nobilis*. Nam magis odoratum est. Nisi colatur, in *nepetam* degenerat.

Scammonium. Officinæ raro verum habent.

Scolopendrium *Seplasiarum* Ceterac existit.

Orosius.
Mirrha.

Scordion. In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπιπλάττωμενον, pro ἐπιπλάττωμενον. croco enim illini sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Orosius.

Mirrha. Quam officinæ vendunt *mirrham*, est deterrima species *mirrhæ*. Optima *subuiritidis* esse debet: confracta, candida vnguium modo. Legitur rursus in codice Græco male ἀδιπλαστομένη, pro ἐπιπλάττωμένη. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Aluminis
species.

Solanum. Vulgus *Solatrum* nominat.

Alumen. *alumen* scissile officinæ vocant *alumen plumæ*, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, veluti pluma esse videntur. *Alumen* rotundum raro in officinis inuenitur. nonnunquam tamen inter figulorum lapides conspicitur, quibus vtilis plumboque mistis, vitrum paternum & laucium parant. *Alumen* liquidum, vocat *seplasia*, *roche alumen*. cum foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueatur rursus liquefcit. Quod placitum & *latercularium* à *Galeno* & *Paulo* nuncupatur, forte est officinarum *alumen seaiolæ*, ex *Gipsi* fodinis, pellucens tanquam subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia *aluminis* Genera in officinis sed fictitia, *Zuccarinum*, quod ex *alumine* liquido aqua rosacea, & *albumine* oui conficitur. *Mulier*es hinc *fucum* parant. Item *alumen catinum* ex her

ex herba quadam cali vulgo dicta. quæ autem sit adhuc ignoro.

Styrax. Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ vocant, styra- styrax.
cem liquidam vocant, mirrha est stacte. Calamitis autem storax, stactæ.
verus styrax est de quo veteres tractant.

Simphitum. Variant sententiæ recentiorum in huius herbe cog- Nota.
nitione. Adiectum est in codice Græco γλισχρόν τι ἡγεὶ λευσμῶδες. Ga-
lenus habet γλισχρόν τι ἡγεὶ δακνῶδες, quod est viscosum quippiam
& mordax.

Schœni anthos. Officinæ squinanthos corrupto vocabulo appel-
lant. verti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad dif-
ferentiam quadrati seu angulosi. Sape autem alterum tantum adij-
cio, vel odorati, vel rotundi.

Calx. Perperam in codice græco erat. σωτρίαι pro θυμαίαι hoc Orosius.
est calefacit. Orosius non aduertit. Gemuseus dissimulat me id an-
te eum annotasse.

Tragus frumentaceus. Ita dicitur, vt ab herba distinguatur
Nam herba quadam etiam Tragos dicitur.

Altercum. Deerat in codice græco τῶν ψυχέρων. Inslauravi
ex Galeno. Orosius libenter, omisit, & si necessario addatur. Gemu-
seus fingit se in exemplari antiquo inuenisse: sed textum tamen im-
pressum, mutilum edidit.

Acs. In siccoribus corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducen-
dam. Sin autem eluatur, in teneris vltima clausula, deerat in codi-
ce Græco, necessario addenda, propter superiorem sententiam, nempe
in siccoribus, hoc est duris. Legendum itaque venit, εἰ δὲ πλεονέχῃ το
ἀπλύτου ἐπὶ τῶν ἀπαλασσομένων χρησιμότητον. Ad verbum fere ex
Galeno. Non obseruarunt censores nostri.

Chamædrys. Quasi dicas humilis quercus. vnde etiam vulgus,
querculam minorem appellat.

Chamæpitys. Hoc est humilis pinus aut picea. officinæ Iuam Iua musca-
muscatam vocant hanc antiquorum chamæpitin. ta.

Chrysocolla. Officinæ vocant Borax.

Ocymum. Vulgo Basilicum dicitur.

IN IIII. CAPVT.

AD affectum induratum. Recte dixit μοχλεῖσθαι quasi ve-
ste quadam agitare. Male autem in codice græco ὀκνῖν ῥωμι-
νῶ pro ὀκνῖν ῥωμῖν. neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus. Orosius diligens vt
ipse sibi videtur, castigator, legit in codice græco ἀπὸ πλεονέχων, quod
est à costis aut latere vt idem vertit, pro ἀπὸ νεύρων. Aetius & Ori

bafius nobiscum sentiunt.

Elaterium. Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimum videtur Dioscoridi. nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci $\pi\omicron\rho\rho\alpha\kappa\epsilon\iota\omicron\nu$ nominant.

Lathyrides. Species Tithymali est. Caput hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyrus ipse frutex vocetur. Dioscorides, & Aetius $\sigma\pi\delta\mu\acute{\alpha}\tau\iota\chi$ hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium. In Græco codice est $\epsilon\pi\iota\pi\lambda\alpha\delta\acute{\alpha}\sigma\alpha$ pro $\iota\delta\iota\pi\alpha\delta\acute{\alpha}\sigma\alpha$. Non emendarunt Aristarchi nostri.

IN V. CAPVT.

Colocynthidis medullæ. Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ vocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim $\alpha\lambda\acute{o}\nu\varsigma \mu\epsilon. \alpha.$ hoc est, aloes pars vna. Gale. vnde Paulus transcripsit, libro primo de compositione medicamentorum secundum locos, $\alpha\lambda\acute{o}\nu\varsigma$ habet $\mu\epsilon. \omega.$ hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex malis cotoneis. Nimis magnum videtur pondus piperis, nempe vnciæ sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes. Habetur in compositione oliuarum colymbadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris infectas in eodem liquore aliquot diebus conficito & vtere.

Catapotia ex lapide armenico. Scammonie pondus erat nimis grande, vnciæ sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur $\tau\omicron. \varsigma.$ hoc est vnciæ sex pro $\tau\epsilon. \varsigma.$ quid est semuncia facilis lapsus, cum quasi eadem literæ vtriusq; facies sit.

Vbi venter inanitus. In Græco lege post $\lambda\acute{\epsilon}\nu\omega\omega\iota\nu, \chi\alpha\sigma\tau\iota\varsigma$. Nō fuit versa in $\chi\alpha\sigma\tau\iota\varsigma$, $\epsilon\phi\acute{\epsilon}\lambda\omicron\nu\varsigma$ dictio, ut putat Castigator Basiliensis. Orosius hunc & superiorem locum præ studio omisit.

Puls. In titulo est Græce $\omega\lambda\iota\delta\iota\nu\acute{o}\varsigma$ tu fac $\epsilon\iota\delta\eta\delta\iota\nu\acute{o}\varsigma$, quasi oedematosis.

IN VII. CAPVT.

Friktionē & medicaminum potu. non purgantium, sed obtundentium vim medicaminis præsumpti, intelligito.

IN VIII. CAPVT.

Mellis quod sufficit. Post $\tau\omicron \alpha\phi\mu\delta\upsilon$. In codice Græco, adde, $\alpha\lambda\lambda\omega\varsigma$. Hoc est aliter. omiserunt censesores nostri.

Hiera Archigenis. In Græco cod. pro $\omega\lambda\iota\omicron\nu$ quidā $\phi\acute{\upsilon}\lambda\lambda\alpha$ legit.

IN

IN X. CAPVT.

PRæcipuè induratis. *Melius in codice Græco legitur τῶν δεικνυμένων pro τῶν δεικνυμένων, quod est scyrrho obdureli. Nam scyrrhus nunquam potest emolliari aut discuti, aut medicamentis intro sumptis amoueri.*

Apij radices. *Apios herba est, cuius radices alia pars sursum, alia infra purgat. ne putes hic apium, quod Græci ὄλιον dicunt, intelligi.*

Purgatio paulatim respondeat. *In Græco est κατὰ λόγον, factu κατ' ὀλίγον. neglexerunt castigatores.*

IN XI. CAPVT.

Hedychroi. *Paulus ad verbum quasi ex commentario Galeni; ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirum in modum variant.*

Carpobalsami. *Huc vsq; conueniunt scriptura: Galenus in citato libello Carpobalsamum non habet: verum primo de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpobalsamum. Præterea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis alijs simplicibus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita pergit, Iunci odorati floris drachmæ duodecim, secundum alios, viginti quatuor. Cinamomi drachmæ duodecim, amomi, Casie, rhapontici singulorum drachmæ quindecim. nardi indicæ, folij singulorum drachmæ sedecim, myrrha, croci singulorum drachmæ duodecim, vino falerno excipito in opobalsamum manus intingens. Alia habetur in commentario de Antidotis, sed variat magis.*

Pastilli scillini. *Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Galenus ait drachmæ centum viginti, erui farine drachmæ sexaginta.*

Pastillorum Hedychroi. *Deest in Græco ἀπὸ τῶν. Antea verteram magmatis hedychoi, secundum Galenum de Antidotis, quod Orosius reprehendit sine causa.*

Rosarum siccarum drachmæ duodecim. *Textus Græcus habet. <.ii. hoc est drachmæ quindecim. Orosius castigans locum, ait legendum <.ii. quod est drachmæ undecim. Ego <.iβ. hoc est drachmæ duodecim, scribendum esse iudico Galeni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum, tum versibus Andromachi consentientibus.*

Napi feminis. *Galenus adiicit γογγύλις & ἀγρίος, quod est Rapi sylvestris. præterijt Orosius.*

Dictamni. *Post dictamni habetur in Græco ἀνθός, quod expungi debet. Orosius ex Galeno.*

Orosius.

Mastic

Masticha Chia. Pauli codex Chia non habet. Ex Galeno addendum.

Cassia nigra. Galenus Cassia fistula nigra.

Nardi Indica. Paulus $\nu\alpha\rho\delta\omicron\tau\acute{\alpha}\chi\upsilon$ & hoc est spice nardi. Sed Galenus ubiq; nardi indica habet, quanquam Aetius spice nardi etiam legat. Post nardi Indica, deest pondus in Græco < .s. hoc est drachma sex.

Carpobalsami. In Codice Græco tantum erat $\beta\alpha\lambda\omicron\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$. Ex Galeno instaurandam $\lambda\alpha\rho\tau\omicron\beta\alpha\lambda\omicron\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$.

Phu pontici. male legebatur in Græco $\phi\upsilon$, $\acute{\epsilon}\pi\upsilon\varsigma$ pro $\pi\omicron\upsilon$ $\pi\omega\tau\eta\iota\kappa\acute{\epsilon}$.

Centaurij. Omnes Theriaca descriptiones apud Galenum habent $\lambda\omicron\nu\tau\alpha\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ quod est centaurij tenuis.

Liquore hypocistidos. Perperam in Græco $\acute{\epsilon}\pi\upsilon\omicron\upsilon\tau\omicron\upsilon\iota\delta\iota$ & pro $\acute{\epsilon}\pi\omicron\upsilon\tau\omicron\upsilon\iota\delta\iota$ &.

In nephriticis cum mulso. Male Græcus codex habet $\acute{\epsilon}\pi\iota$ $\nu\epsilon\phi\rho\iota\tau\iota\kappa\acute{\omega}\nu$ μετ' $\acute{\epsilon}\xi\upsilon\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\tau$ & pro $\acute{\epsilon}\pi\iota$ $\nu\epsilon\phi\rho\iota\tau\iota\kappa\acute{\omega}\nu$ μετ' $\acute{\delta}\iota\upsilon\omicron\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\tau$ &, ex Galeno castigatum. Basiliensis castigator omisit.

Sumuntur viperæ. Ex libello Galeni de Theriaca ad Pampphilianum ad verbum sunt transcripta nisi quod deest in illo, apij.

Rutæ sativæ seminis libra. Paulus habet ζ . β. hoc est sextarij duo, male nimirum pro $\lambda\iota$: α , ut habet Galenus, omisit, Oroscius.

Malabathri foliorum. Codex Pauli habet singulorum vncia. Galenus vncijs quatuor. Ita etiam Aetius. Neglexit Oroscius.

Thymi summitatum. Hic quoque castigandus codex. Legendumq; $\gamma\omicron$. β. pro $\gamma\omicron$. β. secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, fœniculi singulorum libris. Male in codice Græco Pauli $\lambda\iota$. α. habet pro $\lambda\iota$. β. sed facilis error erat, ponere ω. pro κ. primum signat. β. secundum, literam $\eta\tau\alpha$, quam Latini in e vertunt. valet autem in numero, octo.

Tordyli montani. Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum. Neglexerunt Oroscius, & Gemusaus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum. In Græco est $\upsilon\omicron\sigma\omicron\nu\acute{\alpha}\mu\omicron\varsigma$ < .η. ubi legendum $\upsilon\omicron\sigma\omicron\nu\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$ < .η. quod praterierunt Aristarchi nostri.

Esdra. in fine compositionis quidam legunt $\acute{\omicron}\iota\gamma\epsilon\omega\varsigma$ hoc est intybi pro $\sigma\iota\acute{\sigma}\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\omega\varsigma$.

Medicamentum Cyphoides. Textus Græcus & mutilus, & deprauatus est. Legendum enim $\lambda\iota\alpha\lambda\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$ < .β. $\beta\omicron\delta\epsilon\lambda\lambda\acute{\iota}\nu$ < .β. β . $\kappa\alpha\alpha\acute{\iota}\alpha\varsigma$ < .α. β . $\lambda\iota\upsilon\alpha\mu\acute{\omega}\mu\omicron\nu$ $\tau\epsilon\iota\acute{\omega}\delta\omicron\lambda\omicron\rho$, $\nu\acute{\alpha}\gamma\delta\omicron\nu$ $\acute{\epsilon}\tau\acute{\alpha}\chi\upsilon$ & < .γ. $\sigma\chi\acute{\epsilon}\iota$

πρὸ ἀρθοῦς < .β. S. Oroscius & castigatōr Basiliensis reliquerunt textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri. Deest in codice Græco *πιπέρηος*. Oroscius omisit.

IN XII. CAPVT.

Terra samia cum cremore ptisanæ. In Græco est *διὰ χυλῶ* *πτισάνης*, forte *μετὰ χυλῶ*. Notauit etiam Oroscius. Gemusæus autem omisit.

Herbæ pulicaris succo. In fine capitis puto Græcum codicem esse deprauatum: quàm proxime autem licuit, ad veritatem conuertit.

IN XVI. CAPVT.

Siquidem vino aut succo. Codex Græcus hic rursus deprauatus est. Habet enim, *εἰ μὴ οἶνω ἢ χύλω τινὶ λασύντε καὶ φίβειν*. Iectio Græcæ pro *εἰ μὴ οἶνω καὶ φίβειν* *ἀπὸ αὐτῶν*. Neglexit castigatōr Basiliensis.

IN XVII. CAPVT.

Oesypo. In principio Capitis Græcus codex habet, *ὁ οἶσῶπῳ* pro *οἰσῶπῳ* hoc est Oesypo. Aristarchi nostri præterierunt.

Lixiuu è ficu cui calx. Græci hoc lixiuium vocant *λιγία* *πρὸ τῶς ἀκτῆς*. Oroscius, alijq; multi vertunt, lixiuium quod primum distillauerit. Paulus autem libro septimo ipse interpretatur, lixiuium cui calx sit admixta. Oroscius.

Emplastrum ex dictamno. Textus Græcus deprauatus corrigi debet ex Galeno de compositione medicamentorum secundum genera in hunc modum *λεπίδῳ* < .S. *χαλκῶς λιπαρῶς μελίου* < .n. *ἀλοῦς*. < .n. *χαλδάνης*. < .β. ut nos vertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor. In emplastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pondus præscriptum *γο*. S. quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ valent semuncia. puto superfluum. Neglexerunt Castigatores.

Olei veteris. In fine Emplastri ex lapidis asij flore. Græcus codex superflue habet *ὄξους ἀρρυμμάτου*. Nam superius mentionem acetii fecerat Paulus. Oroscius & Gemusæus omiserunt.

IN XVIII. CAPVT.

Sertulæ campanæ. In malagmate polyarchio, Deest *μελιλύτῃς*. Instauratum ex Galeno. Neglexerunt hoc correctores.

Pentamyron. In medicamento quedam sunt superflua, & nomen ipsum Græcum indicat, quinque tantum significans. & Oribasius consentit. Ita autem sonant ea quæ adijciuntur, folia tum, phylli uncia tres, ammoniaci uncia. Castiæ uncia sex, Ladani &c. aut in fine

in fine addendum, ladanii vnciae sex.

Seui Taurini. In medicamento diaspermato deest codici Græco
λτ. Ut sit seui Taurini libra. Sic etiam habet Alexander medicus.
omisit Orosius & Castigator Basiliensis.

Copton. Sic dicitur medicamentum, quod non coquitur, ve-
rum tunditur, & succis aut liquidis affusis, ad figuram malagmatis
redigitur.

FINIS LIBRI VLTIMI

COMMENTA-

RIORVM.

*


ERRATA GRÆCARVM


aliquot vocum in Pauli commentarijs. Prior
numerus folium, secundus verò pagi-
nam indicat.

*

Folio 663. 19. lege ἀναῖται. 664. 19. ῥάχης. ἐμπροσθεν. eod. 20.
φλεγμαίνη. eod. 37. ποιότητων. ἀρ. 665. 39. νήσιος. 673. 20. ἀλαφῆ.
674. 27. διωάμεν. 697. 20. προνοῖται. προφῶν. 21. ἐκπρίσιως.
699. 28. προσπλατῆ μῆνον. 707. 10. ὑδιστραφείσης. 727. 16. ἀνα-
γωγῆ. 30. δριμύτι καὶ. 728. 13. παρχημήν. 731. 5. πολλήν. 23.
ἐπιτομάχῳ. 733. 33. κοινά. 734. 6. γίγνεται. 736. 19. ἄλλως. 735. 27.
ἀναπυσσάτω. 741. 30. νυστάζειν. 31. ὑπνώτουν. 744. 37.
διαφλάφην. 745. 34. ἑραστία. 746. 20. ἀπορρύψαντα.
841. 26. ἀπαλασάμεν χρησιμώτερον. 773. 8. ἀποβεβρεγμένων.
775. 13. οὐλὴ gingivæ. 782. 16. ἀτμῶδες. folio eodem. σῆμα.
784. 9. pro decentia lege decidentia. 791. 36. τακῆν. 792. 22. ῥα-
τίνης. 801. 20. ἱς. 812. 16. πηλοποιήσιν.

Lugduni,
EXCVDEBAT
PHILIBERTVS
ROLLETIVS.





INDEX EORVM

QVAE HOC OP E-

RE CONTINEN-

TVR.

*



Baptismus instru-	Absinthium	481
mentum 435	Acacalis	471
Abdominis inte-	Acacia	ibid.
rioris membrana	Acalyphe	471
vulnera quomodo	Acaniha Aegyptia vel arabi-	
manu curentur.	ca	472
Abdominis suendi ratio	Acaniha leuce	ibid.
Abies	Acanthium	ibid.
Abrafia quomodo curanda	Acanthobolon	382
Abrafia ab inflammatione quid	Acanthus	472
tueatur	Aceratos emplastrum Gal.	619
Abrotanum	Acetabulum 510 & 658 & 659	
Abfcessibus corporis exterioribus	Aceti fex	548
conuenientia medicamenta	Acetum	527
In abfcessibus qualia corpora inue-	Acetum scillites 573. quibus uti-	
niri soleant	le	574
Abfcessui quomodo manu scalpel-	Achores quid 113. unde oriantur	
loq; fit medendum	ibidem. quomodo curentur ibidem	
Abfcessum in pus transijse quomo	& 114	
do deprehendendum	Achras	481
Abfcessus medicamentorum	Acidorum vires	467
Abfcessus quid	Acinos herba	472
Abfcessus rumpentia	Acini mali punici	536
Abfcessuum generatio	Aconitum	472
Note	Aconiti poti nota 356 Remedia	
Abfcessuum neruicorum medica-	ibidem	
menta	Acopa unde dicantur 231 & 633	

*

INDEX.

652		<i>Acutus morbus exacte non exacte</i>	
<i>Acopa calefacientia</i> quibus con-	713	<i>Acutus morbus</i>	ibid.
stent 633. eorum usus	ibidem	<i>Acutus ex decedentia</i>	714
<i>Acopa emollientia</i> quibus conue-	ibid.	<i>Adarce tantum acrimonia & ca-</i>	
niant	ibid.	<i>loris habet ut extrinsecus cum alijs</i>	
<i>Acopa quam spissitudinem</i> habe-	ibid.	<i>imposita vrat.</i>	470
re debeant	ibid.	<i>Adeps animalium. 47. & 542. suil-</i>	
<i>Acopon à varietate pæcilon di-</i>		<i>lus ibidem caprillus ibidem anse-</i>	
ctum	634	<i>rimus ibidem. gallorum. gallinarum</i>	
<i>Acopon a Zanite</i>	ibid.	<i>ibidem. leoninus ibidem. bubu-</i>	
<i>Acopon barbaricum</i> dia euphor-		<i>lus ibidem. vrsinus, vulpinus ibid.</i>	
<i>bin, ad coxædum dolores, & alia</i>		<i>viperinus ibidem</i>	
<i>pleraque</i>	635	<i>Adeps marinum calidior & sic-</i>	
<i>Acopon Basilij</i>	ibid.	<i>cior quàm sceminarum</i>	ibidem
<i>Acopon bromion</i>	634	<i>Adeps vetustate calidior redditur</i>	
<i>Acopon cui nomen est pyxis</i>			
636		543	
<i>Acopon dysules ex Gal. 638. aliud</i>		<i>Adglutinamenta</i>	600
ibidem		<i>Adianthum</i>	470 & 832
<i>Acopon ex abiete Gal.</i>	636	<i>Adolescentia atas</i>	666
<i>Acopon ex atramento librario, cu-</i>		<i>Adolescens mulier</i>	ibid.
<i>ius ruborem peculiariter inducens,</i>		<i>Aedaon</i>	470
<i>idq; potissimum in ijs quibus alte-</i>		<i>Aegilops</i>	771
<i>ra capitis pars dolet, ex commen-</i>		<i>Aegilops</i>	470
<i>tarijs Alexandri</i>	637	<i>Aegilops morbus quid. 149 & 376</i>	
<i>Acopon ex nigra populo. 636 &</i>		<i>curatio ibidem</i>	
673		<i>Aegirinum oleum</i>	641
<i>Acopon lysiponium</i>	635	<i>Aegiros</i>	470
<i>Acoron</i>	472	<i>Aegyptia artaba</i>	659
<i>Acorus nostra</i>	832	<i>Aegyptia pessus</i>	648
<i>Acorus veterum</i>	ibid.	<i>Aegyptia spina sanguine & alias</i>	
<i>Acridæ</i>	472	<i>fluxiones retinet.</i>	472
<i>Acrium vires</i>	467	<i>Aegyptia stomatica</i>	597
<i>Acrochordon</i>	233	<i>Aegyptia terra</i>	485
<i>Acroteriasmos</i>	426	<i>Acma</i>	471
<i>Acron acraganthus</i>	87	<i>Aequinoctium vernum quid in ho-</i>	
<i>Acle</i>	472	<i>minibus efficiat</i>	55
<i>Aculos extrahentia medicamen-</i>		<i>Aequinoctio verno quid facien-</i>	
<i>ta</i>	320	<i>dum</i>	ibidem
		<i>Aeq</i>	

I N D E X.

<i>Aequinoctium vernum dies habet</i>	<i>rio</i>	
<i>quadraginta sex vsq; ad vergilia</i>	<i>Aethale</i>	6
<i>rum ortum</i>	<i>Aethiopica olea</i>	469
<i>ibid.</i>	<i>Aethiopia</i>	490
<i>Aequinoctium autumnale quid in</i>	<i>Aetius Cappadox</i>	470
<i>homine efficiat</i>	<i>Aetionychon</i>	272
<i>56</i>	<i>Agalloctum</i>	470
<i>Aequinoctio autumnali quid fa-</i>	<i>Agapete compositio ad podagram</i>	469
<i>ciendum</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Ab aequinoctio autumnali dies sunt</i>	<i>Agaricum</i>	469
<i>quadraginta sex ad occasum ver-</i>	<i>Agarici nigri damnum corpori affe-</i>	
<i>giliarum</i>	<i>ibid.</i>	362
<i>Aera lolium</i>	<i>Agarici vires. 553 Dandi modus</i>	
<i>471</i>	<i>Agaricus. ibidem. Quale deligen-</i>	
<i>Aeree aquae quibus conferunt</i>	<i>ibid.</i>	
<i>24</i>	<i>Agarion</i>	469
<i>Acrem morborum causum esse quo-</i>	<i>Agaratus</i>	517
<i>modo cognoscatur</i>	<i>Agglutinamenta</i>	600
<i>87</i>	<i>Agglutinamenta oculorum qui</i>	
<i>Aereolus</i>	<i>defluxionibus infestantur</i>	609
<i>657</i>	<i>Agnus</i>	469
<i>Aer intemperatus contrariae tempe-</i>	<i>Agrinus sanguis</i>	471
<i>rieti confert</i>	<i>Agressus</i>	469
<i>22</i>	<i>Agrioscordon</i>	540
<i>Aeris flos mixtus collyrijs palpebra-</i>	<i>Aima</i>	471
<i>rum & asperitates & ficus ex-</i>	<i>Aizoon</i>	470
<i>terit. 552 quomodo coqui debeat</i>	<i>Alabastrites</i>	517
<i>649</i>	<i>Alana terra</i>	486
<i>Aer optimus. 22 Semper prodest</i>	<i>Ale quomodo adurantur</i>	393
<i>ibidem</i>	<i>Alanda</i>	510
<i>Aer temperatus temperatis corpo-</i>	<i>Albus cygnus</i>	602
<i>ribus utilis</i>	<i>Albugines oculorum quomodo cu-</i>	
<i>ibid.</i>	<i>rentur</i>	154
<i>Aer vitiosus ibidem. semper nocet</i>	<i>Album diarodon</i>	606
<i>ibidem. quomodo emendandus</i>	<i>Alcea</i>	473
<i>87</i>	<i>Alcibiadion</i>	494
<i>Aerago 498 quomodo coquenda</i>	<i>Alcibiadios anchusa</i>	469
<i>649</i>	<i>Alcyonium</i>	473
<i>Aes combustum ad cicatricem vl-</i>		
<i>ceribus obducendam in sicciori-</i>		
<i>bus corporibus praestantissimum</i>		
<i>est. 552 quomodo coquendum</i>		
<i>648</i>		
<i>Aestate quae victus ratio conue-</i>		
<i>niat</i>		
<i>25</i>		
<i>Aetatum omnium victus ra-</i>		

INDEX.

<i>Alexandri cyphoides</i>	580	<i>Althea</i>	473
<i>Alexandri purgatio ex Rhodomelite confecta</i>	561	<i>Alumen</i>	543. quomodo coquendum 649
<i>Alexandri acopon ex atramento librario</i>	637	<i>Aluminatae aquae ad quid conducant</i>	24
<i>Alica</i>	43	<i>Aluus</i>	quomodo subducenda 12
<i>Alimenta quae laudatiss.</i>	40	<i>Aluus</i>	pueris quomodo cienda 405
<i>Alimentorum facultates</i>	ibid.	<i>Aluus</i>	quomodo emollienda 540
<i>Alimon</i>	473	<i>Alui</i>	deiectiones quid praesagiant 74. vide deiectiones.
<i>Allium</i>	42 & 540	<i>Aluo</i>	astrecta quomodo medendum 213
<i>Allium sylvestre</i>	ibid.	<i>Aluus</i>	quomodo subducenda sanis 20
<i>Alme</i>	473	<i>Alui</i>	fluxionibus maxime biliosis medetur lac coctum in quod demissi sunt igniti marini calculi 49 & intestinorum torminibus 49
<i>Aloë</i>	ibid.	<i>Alui</i>	astrecta cito & cruenta in febribus cause & curatio 103
<i>Aloë quibus danda</i>	556	<i>Alypon</i>	474
<i>Aloës dosis</i>	556	<i>Alypi</i>	seminis vires, quantitas & dandi modus 559
<i>Aloën exhibendi tempus & modus</i>	ibidem	<i>Alysson</i>	474
<i>Aloë quomodo coquenda</i>	651	<i>Alysi</i>	vires & vtendi modus 559
<i>Aloë sola inter medicamenta purgantia stomacho conducit</i>	556	<i>Amantium</i>	notae 135. curatio ibidem
<i>Allopex</i>	474	<i>Amaracinum oleum</i>	643
<i>Allopecia vnde dicta</i>	107	<i>Amaracus</i>	474
<i>Allopecia remedia</i>	108	<i>Amarantus</i>	474 & 491
<i>Allopecia & ophiafis quomodo differant</i>	107	<i>Amarorum vires</i>	467
<i>Alos achne</i>	474	<i>Amaurosis oculorum</i>	158
<i>Alos anthos</i>	ibid.	<i>Ammanite fungi</i>	43
<i>Alphitidon</i>	433	<i>Ama</i>	
<i>Alphorum generatio</i>	281		
<i>Alphorum curatio</i>	ibidem		
<i>Alphi albi vnde ducant originem</i>	ibidem		
<i>Alphi nigri vnde generentur</i>	ibidem		
<i>Als</i>	472		
<i>Alfine</i>	474 & 523		
<i>Altercum</i>	549		
<i>Alterci assumpti notae</i>	354. Re-		
<i>media</i>	ibidem		

INDEX.

<i>Amaſonum paſtillus</i>	587	<i>Anagallis</i>	476
<i>Ambroſia ad febres arcendus</i>		<i>Anagyrrus</i>	ibidem
<i>apta</i>	633	<i>Anarrhinon</i>	477
<i>Ambroſia</i>	474	<i>Ancyloſis quid & quomodo cura-</i>	
<i>Ambuſtorum medicamenta</i>		<i>randa.</i>	326
284		<i>Anaphorici</i>	178
<i>Ambuſtis quomodo pili renaſcan-</i>		<i>Anas</i>	46
<i>tur</i>	285	<i>Anatis ſanguis</i>	471
<i>Ami</i>	474	<i>Anchilops eiſque curatio</i>	149
<i>Amiantum</i>	ibidem	<i>Anchuſa quatuor</i>	469
<i>Amithaonis empl.</i>	616	<i>Ancyle</i>	226
<i>Ammos</i>	475	<i>Ancyloſis</i>	ibidem
<i>Ammoniacum quomodo coquen-</i>		<i>Ancylion</i>	380
<i>dum</i>	651	<i>Ancylogloſſon</i>	ibidem
<i>Ammoniacū thymiana</i>	475	<i>Andrachne</i>	476
<i>Ammoniacum ſuffimen</i>	ibid.	<i>Andronius paſtillus</i>	588
<i>Ammoniaci gutta</i>	ibid.	<i>Androſamon</i>	476
<i>Ammoniaci ſuffiminis, pondus. mo-</i>		<i>Androſarces</i>	ibidem
<i>duſ utendi, atque vires</i>		<i>Anemomæ</i>	ibidem
560		<i>Anethine malagma</i>	632
<i>Amomum</i>	476	<i>Anethinum oleum</i>	639
<i>Amores</i>	135	<i>Anethum</i>	476
<i>Ampelos melena</i>	475	<i>Anethum olea incoctum, dolo-</i>	
<i>Ampelos leuce</i>	ibidem	<i>rem lenit & ſomniſerum eſt</i>	
<i>Ampelos agria</i>	ibidem	92	
<i>Ampelos hemeros</i>	ibid.	<i>Aneurisma quid</i>	386. <i>Eius</i>
<i>Ampelopraſum</i>	475	<i>cauſe</i>	387. <i>Notæ ibidem. cura-</i>
<i>Ampelitis terra</i>	486	<i>tio</i>	ibidem
<i>Amphisbenæ morſus curatio</i>		<i>Angina eiſq; ſpecies, & curatio</i>	
344		173	
<i>Amygdalinum oleum</i>	641	<i>Anguis ſeneſta</i>	486
<i>Amygdalinum metopion</i>	ibidem	<i>Anicetos empl.</i>	619
<i>Amygdala, dulcia, amara</i>	45	<i>Ani inflammationis curatio</i>	
& 475		233	
<i>Amylum</i>	43	<i>Ani eryſipelata quomodo curetur</i>	
<i>Amylon</i>	475	ibidem.	
<i>Amurca</i>	ibidem	<i>Ani dolore mitigantia</i>	234
<i>Ambrochiſmus in quibus & quo</i>		<i>Ani excreſcentiæ quomodo cu-</i>	
<i>modo fiat.</i>	272	<i>randa</i>	ibidem.

INDEX.

235	Anodynnon collyrium liquidum	
Ani vlcera pascendo serpen-	146	
tia quomodo sananda	232	Anonis 477
Ani rimas curantia ibidem.		Anorexia 192
234		Anseres 46
Ani condylomata quomodo curan-		Anserinus adept 542
da	234	Anseris sanguis 471
Ani condylomata, tubercula		Anserum oua 46
rimae quomodo manu curentur		Anthemis 553
424		Antheron 593
Ani fistularum curatio manu ad-		Anthyllis 477
ministrata	421	Antiad. curantia 172
Ani non perforati curatio	424	Antidotum quid 569
Ani vlcera humida quomodo cu-		Antidotum dia hematon ex sangui-
randa	232	nibus 473 & 471
Ani vlcera citra inflammatio-		Antidotorum differentia 569
nem oborta quomodo curanda		Antidotum Mitridatis, diaslin-
ibidem		cu 573
Ani proidentis curatio	235	Antidotum philonis 575
Ani vlcera sicca recentia quomo-		Antidotum, Solera 576
do curanda	232	Antidotum Satyriacum 583
Animi relaxatio ad probam corpo-		Antidotum theodorctum 217
ris educationem plurimum affert		Antidotum theriace quomodo pa-
momenti	6	retur 570. Eius vsus 571
Anime defectus causae & reme-		Antirrhinon 477
dia	104. & deinceps	Antiochi hicra 565
Animalia pedestria	47	Antilium 632
Animalia fera siccus, quam		Antitasis 440
domestica, alimentum exhi-		Aparine 477
bent, minusque excrementicium		Apechema 434
48		Aphace 480
Animalia volatilia	46	Aphrodes papauer 521
Animalium partes	47	Aphromtrum 481
Animalium pedestrium carnes		Aphroselenes lapis 517
ibidem		Aphroditarium 593
Anisum	477	Aphrodisiasticon elidion pastillus
Anodynnon medicamentum ad ab-		586
rasa, flagris caesa, & articulorum		Aphros 481
contusiones	286	Aphthas curantia 6. & 171
		Api

INDEX.

<i>Apiastrum</i>	521	<i>Aqua inter cutem. Vide hydroph.</i>
<i>Apios</i>	477	<i>Aque aluminatæ ad quid conducant 24. nitrosæ, & falsæ ibid.</i>
<i>Apium</i>	538	<i>sulfuratæ ibidem. bituminatæ ibid. ferreæ ibid.</i>
<i>Apium grande</i>	499	<i>Aqua in qua ferrum extinctum est 538</i>
<i>Apium palustre.</i>	49	<i>Aqua frigida quando assumenda 23</i>
<i>Apium iclus notæ 339. Reme- dia</i>	ibidem	<i>Aquam eductentia 560. quibus conueniant ibidem</i>
<i>Apium montanum</i>	527	<i>Aque rosatæ quam hydrosatum dicunt, compositio 599</i>
<i>Apium sylvestre</i>	541	<i>Aquosorum vis 467</i>
<i>Apj dimidij quod ad radicem est utendi modus</i>	559	<i>Aquosum ramicem curantia 228</i>
<i>Apium quas vires possideat 41</i>		<i>Aqua frigida quando cum fiducia propinanda in febribus 83</i>
<i>Apochyma</i>	477	<i>Aquam elicientia quibus exhibenda 560</i>
<i>Apochymatis coëlio</i>	650	<i>Aque bituminatæ quibus conferant 24</i>
<i>Apocynon</i>	477	<i>Aquarum naturalium differentia ibidem</i>
<i>Apollinaris herba</i>	549	<i>Aque sulfuratæ quibus conferant ibidem.</i>
<i>Apomeli</i>	599	<i>Aqua vitiosa quomodo emendanda 23</i>
<i>Apomeli, ex commentarijs philagrij</i>	599	<i>Aque falsæ & nitrosæ quibus conferant 24</i>
<i>Apoplexia quid</i>	135	<i>Aque ferreæ quibus conferant ibidem</i>
<i>Apoplexia cui ætati & temperamento potissimum accidat 136</i>		<i>Aque vitiosæ notæ 22</i>
<i>Apoplexiæ signa</i>	ibid.	<i>Aque frigide potu coercendi phrenitici 122</i>
<i>Apoplexiæ causa</i>	ibid.	<i>Aquam eductentia 220</i>
<i>Apoplexiæ curatio</i>	136	<i>Aquam vitiosam sumpturus quæ præmittere debeat 23</i>
<i>Aposyrmata quomodo curanda 285</i>		<i>Aquosorum vires 467</i>
<i>Apothetapia 8. & 10. & 11.</i>		
<i>Apothrausis</i>	433	
<i>Appetentia canina quomodo curanda 99</i>		
<i>Apri tecur</i>	496	
<i>Aqua 549. nitrosa, bituminosa, ibidem. pluvialis, ibidem mari- na</i>	496	
<i>Aqua hydropicis quomodo emit- tatur</i>	396	

INDEX.

<i>Aqua marina</i>	496	<i>media</i>	361
<i>Aquarum naturalium vis</i>	24	<i>Argenti recrementum</i>	491
<i>Aqua frigida in febribus putridis quando tũd exhibeatur</i>	78	<i>Arida medicamenta eorumq; va- riae differentiae</i>	591
<i>Aqua quae optima 22. eius nota ibidem.</i>		<i>Aridum ad xerophthalmiam &c.</i>	609
<i>Aquae aerea quibus conferant</i>	24	<i>Aridum collyrium Gal. quod ocu- los tuetur</i>	608
<i>Aquae frigidae subito ac cumulati- m pota remedia</i>	362	<i>Aridum dia crocus</i>	609
<i>Aqua vitiosa 22. quomodo corri- genda</i>	23	<i>Aridorum mensura</i>	659
<i>Aquarum sponte provenientium differentiae 24. vires</i>	ibid.	<i>Arietum testiculi</i>	47
<i>Arabica spina</i>	472	<i>Ariobarzanion emplastrum</i>	614
<i>Arabicus lapis</i>	517	<i>Arisarum</i>	478
<i>Arachne</i>	477	<i>Aristolochia</i>	ibidem
<i>Aranæus</i>	ibidem	<i>Aristolochiae clematidis pondus, modus exhibendi & vires</i>	558
<i>Aranæe ictus nota 340. remedia ibidem</i>		<i>Aristophanium emplastr.</i>	616
<i>Arbutus</i>	508	<i>Armenia</i>	45
<i>Aceuthos</i>	478	<i>Armenia emplastr.</i>	619
<i>Archigenis hiera</i>	566	<i>Armenia terra</i>	486
<i>Archigenis medicamentum ad vi- perarum morsus</i>	344	<i>Armeniacus lapis</i>	517
<i>Archigenis medicamentum ad ero- sionem mamillarum cum ma- lignitate</i>	190	<i>Armeniacum</i>	478
<i>Archigenis medicamentum ad car- cinode & cacoethe vlcera</i>	300	<i>Armenia mala</i>	45
<i>Arction</i>	468	<i>Arnabo</i>	478
<i>Arena</i>	475	<i>Arnoglossum</i>	478
<i>Algemon</i>	152	<i>Aron</i>	479
<i>Argemone</i>	478	<i>Arquatus</i>	225
<i>Argæi montis Cappadociae lapi- des.</i>	517	<i>Arsenicum</i>	479
<i>Argentum viuum</i>	549	<i>Artaba ægyptia</i>	659
<i>Argenti spuma 516. quomodo co- quenda</i>	648	<i>Artemisia</i>	479
<i>Argenti vini assumpti nota & re-</i>		<i>Arteriace ad abscissum vocis so- num & eius claritatem faciens</i>	178
		<i>Arteriace, hypoglossis appellata, ad abscissionem vocis, raucitatem, & agrè reijcientes</i>	ibid.
		<i>Arteria quid</i>	63
			<i>Arie</i>

INDEX.

<i>Arteriarum vsus</i>	<i>ibid.</i>	<i>ter ossa articularum impactis</i>	
<i>Arteriarum origo</i>	<i>ibid.</i>		263
<i>Arteriæ omnes eodem pulsandi modo inter se & cum corde conueniunt</i>	<i>ibid.</i>	<i>Articulorum topi quomodo curandi</i>	264
<i>Arteriæ quæ tãgenda pulsus dignoscendi causa</i>	64	<i>Articulorum tophos quid coalescere impediatur</i>	263
<i>Arteriæ post aures in quibus passionibus incidenda</i>	365	<i>Articulorum intortorum & contusorum remedia</i>	302
<i>Arteriæ quomodo diuidantur ibi.</i>		<i>Articulorum contractio seu ligatio quæ ancylosis dicitur, quomodo curanda</i>	326
<i>Arteriæ asperæ tumor qui bronchocele dicitur 387. eius differentia duplex ibid. curatio</i>	388	<i>Articulorum contusionum medicamenta</i>	286
<i>Arteriam humidiores quæ reddant</i>	72	<i>Articulorum morbis quomodo & quæ medicamenta adhibenda</i>	262
<i>Arteria aspera quomodo incidi debeat</i>	383	<i>Articulorum vlcera curatio</i>	320
<i>ἀρτηριότομος</i>	175	<i>Artos</i>	479
<i>Arteriotomia</i>	365	<i>Artus sanguine infestati quomodo curentur</i>	264
<i>Arthritis quid 258 signa ibidem</i>		<i>Asarum</i>	479
<i>Arthritidis causæ</i>	257	<i>Asbole</i>	479
<i>Arthritis à podagra quid differat.</i>	258	<i>Ascalabotes</i>	<i>ibidem</i>
<i>Arthritidis ex sanguineo humore curatio</i>	261	<i>Ascarides lumbrici 331. vbi generentur ibidem. causæ & curatio.</i>	332
<i>Arthriticis non sanguineis solum, sed pituitosis etiam & melancholis in morbi initio sanguis mitti debet.</i>	<i>ibidem</i>	<i>Ascyrrhon</i>	476. & 479
<i>Arthritidis ex bile curatio</i>	259	<i>Ascyrrhoides</i>	476
<i>Articularis morbus vide arthritis.</i>		<i>Asclepias</i>	479
<i>Articulorum dolor vehemens quomodo leniendus</i>	<i>ibid.</i>	<i>Asclepion chironium</i>	530
<i>Articuli vnde laxentur</i>	377	<i>Asclepion panaces</i>	<i>ibid.</i>
<i>Articulorum relaxatorum curatio ibidem</i>		<i>Asclepios smegma aridum</i>	594
<i>Articulorum doloribus contractis intenso frigore aut humoribus in-</i>		<i>Aselli</i>	460
		<i>Asia petra flos</i>	517
		<i>Asini</i>	527
		<i>Asininum lac</i>	484
		<i>Asininum iecur</i>	496
		<i>Aspalus</i>	480

INDEX.

<i>Aspalatus</i>	479	menta quibus & quando exhibenda	558
<i>Asparagus</i>	480	<i>Atramentum indicum</i>	520
<i>Asparagorum differentia & vires</i>	480	<i>Atramentum scriptorium</i>	520
<i>Asphodelus</i>	42	<i>Atramentum sutorium</i>	552.c.20
<i>Aspera arteria quomodo incidi debeat</i>	383	4. quomodo coquendum	649
<i>Aspidis morsus notæ 346. curatio.</i>	347	<i>Atriplex</i>	480
<i>Aspidis tria genera</i>	346	<i>Atrophia oculorum</i>	156
<i>Aspidis exuvium</i>	486	<i>Attenuantium alimentorum vires</i>	40
<i>Asplenon</i>	480	<i>Auditum gravem corrigentia</i>	14
<i>Astaphis</i>	ibidem	<i>Auditum gravem curantia</i>	161
<i>Aster atticus</i>	ibidem	<i>Auditus gravis quomodo curandus</i>	163
<i>Aster magni</i>	606	<i>Auditorij meatus non perforati causa & curatio</i>	377
<i>Aster pastillus</i>	585	<i>Auellana</i>	45
<i>Astragalus</i>	480	<i>Avena</i>	43. & 484
<i>Asthmatici 179. eorum curatio ibidem</i>	467	<i>Avena decoctio</i>	43
<i>Astringentium vires</i>	467	<i>Aves</i>	46
<i>Astringentium ante & post cibum sumptorum facultas</i>	45	<i>Aures animalium</i>	47
<i>Atactos compositio ad podagram</i>	584	<i>Auricula muris</i>	474
<i>Attagea</i>	46	<i>Aurium sordes extrahentia</i>	161
<i>Athanasia Oribasij</i>	575	<i>Aurium dolor quæ causis habeat & quomodo curari debeat. 159. & deinde per totum caput.</i>	159.
<i>Athena emplastrum</i>	617	<i>Auribus incidentia quomodo extrahantur.</i>	163
<i>Athera</i>	470	<i>Auribus incidentia quomodo extrahantur.</i>	378
<i>Atheroma quid 306. curatio ibidem. & 386</i>	429	<i>Aurium sonitus quomodo curandus</i>	163
<i>Atracton</i>	480	<i>Aurium vermes quomodo curandi</i>	162
<i>Atractylis</i>	41	<i>Aurium cruorem fundentium remedia</i>	ibid.
<i>Atractylis vires</i>	558	<i>Aurium vlcera diuturna quæ faciunt.</i>	ibid.
<i>Atrabilis duplici modo generatur</i>	558		AN
<i>Atram bilem vacuantia medicamenta simplicia</i>	558		
<i>Atram bilem purgantia medicamenta</i>			

INDEX.

<i>Aurium</i> tinnitus quomodo emen-	conferant	24
dandus	163	<i>Balnea sulfurata</i> quibus conferant
<i>Aurium</i> humiditates desiccantia	ibidem	
5	<i>Balnei aquæ dulcis calidi</i> utilita-	
<i>Auris</i> contusæ curatio	440	tes
<i>Aurium</i> pus curantia	161	<i>Balneorum</i> naturalium differen-
<i>Aurium</i> caro excrescens quomodo	tie	ibidem
arcenda	162	<i>Balneorum</i> sordes
<i>Aurium</i> ulceribus cum inflamma-	487	
tione quid faciendum	ibid.	<i>Balsamum</i>
<i>Aurium</i> curia quomodo sarcienda	482	<i>Barbara</i> , emplastrum
379	617	<i>Barbaricum</i> acopon, dia euphor-
<i>Aurium</i> contusio quomodo curan-	biu	635
da	163	<i>Barbe alopecij</i> s efficax remedium
<i>Auripigmenti</i> assumpti nota	361.	151
remedia	ibidem	<i>Basilisci</i> morsus nota
<i>Auripigmentum</i>	479. quomodo	347
coquendum	649	<i>Basilicum</i> tetrapharmacum
<i>Autumno</i> quæ victus ratio conue-		611
niat	25	<i>Basilij</i> acopon
<i>Aulforum</i> remedia	203	<i>Bassi</i> hygra ad hypopios
B		153
<i>Bacca</i> prunorum sylvestrium		<i>Batina</i> mora
507		597
<i>Baccharis</i>	481	<i>Batrachi</i>
<i>Baion</i> malagma	630	482
<i>Balanion</i> oleum	641	<i>Bdellium</i>
<i>Balanus</i> myrepfica	481	ibid.
<i>Balaustium</i>	ibidem	<i>Bdellij</i> pondus, & modus utendi
<i>Balena</i>	50	560
<i>Ballote</i>	482	<i>Bdellium</i> quomodo coquendum
<i>Balnea</i> aluminosa quibus confe-		651
rant	24	<i>Bechicon</i>
<i>Balnea</i> creta quibus conferant ibi-		178
dem		<i>Bechicon</i> ex styrace ad tussim
<i>Balnea</i> bituminata quibus confe-		577
rant	ibid.	<i>Bechium</i>
<i>Balnea</i> ferrea quibus conferant ibi-		483
dem		<i>Belulcum</i>
<i>Balnea</i> salsa & nitrosa quibus		429
		<i>Besasa</i>
		524
		<i>Beta</i>
		546
		<i>Betæ</i> vires
		41
		<i>Betonica</i>
		482
		<i>Bilis atra</i> duplici modo generatur
		272
		<i>Bilis vomitioni</i> quomodo occurren-
		dum
		102
		<i>Bilem atram</i> vacuantia medica-
		menta simplicia
		558
		<i>Bilem</i>

INDEX.

Bilem atrā purgantia medicamen- ta quibus & quando exhiben- da	ibi. & 559	Bremus	484
Bilem flauam eduentia, quando & quibus exhibenda	556	Bronchion	182
Bilem flauam purgantia medica- menta simplicia 556. & sequen- tibus		Bronchus	175
Biliofis alui fluxionibus medetur		Bronchocele	387
lac coctum in quod calculi mari- ni igniti decocti sunt 49. & inte- stinorum torminibus	ibidem	Bryonia	484
Bithynus pastillus	589	Bryon thalassion	ibid.
Bitumen	48	Bubonium	483
Bituminatæ aquæ quibus confe- rant	24	Bubo quid 296. Curatio	ibid.
Bitumen quomodo coquendum	650	Βουβονικήη	227 & 412
Blatta quæ in pistrinis inuenitur	539	Bubulum lac	484
Blepharoxiston	150	Bubula caro	47
Blitum	483	Bubulum stercus	262
Bliti vires	41	Bubulum stercus	508
Boleti	43	Bubulus talus	528
Βομβύλιæ	124	Bubulus adeps	542
Botanicum emplastrum	611	Bucellatus purgans	561
Botryon	152	Buccina	50 & 505
Botrys	583	Buglossum	483
Bonis femora cremata	529	Bulbus	483
Brachialis luxatio quomodo cure- tur	459	Bulbus agrestis	357
Brachij confracli curatio	445	Bulbi	42
Brassica marinæ facultates	41	Bulimos quomodo curetur	99
Brassica marina	477	Bunium	483
Brassica facultates	41	Buphthalmion	ibidem
Brathy	483	Buprestis assumpta nota 352. Cu- ratio	ibidem
Brion	484	Buprestis	483
Britannica	ibidem	Butyrum	483
Bromion acopon	634		

C	Acacia	500
	Cachexia quid 218 eius cu- ratio	ibidem
	Cactus arbor	541
	Cacoethe vlcera	315
	Caecos	362
	Cadmia 500. quomodo coquen- da	649
	Cacitudo nocturna quid & quo- modo curetur	156
	Casi	

INDEX.

<i>Casi flagris quomodo curandi</i>	285.	dem	
et 286		<i>Calidi et humidi temperamenti</i>	
<i>Calamagrostis</i>	500	notæ	29
<i>Calamus</i>	ibid.	<i>Caliginem oculorum prohibentia</i>	
<i>Calaminta</i>	500	14	
<i>Calcanei ex longo decubitu attri-</i>		<i>Callus quid</i>	420
<i>tus quomodo curandi</i>	268	<i>Callos excidentia</i>	318
<i>Calcaneorum et plani pedum scis-</i>		<i>Caluarie fractæ curatio</i>	435
<i>sura quomodo curandæ</i>	ibid.	<i>Caluitium vnde fiat</i>	107
<i>Calciamentorum veterum coria</i>	488	<i>Caluitij curatio</i>	107 et 109
<i>Calx</i>	547	<i>Camarosis</i>	433
<i>Calcis assumptæ notæ</i>	361. reme-	<i>Cameli cerebrum</i>	490
<i>dia</i>	ibidem	<i>Campe</i>	501
<i>Calculorum in renibus notæ</i>		<i>Cancamum</i>	500
207		<i>Cancanus</i>	ibidem
<i>Calculi ne creentur</i>	208	<i>Cancer in quibus corporis partibus</i>	
<i>Calculorum materia</i>	207	<i>oriri soleat</i>	299. Cause ibidem.
<i>Calculi tussi eiecti</i>	175	<i>Signa</i>	300. Curatio 299
<i>Calculorum causæ</i>	207	<i>Cancer in fæminarum mammis</i>	
<i>Calculi in vesica notæ</i>	404	<i>cur potissimum accadat</i>	299
<i>Calculorum in renibus curatio</i>		<i>Cancer latens</i>	394
207		<i>Cancer vnde appelletur</i>	300
<i>Calculi vesicæ quomodo excinden-</i>		<i>Cancer cur planè non consanescat</i>	
<i>di</i>	404	ibidem	
<i>Calculus quibus excinditur, qui fa-</i>		<i>Cancer quid</i>	272. Incurabilis ibi-
<i>cile curationem recipiant</i>	ibid.	dem.	
<i>Calculos quatuor aut quinque a-</i>		<i>Cancer quomodo præcauendus</i>	
<i>speros tribulorum modo, ad ma-</i>		300	
<i>gnitudinem siliquarum trium,</i>		<i>Cancer quibus partibus corporis ac-</i>	
<i>aut quatuor expuit quidam</i>	182	<i>cidat</i>	394
<i>Calculus per anum in tenesmo ex-</i>		<i>Cancer quid</i>	394. vnde dicatur,
<i>cretus</i>	198	ibidem. Eius curatio manu adhi-	
<i>Calculi in sanguinis reiectione ex-</i>		<i>bita</i>	ibidem
<i>creti</i>	175	<i>Cancro</i>	50 et 502
<i>Calida intemperies quomodo corri-</i>		<i>Canis noui rabiosi morsus remedia</i>	
<i>gatur.</i>	36	339	
<i>Calidi et sicci temperamenti notæ</i>		<i>Canis qui momordit rabiosus sit</i>	
29		<i>an non, qua ratione cognoscatur</i>	
<i>Calidioris temperaturæ notæ ibi-</i>		337	

Canis

INDEX.

<i>Canis rabidi morsuum symptoma-</i>		<i>rie curantia</i>	115
<i>ta</i>	336	<i>Capitis dolor unde oriatur</i>	<i>ibi-</i>
<i>Caninus appetitus quomodo cu-</i>		<i>dem</i>	
<i>randus</i>	99	<i>Capitis vlcuscula densa, rubraq;</i>	
<i>Canis rabidi iecur</i>	496	<i>quomodo curanda</i>	113
<i>Canis rabidi signa</i>	336	<i>Capita 504. Menarum ibid. Sma-</i>	
<i>Canum stercus</i>	508	<i>ridis ibid. Muris ibid. Milui ibi-</i>	
<i>Canes rabiunt plerunq; in aestu ve-</i>		<i>dem. Lacertæ</i>	<i>ibid.</i>
<i>hementiore</i>	336	<i>Capitis quantitas & figura qua</i>	
<i>Canis rabiosi morsuum remedia</i>		<i>bona, quæ mala</i>	30
<i>338</i>		<i>Capitis morbos quæ signa præce-</i>	
<i>Cannabis</i>	501	<i>dant</i>	13
<i>Canopus</i>	560	<i>Capitis vlcera manantia unde fi-</i>	
<i>Canopon</i>	501	<i>ant 113 quomodo curentur ibi-</i>	
<i>Cantharidis assumpta signa</i>	352	<i>dem, & 114</i>	
<i>curatio</i>	<i>ibid.</i>	<i>Capitis exanthemata quomodo cu-</i>	
<i>Cantharides</i>	501	<i>rentur</i>	114
<i>Capillus qua ratione aureus redda-</i>		<i>Capitis morborum signis neglectis</i>	
<i>tur</i>	111	<i>quæ aggritudines sequantur</i>	54
<i>Capitis dolor ex insolatu contra-</i>		<i>Capitis morborum signa ubi appa-</i>	
<i>ctus quibus notis dignoscatur</i>		<i>ruerint quid faciendum</i>	<i>ibid.</i>
<i>115</i>		<i>Capitis sani unde nascantur &</i>	
<i>Capitis dolor ex insolatu contra-</i>		<i>quomodo curentur</i>	113
<i>ctus quomodo curetur</i>	<i>ibi-</i>	<i>Capitis formatio</i>	30
<i>dem</i>		<i>Capitis pediculi quomodo abigendi</i>	
<i>Capitis dolorem ex frigida intem-</i>			114
<i>perie notantia, & curantia</i>		<i>Capito piscis</i>	49
<i>ibidem</i>		<i>Capnistos pastillus</i>	178
<i>Capitis dolorem ex bilioso humore</i>		<i>Capnion</i>	501
<i>curantia</i>	116	<i>Capnos</i>	<i>ibid.</i>
<i>Caput consortij lege in dolens quo-</i>		<i>Capparis</i>	41 & 501
<i>modo curetur</i>	<i>ibidem</i>	<i>Caprarum sanguis</i>	471
<i>Capitis dolor ex vino quomodo cu-</i>		<i>Caprarum sylvestrium sanguis</i>	
<i>retur</i>	117	<i>ibidem</i>	
<i>Capitis dolor ex ictu quomodo cu-</i>		<i>Caprillus finus</i>	262
<i>retur</i>	<i>ibidem</i>	<i>Caprillum stercus</i>	508
<i>Capitis psyracia quomodo cure-</i>		<i>Caprillus adeps</i>	542
<i>tur</i>	112	<i>Caprilla caro</i>	47
<i>Capitis dolorem ex calida intempe-</i>		<i>Caprillum lac</i>	484
		<i>Capr</i>	

INDEX.

Caprillum cornu	504	Carpesium	501
Caprillum iecur	496	Carpesia liquoris poti notæ 356. re-	
Caput adurendi modus	263	media	ibidem
Caput quomodo aduratur in lip-		Carya	502
pientibus egre spirantibus, &		Caryinum oleum	642
elephanticis	363	Caryophyllon	502
Caput per os & nares quibus me-		Casens	42 & 548
dicamentis euacuandum	21	Casens laudatior	49
Carbunculus quid 298. Cause ibi-		Casens acris	ibid.
dem. Notæ ibidem. Curatio	ibid.	Casens pessimus	ibidem
Carbunculus	287	Casens oxygalactinus	548
Carbunculus oculorum	155	Casosum lactis	484
Carcinoma oculorum	ibidem	Cassamum	503
Cardamine	540	Cassia	ibid.
Cardamomum	502	Castanea	46
Cardamum	502	Castorium	503
Cardiogmos	127	Catagmatice Oribasij 625. ex com	
Carduus	540	mentarijs Heracleti	ibi.
Cari radix	42	Catalepsis	125
Carice	44	Cataphora quid	72
Cari species	23	Cataphoræ curatio	93
Caris	502	Cataphora quid 53. Cause ibidem.	
Caries lignorum	537	Curatio	ibid.
Carnes optimæ quæ	47	Cataplasma quod oras vulneris la-	
Carnes volatiliū quomodo diffe-		tas in rabidi canis morsu seruat 338	
rant	46	Cataplasma ad sacrum ignem, her-	
Carnem generantia medicamenta		petas, abscessus, parotidas, & am-	
309		busta	295
Carnis contusæ curatio	302	Cataplasmata	591
Caro bubula	47	Catapotia ex aloë 560 modus riē-	
Caro ceruina	ibid.	di atq; pondus	ibid.
Caro hircina	ibid.	Catapotia ex lapide armenico, ar-	
Caro humana	ibid.	thriticus	563
Caro leporina	ibid.	Catapotia ad tussim veterem ac-	
Caro ovilla	ibidem	commotata	177
Caro suilla	ibid.	Catapotia ex xylomacere, dysente-	
Caro thymi falsi	545	ricis vilia	583
Caros	123	Catapotia ad destillationem in fau-	
Caros à lethargo quid differat	123	ces & tussim	177
		Cassia	

I N D E X.

<i>Catapotia Dofilhei ad iecur infcri</i>	592		
pta	581	<i>Cera</i>	505
<i>Catheter</i>	213	<i>Cera cū oleo qui modus eſſe debeat</i>	
<i>Catheteriſmus</i>	403	<i>in conficiendis vnguentis</i>	652
<i>Catochos</i>	121 & 125	<i>Cera quomodo coquenda</i>	659
<i>Catochi cauſa ibid. Signa ibid. Cu</i>		<i>Ceras</i>	504
<i>ratio</i>	126	<i>Ceramium</i>	657
<i>Catochi vel catochomeni vnde di</i>		<i>Ceramium Italicum</i>	ibidem
<i>ſti</i>	125	<i>Ceraſia</i>	45
<i>Caucaliſ</i>	503	<i>Ceraſia 504. dulcia, auſtera ibid.</i>	
<i>Cauda equina</i>	499	<i>acida</i>	ibidem
<i>Cauſos febris</i>	81	<i>Ceraſi arboris gummi</i>	ibidem
<i>Cauſtica</i>	151	<i>Ceraſtis morſus notæ 346. Cura</i>	
<i>Cecis</i>	504	<i>tio</i>	347
<i>Cedrea</i>	503	<i>Ceratum</i>	657
<i>Cedrus arbor</i>	ibidem	<i>Ceratonia arbor</i>	504
<i>Cedrus frutex</i>	ibid.	<i>Ceratoides membrana</i>	152
<i>Cele, Vide ramex</i>		<i>Ceratum thaidis quo facies rube</i>	
<i>Cenchros</i>	ibid.	<i>ſcat</i>	168
<i>Cenchri morſus notæ</i>	346	<i>Ceratum dia turpenes ad podagrā</i>	
<i>Curatio</i>	ibidem	<i>dolorem leniens mirabiliter</i>	624
<i>Centaurium</i>	503	<i>Cercosſis quid 415. quomodo ſit e</i>	
<i>Centaurij minoris vires 558. Pon</i>		<i>mendanda</i>	ibid.
<i>duſ ibid. Exhibendi modus ibid.</i>		<i>Cerebrum 490. Leporis ibidem,</i>	
<i>Centunculus</i>	487	<i>Galli ibid. Cameli ibid. Muſte</i>	
<i>Cepa</i>	42. 512	<i>la ibid. Hirundinum ibid. Ouil</i>	
<i>Cepæa</i>	505	<i>lum</i>	ibid.
<i>Cephaleam curans apophlegmatiſ</i>		<i>Cerebri membrane inflammationis</i>	
<i>mus</i>	120	<i>notæ, cauſſæ & curatio</i>	437
<i>Cephaleæ</i>	504	<i>Cerebri vulnerati notæ</i>	431
<i>Cephaleæ curatio</i>	118	<i>Cerebri membrane conuulneratæ</i>	
<i>Cephaleam curans epithema. ibid.</i>		<i>ſigna</i>	ibid.
<i>Cephaleam curans vnguentum</i>		<i>Cerebri membrana nigreſcens quo</i>	
<i>119</i>		<i>modo curetur</i>	438
<i>Cephaleæ</i>	117	<i>Cerebri eryſipelatis ſigna & cu</i>	
<i>Cephaleam curantia medicamen</i>		<i>ratio</i>	123
<i>ta varia</i>	119	<i>Cerebri temperaturarum notæ 30</i>	
<i>Cephalalgia vnde oriatur</i>	115	<i>Cerebrum animalium</i>	47
<i>Cephalicus puluis, capiti conueniēs</i>		<i>Cerebri inflammationis ſigna &</i>	
		<i>curatio</i>	

I N D E X.

curatio	123	Chamaeraphanon	559
Cerion qui d 421. eius curatio	ibid.	Chamaesyce	553
Cervicistumor curatio	388	Chelidones	ibidem
Cervi cornu	504	Chelidonia aspidis genus	346
Cervi masculi pudendum	470	Chelidonium	553
Cervina caro	47	Chema	657
Cerussa assumpta signa 361. remedia	ibidem	Chemosis quid, & quomodo curatur	148
Cerusa 555. quomodo coquenda	649	Cherssea aspidis genus	346
Ceryces	505	Chexananze	566
Cherafolium	ibidem	Chia terra	486
Chalbane	552	Chiacum collyrium	601
Chalazion & eius curatio	150	Chirurgica partes duae	363
Chalcanthion	552	Choenix	657. & 659
Chalcitis	ibidem	Chole	553
Chalcitis quomodo coqui debeat	648	Cholera quid 195. eius curatio	ibid.
Chalcidica lacerta	538	Chondrilla	554
Chalcos	552	Chondrus	554
Chalcus	657	Chondri coctio	43
Chalcuanthos	552	Constantini sapo	595
Chalazium quid 373. curatio	ibid.	Chorion	419
Chame	50	Chrysanthos	491
Chamaeacte	472	Chryse emplastrum	625
Chamedrops	553	Chrysocolla	554
Chamedrys	552	Chrysocome	554
Chamaeleon	ibid.	Chrysitis	554
Camelae pondus & modus administrandi 558. vires	ibidem	Chrysos, pessus emolliens	647
Chamelea	553	Cibus	657
Chameleuce	552	Cibi in ventre corruptis quid faciendum	15
Chamaeleontis nigri assumpti notae	354. curatio	Cibi fastidium prohibentia	I
ibidem	ibid.	Cibi fastidium eiusq; causae signa & curatio	191. & 192
Chamaeleontis sanguis	471	Cibi qui laudatissimi	40
Chamaemelon	553	Cibi varij assumi non debent	40
Chamaemelon oleum	639	Cibi fastidium in febris quomodo curandum	98
Chamaepityos pondus & utendi modus	559	Cicade	545
Chamaepitys	553	Cicatrix ulceri quo inducenda	313
		Cicatrices oculorum quomodo curantur	**

I N D E X.

ventur	154	Clauicula luxata curatio	455
Cicatrices nigrae quomodo tollende		Clauicula confRACTA curatio	441
316		Clematis	506
Cicatrices quomodo tingantur	154	Clematis altera	ibidem
Cicer	44	Cleonis collyrium	606
Cicer	492	Cleopatrae mors	346
Cichorium	506	Clidion aphrodisiasticon, pastillus	
Cici	505	586	
Cicinum oleum	641	Clidion oribasi ad dysentericos &	
Ciconiarum stercus	509	celiacos	ibid.
Cicuta	513	Clinopodion	506
Cicutae potae notae 355. remedia	ibid.	Clystere vesicae	403
Cimex	507	Clysteribus qui vti debeant 20. &	
Cimolia terra	486	qualibus	ibid.
Cinara quomodo preparanda	41	Cneoron quas vires obtineat	560
Cinerula	542	Cnicus	507
Cinis	545	Cnici seminis pondus & sumendi	
Cinnabaris	505	modus	560
Cinnamomum	ibid.	Coagulum 535. leporinum	ibidem
Cinariae vires	41	equinum ibid. Phocae ibid.	
Cinocrambe	477	Coccus enidios	507
Circaea	505	Cocci gaudiij vires, pondus, & su-	
Circuncisorum curatio	403	mendi modus	560
Cirfocele	409	Coccus baphicos	507
Cissaros	506	Coccymela	ibid.
Cisseris	505	Cochlea	510
Cissos	506	Cochlea	50
Cisthes	ibid.	Cochleae terrestres	ibid.
Cissimum emplastrum	613	Caelia	507
Citta causa	1	Caeliacus affectus	197
Citta grauidarum symptoma vn-		Colchicon vnde dicatur	357
de nomen acceperit	2	Colis glans coniecta quomodo ape-	
Citreum malum	46	riatur	401
Citrei mali tres partes	ibid.	Colicus dolor in Italia victus ratio	
Citrium	506	ne temeraria curatus à quodam	
Citrium malagma	631	medico	205
Claudiacum dia smyrnon	603	Colla	507
Clauus quid 269. curatio	ibidem	Colon quid	202
Clauus quid & vnde dicatur	427.	Colobomata	379
curatio	ibid.	Colocyntha	507
		Col	

INDEX.

Colocynthis	ibid.	los tuetur	ibid.
Colocynthis effectus 557. pondus		Collyrium chiacum	601
ibidem. exhibendi modus ibid. qui		Collyrium ex olea turionum succo	
bus exhibenda	ibid.	tenorum	603
Colicorum remedium	217	Collyrium ex decoctis	602
Colis glans nuda quomodo contegenda	401	Collyrium ex cornu Galeni	605
Colicus morbus quid 202. causse		Collyrium monohemeron	601
ibidem signa ibidem curatio 203		Collyrium dia hydrias repellens	602
& deinceps		Collyrium liquidum ex caucalide	
Colico & renum dolori quid com-			609
mune, quid proprium	207	Collyrium dia crocu	ibid.
Colliquamenta corporis quomodo		Collyrium Ilambonis	603
curanda 92. & sequentibus		Collyrium è thure	605
Color urine aquosus rufus & bilio		Coma	121
sus mediocriter pallidus quid signi-		Coma vigilans	121
ficet	7	Comatis vigilantis causse 125. signa	
Color malus corporis quomodo emē-		ibid. curatio ibidem	& 126
dandus	13	Comaros	508
Colpos quid 316. curatio	ibid.	Comitialis morbi nota	128
Columbarum sanguis	471	Comitialis morbi causse	ibid.
Columbinus pullus	46	Comitialis morbi curatio 129. &	
Columbarum sylvestrium stercus		deinceps	
309		Comitialis morbus cui ferè atati ac-	
Columella 381. curatio	ibid.	cidat	128
Columelle inflammatio quomodo		Comitialis morbus trifariam gigni-	
curanda	172	tur	ibid.
Collyrium anodynon	146	Comitiales quomodo coarguendi	
Collyrium malabathrinum	608		129
Calymbades	45	Comum	513
Collyria	600	Commi	508
Collyrium ex succo sœniculi	607	Compositio Procli, podagræ & co-	
Collyrium ex opobalsamo	ibidem	xendicum doloribus accommodata	
Collyrium ex aloë	606		584
Collyrium ex succo sœnugraci	606	Compositio dia hermodactyli ad	
Collyrium cleonis	ibid.	podagram	562
Collyrium crassius ex rino	608	Compositio dia citrii, quod est ex	
Collyrium ex duobus lapidibus ad		malo medico. stomacho utilis	561
asperitudinem	608	Compositio dia coronopodii	563
Collyrium aridum Gal. quod ocu-		Compositio rhodostacti	559

I N D E X.

Compositio Agapeti ad podagram	584	tio	ibidem
Compositio atactos ad podagram	ibidem	Corianum	509
Compositio pæonia	581	cordis temperatura nota	33
Conchule Indice	527	Cornu 504 Caprillum, hircinum	
Conchylia	507	ibidem: cerui ibidem . Taurinum	
Concoctionis signa nunquam sum-	stre apparent	ibidem	
Conditum calculos confringens	582	Cornea membrana oculi	152
Condylomata locorum muliebrium	415. quomodo excidenda	Coronopos	510
Condylomatum ani curatio manu	administrata	Corpus hominis in quatuor partes	
Confectio Rhoetis	600	diducitur	53
Confectio masucha	646	Corpus ut bene oleat quomodo effi-	
Congius	657. & 658. 659	ciendum	13
Conuulsiones unde oriuntur	140	Corporis liuores prohibentia	ibid.
Conuulsionibus puerorum meden-	tia	Corpus crassum quomodo extenuan-	
Conuulsiones ex inanitione origi-	nem ducant an ex repletionem quo-	dum	27
modo cognoscendum	141	Corporis habitus quomodo recalsa-	
Conuulsionum curatio	ibid.	ciendus	13
Coryza	508	Corpus tenue quomodo impleatur	28
Copros	ibid.	Corporum intemperatorum nota	29
Copton ad duritiem stomachi &	iocinoris malagma	Corporis temperatissimi nota	28
Coracon emplastrum	616	Corpus pleioricum	62
Coria calceamentorum veterum	488	Corpus quomodo erugandum	13
Corallium	509	Corporis malus color quomodo emen-	
Corium	ibidem	dandus	ibid.
Coris herba	ibid.	Corporis colliquamentorum reme-	
Cordis affectus quomodo curandi	188	dia	92
Cor animalium	47	Cortex piceæ	532
Coriandrum	510	Corydallus	510
Cordis palpitatio	189	Corydos	ibid.
Coris animal	509	Coryza	175
Coriandri assumpti notæ 355. cura-		Cos olearia	517
		Costarum rupture & contusionis	
		notæ & curatio	443
		Costus	510
		Cotis noxiæ detrimentum	517
		Cotyla	657
		Cotyledon	510
		Coxarum dolor ab articulari mor-	bo

INDEX.

bo quid differat	255	Crocodili morsus remedia	348
Coxarum doloris causa ibidē. Nota ibid. curatio	ibid.	Crocodilus terrestris	540
Coxarum fractura, differentia, nota, & curatio	444	Crocodilion	512
Coxe luxata curatio	461	Crocus	ibid.
Coxendices quomodo adurantur	419	Crocomagmati confectura	644
Crania	510	Crocomagma quomodo paratur	588
Crambe	511	Crommyon	512
Crapulam quid discutiat	51	Crotones	559
Crataegonos	511	Cruentis humoribus abundantes quam curandi rationem desyderent	89
Cremaſteres	406	Cruenti sputi cause signa	181
Creta ſutoria	520	Cruentum sputum quomodo curatur	182
Cretica terra	486	Crus quomodo reponi debeat	450
Crethmon	511	Crusta generantia medicamenta	322
Crinaton ſuffimen	645	Cryſtalloides humor oculi	157
Crimnon	511	Cubiti fractura quomodo curanda	447
Crinon	ibid.	Cubiti luxatio quot modis fiat & quomodo curetur	458
Crines	548	Cucumer	44
Crisis inſtans quomodo agnoſcenda	61	Cucumis	539
Crisis futura quomodo prenoſcenda ibidem	ibid.	Cucumis ſylueſtris	ibid.
Crisis optima peracta quomodo agnoſcenda	63	Cucumeris ſylueſtris radicis torticis pondus	559
Crisis qualis futura ſit, quomodo dignoſcendum & ſequentibus	61. & ſequentibus	Cucurbitulas ad mouendi modus	391. & deinceps
Crithe	511	Cucurbita ſylueſtris	507
Crithe quid eiſq; curatio	150	Cucurbita	44
Critonis ſmegma	595	Cucurbita	507
Crociniſmum dia rhodon	607	Cucurbitularum uſus	391
Crociniſmum oleum	644	Cucurbitula leuiſ quid efficiat	391
Crocides peſſus	647	Cucurbitula cum ſcarificatione ad quid preſtet	392
Crocides paſtillus	586	Cuminum	512
Crocodili terreſtris ſanguis	471	Cupreſſus	513
Crocodilorum terreſtrium ſtercus	509	Cura quid	135
Crocodilorum fluuiatiliſ ſtercus	509		

INDEX.

Curei malagma	631	D	
Cutis astrictio	10. Eius caussa	Damasena	46
ibidem.	Nota ibidem. cura-	Damasena	507
tio	11	Damasena	488
Cuti senili teneraq; conuenientia		Damasonium	ibidem
medicamenta	286	Daphne	ibid.
Cyamos	512	Daphne herba	ibidem
Cyanos	ibid.	Daphnoides	506
Ciathus	6	Darti	406
Cyclaminus	512	Daucus	488
Cyclamini radices pondus & mo-		Dauci radix	42
dus rtendi	658	Decretoria signa in morboru princi-	
Cyclisti	436	pio praua sunt 61. Sed ubi mor-	
Cydonaton contusum fragmentis		bus inclinauerit, bona sunt	ibid.
suluis	436	Decamyron malagma	629
Cygnarium	602	Deiectio quæ optima	74
Cygnus albus	ibidem	Deiectio cruda	ibidem
Cygnus rubens	ibidem	Deiectio merè ruffa	ibid.
Cyminum	512	Deiectio viridis	ibidem
Cynanche	513	Deiectio nigra	ibidem
Cynosbatos	ibidem	Deiectio liuida	ibidem
Cyphi 645. Eius materia	ibidem.	Deiectio oleosa. pinguisq;	ibidem
vsus ibidem.		Deiectio viscosa	ibidem
Cyphi magnum quod vocant sola-		Deiectio nimis fætida	ibidem
re ex rebus triginta sex confe-		Deiectio omnium deterrima & pe-	
ctum	645	stifera	75
Cyphi, quod rebus viginti octo con-		Deiectiones quid præfagiant	56
stat, lunare appellatum	646	Delphini	50
Cyparissus	513	Dentes quomodo eximantur	380
Cyperus	ibidem	Dentes exesi quomodo eximendi	
Cyphoides Alexandri	580	ibidem	
Cyphoides medicamentum ad ieco-		Dentes superflui quomodo tollen-	
rosos & pectoris vitia	580	di	ibidem
Cypros	513	Dens confectus quomodo curan-	
Cytinus	536	dus	ibidem
Cyprinum oleum ex commentarijs		Dentes ab interitu vindicantia	14
Posidonij	643	Dentium dolorem sedantia	169
Cyprinum aliud	ibidem	Dentes quo tempore oriantur pue-	
Cytisus	513	ris	4
		Deu	

INDEX.

Dentes attritos curantia	170	Dia cadmias emplastrum	615
Dentium candorem facientia ibi.		Dia dictamnii empla.	617
Dentium stuporem tollentia ibid.		Dia erigerontos empla.	614
Dentium inflammationem curan- tia ibidem		Dia euphorbii, acopon	635
Dentes mobiles stabilientia	169	Dia corallii medicamentum, po- dagricis idoneum	583
Dentifricium	170	Dia electri pastillus	586
Dentientibus pueris superantia	5	Diarrhea	196
Dentium smegma	170	Dia hamaton antidotum	573
Verma	488	Dia hermodactyli compositio ad podagram	562
Destillatio	175	Dia libani	593
Destillationis curat.	ibid.	Dia œnelei pastillus	589
Destillationis acris tenuisq; cura- tio	177	Dia osiricon	593
Denterion	419	Dia oxynrſines	594
Dia aloes medicamentum	592	Dia phellon pastillus	589
Dia anacardion	580	Dia physaliden	587
Dia alicacabu pastillus	590	Dia rhoden pastillus	586
Diabrosis	181	Dia stole pulsus	63
Dia bacani medicamentum he- pati accommodatum	580	Diafemen	573
Diabetes quid 212. eius signa ibi. dem. curatio ibidem		Dia spermaton pastillus	585
Dia calaminthes	579	Dia sphedes, hoc est, ex fece vini cō- busta, M anethonis	593
Diacodion, ex papaveris capitibus et melle	575	Dia cinnabarcos empla.	623
Dia corallii pastillus	586	Dia iteon empl.	618
Diacodion compositum	576	Dia meliloton malagma	626
Dia citrii medicamentum, tarde concoquentibus efficeat	579	Dia spermaton malagma	631
Diacodion, ex papaveris capitibus et sapa.	575	Dia struthii emplastrum	612
Dia chartii pastillus	588	Dia rhodon, quæ septuaginta duas uncias pendunt	606
Dia citrii compositio stomacho utilis	561	Dia thalias, collyrium	603
Dia chartii	594	Dia thalias, ruffum	ibid.
Dia coronopodii compositio	553	Dia smyrnon, claudiacum	ibid.
Diacodyon	121	Dia moron simplex	596
Dia aggylos, acopon	636	Dia moron compositum	ibid.
Dia aron emplastr.	620	Diamoron ex moris batuis, quæ rubi fructibus sunt	597
		Dia caryon simplex	ibid.
		Dia caryon compositum	ibid.
		Dia gyreos emplastrum	611

INDEX.

<i>Diagleucous</i>	597	<i>retur</i>	459
<i>Dia besafa</i>	ibid.	<i>Digitorum pterygia putrida quo-</i>	
<i>Dia rhodon album</i>	606	<i>modo curanda</i>	270
<i>Dia smyrnon ad & rhyadas &</i>		<i>Digitorum pedis luxatorum cura-</i>	
<i>egylopas</i>	603	<i>tio</i>	465
<i>Dia gigurton, malagma</i>	632	<i>Digitos puerorum, dentibus vulne</i>	
<i>Dia staetes emplastrum</i>	622	<i>ratos quid sanet</i>	5
<i>Dia chylon emplastrum</i>	611	<i>Digitorum contusionis & confra-</i>	
<i>Dia asphodelu emplastrum</i>	611	<i>ctiois curatio</i>	449
<i>Dia ceratos collyrium Galenus</i>		<i>Dioclis epistola Antigono regi</i>	
605		<i>scripta ad valetudinem tuendam</i>	
<i>Dia elcysmatos</i>	613	53	
<i>Dia melitos emplastrum</i>	611	<i>Dionysias</i>	489
<i>Dia aloes collyrium</i>	606	<i>Diospolites</i>	579
<i>Dia libanu collyrium</i>	605	<i>Diphryges quomodo coqui debeat</i>	
<i>Dia scoridon emplastrum</i>	612	648	
<i>Dia rhodon Crocinum</i>	607	<i>Diphryges</i>	486
<i>Dia pyranu emplastrum</i>	612	<i>Dipsacos</i>	ibidem
<i>Dia hydrias collyrium</i>	503	<i>Dipsus unde dictus.</i>	345
<i>Dia Zomaton collyrium</i>	602	<i>Dipsadis morsus nota ibid. cura-</i>	
<i>Dia crocu aridon</i>	609	<i>tio</i>	ibidem
<i>Dia rhodon Nili</i>	607	<i>διψαδίου quid 367. Eius causse</i>	
<i>Dia pternes emplastrum</i>	623	<i>ibidem. curatio ibidem</i>	
<i>Dia leptocaryon emplastrum</i>	623	<i>Dolichon</i>	44
<i>Dia turpenes ceratum</i>	624	<i>Doloris species & causse</i>	91
<i>Dia halon emplast.</i>	623	<i>remedia</i>	ibid.
<i>Dia sampsicu malagma</i>	632	<i>Doloris capitis in febris curatio</i>	
<i>Dichromon empla.</i>	620	94	
<i>Dictamnium</i>	489	<i>Doloris in febris causse 91. re-</i>	
<i>Dies decretoryj</i>	59	<i>media</i>	ibidem
<i>Dies speculatoryj</i>	60	<i>Dorias</i>	494
<i>Digerentia medicamenta</i>	122	<i>Dorycinon</i>	489
<i>Digitum in manu ubi adnascantur</i>		<i>Dorycnyj poti nota 358. reme-</i>	
393		<i>dia ibidem</i>	
<i>Digitorum adnatorum differentia</i>		<i>Dosilhei catapotia ad iecur inscri-</i>	
<i>ibidem</i>		<i>pta</i>	581
<i>Digitum adnati quomodo praceden-</i>		<i>Dothiene emplastrum</i>	612
<i>di.</i>	ibid.	<i>Drachma</i>	658
<i>Digitorum luxatio quomodo cu-</i>		<i>Dracunculus</i>	489
		<i>Dra</i>	

INDEX.

Dracunculi 332. ubi generentur	Echinon	ibidem
ibidem. curatio ibidem	Ecchymona quid 302. curatio ibid.	
Dracunculi curatio 426	Echidna 494	
Draconis marini ictus cura 347	Eclegma ex marrubio compo-	
Dracuntium 489	tum 576	
Dropax Gallus Oribasij 636	Eclegma ad tuſſim 177	
Dropacis duplex preparatio 633.	Eclegma ex marrubio simplex	
uſus ibidem	576	
Druppa oliuae 45	Ecpieſmus oculi 158	
Drys 489	Ecpieſma 433	
Dryini morſuum ſigna 344. reme-	Electropion, eiusq; curatio 149	
dia 345	Electropion 371. Eius cauſſa ibi-	
Dryinus peſſimus ſerpens 344	dem. curatio ibidem.	
Dryopteris 489	Educentia ſpicula aculeos, arundi-	
Dulcis radícula 487	nes, ſpinas & conſimilia 320	
Dulcium vires 467	Eis onycha 433	
Duracina 45	Elate 491	
Dysenteria quid 199. ſpecies ibid.	Elatine ibidem	
cauſſa ibid. ſigna ibidem. curatio	Elaterij noxae quomodo remouen-	
ibid. & ſequentibus	de 362	
Dysenteria cruenta ibid. Iecora-	Elaterij effectus 558. quale deli-	
ria ibidem.	gendum. ibidem. Exhibendi mo-	
Dysentericis vtilia catapotia ex xy-	lus & pondus ibidem	
lomacere 583	Elaphobofcus 491	
Dysodes acopõ ex Gal. 635. aliud	Elaterium ibidem	
ibidem	Elæa 490	
Dysodes malagma 632	Elæon ibidem	
	Elæa æthiopica ibidem	
	Elæomeli ibidem	
	Elephantia quid 272	
	Elephantia incurabilis quare ibi.	
	Elephantia duplex ibid. Quæ mi-	
	nus maligna ibidem. Quæ mali-	
	gnior ibidem	
	Elephantia minus malignæ cura-	
	tio ibidem	
	Elephantia laborantium ſpiran-	
	di difficultas quomodo curanda	
	276	

E

EBenus 489	
EBrietatem præcauentia 51	
EBrietatis curatio 15	
EBulus 472	
EBur 491	
Eccope 433	
Echini 50	
Echinus herba 494	
Echinus ibidem	

INDEX.

<i>Elephantia caussa</i>	272	<i>Empla. ex oxelæo</i>	616
<i>Elephantia victus ratio conueniens</i>	274	<i>Empl. ex achate, discutiens emolliensq;</i>	ibid.
<i>Elleborine</i>	492	<i>Empl. ex plumbagine ad calidas affectiones</i>	ibid.
<i>Eleoselinon</i>	491	<i>Empla. coracon ex oxymelite, ad naturalium vitia & nomas accommodatum</i>	ibidem
<i>Eleliphacus</i>	ibidem	<i>Emplastrum Icesios ad strumas, abscessus, lienem, articulos, & coxenicum dolores</i>	617
<i>Electrum</i>	496	<i>Empl. Neronis, ad iclus omnemq; particularum carnosarum dolorem</i>	618
<i>Elos</i>	153	<i>Empla. ex cerusa vel oui</i>	615
<i>Elymus</i>	492	<i>Emplastrum parygren Oribasij</i>	ibidem
<i>Empetron</i>	492	<i>Emplastrum ariobarzanion</i>	614
<i>Emphysema quid</i>	148	<i>Emplastrum ex dracunculo</i>	ibid.
<i>Emphysematis cura</i>	ibid.	<i>Emplastrum Aristophanium emolliens</i>	616
<i>Empiema 184. caussa 185. signa ibidem. curatio ibidem</i>		<i>Emplastrum ex althea, podagricis alijsq; duricis accommodatum</i>	613
<i>Emplastrum smilion ad abscessus</i>	612	<i>Emplastrum cissonum ad neruorum vulnera, punctus, & maximè diuturna</i>	ibidem
<i>Emplastrum diascorodon ad rumpendum</i>	ibid.	<i>Emplastrum botanicum</i>	611
<i>Emplastrum dia apyranu ad discutendum</i>	ibid.	<i>Emplastrum ex polline farinaceo</i>	611
<i>Emplastrum dia struthiu, strumas discutiens</i>	ibidem	<i>Emplastrorum materia, preparatio & differentia</i>	609
<i>Emplastrum pelarion ex scorïa argenti</i>	613	<i>Emplastrum pyrine, ad duritias scirrhus</i>	613
<i>Emplastrum è fermento abscessus rumpens</i>	612	<i>Emplastrum tetrapharmacu</i>	611
<i>Emplastrum dothiene</i>	ibid.	<i>Emplastrum dia chylon</i>	611
<i>Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergensq;</i>	611	<i>Emplastrum dia asphodelu</i>	ibid.
<i>Emplastrum ex melle</i>	ibi.	<i>Emplastr. oxera multiplicis usus</i>	
<i>Empl. barbara quod cruentis protinus vulneribus inijcitur, & fracturarum callos firmat</i>	617		
<i>Empl. ex salicibus, glutinans cruenta excreantibus, & purulentis efficaax, thoraci impositum</i>	618		
<i>Empla. Galeni aceros, glutinat, concoquit, vlcera ad suppurationem perducit</i>	619		

Em

INDEX.

<i>Empla. ex ochra, inflammationem</i>	<i>tum</i>	624.
<i>arctet tum sponte, tum in iudicio</i>	<i>Emplast. quod nutrienda ulcerum</i>	
<i>toris idoneum</i>	<i>carni est</i>	<i>ibidem</i>
621		
<i>Emplast. ex cedria, glutinat discutit, abstergitque ibid. Aliud</i>	<i>Emplast. Italicum ad purgandum</i>	
<i>emolliens</i>	<i>sordida, inducendumq; carnem</i>	
<i>ibidem</i>		625
<i>Emplast. ex pumice, ad cicatricem ducendam</i>	<i>Emplast. entaticon</i>	<i>ibidem</i>
622		
<i>Emplast. paula, strumis & bubonibus efficax</i>	<i>Emplast. ex cinnabari ad topbos</i>	
<i>ibid.</i>	<i>aliisque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes</i>	
<i>Emplast. palmulatum</i>		623
615		
<i>Empla. ex metallicis</i>	<i>Empla. viride simplex</i>	622. aliud
619	<i>viride, ad humida vitia, & carnis excrecentias</i>	<i>ibid.</i>
<i>Emplast. armenia fracturis accommodata</i>	<i>Emplast. peganera ad pleuriticos</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>		
<i>Emplast. ex anclusa, ambustis efficax</i>	<i>Emplast. athena, ad ulcera sordida, impacta, nervorum vulnera</i>	
615		617
<i>Emplast. ex pampholige</i>	<i>Emplast. dia dictamn. glutinans, ad canum morsus, & omnigena ulcera</i>	<i>ibidem</i>
<i>ibid.</i>		
<i>Emplast. leena, noxia educit in superficiem, humoresq; euacuat</i>	<i>Emplast. enitro ad abscessus, scyrrhos, ad tumores</i>	623
621		
<i>Emplast. Macedonicum</i>	<i>Empla. conglutinans ad ulcera que serpendo depascunt, & sanguinis sputum</i>	620
<i>ibid.</i>		
<i>Empla. chryse, cruentis vulneribus accommodatum</i>	<i>Emplast. ex cinere aspidu, discutit strumas & podagras</i>	<i>ibid.</i>
625		
<i>Emplast. anicetos. glutinat discutit, squamas separat, & ad articulos recenti cicatrice contractos valet</i>	<i>Emplast. leena, siccant discutitq; ibi.</i>	
619	<i>Emplast. ex nitro ad carbunculos</i>	621
<i>Emplast. Serapionis Melane</i>	<i>Emplast. ex anemone</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>		
<i>Emplast. ex lolio</i>	<i>Empl. viride Macherionis, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus</i>	<i>ibidem</i>
620		
<i>Emplast. Isis, cruentis accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum</i>	<i>Emplast. ingrediētia medicamēta quomodo coqui debeant</i>	648
616		
<i>Emplast. ex urina muli, podagricis utile</i>	<i>Emplast. philocotryche, dolorem leniens, ad sedem utilis</i>	615
624		
<i>Emplast. ex lapidis asij flore, philogry ad scyrrhos</i>	<i>Empl</i>	
<i>ibidem. ex eodē Galeni</i>		
<i>ibidem</i>		
<i>Emplast. ex salis flore, articularis in declinatione accommodata</i>		

INDEX.

<i>Empl. Amithaonis, ad articulos</i>		<i>Epilepsia trifariam gignitur</i>	128
<i>recenti cicatrice contractos, con-</i>		<i>Epilepsie curatio</i>	129. & sequent.
<i>uulsosq; ad extrahendum etiam</i>		<i>Ephialtes unde constituatur</i>	134
<i>efficax</i>	616	<i>Epilepsie causse</i>	128
<i>Emplastrum ex perna, tophos sol-</i>		<i>Epilepsia cui ferè atati accidat</i>	
<i>uit</i>	623	<i>ibidem</i>	
<i>Empl. ex lixiuio, coxendicum dolo-</i>		<i>Epilepsie notæ</i>	ibidem
<i>ribus, articularijs & tumoribus</i>		<i>Epileptici quomodo coarguendi</i>	129
<i>oedema referentibus utile</i>	622	<i>Epimedium</i>	492
<i>Emplast. ex auellanis, ad articulo-</i>		<i>Epimyctides quid</i>	283. signa cu-
<i>rum tophos probatum</i>	623	<i>ratio ibi. & 284</i>	
<i>Empla. Sphærien ad ardores</i>	621	<i>Epimelis</i>	492
<i>Emplastrum Nicolai ad recentia</i>		<i>Epiphora oculorum quomodo cure-</i>	
<i>vulnera, & sinus glutinandos</i>		<i>tur.</i>	147
<i>aptum</i>	618	<i>Epiploenteroceles</i>	411
<i>Empl. ex liquore sycamino</i>	620	<i>Epipactis</i>	492
<i>Empla. dichromen.</i>	ibid.	<i>Epiplocele</i>	411
<i>Emplastrum dia cadmias, cicatri-</i>		<i>Epistola Dioclis Antigono regi</i>	
<i>cem inducens</i>	615	<i>scripta ad valetudinem tuen-</i>	
<i>Emplastrum Mnasci discutiens</i>		<i>dam</i>	53
	614	<i>Epithymi vires, pondus, & vtendi</i>	
<i>Empl. melanchlorum</i>	613	<i>modus</i>	559
<i>Empl. ex senetione</i>	614	<i>Epithymbri vires</i>	ibid.
<i>Emplastrum psitacium</i>	ibid.	<i>Epithymum</i>	492
<i>Emprosthotonos</i>	142	<i>Epomphalum medicamentum quod</i>	
<i>Encanthis quid eiusq; cura</i>	151	<i>umbilico illinitur ad aluum sub-</i>	
<i>Encephalos</i>	489	<i>ducendam</i>	566
<i>Engisoma</i>	433	<i>Epithematum differentia & vsus</i>	
<i>Entaticon empl.</i>	625		626
<i>Enterocelos</i>	410	<i>Epulis 380. Eius curatio</i>	ibid.
<i>Enthenstici</i>	132	<i>Epulis quid et quomodo curetur</i>	
<i>Ephelidem curantia</i>	167		170
<i>Ephemeron</i>	494	<i>Equarum sanguis</i>	471
<i>Ephemeris assumpti notæ 357. reme-</i>		<i>Erasistrati panchrestos hygra</i>	609
<i>dia</i>	ibid.	<i>Erethrias terra</i>	486
<i>Ephialtes unde dicatur</i>	134	<i>Eria</i>	493
<i>Ephialtes quomodo cognoscatur</i>		<i>Erice</i>	ibid.
<i>ibidem.</i>		<i>Erigerum</i>	496
<i>Ephialtes quomodo curandus</i>	ibid.	<i>Erinaceus</i>	494
<i>Epicaunia vlcus oculi</i>	152	<i>Erimon</i>	493
		<i>Eri</i>	

INDEX.

<i>Eruum</i>	528	<i>Exercitatio quid</i>	<i>ibid.</i>
<i>Eruca</i>	493	<i>Exercitationis commoda</i>	7
<i>Eruca picearum</i>	532	<i>Exercitationis tempus idoneum,</i>	
<i>Eruca facultates</i>	41	<i>vrinarum color indicat</i>	<i>ibidem</i>
<i>Eruca pinorum assumptæ signa</i>		<i>Exercitatio vocis qualis esse debeat</i>	
353. <i>Curatio</i>	<i>ibidem</i>	<i>Et quæ eius sint commoda</i>	9
<i>Eruca olerum</i>	501	<i>Exomphalon</i>	397
<i>Eryngium</i>	496	<i>F</i>	
<i>Erysipelas inflammatorium</i>	96	<i>Faba</i>	512
<i>Erysipelas quid</i>	287	<i>Fabe</i>	44
<i>Erysipelata capitis periculosa</i>	96.	<i>Faba Aegyptia</i>	<i>ibidem</i>
<i>eorum curatio</i>	<i>ibidem</i>	<i>Facies vt rubeseat quomodo effi-</i>	
<i>Erysipelas quid ibid. Curatio ibid.</i>		<i>ciendum</i>	168
<i>Erysipelatis cerebri signa & cura-</i>		<i>Faciem à rugis asserentia</i>	167
<i>tio</i>	123	<i>Faciei pillos tollentia</i>	168
<i>Erythrodanon</i>	493	<i>Faciei nigritias tollentia</i>	<i>ibidem</i>
<i>Erythroides tunica</i>	406	<i>Faciei varos tollentia</i>	<i>ibid.</i>
<i>Erythrum</i>	630	<i>Faciei aspretudinem tollentia ibi-</i>	
<i>Eupatorium</i>	493	<i>dem</i>	
<i>Euphorbium</i>	494	<i>Faciei vitia quomodo curentur</i>	
<i>Euphorbij pondus, vires, & modus</i>			167
<i>vtendi</i>	560	<i>Facultates alimentorum</i>	40
<i>Eunuchi quomodo fiant</i>	414	<i>Fames grandis, in febribus quomo-</i>	
<i>Eunuchismus</i>	<i>ibid.</i>	<i>do curetur</i>	99
<i>Euodes, à grato odore dictum, ma-</i>		<i>Farinaceus pollen</i>	487
<i>lagma</i>	630	<i>Fastidium cibi</i>	192
<i>Euzomon</i>	493	<i>Fastidium cibi in febribus quomo-</i>	
<i>Exanthemata puero oborta quo-</i>		<i>do curandum</i>	98
<i>modo curanda</i>	4	<i>Fastidium cibi prohibentia</i>	1
<i>Exanthemata ficsa capitis & men-</i>		<i>Fatuitatis causa</i>	126
<i>ti quomodo curanda</i>	114	<i>Fauſtini paſtillus</i>	589
<i>Exanthematū capitis præſid.</i>	113	<i>Fauus quid 421. curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Exanthroma</i>	453	<i>Fauus quid 307. quomodo cure-</i>	
<i>Exercitationum genera</i>	7	<i>tur</i>	<i>ibidem</i>
<i>Exercitatio valida seu violenta</i>	7	<i>Fau capitis vnde naſcantur, &</i>	
<i>Exercitatio celeris</i>	8	<i>quomodo curentur</i>	113
<i>Exercitatio composita</i>	<i>ibidem</i>	<i>Februm continuarum origo nota</i>	
<i>Exercitatio quando finienda</i>	8	<i>& curatio</i>	83
<i>Exercitatione finita quid facien-</i>		<i>Fex</i>	548
<i>dum</i>	8	<i>Februm putridarum agnitio</i>	77
		<i>Febr</i>	

INDEX.

<i>Febrium tertianarū agnitio</i>	78	<i>Febres continentes</i>	83
<i>Febris tertiana</i>	79	<i>Febris continens quid</i>	ibid.
<i>Febris tertiana exacta</i>	ibi.	<i>Febres curaturus quot & quæ per-</i>	
<i>Febris tertiana extensa</i>	ibid.	<i>quirere debeat</i>	57
<i>Febrium putridarū curatio</i>	78	<i>Fel 553. Suillum 554. Ouillum</i>	
<i>Febris tertianæ victus</i>	79	<i>ibid. Caprillum, Vrsorum, Boum,</i>	
<i>Febris tertianæ curatio</i>	ibid.	<i>Taurinum ibid. Hyænæ, Callio-</i>	
<i>Febris tertianæ nothæ curatio</i>	80	<i>nymi piscis ibid. Scorpionis ibid.</i>	
<i>Febrium quartanarū agnitio</i>	ibid.	<i>maxime Hirundinis, Capræ syl-</i>	
<i>Febrium quartanarum differen-</i>		<i>uestris, ibid. Gallorum, Perdicū,</i>	
<i>tiæ</i>	ibidem	<i>Accipitrum, Aquilarum ibid.</i>	
<i>Febrium quartanarū curatio</i>	ibi.	<i>Fel volucrum acrius & siccando</i>	
<i>Febrium quotidianarū agnitio</i>	81	<i>vehementius, quàm quadrupedū</i>	
<i>Febriū quotidianarū curatio</i>	ibi.	<i>ibidem</i>	
<i>Febris quartana quo ferè anni tem-</i>		<i>Felus morsus notæ 342 curatio ibi-</i>	
<i>pore incipiat</i>	80	<i>dem</i>	
<i>Febris hepialis signa, causse & cu-</i>		<i>Femora bouis cremata</i>	529
<i>ratio</i>	82	<i>Femorum intertrigines curantia</i>	5
<i>Febris hepialis vnde dicatur</i>	ibid.	<i>Femoris fracturæ quomodo curen-</i>	
<i>Febrium ardentium agnitio</i>	84	<i>tur</i>	448
<i>Febrium ardentium curatio</i>	ibid.	<i>Fœniculum grande</i>	498
<i>Febrium quibus ex affectu erysipe-</i>		<i>Fermentum</i>	495
<i>laceo origo est notæ ibid. eorundem</i>		<i>Ferree aquæ quibus conferant</i>	24
<i>curatio</i>	ibid.	<i>Ferrum</i>	538
<i>Febrium hefticarum agnitio</i>	85	<i>Ferula</i>	525
<i>Febrium hefticarum duæ species</i>		<i>Ficus</i>	44
<i>ibidem</i>		<i>Ficus</i>	544
<i>Febrium hefticarum curat. ibidem</i>		<i>Ficus arbor</i>	544
<i>Febrium diariarum causse</i>	76	<i>Ficus humilis</i>	553
<i>Febris diaria qua ratione dignosca-</i>		<i>Ficus capitis morbus quomodo cu-</i>	
<i>tur</i>	ibidem	<i>randus</i>	114
<i>Febris diariæ qui opportuni</i>	ibid.	<i>Ficosa capitis & menti exanthea-</i>	
<i>Febris diariæ curandi ratio</i>	ibid.	<i>mata quomodo curanda</i>	ibid.
<i>Febris diaria laborantium victus</i>		<i>Filicula</i>	489
	77	<i>Filicula</i>	533
<i>Febrium putridarum notæ ibidem</i>		<i>Filix</i>	534
<i>Febrium putridarum curat.</i>	78	<i>Fistula quid</i>	420
<i>Febris semitertianæ notæ, eiusq; ge-</i>		<i>Fistula quid 318. curatio</i>	ibid.
<i>neratio duplex</i>	86	<i>Fistulæ insanabiles</i>	422
<i>Febris semitertianæ curatio ibidem</i>		<i>Fistulæ agrè confanefcentes</i>	ibid.
		<i>Fistula</i>	

INDEX.

<i>Fistularum ani curatio que ma-</i>	<i>Frictionum genera</i>	8
<i>nu peragitur</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Fistularum differentie</i>	<i>Frictionum noue coniugationes</i>	9
420	<i>Frictio dura</i>	8
<i>Fistule quomodo manu curande</i>	<i>Frictio mollis</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>	<i>Frictio mediocris</i>	<i>ibidem</i>
<i>Fistularum ani latentium note</i>	<i>Frictio multa & dura</i>	<i>ibid.</i>
(421)	<i>Frictio modica & mollis</i>	<i>ibidem</i>
<i>Fistularum ani manifestarum no-</i>	<i>Frictio apotherapentica</i>	<i>ibidem</i>
<i>te</i>	<i>Frictio preparatoria</i>	7
422	<i>Frigida lauatio quibus conueniat</i>	
<i>Flagris casi quomodo curandi</i>	23	
285	<i>Frigida intemperies quomodo cor-</i>	
<i>Flatus ventriculi unde generentur</i>	<i>rigatur</i>	37
195. quomodo curentur	<i>Frigus cui nocuit, quid facere de-</i>	
<i>ibid.</i>	<i>beat</i>	18
<i>Flauum medicamentum</i>	<i>Frigidi & sicci temperamenti no-</i>	
593	<i>te</i>	30
<i>Fluxionibus alui biliosis maxime</i>	<i>Frigidi & humidi temperamenti</i>	
<i>medetur lac coctum in quod cal-</i>	<i>note</i>	29
<i>culi marini igniti demissi sunt</i>	<i>Frigidi temperamenti note</i>	29
49	<i>Frons quomodo incidatur & qui-</i>	
<i>& intestinorum torminibus</i>	<i>bus</i>	366
<i>ibid.</i>	<i>Fructus temporarij</i>	44
<i>Fœniculum</i>	<i>Fructus arborum</i>	<i>ibid.</i>
519	<i>Fru mentaceorum vires</i>	43
<i>Fœnugracum</i>	<i>Fucus</i>	551
44	<i>Fuligo</i>	516
<i>Fœnugracum</i>	<i>Fuligo</i>	470
546	<i>Fumaria</i>	501
<i>Fœtum educentia</i>	<i>Fagorum assumptorū remedia</i>	359
238	<i>Furunculus quid</i>	297. curat. <i>ibid.</i>
<i>Folium</i>	<i>Fuca purgans & stomacho grata</i>	
551	562	
<i>Fracturis idoneum medicamētum</i>		
<i>Oribasij</i>		
625. Ex commentarijs		
<i>Heracleti</i>		
<i>ibid.</i>		
<i>Fractura ossis quid</i>		
433		
<i>Fractura in capite quid</i>		
<i>ibidem</i>		
<i>Fracturarum differentie</i>		
<i>ibid.</i>		
<i>Fracturarū capitis differentie</i>		
<i>ibidem</i>		
<i>Fractura capitis species quomodo</i>		
<i>deprehendenda</i>		
434		
<i>Fractura capitis curatio</i>		
435		
<i>Fractura cum vulnere curat.</i>		
451		
<i>Fractura callo non firmata quomo-</i>		
<i>do curande</i>		
453		
<i>Fracturae immodico callo obducte</i>		
<i>quomodo curentur</i>		
452		
<i>Fraxinus</i>		
520		

INDEX.

<i>Galenium malagma</i>	630	<i>riri possit</i>	401
<i>Galenii picra</i>	579	<i>Glandes ad quid conueniant</i>	20
<i>Galerita</i>	510	<i>Glandes unde conficiantur</i>	ibidem
<i>Galion</i>	485	<i>Glans colis nuda quomodo contegen</i>	
<i>Galliopsis</i>	ibidem	<i>da</i>	401
<i>Galla</i>	504	<i>Glandule animalium</i>	47
<i>Galli cerebrum</i>	490	<i>Glaſlum</i>	499
<i>Gallina</i>	46	<i>Glaux</i>	486
<i>Gallinarum stercus</i>	509	<i>Glaucium</i>	ibid.
<i>Gallarum ventris interior mem-</i>		<i>Glaucoma quid eiusq; remedia</i>	157
<i>brana</i>	507	<i>Glechon</i>	487
<i>Gallus dropax, Oribasij</i>	636	<i>Gloeos</i>	ibid.
<i>Gallarum cohortalium sanguis</i>		<i>Gluten piscium</i>	500
471		<i>Glutinium</i>	507
<i>Galopsis</i>	485	<i>Glutinium bubulum</i>	509
<i>Gammari</i>	50	<i>Glycea quomodo curentur</i>	156
<i>Ganglion quid 388. Eius nota ibi</i>		<i>Glycyrrhiza</i>	487
<i>dem. Curatio</i>	ibidem	<i>Gnaphalium</i>	ibidem
<i>Ganglium quid 287. curatio ibid.</i>		<i>Gone pessus</i>	648
<i>Gangrena quid 291. curatio 292</i>		<i>Gongylis</i>	487
<i>Gangranarum remedia</i>	292	<i>Gordylion</i>	ibidem
<i>Garum</i>	485	<i>Gramma oboli</i>	658
<i>Ge</i>	ibidem	<i>Gramen</i>	469
<i>Genista</i>	541	<i>Gramen arundinaceum</i>	500
<i>Gentili exulcerato conueniens me-</i>		<i>Grandines tuſſiendo eieſti</i>	175
<i>dicamentum</i>	267	<i>Granum gnidium</i>	507
<i>Gentiana</i>	485	<i>Granum tinctorium</i>	ibidem
<i>Genu articulus luxatus quomodo</i>		<i>Crassum corpus quomodo extenuan</i>	
<i>reponatur</i>	464	<i>andum</i>	27
<i>Geranium</i>	485	<i>Grauedo</i>	175
<i>Geras</i>	486	<i>Grauedinis curatio</i>	ibidem
<i>Ges entera</i>	ibid.	<i>Grauedinis puerorum curatio</i>	4
<i>Gigarta</i>	ibidem	<i>Gravidarum Symptomata, eorūq;</i>	
<i>Gingidion</i>	41	<i>remedia</i>	1
<i>Gingidium</i>	486	<i>Grossi</i>	526
<i>Gingivas corrosas curantia</i>	171	<i>Grues</i>	46
<i>Gladiolus</i>	526	<i>Gummi</i>	508
<i>Glandes</i>	46	<i>Gummi cerasi arboris</i>	504
<i>Glans unguentaria</i>	481	<i>Gurgulio</i>	381
<i>Glans penis cōtaſta quomodo ape-</i>		<i>Gutturis aspredinem curantia</i>	177
		<i>Gutta</i>	

INDEX.

<i>Cutturi spina quō eximantur</i>	382	<i>Hemionitis</i>	496
<i>Gypsum</i>	487	<i>Hemiplagia quid.</i>	135
<i>Cypsi poti vota & remedia</i>	360	<i>Hepar</i>	496. Vide <i>Iecur</i>
<i>Cyngathon</i>	133	<i>Hepar quomodo vratur</i>	395
<i>Cyris</i>	487	<i>Hepatis temperaturæ notæ</i>	34
<i>H</i>		<i>Hepialus febris</i>	82
<i>Habitus corporis quomodo</i>		<i>Hepiali curatio</i>	ibidem
<i>recalsaciendus</i>	13	<i>Hepsema</i>	494
<i>Hæmatites</i>	516	<i>Heraction</i>	517
<i>Hæmorrhoides cæcæ curatu diffici-</i>		<i>Heraclius lapis</i>	ibidem
<i>les existunt 234. quomodo aperien-</i>		<i>Herba lactaria</i>	546
<i>de</i>	ibidem	<i>Herba apollinaris</i>	549
<i>Hæmorrhoidum fluxus superfluus</i>		<i>Herbæ quomodo coquendæ</i>	652
<i>quomodo sistendus</i>	ibid.	<i>Hermaphroditus unde appellati</i>	414
<i>Hæmorrhoides quid, & cur sic di-</i>		<i>Eorum quatuor differentiæ, in</i>	
<i>cantur</i>	ibid.	<i>viris tres, in mulierib. vna</i>	ibidem
<i>Hæmorrhoides muliebrium locorū</i>		<i>curatio</i>	ibid.
<i>quomodo excindendæ</i>	415	<i>Hermodactylus stomacho nocet</i>	
<i>Hæmorrhoides ani quomodo manu</i>			261
<i>curandæ</i>	424	<i>Herpes quid</i>	287
<i>Halatia, quasi dicas ex sale confe-</i>		<i>Herpes exedens</i>	293
<i>cta purgatio</i>	562	<i>Herpes miliaris</i>	ibidem
<i>Halimi vires</i>	41	<i>Herpyllum</i>	493
<i>Hæmation</i>	608	<i>Hidros</i>	498
<i>Hæstula regia</i>	480	<i>Hieracitis</i>	517
<i>Hedera</i>	506	<i>Hiera Antiocchi</i>	565
<i>Hedera terrestris</i>	552	<i>Hiera Archigenis</i>	566
<i>Hedychroi confectio</i>	569	<i>Hiera Galeni</i>	565
<i>Hedysmus</i>	495	<i>Hiera Iusti</i>	ibidem
<i>Hedysarum</i>	ibid.	<i>Hiera Rufi</i>	566
<i>Helcysma</i>	491	<i>Hippocampus</i>	498
<i>Helichorus</i>	ibid.	<i>Hippolapathum</i>	ibidem
<i>Helechryson</i>	ibid.	<i>Hippomarathon</i>	ibid.
<i>Helenium</i>	ibid.	<i>Hippopotami</i>	448
<i>Heliosas medicamentum</i>	593	<i>Hippopotamus</i>	499
<i>Helxine</i>	492	<i>Hipposelinon</i>	ibid.
<i>Hemerocalles</i>	496	<i>Hipposelinon</i>	541
<i>Hemicrania</i>	117	<i>Hipposelini vires</i>	41
<i>Hemicraniæ curatio</i>	118	<i>Hippuris</i>	499
<i>Hemina</i>	657. & 658 659	<i>Hircinacaro</i>	47

†

I N D E X.

<i>Hircinum iecur</i>	496	24	
<i>Hircinum cornu</i>	504		<i>Hygra ex caucalide</i> 609
<i>Hirundines</i>	553		<i>Hygidion Ammonij</i> 604
<i>Hirundinum cerebrum</i>	490		<i>Hyoſcyamus</i> 549
<i>Hirundinaria herba</i>	553		<i>Hypericum</i> <i>ibid.</i>
<i>Hirudinum denoratarum digno-</i>			<i>Hypericon</i> 509
<i>tio</i> 354. <i>curatio</i>	<i>ibidem</i>		<i>Hypecoon</i> 550
<i>Hyſſopi liquidi medicamenti præ-</i>			<i>Hypociſtis</i> <i>ibid.</i>
<i>paratio</i>	625		<i>Hypogloſſon</i> <i>ibid.</i>
<i>Hædi ſanguis</i>	471		<i>Hypoglottides medicamen.</i> 176
<i>Hominis temperatiſſ. notæ</i>	28		<i>Hypopyi</i> 374
<i>Hominis morſus remedia</i>	348		<i>Hypopyj</i> 153
<i>Hordeum</i>	511		<i>Hypophæſton</i> 550
<i>Humana caro</i>	47		<i>Hypoſphatiſmus</i> 366
<i>Humerus ſummus quid</i>	455		<i>Hypoſpadiæon</i> 401
<i>Humeri luxati curatio</i>	455		<i>Hypoſphagma quid eiùſq; curatio</i>
<i>Humiditates aurium deſiccantia</i> 5	148		
<i>Humidi temperamenti notæ</i>	29		<i>Hyrcorum ſanguis</i> 471
<i>Hyalos</i>	549		<i>Hyſſopum</i> 551
<i>Hyacinthus</i>	548		
<i>Hydatidis quid</i> 372. <i>notæ</i> <i>ibid.</i> <i>cura-</i>			I
<i>tio</i>	<i>ibid.</i>		<i>Aſpis</i> 516
<i>Hydnon</i>	549		<i>Ichores</i> 179
<i>Hydor</i>	<i>ibid.</i>		<i>Ichthyocolla</i> 500
<i>Hydrargyros</i>	<i>ibid.</i>		<i>Icterus quid</i> 224
<i>Hydros</i>	346		<i>Icterus niger</i> 222
<i>Hydrocele</i>	228		<i>Ictericorum remedium</i> 217
<i>Hydrocephalon quid</i> 364. <i>Eius</i>			<i>Icterus ratione iudicationis in febr-</i>
<i>cauſſæ</i> <i>ibidem.</i> <i>notæ</i> <i>ibidem.</i> <i>curatio</i>			<i>bus facile curatur</i> 224
<i>ibidem</i>			<i>Icteri ex calida intemperie iocinoris</i>
<i>Hydromalum vinoſum</i>	598		<i>notæ</i> <i>ibid.</i> <i>curatio</i> 225
<i>Hydrops leucophlegmatias, hypo-</i>			<i>Icteri ex calida intemperie ſolida-</i>
<i>ſarcidios, vel anafarca, eiùſque ſi-</i>			<i>rum partium generatio</i> 224. <i>notæ</i>
<i>gna & cauſſæ</i> 219. <i>eiùſdem cura-</i>			<i>225. curatio</i> <i>ibid.</i>
<i>tio</i> <i>ibid.</i> & 220. & 221			<i>Ictericis quæ vena ſecanda</i> <i>ibid.</i>
<i>Hydropeperi</i>	549		<i>Idea radix</i> 498
<i>Hydropicus aqua quomodo emitta-</i>			<i>Iecur</i> 496. <i>Canis rabidi</i> <i>ibid.</i> <i>ca-</i>
<i>tur</i>	396		<i>prillum</i> <i>ibid.</i> <i>Hircinum</i> <i>ibid.</i> <i>la-</i>
<i>Hydrophobia</i>	336		<i>certæ</i> <i>ibid.</i> <i>Lupinum</i> <i>ibid.</i> <i>Aſi-</i>
<i>Hyemi quæ victus ratio conueniat</i>			<i>ninum, Apri</i> <i>ibid.</i> <i>Mergi</i> <i>ibid.</i>
			<i>Iecur animalium</i> 47
			<i>Iecur</i>

INDEX.

<i>Iecur suillum</i>	ibid.	<i>Iecinoris sicca intemperiei nota</i>	215
<i>Iecur quomodo vratur</i>	394	<i>humida nota ibidem</i>	
<i>Ilambanis collyrium</i>	603	<i>Iecinoris inflammationis signa ibi.</i>	
<i>Ileos quid</i>	206	<i>eiusque curatio</i>	217
<i>Ilex</i>	534	<i>Iecinoris inflammatio à pleuritide</i>	
<i>Incrassantium alimentorum differe- rentia & vires</i>	40	<i>quomodo discernenda</i>	215
<i>Incubo vel Incubus unde dicatur</i>		<i>Iecinoris inflammationum in gib- ba eius parte, nota</i>	ibid.
134		<i>Iecinoris venarum obstructionis no- ta ibid. curat. 216.</i>	
<i>Indicius lapis</i>	517	<i>Ion</i>	498
<i>Infans recens natus quomodo nu- tritur</i>	3	<i>Ios</i>	ibid.
<i>Infantium victus ratio</i>	6	<i>Iris</i>	499
<i>Inflammatio proprie quid 287. cu- ratio</i>	288	<i>Isatis</i>	499
<i>Inflammatio erysipelacea</i>	96	<i>Isis emplastr.</i>	616
<i>Inguinalis herba</i>	294	<i>Isopyron</i>	499
<i>Inguinibus conueniens medicame- tum</i>	290	<i>Isotheon collyrium</i>	608
<i>Inodora</i>	465	<i>Itea</i>	499
<i>Insania curatio</i>	147	<i>Itgon</i>	122
<i>Intemperies frigida quomodo corri- gatur</i>	37	<i>Iudicium futurum quomodo præ- noscendum</i>	61
<i>Intemperatorum corporum nota</i>	29	<i>Iudicium instans quomodo agno- scendum</i>	61
<i>Intertrigines femorum curantia</i>	5	<i>Inglans</i>	45
<i>Intertrigines curantia</i>	286	<i>Inguli confecti curatio</i>	441
<i>Intestina terre</i>	486	<i>Iuncus angulosus</i>	513
<i>Intestini procidentia quomodo cu- ran.</i>	399	<i>Iunci odorati & rotundi flos</i>	545
<i>Intestina animalium</i>	48	<i>Iuncus palustris</i>	ibid.
<i>Intybus syluestris</i>	506	<i>Iuniperus</i>	478
<i>Intybi facultates</i>	41	<i>Ixos</i>	498
<i>Iecinoris affectus</i>	214	<i>Ixia signa 357. remedia ibidem</i>	
<i>Iecinorosi qui</i>	ibid.	<i>κακοχυμία quid</i>	25
<i>Iecinoris temperatura nota</i>	34	<i>Κασινα medicamenta</i>	122
<i>Iecinoris imbecillitas</i>	214	<i>I.</i>	
<i>Iecinoris frigide intemperiei nota</i>		L aboriosam vitam agentium	
<i>ibid. curatio</i>	216	<i>victus ratio</i>	25
<i>Iecinoris caua pars per aluum gib- ba per vrinas expurgatur</i>	218	<i>Labrorum curia quomodo sarcieda</i>	
		371	
		<i>Labrum veneris</i>	489
		<i>Lac</i>	484

INDEX.

<i>Lac recens multum</i>	48	<i>caussæ ibid. curatio</i>	187
<i>Lac bubulum</i> 484. <i>Muliebre ibid.</i>		<i>Lathyrus</i>	514
<i>Caprillum, Asininum, Ouillum,</i>		<i>Laurus arbor</i>	488
<i>Vaccinum ibidem.</i>		<i>Lauri foliorum viridiū pondus</i>	159
<i>Lac coctum</i>	48	<i>Laurus Alexandrina</i>	488
<i>Lac nutricis viciatum quomodo</i>		<i>Laurinum oleum</i>	641
<i>corrigatur</i>	3	<i>Leana empl.</i>	620. & 621
<i>Lac ouillum</i>	48	<i>Legumina</i>	44
<i>Lac scissile</i>	49	<i>Lemæ quid</i>	121
<i>Lac humidius</i>	48	<i>Lamonium</i>	514
<i>Lac caprillum</i>	ibid.	<i>Lemnia terra</i>	485
<i>Lactis probatio</i>	3	<i>Lentes</i>	550
<i>Lac crassius</i>	48	<i>Lenticula</i>	44
<i>Lac coquendi modus</i>	ibid.	<i>Lenticula palestris</i>	550
<i>Lac statim à partu redditum</i>	49	<i>Lenticulas curantia</i>	167
<i>Lac nutricis quot modis vicietur</i>	3	<i>Lentiscus</i>	544
<i>Lactaria herba</i>	546	<i>Lentiscinum oleum</i>	642
<i>Lacerta</i>	538	<i>Leontopetalon</i>	514
<i>Lacerta</i>	537	<i>Lepidion</i>	ibid.
<i>Lacertæ iecur</i>	496	<i>Lepidoile ossa</i>	364
<i>Lactuca</i>	497	<i>Lepis</i>	515
<i>Lactuca facultates</i>	41	<i>Leporina caro</i>	47
<i>Ladanon</i>	514	<i>Leporis cerebrum</i>	489
<i>Lagopus</i>	513	<i>Lepra quid</i> 276. <i>caussæ ibid. signa</i>	
<i>Lane</i>	493	<i>ibid. curatio</i>	277
<i>Lana pinguitudo</i>	526	<i>Leihargi caussæ</i> 123. <i>signa ibid. cu-</i>	
<i>Lapathum</i>	514	<i>ratio</i>	124
<i>Lapides</i>	516	<i>Leihargus à caro quid differat</i>	
<i>Lapides quomodo coquendi</i>	649		123
<i>Lapides argæi montis cappadociæ</i>		<i>Leucacanthum</i>	515
	517	<i>Lencas</i>	ibid.
<i>Lapis specularis</i>	542	<i>Lence</i>	ibid.
<i>Lapsana</i>	514	<i>Lence quid</i> 280. <i>caussæ ibidem cu-</i>	
<i>Larinx</i>	173	<i>ratio</i>	ibid.
<i>Larix</i>	536	<i>Lencus pastillus</i>	590
<i>Laserpitium</i>	539	<i>Leuiratæ</i>	50
<i>Lasitudinum ob exercitationem</i>		<i>Libanius pessus</i>	647
<i>quatuor species earumque reme-</i>		<i>Libanotides</i>	515
<i>dia</i>	9. & 10	<i>Libanotos</i>	ibid.
<i>Lateralis dolor quid</i> 186. <i>notæ ibid.</i>		<i>Libanum</i>	605
			<i>Lib</i>

INDEX.

<i>Libella</i>	50	<i>Locustæ</i>	58
<i>Libra</i>	658	<i>Loligines</i>	ibid.
<i>Lichen herba</i>	514	<i>Lolium</i>	471
<i>Lichenes equorum</i>	ibid.	<i>Lonchitis</i>	518
<i>Lien animalium</i>	48	<i>Lonchitidis seminis pondus & mo-</i>	
<i>Lien quomodo aduratur</i>	395	<i> dus utendi</i>	560
<i>Lienis obstructionis notæ</i>	222	<i>Lotus herba</i>	518
<i>Lienis expultricis facultatis imbe-</i>		<i>Lotus arbor</i>	519
<i> cillitas quomodo cognoscenda ibid.</i>		<i>Lumbricorum origo</i>	327
<i>Lienis intemperies quomodo cure-</i>		<i>Lumbrici rotundi infantibus pecu-</i>	
<i> tur ibidem</i>		<i> liares</i>	328
<i>Lienteria quid, eius species, causse,</i>		<i>Lunare cyphi</i>	646
<i> notæ, & curatio</i>	197	<i>Lupinum</i>	497
<i>Lignys</i>	516	<i>Lupinum</i>	44
<i>Lignorum caries</i>	537	<i>Lupinum iecur</i>	496
<i>Ligyslicum</i>	516	<i>Luporum stercus</i>	508
<i>Lilium</i>	511	<i>Lupus, piscis</i>	49
<i>Liliaceum oleum</i>	640	<i>Luxatio quid</i>	453
<i>Linguae animalium</i>	47	<i>Luxationis duæ species</i>	ibid.
<i>Linguae morbus</i>	171	<i>Luxatio cum fractura quomodo</i>	
<i>Linguae scabrities quomodo curan-</i>		<i> curetur</i>	466
<i> da</i>	101	<i>Luxatio cum ulcere quomodo cu-</i>	
<i>Lini semen</i>	517	<i> retur</i>	465
<i>Linospermon</i>	ibid.	<i>Lycaonis signa 134. curatio</i>	ibid.
<i>Linozostis</i>	ibid.	<i>Lychnis</i>	518
<i>Liosporon</i>	517	<i>Lychnidis seminis pondus & mo-</i>	
<i>Lipasmata</i>	138	<i> dus utendi</i>	559
<i>Lippitudinis causa 145. curatio</i>		<i>Lycium</i>	518
<i> ibidem</i>		<i>Lycotimon</i>	472
<i>Liquidorum mensuræ</i>	658	<i>Lycopsis</i>	518
<i>Liquidum colly. ex caucalide</i>	609	<i>Lycopsis</i>	469
<i>Liquor 527. Cyrenacius, Medicus,</i>		<i>Lygis</i>	ibid.
<i> Syriacus</i>	ibid.	<i>Lynceus ad claritatē oculorū</i>	607
<i>Lirium suffimen</i>	645	<i>Lypyrie febres</i>	83
<i>Lysiponium acopon</i>	635	<i>Lysimachium</i>	518
<i>Lithargyros</i>	516		
<i>Lithi</i>	ibid.		
<i>Lithospermon</i>	517		
<i>Litrum</i>	518		
<i>Liuores corporis prohibentia</i>	13		

INDEX.

<i>Magni aster</i>	606	<i>Mamiras</i>	519
<i>Mala</i>	521	<i>Mammorum inflammationes quo</i>	
<i>Mala dulcia ibid. austerā, acida,</i>		<i>modo curandæ</i>	300
<i>assa, elixa</i>	ibidem	<i>Mamimis medicamentum conue-</i>	
<i>Mala punica</i>	45	<i>niens</i>	290
<i>Malabathrinum collyrium</i>	608	<i>Mandragora</i>	519
<i>Malobathron</i>	519	<i>Manethonus diasphedes</i>	593
<i>Malacia piscis</i>	50	<i>Manus summa contusionis curatio</i>	
<i>Malacia gravidarū Symptoma</i>	1	448	
<i>Malache</i>	519	<i>Manna thuris</i>	519
<i>Mala costrata</i>	50	<i>Manna thuris quomodo coquenda</i>	
<i>Malagma ad capitis dolorem</i>	117	651	
<i>Malagma anethine</i>	632	<i>Marathron</i>	519
<i>Malagma ex baccis lauri</i>	631	<i>Marasmos</i>	85
<i>Malagma ex seminibus</i>	ibidem	<i>Marcellius thronus pastillus</i>	588
<i>Malagma erythrium</i>	630	<i>Marciatum malagma</i>	628
<i>Malagma mendesium</i>	627	<i>Marina aqua</i>	496
<i>Malagma marciatum</i>	628	<i>Marrubium</i>	534
<i>Malagma pentamyron</i>	629	<i>Marrubium nigrum</i>	482
<i>Malagma euodes</i>	630	<i>Masaphion confectio</i>	646
<i>Malagma ex sertula cāpana</i>	626	<i>Massalioti medicamentum</i>	594
<i>Malagma citrinum</i>	631	<i>Mastiche</i>	520
<i>Malagmatū differētia et vsus</i>	626	<i>Maxilla confraēta curatio</i>	440
<i>Malagma dia sampsycho</i>	632	<i>Maxillarum luxatio quomodo cu-</i>	
<i>Malagma ex vinaceis</i>	ibid.	<i>randa</i>	453
<i>Malagma decamyron</i>	629	<i>Maça</i>	43
<i>Malagma ex cenanthe</i>	632	<i>Mecon</i>	521
<i>Malagma polyarchion ex Galeno</i>		<i>Medicamentum ex thure</i>	593
627. aliter	ibidem	<i>Medicamentum vomitum citantia</i>	
<i>Malua</i>	519	567	
<i>Malua vires</i>	41	<i>Medicamentum ex ostreis</i>	593
<i>Malicorium</i>	536	<i>Medicamentum ex duplici pipere</i>	
<i>Malus armeniaca</i>	522	575	
<i>Malum citreum</i>	46	<i>Medicamentum ex charta, ad no-</i>	
<i>Malum medicum</i>	506	<i>mas oris potissimum & natura-</i>	
<i>Malus persica</i>	522	<i>lium vlcera</i>	594
<i>Malum punicum</i>	536. Eius acini	<i>Medicamenta purgantia compo-</i>	
ibidem		<i>ta</i>	560
<i>Malum terre</i>	478	<i>Medicamentum heliocas, adurens,</i>	
<i>Mamillarū affectus curantia</i>	189	593	

Med

INDEX.

<i>Medicamenta atram bilem pur-</i> <i>gantia quibus & quando exhi-</i> <i>berenda</i> 558	<i>Medicamentum fracturis idoneum</i> <i>Oribasij</i> 625. <i>Ex commentarijs</i> <i>Heraclei</i> ibidem
<i>Medicamenta simplicia bilem fla-</i> <i>uam purgantia</i> 555	<i>Medicamentum ex sanguine hirci</i> <i>no</i> 582
<i>Medicamentum dia besasa ex ru-</i> <i>ta syluestri</i> 597	<i>Medicamentum nephriticum ex ci-</i> <i>cadis</i> 583
<i>Medicamentum ex syluestris ma-</i> <i>lue semina</i> 583	<i>Medicamentum ex eruis</i> 576
<i>Medicamenti hyssopiliquidi prae-</i> <i>paratio</i> 625	<i>Medicamentum ex malorum coro-</i> <i>neorum carnibus</i> 578
<i>Medicamentum philoxeni, puru-</i> <i>lentis & longa defluxione infe-</i> <i>statis idoneum</i> 577	<i>Medicamenta liquida quae illinun-</i> <i>tur ad oris vitia, ac guttur accom-</i> <i>modata</i> 595
<i>Medicamentum è musto</i> 596	<i>Medicamenta purgantia stomacho</i> <i>aduersantur, excepta aloe</i> 556
<i>Medicamentum dodecalheon</i> 576	<i>Medicamentum à murino colore</i> <i>psaron dictum</i> 593
<i>Medicamentum dia citriu, tarde</i> <i>concoquentibus efficax</i> 579	<i>Medicamentorum emplastra in-</i> <i>gredientium differentia eorumque</i> <i>coctio</i> 609
<i>Medicamentum massalioti</i> 594	<i>Medicamentum ex lupino iecore</i> <i>prestantissimum</i> 579
<i>Medicamentum quod umbilico illi-</i> <i>nitur epomphalium dictum, ad al-</i> <i>uum subducendam</i> 566	<i>Medicamentum xanthon</i> 593
<i>Medicamentum ex myrto sylue-</i> <i>stri</i> 594	<i>Medicum malum</i> 506
<i>Medicamentum dia coralliu poda-</i> <i>gricus idoneum</i> 583	<i>Medimnus</i> 658
<i>Medicamentum dia calaminibus</i> 579	<i>Medion</i> 521
<i>Medicamentum dia bacanu, hepa-</i> <i>ti accommodatum</i> 580	<i>Medimnus atticus</i> 659
<i>Medicamentum Zopyrios</i> ibid.	<i>Medulla animalium</i> 47
<i>Medicamentum Galeni è stilla co-</i> <i>mittalibus potissimum efficax</i> 574	<i>Melan</i> 520
<i>Medicamentum dia trion pipereon</i> 578	<i>Mel</i> 51
<i>Medicamentum ex succo mali pu-</i> <i>nici</i> 597	<i>Mel coctum</i> ibid.
<i>Medicamentum ex succis malorum ad</i> <i>appetentiam abolitam & agram co-</i> <i>ctionem probatum</i> 578	<i>Mel non coctum</i> ibidem
	<i>Mel sachar</i> 520
	<i>Mel vino quanto ponderosius</i> 618
	<i>Mel oleo quanto grauius</i> 658
	<i>Mela</i> 521
	<i>Melancholia quid</i> 131
	<i>Melancholia caussa</i> ibidem
	<i>Melancholia signa</i> ibid.

INDEX.

<i>Melancholia curatio</i>	ibid.	<i>Mensium suppressio ob interanea-</i>
<i>Melancholia hypochondriaca</i>	131	<i>rum partium aliquam primario</i>
<i>Melanthion</i>	520	<i>affectam quomodo curari debeant</i>
<i>Meli</i>	ibid.	<i>ibidem</i>
<i>Melanchloron emplastrum</i>	613	<i>Mensium suppressionis causse qui</i>
<i>Melanchlorus pastillus</i>	590	<i>bus notis deprehendantur ibid.</i>
<i>Melantaria</i>	520	<i>Mensium suppressorum causse ibi.</i>
<i>Melaplacontium quomodo pare-</i>		<i>curatio. ibid.</i>
<i>tur</i>	578	<i>Menses vulneribus quando fluere</i>
<i>Melene serapionis emplastrum</i>	619	<i>incipiant 235. quando desinant 236</i>
<i>Melea</i>	522	<i>Mensium tempus ibid.</i>
<i>Melia</i>	520	<i>Menses moratos prouocantia ibid.</i>
<i>Melitera Oribasij</i>	593	<i>Mensura 657</i>
<i>Meliceris quid 386. eius notae ibi.</i>		<i>Mensurarum notae ibidem</i>
<i>curatio ibidem</i>		<i>Mensura aridorum ibid. & 659</i>
<i>Meliceris quid 306 curatio ibid.</i>		<i>Mensura liquidorum 657. & 658</i>
<i>Melilotus</i>	520	<i>Menta 495</i>
<i>Meline</i>	492	<i>Meon 522</i>
<i>Melinum oleum</i>	640	<i>Mercurialis herba 517</i>
<i>Melittites</i>	516	<i>Mergi venter 507</i>
<i>Melon</i>	153	<i>Mergi iecur 496</i>
<i>Melopepon</i>	44	<i>Merula 46</i>
<i>Memaculos</i>	521	<i>Mespila 521</i>
<i>Membrum distortum callo firma-</i>		<i>Mespila 45</i>
<i>tum quomodo curetur 452</i>		<i>Metopion 642</i>
<i>Membrorum attenuatorum cura-</i>		<i>Milax 522</i>
<i>tio 28</i>		<i>Millefolium 524</i>
<i>Membrana cerebri sinigruerit quo</i>		<i>Milium 503</i>
<i>modo curanda 438</i>		<i>Milium 43</i>
<i>Memoriae noxa quomodo acculat</i>		<i>Milphosis quid et eius curatio 150</i>
<i>126. quomodo cognoscatur ibidem</i>		<i>Mina 658</i>
<i>quomodo curetur 127</i>		<i>Mina egyptia ibidem</i>
<i>Menses scientia medicamenta 237</i>		<i>Mina attica ibidem</i>
<i>Menses mouentia 21</i>		<i>Mina Romana ibidem</i>
<i>Mesium immoderatus fluxus quas</i>		<i>Minium quomodo coquendum 649</i>
<i>causas habeat 238 quomodo cu-</i>		<i>Minium rubricum 485</i>
<i>randus ibid.</i>		<i>Misy 522</i>
<i>Mensium suppressio complures af-</i>		<i>Misy quomodo coquatur 649</i>
<i>fectus & longos procreare solet</i>		<i>Murhidatis antidotum dia seincu</i>
<i>236</i>		<i>573</i>

Mnas

INDEX.

<i>Mnasei emplastrum discuties</i>	614	<i>se</i>	415. incommoda	<i>ibidem</i>	en
<i>Modius</i>	658	<i>ratio</i>	<i>ibidem</i>		
<i>Modius aegyptius</i>	659	<i>Muliebrium</i>	locorum thymi condy		
<i>Modius Italicus</i>	<i>ibid.</i>	<i>lomata</i>	<i>Chamorrhoides</i>	quomodo	
<i>Mola quid 246. nota</i>	<i>ibid.</i>	<i>excindantur</i>		<i>ibidem</i>	
247		<i>Mullus</i>		547	
<i>Mola & aquae inter cutem diffe-</i>		<i>Mullus piscis</i>		49	
<i>rentia</i>	146	<i>Mulsa</i>		51	
<i>Moly</i>	524	<i>Mulse preparatio</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Molybdos</i>	522	<i>Multipede</i>		527	
<i>Molybilana</i>	<i>ibid.</i>	<i>Muria</i>		473	
<i>Monohemerum collyrium</i>	601	<i>Murene morsus curatio</i>		347	
<i>Mora</i>	45	<i>Muris arane ictus nota</i>		342	
<i>Moraa</i>	522	<i>curatio</i>		<i>ibidem</i>	
<i>Morbi principium quod</i>	57	<i>Muris auricula</i>		523	
<i>Morbus comitialis trifariam gigni</i>		<i>Murium stercus</i>		509	
<i>tur</i>	128	<i>Muse pastillus</i>		587	
<i>Morbi publicè grassantes</i>	86	<i>Mustela</i>		484	
<i>Morbi publicè grassantes unde o-</i>		<i>Mustela venter</i>		507	
<i>riantur</i>	<i>ibid.</i>	<i>Mustela cerebrum</i>		490	
<i>Morbi ex aeris statu futuri quomo-</i>		<i>Muscus</i>		484	
<i>do praesagiendi & prohibendi</i>	87	<i>Muscus marinus</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Morbi letalis nota</i>	58	<i>Myaces</i>		523	
<i>Morbi non letalis signa</i>	<i>ibid.</i>	<i>Myagros</i>		<i>ibidem</i>	
<i>Morosis unde fiat</i>	126	<i>Myaron</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Moroxus</i>	516	<i>Mycetes</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Morus</i>	522	<i>Mydriasis oculorum</i>		156	
<i>Motus mediocris valetudini tuen-</i>		<i>Myelos</i>		523	
<i>de summum affert praesidium</i>		<i>Myocephalon</i>		153	
40		<i>Myopia qui</i>		159	
<i>Muliebre lac</i>	484	<i>Myopiasis</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Mulier agrè pariens superstes ne</i>		<i>Myosote</i>		523	
<i>futura sit an minus quomodo co-</i>		<i>Myrica</i>		<i>ibidem</i>	
<i>gnosendum</i>	417	<i>Myriophyllum</i>		524	
<i>Muliebris fluor 235 eius species &</i>		<i>Myrmecia</i>		233	
<i>causae ibidem. nota ibidem. cura-</i>		<i>Myrmecia quid 427 unde sic ro-</i>			
<i>tio ibidem</i>		<i>cetur 428. curatio ibidem</i>			
<i>Muliebres loci, vide vulva &</i>		<i>Myrrha</i>		541	
<i>uterus</i>		<i>Myrrha</i>		524	
<i>Muliebrium locorum clausura caus</i>		<i>Myrrha quomodo coquenda</i>		652	

INDEX.

<i>Myrrhis</i>	524	<i>Nascanthos</i>	524
<i>Myrrhine</i>	ibid.	<i>Nascaphthos</i>	ibid.
<i>Myrsinatum emplastrum</i>	615	<i>Nasturtium</i>	501
<i>Myrsine</i>	524	<i>Nasturtij vires</i>	41
<i>Myrsinoides</i>	506	<i>Natricis morsus nota</i>	346
<i>Myrtus</i>	524	<i>curatio</i>	ibid.
<i>Myrtites quomodo fiat</i>	559	<i>Naturalia. Vide pudenda</i>	
<i>Mystrum</i>	658	<i>Naturalium inflammationes quo-</i>	
<i>Mystrum magnum</i>	ibidem	<i>modo curande</i>	300
<i>Mystrum paruum</i>	659	<i>Naturalium vlcera citra inflam-</i>	
<i>Mytuli</i>	523	<i>mationem oborta quomodo cu-</i>	
<i>Myurus unde dicatur</i>	66	<i>randa</i>	232
<i>Myxa</i>	523	<i>Naturalium particularum conser-</i>	
		<i>uatio</i>	226
N			
N <i>Apus</i>	42	<i>Naturalium aquarum vis</i>	24
<i>Napy</i>	524	<i>Naturalium aquarum differentie</i>	
<i>Narce</i>	525	<i>ibidem</i>	
<i>Narcissus</i>	ibid.	<i>Naturalium balneorum differen-</i>	
<i>Narcoticorum largior vsus quæ in</i>		<i>tie</i>	ibidem
<i>commoda afferat</i>	260	<i>Naturalium thymi</i>	403
<i>Nardinum</i>	604	<i>Nauigantium viscus</i>	26
<i>Nardostachys</i>	524	<i>Nausea quomodo curanda</i>	101
<i>Nardus cizicine iniectio prima</i>		<i>Naxie cotis detrimentum</i>	517
<i>629. altera iniectio ibidem. tertia</i>		<i>Nephritici</i>	207
<i>iniectio ibidem</i>		<i>Nephriticum medicamentum ex</i>	
<i>Nardus gallica</i>	524	<i>bellarijs vesicæ & renum exul-</i>	
<i>Nardus montana</i>	ibid.	<i>cerationi idoneum</i>	583
<i>Nares fractæ & contusæ quomodo</i>		<i>Nephriticum medicamentum ex ci-</i>	
<i>curentur</i>	439	<i>cadis</i>	582
<i>Narium vitia 165. & deinde per</i>		<i>Nepita</i>	500
<i>totum caput</i>		<i>Nerion</i>	525
<i>Narium sanguinis fluxus quomo-</i>		<i>Neruitegium</i>	406
<i>do sistendus</i>	166	<i>Nervus precisus quomodo curan-</i>	
<i>Narium vlcera quomodo curentur</i>		<i>du</i>	326
<i>166</i>		<i>Nervis vulneratis aut punctis quæ</i>	
<i>Narium fædus odor quomodo cu-</i>		<i>accidant</i>	323
<i>retur</i>	ibid.	<i>Nervorum vulneratorum curatio ibid.</i>	
<i>Narium vitia quomodo emenden-</i>		<i>Nervorum contusorum curatio</i>	326
<i>tur</i>	165	<i>Nervicorum abscessuum medica-</i>	
<i>Nartex</i>	525	<i>menta</i>	290
			Ner

INDEX.

<i>Neuras</i>	525	<i>ibidem. nota ibidem. curatio</i>	376
<i>Nigella incommoda quomodo amo-</i>		<i>Oculorum qui defluxionibus infe-</i>	
<i>lienda</i>	362	<i>stantur agglutinamenta</i>	609
<i>Nili dia rhodon</i>	607	<i>Oculorum carcinomati quid fieri</i>	
<i>Nili malagna ad lienem omnemq;</i>		<i>debeat</i>	155
<i>duritiæ</i>	630	<i>Oculi procidentia quomodo curan-</i>	
<i>Nurum</i>	518	<i>da</i>	153
<i>Nutrū quomodo coqui debeat</i>	649	<i>Oculi humor crystalloides</i>	157
<i>Nitri spuma</i>	481	<i>Oculorum obscuritas</i>	158
<i>Nitrose & salsa aquæ quibus con-</i>		<i>Oculorum suppurationem curan-</i>	
<i>ferant</i>	24	<i>tia</i>	155
<i>Nocturæ sanguis</i>	471	<i>Oculi procidentia</i>	153
<i>Nuces</i>	502	<i>Oculorum hebetudo</i>	158
<i>Nuces</i>	45	<i>Oculorum confusio quomodo cu-</i>	
<i>Nuces virides, aride</i>	<i>ibid.</i>	<i>randa</i>	159
<i>Nuclei acinorum ruæ</i>	486	<i>Oculi purulenti quomodo curandi</i>	
<i>Nutrix qualis esset debeat</i>	2		153
<i>Nutrici quæ sint vitanda</i>	<i>ibidem</i>	<i>Oculorum suffusio quid, eiusq; cu-</i>	
<i>Nutricis lac laudatissimum</i>	<i>ibid.</i>	<i>ratio</i>	157
<i>Nutricis lac quod modis vicietur</i>	3	<i>Oculi si cute non obtegatur, cura-</i>	
<i>Nutricis lac vitiatum quomodo cor-</i>		<i>tio</i>	370
<i>rigatur</i>	<i>ibid.</i>	<i>Oculi purulenti quomodo curandi</i>	
<i>Nyctalops quid & quomodo cu-</i>			374
<i>retur</i>	156	<i>Oculi dolorum causæ</i>	145
<i>Nymphæa</i>	525	<i>Oculorum epiphora, id est, defluxio-</i>	
<i>Nymphæ quid</i>	415.	<i>nis impetus quomodo curetur</i>	
<i>denda</i>	<i>ibid.</i>		147
<i>Nymphodoti pastillus</i>	591	<i>Oculorum vnguis</i>	374. curatio
<i>O</i>		<i>ibidem</i>	
<i>Obolus</i>	658	<i>Oculorum phlysis eiusq; curatio</i>	
<i>Oboli gramma</i>	658		156
<i>Oclra</i>	486	<i>Oculorum atrophia eiusq; curatio</i>	
<i>Oclron</i>	44		156
<i>Ocimum</i>	555	<i>Oculorum hebetudinem curantia</i>	
<i>Ocimoides</i>	<i>ibidem</i>		155
<i>Oculorum caliginē prohibentia</i>	14	<i>Oculorum albugines quomodo cu-</i>	
<i>Oculorū expressionis curatio</i>	158	<i>rentur</i>	154
<i>Ocularium medicamentorum disse-</i>		<i>Oculorum vnguis qui pterygion</i>	
<i>rentia atq; vsus</i>	600	<i>græcis dicitur, quid, eiusq; cura-</i>	
<i>Oculorum suffusio</i>	375. unde fiat		110
		<i>ibidem</i>	
		<i>Ocu</i>	

INDEX.

Oculorum vlcera eorumq; curatio	152	Oleum balaninum	641
Oculorum inflammationis curatio	145	Oleum caryinum	ibid.
Oculorum cicatrices quomodo cu- rentur	154	Oleum chamæmelinum	639
Oculi membrana cornea	152	Oleum cicinum	641
Oculorum carbunculo quid facien- dum	155	Oleum cyprinum posidonij	643.
Oculi tunica παγοδὴς	153	Aliud	ibidem
Oculi dolorum curatio	145	Olei cū cera qui modus esse debeat in conficiendis vnguentis &c.	652
Oculorum mydriasis	156	Oleum crocinum	644
Ocimum	41	Oleum dulce 490 omotribes	ibid.
Odora	467	elotum ibidem. Vetus ibidem. Te- nue ibidem. Sabinum ibid. Ex agreſti olea ibid. Ricininum ibi- dem. Sesaminum, Raphaninum	ibidem
Oe	526	ibidem	
Oedema quid	25	Oleum irinum	643
Oedema quid 301. cauſſe	ibidem	Oleum laurinum	642
curatio	ibidem	Oleum liliaceum	640
Oedema aliorum morborum acci- dens nonnunquam 301. quomodo curandum	ibid.	Oleum lentifcinum	643
Oedemata pedum diſcutientia	2	Oleum maſtichinum 642. magis varium	ibidem
Oenanthe	526	Oleum ſycionium ſimplex 642. compoſitum ibidem. aliud effica- cins	ibid.
Oenantharia	644	Oleum melinum	640
Oenanthini confectio	ibid.	Oleum picinum	532
Alia	645	Oleum raphaninum	641
Oenos	526	Oleum ricininum	ibid.
Oeſypus	ibid.	Olei roſacei confectio	639
Oeſypos	493	Oleum ſeſaminum	640
Olea	658	Oleum ſuſinum	ibidem
Olea	490	Oleum violaceum	641
Olea radiciſ corticiſ pondus & v- tendi modus	559	Oleum melle quanto leuius	658
Olea digerentia	89	Oleum vino quanto leuius	ibid.
Oleum	490	Oleum quomodo coquendum	650
Oleum amaracinum	643	Olei diuerſa genera quomodo con- ficiantur	637
Oleum amygdalinum	641	Oleoſorum vires	468
Olea Aethiopica	490	Olearia coſ	517
Oleum egirinum	641	Olera ſylueſtria vitioſos humores gign	
Oleum anethinum	639		

INDEX.

gignunt	41	syriacus	ibid.
Olerum facultates	ibid.	Orchis herba	528
Olera cruda peiores succos procreant		Ordeum	43
quàm cocta	42	Oreoselinum	527
Olera condita muria vel oxalme		Oribasij elidion	586
quas facultates habeant	ibid.	Oribasij dropax Gallus	636
Olfactus vitia 165. & deinde per		Oribasij melitera	593
totum caput		Oribasij parygrum emplastrum	615
δαισάμενον vinum	122	Origanum	527
Oliua	45	Oriogenes pastillus	590
Olostium	526	Oris affectus	168
Olympos seu olympiacum	604	Oris ventriculi inflammationes quo-	
Olynthi	526	modo curentur	191
Omenti procidentia quomodo cu-		Oriza	43
randia	401	Orminum	528
ἐμὴν λύσις	174	Orobancha	528
Omphacium	526	Orobos	ibid.
Omphacomelitis preparatio	599	Orthopnoea	179
Onagra	526	Oryza	528
Onobrychis	527	Ossa	528
Onochelos	469	Osta	ibid.
Onoclea	ibid.	Ostheon	406
Onoma	526	Ostraca	529
Ononis	ibid.	Ostracoderma	49
Ononis	477	Ostracites	517
Ononis	527	Ostrea	50
Ononis	526	Ostrea	529
Onotheca	ibid.	Ostryis	528
Onoturris	ibid.	Othoma	526
Onyches	527	Otium summum valetudini maxi-	
On	555	me obest	40
Ophiasis vnde dicta	107	Oua puncta 45. Fricla	47
Ophites	517	Ouilla caro	47
Ophthalmia vnde fiat	145	Ouillum cerebrum	490
Opiethocranion	363	Ouium stercus	509
Opiethotonos	142	Ouillum lac	484
Opiethotonosis potio accommoda	143	Ouina pellis	488
Opopanax quomodo coqui debeat		Ouron	529
651		Ouum	555
Opos 527. Cyrenaicus, medicus,		Oui candidum	ibidem
		Oui lu	

INDEX.

<i>Oui luteum</i>	ibid.	<i>Papyrus</i>	530
<i>Onum aceto incoctum ventris fluxiones desiccant</i>	ibid.	<i>Paracynanche</i>	173
<i>Oxera emplastr.</i>	619	<i>Paralysis quid</i>	135
<i>Oxos</i>	527	<i>Pararibrema</i>	453
<i>Oxyacanthos</i>	ibid.	<i>Parastata</i>	406
<i>Oxybaphus</i>	658	<i>Pardalianches</i>	472
<i>Oxymeli simplex</i>	573	<i>Paresis curatio</i>	137
<i>Oxymeli Iuliani</i> 560. <i>Pōilus</i>	561.	<i>Parietaria</i>	492
<i>Vires</i>	ibid.	<i>Paronychia</i>	530
<i>Oxymeli splenicum</i>	581	<i>Paronychia</i>	270
<i>Oxymeli scillinum</i>	574	<i>Parotis quid</i>	164
<i>Oxenas curantia</i>	165	<i>Partes animalium</i>	47
P		<i>Particularum naturalium conseruatio</i>	226
<i>Peonia</i>	487	<i>Particularum principalium vuneratarum agnitio</i>	431
<i>Peonia compositio</i>	581	<i>Partium attenuatarum curatio</i>	28
<i>Paguri</i>	50	<i>Partium extremarum praecisio quomodo administranda</i>	426
<i>Paliuron</i>	529	<i>Parthenium</i>	492
<i>Palma</i>	551	<i>Parthenij vires, & vtendi modus</i>	559
<i>Palpebrarum pili oculum irritantes quomodo curandi</i>	151	<i>Partus difficilis causae 253. curatio</i>	254
<i>Palpebrarum vstionem ex vrente medicamento factam veteres omnes damnarunt</i>	369	<i>Partus ex vtero qua ratione excutitur excindaturq; 417. & deinde per totum caput</i>	
<i>Palpebra superioris sutura quomodo administranda</i>	368	<i>Parulis 379. Eius curatio</i>	ibid.
<i>Palpebrarum pediculi quomodo ar cendi</i>	150	<i>Parulus quid & quomodo curetur</i>	170
<i>Palpitatio cordis</i>	189	<i>Parygrum emplastr. Oribasij</i>	615
<i>Palumbus</i>	46	<i>Passer troglodytes</i>	548
<i>Palumbi sanguis</i>	471	<i>Passeres exigui</i>	46
<i>Palumbi venter</i>	507	<i>Pastillus Oribasij elidion</i>	586
<i>Panaces Herculeum</i>	529	<i>Pastillus dia spermaton</i>	585
<i>Pancration</i>	529	<i>Pastillus purgans</i>	562
<i>Panicum</i>	492	<i>Pastillus ex spina Aegyptia</i>	586
<i>Panis</i>	479	<i>Pastillus dia castorin, colicis effi cax</i>	589
<i>Panis syncomistos</i>	43	<i>Pastilli scillini quomodo praeparantur</i>	
<i>Papauer</i>	521		
<i>Papaueris liquoris epoti nota</i>	355.		
<i>Curatio</i>	ibid.		

INDEX.

<i>ventur</i>	570	<i>Pegannum</i>	531
<i>Pastillus dia rhodon</i>	586	<i>Pelagij pisces</i>	49
<i>Pastillus faustini</i>	588	<i>Pelaron ad vlcera</i>	602
<i>Pastillus leucus</i>	590	<i>Pelaron ex scoria argenti</i>	613
<i>Pastillus cui nomen est thronus</i>		<i>Pelecinos</i>	495
<i>Marcellius</i>	588	<i>Pelles calceamentorū veterū</i>	488
<i>Pastill. ex erica, lienī dicatus</i>	587	<i>Penis glans nuda quomodo conte-</i>	
<i>Pastillus nerae ex Hera commen-</i>		<i>gatur</i>	401
<i>tarius</i>	588	<i>Pentamyron malagma</i>	629
<i>Pastillus trigonus</i>	585	<i>Pentaphyllon</i>	530
<i>Pastillus nymphodoti</i>	591	<i>Peperi</i>	ibid.
<i>Pastillus capnistos ad tussim con-</i>		<i>Peplion</i>	ibid.
<i>tinuam</i>	178	<i>Peplon herba</i>	ibid.
<i>Pastillus oriogenes</i>	590	<i>Pepon</i>	44
<i>Pastillus musae</i>	587	<i>Peponatum smegma</i>	594
<i>Pastillus ad capitis dolorem ex in-</i>		<i>Perdix</i>	46
<i>temperie calida</i>	115	<i>Perdicium</i>	491
<i>Pastilli 584. eorum differentia ibi</i>		<i>Periclymenon</i>	530
<i>dem. vsus</i>	ibid.	<i>Periphymosis</i>	402
<i>Pastillus aster dictus</i>	585	<i>Peripneumonia quid</i>	180
<i>Pastillus dia corallio</i>	586	<i>Periscyphismus</i>	367
<i>Pastinaca</i>	542	<i>Peritonai vulnera quomodo manu</i>	
<i>Pastinaca marina</i>	548	<i>curanda</i>	398
<i>Pastinaceradix</i>	42	<i>Perniones quid 267. eorum cura-</i>	
<i>Pastinaca</i>	50	<i>tio</i>	ibidem
<i>Patella</i>	449	<i>Persaea</i>	531
<i>Patelle fracte curatio</i>	ibid.	<i>Perturbationis oculi causa</i>	145
<i>Panicum</i>	43	<i>Pessi</i>	646
<i>Pauo</i>	46	<i>Pessus quid</i>	237
<i>Pectoris rupture, impressionis, con-</i>		<i>Pessorum differentie</i>	646
<i>fractionis nota & curatio</i>	443	<i>Pessus titianus</i>	648
<i>Pediculi capitis quomodo abigendi</i>		<i>Pessorum aperientiu materia</i>	647.
114		<i>vsus</i>	ibid.
<i>Pedis ossa fracta quomodo curentur</i>		<i>Pessus Aegyptia</i>	648
450		<i>Pestilentia quomodo precauenda</i>	
<i>Pedis digitorum luxatorum cura-</i>		88	
<i>tio</i>	465	<i>Pestilentie nota</i>	87
<i>Pedi rime quomodo curande</i>	268	<i>Pestilentiam arcentia</i>	87
<i>Pedum oedemata discutientia</i>	2	<i>Petasites</i>	531
<i>Peganaera emplastrum</i>	622	<i>Peuce</i>	531
		<i>Peuc</i>	

INDEX.

<i>Peucedanum</i>	ibid.	<i>Phusta</i> , ad conterendum calculos	
<i>Phaci</i>	550		581
<i>Phacos</i>	ibidem	<i>Phycos</i>	551
<i>Phæon</i> ad oculos sanguine suffu-		<i>Phygeahlon</i>	296
fos, & magnos affectus	602	<i>Phylites</i>	552
<i>Phagedæne</i> remedia	311	<i>Phyllon</i>	551
<i>Phalangites</i>	550	<i>Phyma</i> quid	296. curatio ibid.
<i>Phalangiorum</i> morsus nota, & cu		<i>Piceæ</i> cortex	532
ratio	339	<i>Picis</i> flos	ibidem
<i>Phalaris</i>	550	<i>Picinum</i> oleum	ibidem
<i>Pharici</i> poti signa 358. remedia		<i>Picra</i> Galeni	579
ibidem		<i>Pilos</i> argentia	109
<i>Pharynx</i>	173	<i>Pilos</i> extenuantia	110
<i>Phaselum</i>	44	<i>Pili</i> palpebrarum oculum irritan-	
<i>Phasganion</i>	525	tes quomodo curandi	151
<i>Phasianus</i>	45	<i>Pilos</i> nutrientia	109
<i>Phasiolum</i>	499	<i>Pinaster</i>	531
<i>Phellos</i>	551	<i>Pinguis</i> terra	486
<i>Philagrianum</i> malagma	627	<i>Pinguedo</i> animalium	47
<i>Phiocotyche</i> emplastrum	615	<i>Pinguis</i> quomodo coquenda	650
<i>Philonis</i> antidotum	575	<i>Pini</i> resina	536
<i>Philyras</i>	551	<i>Pini</i> nucleus	45
<i>Phlegmone</i> quid	287	<i>Pinus</i>	531
<i>Phlomis</i>	526	<i>Piper</i>	530
<i>Phlomos</i>	551	<i>Piper</i> aquaticum	549
<i>Phlyctæna</i>	153	<i>Pappi</i> quid 362. eorum remedia	
<i>Phlyctenæ</i> quomodo curandæ	284		361
<i>Phœnicine</i> emplastrum	615	<i>Pirum</i> agreste	481
<i>Phœnix</i> herba	551	<i>Pirus</i>	477
φένικρις	125	<i>Pisces</i>	49
<i>Phormion</i>	551	<i>Pisces</i> cetacei	50
<i>Phrenes</i>	121	<i>Pisces</i> omnium deterrimi	49
<i>Phrenitis</i> quid	120	<i>Pisces</i> molles cute	50
<i>Phrenitidos</i> causæ ibid. & signa		<i>Pisces</i> pelagij	49
ibid. Curatio	121	<i>Piscium</i> ius	495
<i>Phrygius</i>	517	<i>Pissa</i>	531
<i>Phrynion</i>	534	<i>Pisselæon</i>	532
<i>Phthysis</i> oculorum	156	<i>Pistacia</i>	46
<i>Phthysis</i> quomodo curetur	186	<i>Pisum</i>	44
<i>Phu</i>	551	<i>Pituita</i> in ventriculo redundans,	
		quomo	

INDEX.

quomodo vacuanda	18	exhibendi	558
Pytyides	532	Pomorum omnium facultates	44
Pityocampe	ibidem	Pompholyx	533
Pityos phlæos	ibid.	Pompholygeron emplastrum	615
Pityriasis	112	Pondera	657
Pityriaseos curatio	ibid.	Ponderum notæ	ibid.
Pityusa	532	Populus nigra	470
Pix	531	Porrigo capitis	112
Plantæ sordida ulcera quomodo cu- randa	267	Porphyræ	533
Platanus	533	Porrum	42
Plethoricum corpus	62	Porrum agreste	475
Πληθώρα quid	25	Portulaca	476
Plumbago	522	Potamogeton	533
Plumbago quomodo coquenda	648	Poterion	534
Plumbum	522	Prasion	534
Plumbi scobis pota signa 361. reme- die	ibid.	Prasoides	492
Pneumon	532	Præcocia	45
Pnigalion	134	Præster unde dictus	345
Podagra quid 257. signa 258		Priapismus quid 231. causæ ibidem	
Podagra causse	256	curatio ibid.	
Podagrica remedia	583	Principium morbi quod	57
Podagra ab arthride quid differat	256	Prinos	534
Podagra quomodo præcauerit possit	267	Proficiscentium victus	26
Pæcilon acopon	634	Propolis	534
Pollen farinaceus	487	Propolis quomodo coqui debeat	650
Polycnemon	533	Propomata	698
Polygalon	ibid.	Prosechy stacticum	604
Polygonon	ibidem	Prospophys	405
Polygonoides	506	Protelus ad claritatem oculorum, cicatricesq; extenuat	607
Polyide sphragis	588	Prunus	507
Polypi	50	Prunus	ibid.
Polypus quid 378. unde dicatur		Pruni fructus	ibid.
ibid. curatio ibid.		Pruna damascena	ibid.
Polypod ascurantia	165	Pruritus causse 269. signa ibidem	
Polypodion	533	Pruritus gingivarum puerorum curantia	45
Polypody radices vires & modus		Psaron medicamentum	594
		Pseudodictamnion	555
		Psilethrum	595

INDEX.

<i>Pfilothra</i> medicamenta quæ	226	<i>Pulmonis</i> temperatura notæ	32
<i>Psimmylion</i>	555	<i>Puls</i> ad purgandum	563
<i>Psitacium</i> emplastrum	614	<i>Falsus</i> quid	63
<i>Pfora</i> quid 276. causæ ibid. signa	ibidem	<i>Pulsus</i> vsus duplex	ibid.
ibid. curatio	ibidem	<i>Pulsus</i> duri & vehementis discrimen	72
<i>Pforicon</i>	555	<i>Pulsuum</i> genera & differentie recensentur & explicantur	63. & deinceps
<i>Pforophthalmia</i> quid eiusque curatio	148	<i>Pulsuum</i> causæ & presagia	69. & sequentibus
<i>Psydracia</i> capitis	113	<i>Pulvis</i> cephalicus, capiti conueniens	592
<i>Psyllium</i>	555	<i>Pulvis</i> pilos abolens, ad podagram	595
<i>Psyllij</i> assumpti notæ 355. remedia	ibidem	<i>Pulvis</i> ex aloë	592
<i>Ptarmica</i>	534	<i>Pumex</i>	505
<i>Ptelea</i>	ibid.	<i>Pumex</i> quomodo coqui debeat	649
<i>Pteris</i>	ibid.	<i>Purgans</i> puls	563
<i>Pterygion</i> quid 374. curatio	ibid.	<i>Purgantia</i> medicamenta non simplicia quodam temperamento, sed totius substantiæ proprietate purgant	556
<i>Pterygion</i> oculorum quid eiusque curatio	154	<i>Purgantes</i> oliuæ	561
<i>Ptyas</i> aspidis genus	346	<i>Purgatio</i> ex Rhodomelite Alexandri	561
<i>Pudendum</i> masculi cerui	470	<i>Purgationibus</i> quos vti conueniat	556
<i>Pudendorum</i> vlcera quomodo curanda	267. & 270	<i>Purgationis</i> tempus	ibid.
<i>Pudendorum</i> rimis curantia	232	<i>Purgans</i> fusca, & stomacho grata	562
<i>Puerorum</i> stercus	508	<i>Purgantia</i> medicamenta composita	560
<i>Puerorum</i> aphluæ quomodo curantur	5	<i>Purgans</i> pastillus	562
<i>Pueris</i> quomodo ciēda aluus 4. & 5	5	<i>Purgans</i> vinum in hydropicis	ibid.
<i>Puerorum</i> tussis quomodo curanda	4	<i>Purgans</i> bucellatus	561
<i>Puerorum</i> morbi & symptomata	ibid.	<i>Purgatio</i> halatia	562
ibidem	ibid.	<i>Purgatione</i> modum excedente quid fieri debeat	564
<i>Pueri</i> quo tempore dentiant	ibid.	<i>Purpure</i>	533
<i>Pulegium</i>	487	<i>Pur</i>	
<i>Pulegij</i> vires, pondus & sumendi modus	559		
<i>Pulicaris</i> herba	515		
<i>Pullus</i> columbinus	46		
<i>Pulmo</i> 332. agninus, suillus, vulpinus	ibid.		
<i>Pulmo</i> animalium	48		

INDEX.

<i>Purulenti quomodo adurendi</i>	393	<i>Rane rubeta haustia signa</i>	353. cu-
<i>Purulenotam curatio</i>	185	<i>ratio</i>	ibid.
<i>Putredinis quamlibet partem occu-</i>		<i>Ranarum sanguis</i>	471
<i>panti accommodata medicamenta</i>		<i>Rapa</i>	42
312		<i>Raphanis</i>	ibid.
<i>Pycnocomon</i>	534	<i>Raphanidon</i>	433
<i>Pyrethrum</i>	535	<i>Raphanus</i>	535
<i>Pyrethri pondus & utendi modus</i>		<i>Raphano quando & quomodo uten-</i>	
539		<i>dum</i>	42
<i>Pyrgia</i>	46	<i>Raphaninum oleum</i>	641
<i>Pyrrine emplastrum</i>	613	<i>Rapum</i>	487
<i>Pyritis</i>	524	<i>Ratiocinationis offensa quomodo</i>	
<i>Pyros</i>	535	<i>contingat, dignoscatur & cure-</i>	
<i>Pytia</i>	535	<i>tur</i>	126
<i>Pyxis acopon</i>	636	<i>Raucitas</i>	175
		<i>Recrementum</i>	541
		<i>Refraetio</i>	433
Q <i>Vanitatis quae mensuratur</i>		<i>Remedia</i>	434
<i>tres differentiae</i>	657	<i>Renēs animalium</i>	47
<i>Quercus</i>	489	<i>Renum affectus quomodo digno-</i>	
<i>Quinquefolium</i>	530	<i>scendi & curandi</i>	207
		<i>Renum calculi causa, notae & cu-</i>	
R <i>Adicula</i>	42	<i>ratio ibid. & deinceps</i>	
<i>Radicula dulcis</i>	487	<i>Repletionis curatio</i>	15
<i>Radices quomodo coquenda</i>	652	<i>Resinae</i>	536
<i>Radix fractura quomodo curanda</i>		<i>Resolutionis curatio</i>	137
447		<i>Resolutionis ob colicum dolorem cō-</i>	
<i>Rate</i>	50	<i>tractae curatio</i>	278
<i>Ramicum genera</i>	227	<i>Rha</i>	535
<i>Ramex intestinorum rupto peri-</i>		<i>Rhacos</i>	ibid.
<i>tonao difficiliter curatur, quā qui</i>		<i>Rhagade ani & pudendorum quo</i>	
<i>ob rariatem illius contingit ibid.</i>		<i>modo sanande</i>	232
<i>Ramex omenti</i>	41	<i>Rhamnus</i>	535
<i>Ramices pueri frequentius patiun-</i>		<i>Rheon</i>	535
<i>tur & quare</i>	227	<i>Rhetinae</i>	536
<i>Ramex varicosus 409. eius notae</i>		<i>Rhinarium</i>	605
<i>ibid. curatio</i>	410	<i>Rhoda</i>	536
<i>Ramex tophaceus 409. curatio ibi.</i>		<i>Rhodia radix</i>	536
<i>Ramex ventosus ibid. curatio</i>	410	<i>Rhodia ad suppressendum sangui-</i>	
<i>Ramicis curatio 227. & deinceps</i>		<i>nem ulcera depascentia, & excre-</i>	
<i>Rane</i>	482		

INDEX.

<i>stentias</i>	593	224	
<i>Rhodomalum</i>	599	<i>Ruta veneris ardorem obtundit</i>	16
<i>Rhoe</i>	536		S
<i>Rhœa</i>	ibid.	S <i>Abina</i>	483
<i>Rhoetis confectio</i>	600	<i>Sachar</i>	520
<i>Rhogme</i>	433	<i>Sagapenum</i>	537
<i>Rhu</i>	551	<i>Sagapenum quomodo coquendum</i>	
<i>Rhyas quid, eiusq; curatio</i>	151	651	
<i>Rhypos</i>	536	<i>Sal</i>	472
<i>Rhythmus quid</i>	65	<i>Sal quomodo coqui debeat</i>	649
<i>Rhythmī differentie</i>	ibidem	<i>Salis flos</i>	474
<i>Rhythmus in pulsu quid</i>	ibid.	<i>Salamandra</i>	537
<i>Ricinum</i>	595	<i>Salamandræ assumptæ signa</i>	353
<i>Ricininum oleum</i>	641	<i>curatio</i>	ibidem
<i>Ricini pondus, utendi modus, &</i>		<i>Sales iheriaci</i>	572
<i>vires</i>	559	<i>Salix</i>	499
<i>Ricinorum sanguis</i>	471	<i>Salsamentum thymi</i>	545
<i>Rigoris in febribus curatio</i>	95	<i>Salse & nitrosæ aquæ quibus con-</i>	
<i>Rimæ ani quomodo manu curande</i>		<i>ferant</i>	24
424		<i>Salforum vires</i>	468
<i>Rimæ digitorum totorumq; pedum</i>		<i>Salvia</i>	491
<i>quomodo curande</i>	268	<i>Sambucus</i>	472
<i>Rhododaphne</i>	525	<i>Sambuci corticis radices pondus, vi-</i>	
<i>Rose</i>	536	<i>res, & modus utendi</i>	560
<i>Rosacei confectio</i>	639	<i>Samia terra</i>	485
<i>Rosmarinus</i>	515	<i>Sandaracha</i>	537
<i>Rostra animalium</i>	47	<i>Sandarac hæc coquenda</i>	649
<i>Rubia</i>	493	<i>Sandix</i>	537
<i>Rubra tinctorum</i>	ibid.	<i>Sanguis</i>	471
<i>Rubus</i>	482	<i>Sanguinem è naribus profluentem</i>	
<i>Rubus caninus</i>	513	<i>in febribus quomodo sistere oportet</i>	103
<i>Rubens cygnus</i>	602	<i>Sanguinis è naribus profluvium sedantia</i>	166
<i>Rufi potio contra pestem</i>	88	<i>Sanguinem commouentia</i>	236
<i>Rumex</i>	514	<i>Sanguis bubulus & leporinus ibi.</i>	
<i>Rumex grandis</i>	498	<i>porci iuuenis ibid. caprillus ibid.</i>	
<i>Ruptorum remedia</i>	303	<i>Sanguis ex vena, arteria vel nari-</i>	
<i>Ruptis à quibus abstinendum</i>	228	<i>bus profluens quomodo sistendus</i>	
<i>Ruta</i>	531	320	
<i>Ruta sylvestris</i>	524		
<i>Ruta sylvestris nocentur remedia</i>			

San

INDEX.

<i>Sanguinem venane an arteria pro-</i>	<i>se ibidem. curatio ibid.</i>	384
<i>fundat quomodo dignoscatur</i>	<i>Sclerophthalmia quid eiusq; cura-</i>	
321	<i>tio</i>	148
<i>Sanguinis renum profluvij curatio</i>	<i>Scolopendra marina</i>	540
211	<i>Scolopendre morsus nota</i>	341. cu-
<i>Sanguinis profluvium curans medi-</i>	<i>ratio</i>	ibid.
<i>camentum</i>	212	<i>Scolopomacharion</i>
<i>Sanguinis ex ore profluvium quo-</i>	<i>Scolymon</i>	366
<i>modo sistendum</i>	173	<i>Scolymos quas vires habeat</i>
<i>Sanguis animalium</i>	48	41
<i>Sanguinaria</i>	533	<i>Scordion</i>
<i>Saporum species</i>	467	540
<i>Sapphyrus</i>	517	<i>Scordon</i>
<i>Sapotes</i>	537	ibidem
<i>Sar cocolla</i>	ibidem	<i>Scordoprason</i>
<i>Sarcomata curantia</i>	165	541
<i>Sardonias herba</i>	358	<i>Scorpioides</i>
<i>Sardonias herbe pote signa</i>	ibid.	541
<i>Satureia</i>	498	<i>Scorpius</i>
<i>Satyriasis quid eiusq; causse</i>	230.	406
<i>que symptomata eam consequan-</i>	ibid.	<i>Scrotum</i>
<i>tur</i>	ibid.	407
<i>Satyriacum antidotum</i>	583	<i>Scroti inflammationis nota</i>
<i>Satyrium</i>	537	228
<i>Saura</i>	537	<i>Scrupulus</i>
<i>Saxifraga</i>	ibid.	658
<i>Saxiphages</i>	ibid.	<i>Scylla</i>
<i>Scammonia</i>	540	540
<i>Scandix</i>	41. & 540	<i>Scytales morsus cura.</i>
<i>Scapularum compressionis, ruptu-</i>	ibid.	344
<i>re, refractionis nota & curatio</i>	ibid.	<i>Secunda relicta quomodo mani-</i>
442	ibid.	<i>educenda</i>
<i>Schidacidon</i>	435	419
<i>Schinos</i>	545	<i>Sedes, Vide anus</i>
<i>Schistos</i>	516	<i>Sedi illita que purgent</i>
<i>Scilli pastilli quomodo praparen-</i>	570	566
<i>tur</i>	540	<i>Sedis tuberosa ulcera quomodo cu-</i>
<i>Scingos</i>	540	<i>randa</i>
<i>Scirrhus quid 303. eius differentia</i>	ibid.	300
<i>ibidem. qui sit insanabilis ibi. caus</i>	ibid.	50
	ibid.	<i>Selache</i>
	ibid.	<i>Selemusiaterra</i>
	ibid.	486
	ibid.	<i>Selinon</i>
	ibid.	538
	ibid.	<i>Semen redundans quomodo immi-</i>
	ibid.	<i>nuendum</i>
	ibid.	17
	ibid.	<i>Semina quomodo coquenda</i>
	ibid.	652
	ibid.	<i>Seminis redundantis noxa</i>
	ibid.	17
	ibid.	<i>Seminaria vasa</i>
	ibid.	35
	ibid.	<i>Sempernium</i>
	ibid.	470
	ibid.	<i>Senescio herba</i>
	ibid.	426
	ibid.	<i>Senecta anguis</i>
	ibid.	480
	ibid.	<i>Senum habitus quomodo recalsare</i>
	ibid.	<i>du</i>
	ibid.	13
	ibid.	<i>Senum victus ratio 12. & sequen-</i>
	ibid.	<i>tibus</i>

I N D E X.

Sepia	50	Singultus causſæ	102
Sapia teſta	538	Sinus quid 216.eius cura	ibidem
Seps	ibidem	Sion	539
Serapionis melane empl.	619	Sion quas habeat vires	41
Serapias	528	Siracon.	494
Seris	538	Siricum	537
Seriphum	ibid.	Sifarum	539
Serpillum	493	Sifer	ibid.
Sertula campana	520	Sisymbrium	ibidem
Serum lactis quomodo à caſeo di-		Sifon	ibidem
ſcernatur	49	Sitis in febris curatio	100
Sesamoides	538	Smegmata	591
Sesaminum oleum	640	Smegma dentium	170
Sextarius	658. & deinceps	Smegma peponatum	594
Sicci temperamenti notæ	29	Smilax	541
Sicyos	539	Smilacis potæ ſigna 357. remedia	
Sicyos agrios	ibid.	358	
Sicyonium oleum ſimplex 642.com		Smilion ad abſceſſus	612
poſitum ibidem.aliud efficacius		Smyris	517
ibidem		Smyrna	541
Sideratio quid 291.vide ſphacilos		Smyrnion	ibid.
Sideritis	538	Smyrniꝝ vires	41
Sideros	ibid.	Stæchas	543
Sidion	536	Sol ſi quem exuſſerit,quid facien-	
Signa decretoria in morborum prin-		dum	18
cipio praua ſunt	61	Solani ſurioſi poti ſigna 358.re-	
Signa concoctionis nunquam ſini-		media	ibid.
ſtre apparent	ibidem	Solanum	543
Signa decretoria vbi morbus incli-		Solare cyphi	645
nauerit, bona ſunt	ibidem	Solſtitium æſtium quid efficiat	
Siliqua	658	in hominibus	56
Siliquæ	46	Solſtitium hyemale quid in corpo-	
Silphe	539	ribus humanis efficiat	55
Silphium	ibid.	Somnus quid	52
Silurus	ibidem	Somni vehementis cauſſæ 53. cu-	
Silibon	ibid.	ratio	ibidem
Smapi	524	Sonchus	541
Sinapiſmi vſus	633	Soporis vehementis cauſſæ ibidem.	
Sinciput quibus ſecetur 367.et quo		curatio	ibidem
modo	ibidem	Soporis noxiꝝ curatio	93
		Sorbi	

INDEX.

<i>Sorba</i>	45	<i>Squille</i>	ibid.
<i>Sordes</i>	536	<i>Stachys</i>	542
<i>Sordes balneorum</i>	487	<i>Stacticum profechij</i>	604
<i>Sori</i>	545	<i>Staphiloma</i>	153
<i>Sotera, antidotum</i>	487	<i>Staphyloma quid</i> 374. <i>curatio ibi</i>	
<i>Sparganium</i>	541	<i>dem</i>	
<i>Spartos</i>	ibid.	<i>Staphylinus</i>	542
<i>Specularium</i>	542	<i>Steata</i>	542
<i>Specularis lapis</i>	ibid.	<i>Steatoma quid</i> 306. <i>Curatio ibid.</i>	
<i>Sphaceles quid</i> 291. <i>Curatio</i>	292	<i>Stegnosus</i>	10
<i>Sphæron emplastr. ad ardore</i>	621	<i>Stellio transmarinus</i>	342
<i>Sphincter</i>	203	<i>Stellionis transmarini morsus re-</i>	
<i>Sphur</i>	332	<i>media</i>	ibid.
<i>Sphongion malagma</i>	631	<i>Stercus</i> 508. <i>Canum ibid. Pueror-</i>	
<i>Sphragis polyide</i>	588	<i>rum ibid. Luporum ibid. Capril-</i>	
<i>Spica nardi</i> 524. <i>Indica, Syriaca</i>		<i>lum ibid. Bubulum</i>	ibidem
<i>ibidem</i>		<i>Stercus caprillum</i>	262
<i>Spina alba</i>	472	<i>Sterilitatis remouenda ratio</i> 250.	
<i>Spina Aegyptia vel Arabica ibi.</i>		<i>& deinceps</i>	
<i>Spine gutturi quomodo eximan-</i>		<i>Sternutamenta quæ citent</i>	166
<i>tur</i>	382	<i>Sternutamenta in febribus quomo-</i>	
<i>Spirandi difficultas</i>	179	<i>do curentur</i>	98
<i>Splen, vide Lien</i>		<i>Stigmata quomodo curanda</i>	282
<i>Spodium</i>	542	<i>Stimmi</i>	543
<i>Spondylium</i>	544	<i>Stæbe</i>	ibid.
<i>Spondyli</i>	50	<i>Stomachus quomodo aduratur</i>	396
<i>Spongia</i>	542	<i>Stomachus atrabile vitiosus quo-</i>	
<i>Spongos</i>	ibid.	<i>modo curandus</i>	192
<i>Spongiarum lapides</i>	517	<i>Stomachi exundationem impedi-</i>	
<i>Spontanearum lassitudinum tres spe-</i>		<i>tia</i>	I
<i>cies, earum curatio II. & deinceps.</i>		<i>Stomacho in febribus quæ cura ad-</i>	
<i>Spuma nutri</i>	481	<i>libenda</i>	94
<i>Spumæ argenti potæ signa</i> 361. <i>re-</i>		<i>Stomachi dolores convulsorij quo-</i>	
<i>media</i>	ibidem	<i>modo curandi</i>	195
<i>Sputi notæ</i>	76	<i>Stomachi affectus curantia</i>	191
<i>Sputum cruentum curantia</i>	177	<i>Stomachi rofionem emendantia</i>	I
<i>Squama</i>	515	<i>Stomatica Aegyptia</i>	597
<i>Squamæ Cypriæ pondus & modus</i>		<i>Stomatica medicamenta</i>	595
<i>viendi</i>	559	<i>Strabismus quid, & quomodo cu-</i>	
<i>Squasine</i>	50	<i>retur</i>	152

INDEX.

Strangulorum curatio	173	Suspiriosi qui	179. Eorum curatio
Stratiotes	543	ibidem	
Strobilinarefina	537	Syca	544
Strobilus	45	Sycamina	45
Strum quid 385. Vnde dicatur		Syce	544
ibidem. ubi oriantur ibidem. cura	ibidem	Sycomora	46
ratio		Sycomorus	544
Strume quomodo curande	299	Sycosis quid eiusq; curatio	150
Strutiocamelus	46	Symphytum petraeum	544
Strychnon	543	Symptomata & morbi puerorum	
Stultitia unde fiat	126	dentientium 4. eorum curatio ibi	
Sturnorum stercus	509	dem & sequentibus	
Stypteria	543	Synanche	173
Styrax	ibid.	Synopes in febribus causse 89. re-	
Styracis albi pondus, & utendi mo-		media	ibidem. & 90
dius	559	Syntexis	48
Suber	551	S. n' exes quomodo curari debeant	92
Succidanea inuicem medicamenta		Syriasis quid	6
652. & deinde per totum cap.		Syriasi succurrentia	ibid.
Succinum	496	Syricea	46
Sudor	498	Syrmaismi	54
Sudorem elicientia	22	Systole pulsus	63
Sudori in febribus quid adhiben-			
dum	96		
Suffimenta	645		
Suffimen rosatum	ibidem		
Suffocatorum curatio	173		
Suffusio	375		
Sugillata quomodo curetur	168		
Suilla caro	47		
Suillus talus	528		
Sulfur quomodo coqui debeat	649		
Sulfurata aquae quibus conferan-			
tur	24		
Sulphur	497		
Suppurationem oculorum curan-			
tia	155		
Surditatis remedia	163		
Susinum compositum	640		
Susinum oleum	ibidem		

T Abes quomodo curetur	186
Tali articulus luxatus quo-	
modo reponendus	464
Talus bubulus	528
Tamarix	523
Tarichos	545
Taurocolla	ibidem
Taurinum cornu	504
Taurorum sanguis	471
Tauri recens occisi sanguinis poti-	
notae 359. remedia	360
Taxus	541. & 357
Tecolithos	517
Tede	484
Tela è corpore quomodo extrahen-	
da	429
Telephion	546
Te	

INDEX.

<i>Telis</i>	<i>ibidem</i>	<i>Thalassion hydor</i>	496
<i>Tellina</i>	545	<i>Thalasseros</i>	607
<i>Temperamentorum ordines</i>	468	<i>Thaliolum</i>	496
<i>interualla</i>	468	<i>Thapsia</i>	497
<i>Temperamenti optimi nota</i>	28	<i>Thapsia quomodo coquenda</i>	651
<i>Tenesmus quid, unde oriatur, &</i>		<i>Thapsia quæ pericula nonnunquam</i>	
<i>quomodo curetur</i>	198	<i>afferat 362. eorundem remedia</i>	
<i>Tenue corpus quomodo impleatur</i>	<i>ibidem</i>		
28		<i>Theion</i>	497
<i>Tephra</i>	546	<i>Thelypteris</i>	<i>ibidem</i>
<i>Terra</i>	485	<i>Theodotion minus</i>	804
<i>Terra quomodo coquenda</i>	650	<i>Theriace antidotum quomodo pare-</i>	
<i>Terra intestina</i>	483	<i>tur 570. Eius vsus</i>	571
<i>Terra tuber</i>	549	<i>Theriace pastilli quomodo fiant</i>	
<i>Terebinthus quid, eius causse, nota</i>		570	
<i>& curatio</i>	297	<i>Thermarum differentie & vires</i>	
<i>Terebinthina resina</i>	536	24. & deinceps.	
<i>Terebinthina ad aluum subdu-</i>		<i>Thermos</i>	497
<i>cendam quantitas & exhibitio-</i>		<i>Thlasia</i>	433. & 434
<i>nis tempus</i>	20	<i>Thlasia aurium</i>	163
<i>Terminthos</i>	545	<i>Thlaspi</i>	497
<i>Teste</i>	529	<i>Thoracis morbos quæ signa prae-</i>	
<i>Testes aphthæ ulcere pressi quomo-</i>		<i>dant</i>	54
<i>docurandi</i>	229	<i>Thridax</i>	497
<i>Testiculorum caro excrescens quo-</i>		<i>Thronus Marcellius pastillus</i>	588
<i>modo amouenda</i>	<i>ibid.</i>	<i>Thus</i>	515
<i>Testiculi inflammationis nota</i>		<i>Thuris lachryma quomodo coquen-</i>	
229. curatio	230	<i>da</i>	651
<i>Testiculus quid</i>	406	<i>Thuris manna</i>	519
<i>Testiculi animalium</i>	47	<i>Thylacitis</i>	524
<i>Testiculorum inflammationes quo-</i>		<i>Thymbra</i>	498
<i>modo curantur</i>	300	<i>Thymus</i>	497
<i>Testiculorum temperaturæ nota</i>	35	<i>Thymus</i>	233
<i>Testium conseruatio</i>	225	<i>Thymus locorum muliebrium</i>	415.
<i>Testudinis marinae sanguis quomo-</i>		<i>quomodo excutendus ibidem</i>	
<i>do preparatur 348. Eius vsus ibi.</i>		<i>Thymi naturalium quid 403. eorū</i>	
<i>Tetrabarmacum emplastr.</i>	611	<i>differentia ibi. curatio ibidem.</i>	
<i>Telluges</i>	545	<i>Thymi praegrandes</i>	50
<i>Tetrion</i>	546	<i>Tibiae fractura quomodo curanda</i>	
<i>Tenton</i>	<i>ibidem</i>	449	

INDEX.

<i>Tilia</i>	551	<i>Tripodium</i>	548
<i>Tiphodes febres</i>	83	<i>Triticum</i>	43 & 535
<i>Titanus</i>	547	<i>Trixago palustris</i>	540
<i>Tulhymalus</i> 546. <i>Eius septem species</i>	ibidem	<i>Troglodytes passer</i>	548
<i>Titianus pessus</i>	648	<i>Tryglum</i>	658
<i>Tonsilla</i> 380. <i>Eius caussa</i> ibid. <i>Cu ratio</i>	381	<i>Trygon</i>	548
<i>Tonsillarum inflammationi resistencia</i>	171	<i>Tryx</i>	ibid.
<i>Tophos in artubus quid coalescere impediatur</i>	263	<i>Tuberum facultates</i>	43
<i>Tophi articularum quomodo curantur</i>	264 & 266	<i>Tubercula ani quomodo manu curanda</i>	424
<i>Tophorum commune</i>	266	<i>Turdo</i>	46
<i>Tormina quomodo curentur</i>	199	<i>Turtur</i>	ibid.
<i>Torpedines</i>	50	<i>Turturis sanguis</i>	471
<i>Torpedo marina</i>	529	<i>Tusis</i>	175
<i>Toxicum unde dictum</i>	359	<i>Tusim continuam pastillus curans</i>	178
<i>Toxici poti nota</i> ibid. <i>Remedia ibidem</i>		<i>Tusti in febribus quomodo occurrendum</i>	97
<i>Trachoma quid, eius curatio</i>	150	<i>Tusti grandines & calculi ex petore educti</i>	175
<i>Tragacantha</i>	547	<i>Tusilago</i>	483
<i>Tragium</i>	ibid.	<i>Tusicula puerorum curatio</i>	4
<i>Tragoriganum</i>	ibidem	<i>Tylosis</i>	150
<i>Tragostodes</i>	ibidem		V
<i>Tragus frumentaceus</i>	ibid.	<i>Vaccinum lac</i>	484
<i>Terebinthus</i>	545	<i>Valetudini tuenda summum otium maxime obest</i>	40
<i>Tremoris origo</i>	144	<i>Varices</i>	409
<i>Triblium</i>	658	<i>Varicosus varix</i>	ibid.
<i>Tribolos</i>	547	<i>Vari quid & quomodo curantur</i>	168
<i>Tribulus</i>	ibid.	<i>Vasa quomodo diuidantur & quibus</i>	565
<i>Triches</i>	548	<i>Vasorum adustio quomodo administranda</i>	366
<i>Trixiacip quæ curent</i>	151	<i>Vena sectio quomodo administranda</i>	391. & deinceps
<i>Trichismus</i>	434	<i>Venena</i>	347
<i>Trifolium</i>	537	<i>Venenorum simplicium enumeratio</i>	351
<i>Trigle</i>	547		110
<i>Trigonus pastillus</i>	585	<i>Venter</i> 507. <i>Mergi</i> ibid. <i>Gallinarum</i>	
<i>Triorchis</i>	528		
<i>Triphyllon</i>	537		

INDEX.

rum ventris interior membrana	tio	ibidem
ibid. Palumbi ibidem. Musſele	Vesica morbos quæ signa præcedans	
ibidem	55	
Ventriculi affectus curantia	191	Vesica morborum signis neglectis
Ventris morborum signis apparen-		quæ agnitudines sequantur ibid.
tibus quid faciendum	54	Vesica resolutio
Venter quomodo emolliendus	56	213
Ventriculus animalium	46	Vesica resolutionē comitantia ibid.
Ventriculi temperatura notæ	32	471
Ventriculi status unde generentur,		Vestis attrita fragmentum
et quomodo curentur	195	535
Ventriculi intemperies quomodo cor-		Victus nauigantium
rigantur	37	26
Veneris ardorem obtundit ruta	16	Victus ratio omnium ætatum 6.
Veneris commoda	ibid.	et deinceps
Veneris impotentia 231. causæ ibi-		Victus ratio infantum
dem. Curatio	ibid.	ibid.
Veratrum	425	Victus ratio in laboribus vitam a-
Veratri albi assumpti noxæ quomo-		gentium
do curandæ	362	25
Veratrum quibus conueniat	557	Victus ratio senum 12. et sequen-
Veratrum quomodo exhibeatur	568	tibus
Verbascum	551	Victus ratio quolibet anni tempore
Verbenaca	531	quæ seruanda
Vergiliarum exortus quid efficiat		24
in hominibus	56	Vigiliæ quomodo arceantur
Veri quæ victus ratio cōueniat	24	52
Vermes terrent	486	Vigiliarum variæ causæ
Vertebrarum contusionis, et fractu-		ibid.
re notæ, et curatio	444	Vigilijs in febribus quomodo resi-
Vertiginis curatio	128	stendum 92. et sequentibus
Verruca quid 428. unde sic nomi-		Vinum album
netur ibid. Curatio	ibid.	51
Verruca pensilis	233	Vinum dulce
Vesicæ affectus quomodo dignoscen-		50
di, et curandi	207	Vinum meracioris copiosi assumpti
Vesica calculi signa	404	remedia
Vesica clistere	403	362
Vesica exulcerata signa 410. Cura-		Vini moderate sumpti commoda
		51
		Vini immoderati sumpti incommo-
		da
		ibid.
		Vinum omne nutrit
		50
		Vini potio in febribus quando con-
		ueniat
		78
		Vinum purgans in hydropicis
		522
		Vinum rubens et crassum
		50
		Vini vires
		ibid.
		Viola
		498
		Viola alba
		515
		Violaceum oleum
		640
		Vipera
		424
		Vipe


INDEX.


<i>Viperatum maris tū fœmina mor</i>	<i>Vmbilici prominentis curatio</i>	226	
<i>sus notæ 343. Curatio</i>	<i>ibid.</i>	658	
<i>Vires quæ dissoluant</i>	72	<i>Vnedon</i>	492
<i>Viride emplastr. Macherionis</i>	622	<i>Vnguenta quomodo coquan.</i>	610
<i>Virulentorum precautiones</i>	334	<i>Vnguentum Rosini ad tremuloice</i>	
<i>Viscum</i>	498	<i>lebratum</i>	636
<i>Vitis nigra 475. Sativa</i>	<i>ibidem</i>	<i>Vngues</i>	50
<i>Vitrum</i>	549	<i>Vngues qui laborauerint, vt absce-</i>	
<i>Vituli marini</i>	50	<i>dant</i>	271
<i>Vlcus simplex quid 307. Quo-</i>		<i>Vngu oculorum, quid eiusq; cura-</i>	
<i>do curandum</i>	<i>ibid.</i>	<i>tio</i>	154
<i>Vlcus cauum quomodo implendum</i>		<i>Vnguium petrygiū quid 426. caus</i>	
309		<i>se ibidem. Curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vlcera sordida quomodo purganda</i>		<i>Vngues cruenti quomodo curand.</i>	
310			271
<i>Vlceri cicatrix quomodo inducen-</i>		<i>Vngues contusi quomodo curandi</i>	
<i>da</i>	313	<i>ibidem</i>	
<i>Vlcera carcinode quomodo curen-</i>		<i>Vnguium reduuia quid 270. cu-</i>	
<i>tur</i>	300	<i>ratio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vlcera chyronia quomodo curanda</i>		<i>Voci exercitatio qualis esse debeat,</i>	
299		<i>et quæ eius sint commoda</i>	9
<i>Vlcera capitis manantia vnde fi-</i>		<i>Volatilia</i>	46
<i>ant 113. quomodo curentur. ibid.</i>		<i>Vomenti quid obseruandum</i>	19
et 114		<i>Vomitum quomodo prouocandus</i>	54
<i>Vlcerum vermes quomodo arcendi</i>		<i>Vomitu qui vii debeant, et quomo-</i>	
310		<i>do 527. et sequentibus</i>	
<i>Vlcera oculorum eorumq; curatio</i>		<i>Vomitum quæ comod. præstet</i>	19
152		<i>Vomitioni bilis quomodo occurren-</i>	
<i>Vlcera cacoethe</i>	315	<i>dum</i>	102
<i>Vlcera chironia, telephia</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vranium</i>	606
<i>Vlcera vetera quomodo cur.</i>	299	<i>Vreteres</i>	210
<i>Vlcera articulorum quomodo cu-</i>		<i>Vrina 529. Humana ibid. Pueri</i>	
<i>rentur</i>	320	<i>venerem non experti ibid. Mulo-</i>	
<i>Vlcerum disruptorum curatio</i>	319	<i>rum ibid. Caprarum, Chamelo-</i>	
<i>Vlcus circa os sacrum vnde proue-</i>		<i>rum</i>	<i>ibid.</i>
<i>niat</i>	105	<i>Vrinam cientia</i>	55
<i>Vlophonos</i>	357	<i>Vrinarum color aquosus, rufus, et</i>	
<i>Vmbilico illita quæ purgent</i>	566	<i>biliosus, mediocriter pallidus quid</i>	
<i>Vmbilici prominentis causse</i>	397.	<i>significet</i>	7
<i>notæ ibid. Curat.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vrinæ difficultas quomodo cu-</i>	213
		<i>Vrin</i>	


I N D E X.

Urine difficultatē indicantia ibid.		Vua passa	480
Urine incontinentia unde oriatur		Vulpes	474
214		Vulua vide Muliebres loci	
Urinam quæ moueant	19	Vulua abscessus quomodo manu cu-	416
Urinam mouentia	220	randus	48
Urinarum notæ	75	Vulua animalium	
Urine retentionis causæ	403	Vulua fluor 239. Eius species, &	
Vesurum sanguis	471	causæ ibid. notæ ibid. Curatio ibi-	
Vitica	ibid.	dem	
Vteri abscessus notæ 242. Curatio		Vulua ostij phymus quomodo cure-	
ibidem		tur	416
Vteri affectus	235		
Vteri callus quomodo curand.	253	X	
Vteri cancrorum species 244. notæ		Anthion	525
ibid. Curatio	ibid.	Xanthion medicamentum	594
Vteri clausuræ, quam phinon appel-		Xerophthalmia quid eiusq; cura-	
lant causæ 250. Curatio	ibid.	tio	148
Vteri duricies quomodo curanda		Xestēs	658
245		Xiphion	525
Vteri hamorrhoides quomodo de-		Xyris	ibidem
prehendendæ 253. Curatio ibidem		Xyraphium medicamentum aduer-	
Vteri inflammationis causæ 240.		sus capitis & menti ficiosa exan-	
Signa ibid. Curatio	ibid.	themata	114
Vteri fluor, vide Muliebris fluor.		Xyris	525
Vteri à naturali sede declinantis		Xyster	605
curatio	241		
Vteri mola	246	Z	
Vteri vlcera pascendo serpētia quo-		Armala	524
modo curanda	243	Zea	494
Vua 381. Curatio	ibid.	Zingiber	ibid.
Vua	44	Zomos	495
Vua inflammatio quomodo curan-		Zopyrios medicamentum	580
da	172	Zosimi unguentum	636
		Zyme	495
		Zythus	ibid.

FINIS INDICIS.







Summa brevis viriditatis Lulii et prima pars
de re medica

177